

Ueber den griechischen *Trichophorus Schaumi* Candèze.

Von

Dr. G. Kraatz.

Herr Dr. Candèze hat diese Art, welche weder in dem Verzeichniß der Coleopteren Griechenlands und Cretas von Herrn v. Oertzen (Berl. Ent. Zeitschr. 1886, Heft II, p. 189 u. flg.), noch in dem Catalogus Col. Eur. et Cauc. von Dr. L. v. Heyden, Reitter und J. Weise (Berol. 1883), noch endlich im neuesten Catal. des Col. de l'Ancien-Monde von Abbé de Marseul (Paris 1889) aufgeführt ist, im Jahre 1881 in seinen *Élatérides nouveaux* III, p. 105 als *Ludius Schaumi* nach einem griechischen Ex. beschrieben, welches früher Schaum gehörte. Ich besitze 3 Ex. derselben, welche unzweifelhaft zur Gattung *Trichophorus* Muls. gehören und in der Gesamtgestalt dem sicilianischen *Trichophorus Guillebeaui* Muls. sehr ähnlich, aber kleiner, röthlicher und glatter als diese Art sind. Diese Unterschiede giebt auch Candèze an und sie genügen vollständig, um den griechischen Käfer mit Sicherheit erkennen zu lassen. Der Umstand, daß er außer dem *Diacanthus sulcatus* die einzige europäische Art unter einigen hundert Exoten ist, hat ihn wahrscheinlich von sämtlichen Autoren übersehen lassen.

Nach meiner Ansicht ist die Gattung *Trichophorus* nicht als Untergattung von *Ludius* aufzufassen, da die habituellen Unterschiede dieser Gattungen für mich schon vollständig genügen, um die eine nicht als Untergattung der anderen zu betrachten.

In dem erwähnten Aufsatz kommen noch einige Arten vor, auf die hier aufmerksam gemacht werden mag:

*Adelocera altaica* Cand. (*Elater chrysoprasus* Herbst?) (p. 2), schmaler, der Thorax schwärzlich, die Fld. röthlich.

*Monocrepidius antennalis* Cand. (p. 52) von Cochinchina, dem *australis* verwandt, mit kräftigeren Fühlern.

*Monocrep. cryptohypnoides* Cand. (p. 57), 2 mill., von Persien.

*Betarmon anaticus* Cand. (p. 114) von As. min., flacher als *bisbimaculatus* und mit größeren Flecken.

*Athous pictus* Cand. (p. 90) vom Amur, aus der Section des *mutilatus*, *laetus*, aber heller gefärbt als dieser.