

- Digitalisierte Fassung im Format PDF -

Operis agrostographici idea seu graminum juncorum, cyperorum, cyperoidum, iisque affinium methodus.

Johann Jakob Scheuchzer

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](#) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

OPERIS
AGROSTOGRAPHICI
IDEA

Seu

**GRAMINUM, JUNCORUM,
CYPERORUM,**
Cyperoidum, iisque affinum

METHODUS

Authore

JOHANNE SCHEUCHZERO
M. D. Tigurino, Acad. Nat. Cur.
PHILIPPO.

TIGURI

Typis Bodinerianis CICCCXIX.

N 10
47

VIRO ILLUSTRISSIMO
JOHANNI PAULO
BIGNONIO
ABBATI S. QUINTINI
REGIS CHRISTIANISSIMI
CONSILIARIO ET PRÆDICA-
TORI ORDINARIO, BIBLIO-
THECÆ REGIÆ PRÆFECTO,
COMITI CONSISTORIALI.
ACADEMIARUM, QUÆ PARISIIS
SUNT, REGIARUM
PRÆSIDI DIGNISSIMO,
SUMMO MUSARUM PATRONO,
SACRAS HASCE FACIT PAGELLAS.

Devotissimus Cliens
Author.

Lectori Botanophilω S. P. D.
Author.

Ad umbilicum tandem perducti Operis Agrostographici, jam inde à multis Annis à me promissi testis, in publicam nunc lucem exit *Graminum Methodus*, Operis, quod incredibili constitit labore, sudore plurimo, portatile fidūmque compendium, uno velut obtutu sistens, difficillimam facilè *Rei* totius *Herbariæ* materiam, in ordinem quantùm fieri potuit naturalissimum, dispositam. Quid per plures hinc ab editione *Prodromi Agrostographici* Annos, in hac confusa *Graminum* mole, singularisque structuræ Regni Vegetabilis producto, fuerit præstitum, æqui judicent Botanices Amatores, & ij quibus

è meliori luto præcordia finxit Titan.

Satis erit, si eo, quo hoc opusculum luci datum Publicæ, & quo propediem opus ipsum sum editurus, animo, quod unicè rogo, sis accepturus. Is mihi scopus, ut maximis adhuc difficultatum tricis irretitam Botanicen, pro viribus juvare, labantiq; magis magisque, ob magnam Botanicorum

corum per Europam penuriam, deliqui-
umque veluti passæ rei succurrere pos-
sim. Aliorum erit, ingenti labore, magnis
sumtibus, pluriūmque Annorum tempo-
re elaboratum, multotiesque, molis adin-
star inconditæ, circumlambitum partum,
benevolentia & æquanimitate comitari.
Hoc etiam, quamvis non adeò invita pro-
gnatus sim modestia, ut meos labores alio-
rum præferre conatibus sustineam, spon-
dere meritò possum, me in tali diu desu-
dasse palæstra, quam vel pleniùs ingredi,
nendum specialiùs in ea se se exercere, vel
nulli, vel paucissimi hactenùs fuerunt ausi.
Quæ laudatissimi in Botanica scientia Viri,
hac in materia fuere moliti, aut superfi-
cilia sunt, minùsque specialiter deducta,
aut parergi in modum tractata, ita ut am-
pla ubique supersit hæsitandi materia,
præsertim si quis novus est in amplissimo
hoc Labyrintho viator. Descriptiones Gra-
minum plerorumque, adeò hactenùs con-
centratæ, breves & ut liberè dicam, adeò
prodieri imperfectæ, ut expertissimos eti-
am Botanicæ magistros, ipsaque Rei Her-
bariæ oracula teneant suspensos, nendum
in incerto. Taceo Methodicam dispositio-
nem, nullibi conspiciendam, quæ curio-
so in-

so indagatori facere possit satis. Interim eodem disposita ordine, *Graminum*, tām Indigenorum seu Helveticorum, quām Exoticorum, quæ quidem ad manus pervenire meas, aut quæ adhibita in itineribus meis solertia collegi, *Historia*, sub prælo jam sudare cepit; Junctas promitto descriptiones amplas, speciosas, ad minimas etiam spicarum panicularumve circumstantias descendentes: id, quod hac in materia desideratum hactenūs, quodque non minūs necessarium, quām in reliqua Plantarum Historia, floris, reliquarumque partium structuræ specialiūs meminisse, easque digitis veluti numerasse. Tabulas æri incisas promitto paucas, tales tamen quæ liberare Botanicæ studiosum, vel omni, vel potiori dubio possint. Interim hoc meo labore, Lector Benevole, utere, Vale & Fave.

Dabam ex Museo a. d. 4. Mart. 1719.



OPERIS AGROSTOGRAPHICI IDEA.

NOTÆ hactenùs inter Batanicos Graminum in *spicata* & *Paniculata* divisioni lumbens subscribo, utut statuere præcisos quosdam inter utraque fines, admodùm sit difficile. *Rajus* generali spicæ definitione, quid proficiui fecerit, hactenùs non video apud, *Tournefortium* altum hac de re silentium, ita ut, qui species noverit utrius generi adscriptas, nondum tamen quid spicatum, quidque sit paniculatum, ex asse noverit, ex methodo hac mea, quid sint *spicata Gramina*, & cujus naturæ, Botanophilorum magis experti facile dijudicabunt: ac proin etiam quid *spica Simplex* quidque sit esse *polystachion*, aut *spicâ Multiplici* præditum esse.

Nec etiam usitatum hactenùs *Rajo*, & *asse-clis suis* morem infringere commodum duxi, qui is est, ut spicata gramina nomen fortiantur à sua quam habent quoad spicam cum *Cerealibus* aut etiam rerum aliarum vulgò notarum, similitudine, suntque.

*Gramina Spicata, SPICA TRITICEA
Simplici.*

Hæc adeò similem cum *Tritici* speciebus obtinent spicarum structuram, ut vix ovum ovo sit similius, nec satis mirari subit, *Tournefortium*

Triticeorum Graminum species inter Loliacea locâsse, meliori quippe jure has omnes ipsi adnumerâsset Tritico, quam Gramina Panicea ipsi Panico, rationes videant Botanophili ex ipla spicarum collatione.

1. Gramen latifolium spicâ triticeâ compactâ C. B. Th. 131. Gr. Latifolium spicâ triticeâ latiore compactâ C. B. Pin. 8. Prodr. 53. Gr. repens officinarum forte, spicæ Triticeæ aliquatenus simile. I. B. II. 457.
2. Gramen Caninum arvense, sive Gramen Dioscoridis C. B. Pin. 1. Gr. Caninum arvense seu primum Dioscoridis & officinarum C. B. Th. 7. Gr. Loliaceum Radice repente seu Gramen officinum. Inst. 516.
3. Gramen Caninum maritimum spicâ Triticeâ nostras. Raij Hist. 1256. Gr. Loliaceum Radice repente maritimum. Inst. 516.
4. Gramen Tritici spicâ muticæ simili angustifolium. C. B. Pin. 8. Th. 132. Gr. arundinaccum spicâ Triticeâ. C. B. Phytopin.
5. Gramen angustifolium spicâ Triticeâ compacta. C. B. Pin. 9. Prod. 56. Th. 131.
6. Graminis spicâ Triticeâ repentis vulgaris varietas cum spica aristata, Ray. Syn. 247. Gr. Loliaceum, radice repente, sive Gramen officinarum aristis longioribus donatum Inst. 516.
7. Gramen spicâ Triticeâ compactâ, hirsutum, aristatum. Nob.

Gramina spicata, SPICA TRITICEA
SPURIA, Simplici.

Horum Locustæ, seu uni axeos denticulo innati glumarum folliculorumve fasciculi, eodem modo ac in Triticeis inter se junguntur: Locustarum autem calyx biglumis, glumis summo truncatis in aliquot aristas abeuntibus: cuius etiam sunt naturæ follicularum glumæ exteriores.

Gramen spicatum durioribus & crassioribus 1.
 Locustis spicâ brevi. *Inst.* 519. Festuca altera
 capitulis duris *C. B.* *Pin.* 10. *Th.* 151.

Gramen spicatum durioribus & crassioribus 2.
 locustis, spicâ longissimâ. *Inst.* 519. Festuca altera capitulis duris, spicâ triunciali *C. B.* *Pin.* 10. Festuca altera capitulis duris *C. B.* *Th.* 151. Festuca altera capitulis duris spicâ longiore. *Bot. Monsp. App. alt.*

Gramina spicata SPICA HORDEACEA
Simplici.

Ray & Tournefortii motus auctoritate, spicam horum graminum vocaveram antehac, *Secalinam*, qua cum affinitatem nullam prorsus habet, convenit autem exesse structura ejus, *Hordei polystichi verni C. B.* spicæ, prout id ad examen revocanti sine ulterioribus verborum ambagibus, ad oculum patebit, suntque.

I. Tribus folliculis unis capi denticulo innatis, Locustam componentibus.

1. Gramen Hordeaceum minus & vulgare. C. B. Pin. 9. Th. 134. Gramen spicatum vulgare secalinum Inst. 517. Hordeum murinum IB. II. 431. Hordeum spontaneum spurium, Holcus Plinii, Anguillaræ. Lob. Ic. 30. Gr. Secalinum & Secale sylvestre Johnsoni apud Gerardum. Ray Hist. 1258. ab hoc solâ magnitudine sesqui cubitali & bicubitali differt Gramen Hordeaceum montanum *five majus* C. B. Th. 135. quodque in Itin. Alp. 1709. descripsi sub titulo *Graminis Hordeacei alpini lanuginosi, glumarum marginibus ciliaribus albis.*
2. Gramen Hordeaceum montanum spicâ stri-gosiori, breviùs aristata. Agrost. Prodr. pag. 14. Tab. I. Gramen secalinum majus sylvaticum D. Bobart. Ray. Syn. 248. Gr. Spicatum, secalinum, spica duriore & angustiore. Inst. 518.
3. Gramen spicatum secalinum minus Inst. 518, Gramen secalinum Ger. Em. L. I. cap. 22. N. 4. Ray. Hist. 1258. Syn. 248.
4. Gramen spicatum secalinum maritimum mi-nus. Inst. 518. Gr. Secalinum palustre & mari-timum, Ray Syn. 248. Hist. Pl. 1258.
5. Gramen secalinum bulbosâ radice, seu ex Alepo Bauhini. Barrel. Ic. 112. II. Gr. bulbosum ex Alepo IB. II. 431. C. B. Theatr. 21.

2. *Duobus folliculis uni scapi denticulo innatis, Locustam componentibus.*

Gramen hordeaceum, spicâ Aristis longissimis circumvallata. Nob. Gr. Secalinum, aristis longissimis. Scherardi. 1.

Glumæ semini arctè adhærentes, legitima & 2. quasi unica *Hordei* nota essentialis si sint, non video, cur *Tournefortius* hæc etiam grama non retulerit ad *Hordei* genus.

Gramina spicata, spica simplici HORDEACEA SINGULARI.

Notæ sunt, Locustæ scapo denticulato alternatim adnatae, quarum duæ glumæ extimæ cassæ, seu calyx, apice truncato aristam emitunt, in quarum sinu folliculi biglumes aliquot alternatim scapo proprio adnati, quorum exterioris glumæ apex in aristam abit.

Gramen Hordeaceum distichon majus, ciliaribus glumis durius. *Barrel. Ic. 112. I. Gr. Creticum spicatum secalinum glumis ciliaribus. Coroll. Inst. 39.* huc etiam voco. *Gramen Hordeo disticho simile C. B. Theat. 135.* 1.

Gramina spicata, spicâ simplici SECALINA.

Notæ sunt, cuique axeos denticulo innascentes Locustæ duæ simplices biglumes nudæ, seu calyce biglumi destitutæ, eidem basi insidentes, invicem juxta positæ.

3. Gramen Creticum, spicatum, secalinum, altissimum, tuberosâ radice. *Coroll. Inst.* 39. adeoque hoc nullatenus censendum est idem cum *Gramine bulbosa ex Alepo*. *CB. & IB.*

*Gramina spicata, spicâ simplici,
LOLIACEA.*

Notæ sunt, spicæ distichæ, seu Locustis alternatim scapo denticulato ad natis duplii versu dispositis, constantes, quæ Locustæ ex uno, vel pluribus uno folliculis alternatim axi propriæ adnatis, compositæ sunt, glumarum item, vel folliculorum juncturæ non in locustarum dorso, sed ad latera existunt, neque versus scapum alterâ locustarum parte respiciunt.

1. *Gramina Loliacea, Locustis & glumis muticis in spicam longam, angustam dispositis.*

1. Gramen Loliaceum angustiore folio & spicâ. *C. B. Th.* 127. Gr. Loliaceum angustiore folio & spicâ, Φοίνιξ dioscoridis. *C. B. Pin.* 9. Phœnix Lolio similis *IB. II.* 436. spicis partialibus crebrioribus & densioribus. *Ray Hist.* 1263.

2. Gramen Loliaceum angustiore folio & spica *CB.* spicis partialibus rariüs & à se invicem remotiüs sitis. *Ray Hist.* 1263.

3. Gramen Loliaceum latifolium spicâ angustiore. *C. B. Pin.* 9. *Prodr.* 60. *Theatr.* 127.

Gramen Loliaceum radice repente , locustis 4.
teretiusculis muticis. Nob.

Graminis Loliacei angustiore folio & spicâ 5.
CB. varietas , spicâ tereti angustissimâ. Jussieu.

2. *Gramina Loliacea , spicis partialibus mu-*
ticis propè summitatem culmi , in spicam
compressam latius expansis.

Gramen Loliaceum spicâ latâ , è plurimis spi- 1.
cis dupli versu densè dispositis constante. A-
grost. prodr. p. 16. Tab. II. Gr. Loliaceum spi-
cis brevibus compressis. Bobart. Hist. Oxon. Sect.
8. Tab. 2. pag. 182. 2.

3. *Gramina Loliacea spicis partialibus in*
spicam longam dispositis Aristatis.

a. *Aristis rectis.*

Gramen Loliaceum spicâ longiore , seu Lo- 1.
lium Dioscoridis C. B. Theat. 121. Gr. Loliaceum
spicâ longiore aristas habens. C B. Pin. 9. Lolium
Gtamineum spicatum caput tentans. I B. II. 437.

b. *Aristis tortilibus geniculatis recurvis.*

Gramen Loliaceum lanuginosum , spicâ fra- 1.
gili articulata , glumis pilosis , aristatum Nob.
Gr. Loliaceum spurium hirsutum , aristis geni-
culatis maximum : Idem medium seu vulgare.
Barrel. Ic. 905. I. II.

Gramen Loliaceum lanuginosum , spicâ fra- 2.
gili articulatâ , glumis glabris , aristatum. Nob.

Graminis Loliacei angustiore folio & spicâ C.B.
varietas aristata. Jussieu.

4. *Gramina Loliacea, spicis partialibus in
spicam longam dispositis teretiusculis,
CORNICULATA dicta.*

1. Gramen Loliaceum corniculatum. *Catal. des plantes aux env. de Paris pag. 92.* Gr. Loliaceum corniculatum spicis villosis. *Inst. 516.*
2. Gramen Loliaceum corniculatum latifolium, spicis glabris. *Nob.* Gr. avenaceum dumetorum spicatum *Ray Hist. 1262.* Gr. Loliaceum corniculatum spicis glabris. *Inst. 516.* Festuca dumetorum *C. B. Th. 148.*
3. Gramen Loliaceum corniculatum villosum molliusculum *Nob.* An? Festuca Graminea nemoralis latifolia mollis. *C.B. Th. 144?*
4. Gramen Loliaceum corniculatum, montanum, spicâ partiali subhirsutâ fragili. *Nob.*
5. Gramen Loliaceum corniculatum, juncifolium, veluti frutescens glabrum Orientale. *Nob.* An. Gr. Loliaceum corniculatum veluti fruticosum foliis angustissimis. *Inst. 517?*
5. *Gramina Loliacea spicis compositis è folliculis brevibus biglumibus, alternatim axi denticulatæ affixis muticis.*
1. Gramen minimum paniculis elegantissimis *C. B.*

C. B. Pin. 2. Theat. 26. Gr. minimum *IB. II. 465.*
Dalechampii. *Hist. Lugd.* 425.

6. *Gramina Loliacea, spicis compositis è Locustis longis, angustissimis, alternatim axi denticulatæ affixis muticis.*

Gramen exile arundinaceum minimum, acuminata reflexo. *Bocc. Mus. Tab. 57.* Gr. junceum nodosum minimum capillare. *Barrel. Ic. 117. I.*

*Gramina Spicata, spicâ simplici
LOLIACEA SPURIA.*

Horum Graminum scapi sinuosi, articulosi & denticulati, denticulis alternatim innascuntur Locustæ, quæ componuntur è duabus glumis calycis vice fungentibus, in locustarum dorso juncturæ rimam habentibus, in quarum sinu folliculus biglumis.

Gramen Loliaceum maritimum scorpioides. *I.*
Scherardi. Gramen spicis articulatis Morisoni varietas, circa Monspelium nascens. *Jussieu.* Gr. Loliaceum junceum majus. *Barrel. Ic. 5.* Sed ramosius est quam figura exhibet.

Gramen Loliaceum spicis articulosis erectis *2.*
Inst. 517. Gramen parvum spicarum loco ferens caules, erumpentibus alternatim acutis glumis veluti dentatis. *Catal. Lel. Triumfett. ap. Fratrem p. 64.* Gr. Loliaceum minus. *Barrel. Ic. 6.* Gr. Loliaceum maritimum spicis articulatis. *Moris.* Gr. parvum minimum, spicâ Loliaceâ *Ger. Emac.*

L. I. cap. 22. pl. 8. Gr. myuros erectum minimum arundinaceum Bocc. Mus. Tab. 59. Phœnix acerosa aculeata Parkins. Theat. 1146.

Gramina spicata, PANICEA dicta.

Hæc partim *Monostachia* sunt, partim *polystachia*, Eorum spicæ compositæ sunt ex locustellis brevibus, biglumibus, quarum quævis sita est in sinu glumæ brevissimæ, exiguae, calycis vice fungente, semen plerumque subrotundum altera parte planum, alterâ convexum.

1. *Gramina Panicea, Locustis simplicibus Muticis, nascentibus in sinu filamentorum aristis similiūm, spicis simplicibus.*

1. Gramen Paniceum, seu panicum sylvestre simplici spicâ C. B. an Panicum vulgare spicâ simplici & molliori Inst. 515. Gr. Paniceum spicâ simplici lævi. Ray Hist. 1261.

Gramen Paniceum spicâ asperâ C. B. Th. 139.
2. Gramen Paniceum, spicâ simplici ελυμάγροσις. C. B. Pin. 8. Panicum vulgare spicâ simplici & asperâ Inst. 515.. Panicum sylvestre dictum & dens Canis primus IB. II. 443.

2. *Gramina Panicea, Locustellarum glumâ alterutrâ, nonnunquam & utraque in aristam terminatâ, Polystachia.*

Gramen Paniceum spica aristis longis armata C. B. Pin. 8. Th. 137. Panicum vulgare spica mul-

multiplici, longis aristis circumvallata. *Inst.*
§ 15.

Gtamen Paniceum spica divisa *C. B. Pin.* 8. 2.
Th. 136. *Panicum vulgare* spica multiplici asper-
riusculâ. *Inst.* § 15. Graminis genus, quibus-
dam Gallis Dens Canis I I. sive *Panicum sylvestre*
spica divisa. *IB. II.* 434.

c. *Gramina Panicea, Locustellarum glumis
muticis, Polystachia.*

Panicum Madraspatanum minus spicâ den- 1.
siore multiplici. *S. B.* 7. 254.

Gramen Paniceum minus Indiæ utriusque. 2.
Petiv.

Gramen paniceum multiplici spicâ Madraspa- 3.
tanum. *Plukn. Phytogr. Tab.* 191. *Fig.* 1.

*Gramina spicâ simplici, PHALAROI-
DEA dicta.*

Locustæ harum spicarum densè congestæ &
imbricatim positæ, constantes ex calyce biglumi-
amplio compresso, ejus glumis ita in Locusta-
rum plano junctis, ut junctura mediæ Locusta-
rum latitudini sit perpendicularis', in quarum
sinu folliculus biglumis aut etiam plurium glu-
marum, semen oblongum accuminatum splen-
dens.

1. *Calyce rotundatum Locustæ ambitum effi-
ciente, glumis folliculi muticis.*

Pha-

1. Phalaris major semine albo C.B. Pin. 28.
Phalaris IB. II. 442. Gr. spicatum semine mi-
liaceo albo. Inst. 518.
2. Gramen bulbosum albo semine perenne Par-
kins. Th. 1163.
2. *Calicis glumis ad basin tumidis, sinuo-*
simumque Locustæ ambitum efficientibus,
folliculo aristato.

1. Gramen pratense spicâ purpureâ ex utriculo
prodeunte, vel Gramen folio spicam amplexan-
te C.B. Pin. 3. Theatr. 44. Gramen spicam folio
amplectens. IB. II. 469. Gr. spicatum praten-
se, spicâ ex utriculo prodeunte. Inst. 519.

Gramina spicâ simplici, ALOPECUROL-
DEA dicta.

Horum nota est, lanugo mollissima delicatissima, & veluti sericea, in qua Locustæ veluti re-
conditæ latent.

1. *Locustis longis, augustis, biglumibus, mu-*
ticis, in filamentosa sericeaque lanugi-
ne latentibus.

1. Gramen tomentosum Creticum spicatum spi-
câ purpureâ. Inst. Coroll. subhoc nomine D. She-
rardus Smyrna misit, est autem potius. Gramen
tomentosum spicatum CB. Pin. 4. Gr. alope-
curos spicâ longâ tomentosâ candicante IB. II.
474.

2. Locu-

2. *Locustis oblongis angustis biglumibus Aristatis in fericeapennataque lanugine latentibus.*

Gramen spicatum tomentosum longissimis 1.
aristis donatum. *Inst.* 517. Gr. Alopecurum molle spicâ incanâ obtusâ majus. *Barrel. Ic.* II. 116. *idem* spicâ incanâ acutâ minore *Barrel. Ic.* 116. I. Gr. Alopecuros spicâ rotundiore *C. B. Pin.* 4. Gr. Alopecuros altera *Lobelii. IB. II.* 475.

*Gramina spicâ simplici TYPHINA, vel
TYPHOIDEA dicta.*

Spica horum cylindracea teres, ex locustis densè congestis composita; Earum calyx componitur è duabus glumis compressis obtusis, eodem modo ac in phalaroideis, junctis, sed apice suo extimo in aristam perbrevem, vel apicem aristiformem elongatis, quo fit ut Locustellæ bicornes efficiantur: in calycis hujus sinnu folliculus biglumis membranaceus.

1. *Typhoidea spicâ tereti cylindracea.*

Gramen Typhoides maximum spicâ longissimâ. *C. B. Th.* 49. Gr. cum cauda muris majoris longâ majus. *IB. II.* 474.

Gramen Typhoides asperum primum. *C. B. Th.* 51. Gramen cum cauda muris minus *IB. II.* 471.

Gramen Typhoides asperum alterum *C. B.* 3.
Th. 52.

Tb. 52. *Gr.* nodosum spica parva *CB.* *Th.* 20.
Gr. cum parva cauda muris, radice nodosa re-
 pens. *IB.* 472.

4. *Gramen Typhoides* spicâ angustiore *CB.* *Brey-*
nii. quod *Bauhinianum* propriè non est.
5. *Gramen Typhinum* maritimum minus. *Ray*
Hist. 1267. *Syn.* 252. *Gr.* spicatum maritimum
 minimum spicâ cylindraceâ. *Inst.* 520.
6. *Gramen Typhoides alpinum* spicâ brevi densâ
 & veluti villosâ. *Agrost.* *Prodr.* pag. 17. *Tab.* III.
7. *Gramen Typhoides alpinum*, spicâ graciliori
 delicatâ & villosâ. *II. Alp.* 1709.

2. *Typhoidea*, spica foliacea proliferâ.

1. *Gramen Typhoides latifolium*, spicâ folia-
 ceâ proliferâ longissimâ. *Nob.*
2. *Gramen Typhoides*, spicâ purpurascente fo-
 liacea. *Breynji.*

Gramina spicâ simplici, *MTO SUROI-* *DEA* dicta.

Horum spica tenuis valde & gracilis, Locustæ
 densissimæ in spicam congestæ, non bitornes:
 constant è calyce biglumi mutico, claudente
 folliculum aut uniglumen, aut biglumein, ejus-
 dem cum calyce circiter longitudinis.

1. *Folliculo uniglumi aristato*, Locustis duas
 trésque lineas longis.

Gramen cum cauda muris purpurascente *IB.* 1.
II. 473. Gramen *Typhoides* spica angustiore. *C B.*
Th. 53. Gr. *typhinum plantaginis* spica, aristis
geniculatis. *Barrel. Ic.* 699. *II.* Gr. *spicatum* spi-
câ cylindraceâ, tenuissimâ longiore. *Inst.* 520.
Idem breviori *Ibid.*

Gramen *Myurum* spicâ molli candicante vil- 2.
losâ. *Nob.* Gramen *Typhoides* molle *C B.* *Brey-*
nio, quod tamen *Bauhinianum* non est.

2. *Folliculo uniglumi mutico, locusta brevi,*
subrotundâ, parvâ.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. 1.
C B. Theat. 41. *Pin.* 3. Gramen cum parva cauda
muris radice non nodosâ repens. *IB. II.* 472. Gr.
fluviatile album Tabern. *Ic.* 216. Gr. *spicatum*
aquaticum spicâ cylindraceâ brevi. *Inst.* 520.

3. *Folliculo biglumi mutico.*

Gramen *Typhinum Orientale ramosum.* 1.
Scherardi.

Gramina spicâ simplici ECHINATA, seu
SPINOSA.

Harum spicarum Locustæ processibus & laci-
niis rigidis & pungentibus donatæ, veluti spi-
nis horridæ sunt.

1. *Locustis biglumibus pluribus unâ, in eo-*
dem calyce biglumi contentis, glumis sum-
mo sui in aliquot lacinias spinæ for-
mes divisis.

Gra-

1. Gramen spicâ subrotunda Echinatâ vel gramen Echinato capitulo C B. Pin. 3. Theat. 107. Gr. Echinatum Tribuloides Column. p. 1. 338. Gr. minimum spicâ globosâ Echinatâ. Barret. Ic. 28. I.
2. Spicâ oblongâ laxâ, Locustis compositis è pluribus folliculis oblongis, biglumibus, quorum glumæ exteriores crassæ & spinulis horridæ sunt.
1. Gramen Caninum maritimum spicâ echinatâ CB. Pin. 2. Th. 16. Gr. Caninum maritimum asperum CB. Prodr. 2. Gr. parvum echinatum. IB. II. 467. Gr. Spicatum Locustis echinatis. Inst. 519.
3. Spicâ oblongâ laxâ, Locustis compositis ex aliquot foliolis laciniatis, & spinulis horridis, calycis vice fungentibus, & in sinu suo continentibus, Locustas aliquot compositas conglomeratas.
1. Gramen Locustis tumidioribus echinatis. Nob. Gramina spicâ simplici, CRISTATA dicta.
 Hujus generis sunt omnia illa Gramina, quorum Locustæ aut earum fasciculi, uni alicui ramulo insidentes, uno duobus, aut pluribus foliolis costatis teguntur; Suntque hæcce foliola nihil aliud quam glumæ in laciniis angustas mucronatas, vel etiam aristâ terminatas, alternatim scapo angusto medio ceu costæ adnatas

divisæ, unâ impari extimum scapum terminante, ita ut foliola pennata, aut costata vel cristata dici hæ glumæ possint.

1. *Foliolis pennatis muticis, locustas breviter aristatas in spicam angustam, turbinatam, heteromallam dispositas, tegentibus.*

Gramen pratense Cristatum, seu spica cristata lævi C.B. Pin. 3. Th. 42. Gramen Cristatum. IB. II. 468. Gr. Typhinum plantaginis spica, glumis digitatis heteromallon majus. Barrel. Ic. 27. I.

2. *Foliolis pennatis, aristatis, tegentibus locustas in aristam longiorem desinentes & in spicam heteromallam dispositas.*

Gramen Alopecuroides spica aspera CB. Plin. I. 4. Th. 58. Gr. cum cauda Leporis aspera, sive spica murina IB. II. 473. Gr. Alopecurum spica aspera. Barrel. Ic. 123. II.

Gramen Cristatum spica heteromalla longiori 2.
Aritata, Nob. Graminis Alopecuroidis spica aspera C.B. varietas major.

Gramina spica simplici, ANOMALA.

Sive

Quorum spica cum Cerealibus, aut rebus aliis vulgo notis comparari, atque ab iis sortiri nomen nequit.

I. *Spica composita* è *Locustis pluribus muticis*, *uni ramulo brevissimo*, *aut pedicello insidentibus*, *compositis* è *calyce bi- aut triglumi mutico*, *in cuius sinu alternatim siti duo tresque folliculi biglumes mutici*.

I. Gramen glumis variis C B. Th. 158. Gr. Ver-sicolor IB. II. 466. An. Gr. pumilum spicatum Anglicum, amethystinis splendentibus glumis. Plukn. Almag. Bot? Gr. montanum spica crassiore purpuro cœrulea brevi Ray Syn. 253.

2. *Spica composita* è *Locustis brevibus densissimè congestis*, *constantibus* è *calyce bi-glumi mutico*, *in cuius sinu folliculus biglumis muticus*, *claudens semen oblongum*.

I. Gramen album capitulo aculeatis Italicum. C B. Th. 108. Gramen aculeatum Matthioli.

3. *Spica composita* è *Locustis parvis brevibus densissimè congestis*, *constantibus ex aliquot folliculis aristatis*, *alternatim in calyce biglumi aristato sitis*.

2. Gramen Alopecuroides Madraspatanum, spica quasi geniculata molli. Plukn. Phytogr. Tab. 190. Fig. 6. Petiv. Mus.

4. *Spica composita* è *Locustis in spicam con-gestis*

*gestis, pluribus uni brevissimo ramulo insiden-
tibus, compositis è calyce biglumi, clauden-
te folliculum biglumem, cuius utraque
gluma aristam nunc longiorem nunc
breviorem emittit.*

Gramen spicatum pratense, spica flavescente 1.
C. B. Pin. 3. Th. 43. Gr. Anthoxanthon spicatum
IB. II. 466. Inst. 528. Gr. Anthoxanthon Da-
lechampii. Hist. Lugd. 426.

Gramen montanum odoratum spicatum. *Flor.* 2.
Pruss. Gr. arvense odoratum spicatum. Gr. ere-
ctum pomum & Melilotum redolens, panicula
Cupressina. *Bocc. Mus.* pag. 67.

5. *Spica angustissima heteromalla, compo-
sita è loculis nudis biglumibus angustis,
uno versu dispositis, aristatis.*

Gramen sparteum juncifolium C. B. Pin. 5. 1.
Th. 69. Spartum parvum Lobelio. IB. II. 513.

6. *Spica angustissima longa, composita ex
Loculis avenaceis, circumquaque axi ad-
natis, laxè sitis, nudis, biglumibus,
utraque gluma aristata.*

Alopecuros malabrica foliis undulatis, spicâ 1.
prætenui. S. B. 7. 258.

7. *Spica angusta, composita ex Loculis di-
versæ structuræ mixtim axi denticula-
tæ alternatim adnatis.*

I. *Ægilops Madraspatana*, glumis pilosis aristatis S.B.7:283. quædam Locustarum, calyce gaudent ex unica gluma mutica constante, duriuscula longiusculis pilis villosa, claudente folliculum biglumem muticum membranaceum tenuem, cuius major gluma aliquot etiam pilis donata; aliæ autem Locustæ, singulæ, unicus veluti folliculus aristatus esse videntur, arista autem hæc nihil aliud est, quam folliculi convoluti gluma altera in aristam abiens tortilem & recurvam.

*Gramina spicata POLYSTACHIA,
DACTYLOIDEA dicta.*

Notæ genericæ sunt, spicæ unâ plures in summo culmorum aut ramulorum seu pediculorum existentes, longæ angustæ, digitorum more expansæ, constantes è scapo recto non ramoso, cui adnascuntur locustæ; quibus notis præcipue à paniculatis, reliquisque spicatis distinguuntur.

I. *Spicis compositis* è Locustis duabus tribusque simplicibus, uni scapi denticulo insidentibus, quarum una nulli, altera, aut due reliquæ, brevi pediculo insident, quarumque illa, quæ nulli pediculo insidet, aristata est, reliquæ muticæ, compositæ è calyce biglumi aut unglumi longiusculo mutico, claudente folliculum biglumem subtilem membranaceum: Folliculis in villosa lanugine sitis,

Gra-

Gramen Dactylon spicis villosis C. B. Th. 116. 1.
Gr. Dactylon angustifolium spicis villosis. C. B.
Pin. 8. Gramen digitatum hirsutum *IB. II.* 445.
Ischæmum *II. Tabern. Ic.* 222. Gr. Dactylon spi-
carum aristis geniculatis. *Barrel. Ic.* 753. II.

Gramen Dactylon spica gemina *Inst.* 521. Fe-
stuca junceo folio spica gemina *C. B. Pin.* 9. *Prodr.*
19. *Theat.* 145. *IB. II.* 445. Gramen bicorne sive
Distachiophorum. *Bocc.* 20.

Schoenanthus Madraspatanus panicula ma- 3.
jore, spicis villosis geminis, an Kodipullu *Hort.*
Malab. V. 12. *Tab.* 57. pag: 107.

Schoenanthus Madraspatanus panicula mino- 4.
re spicis villosis geminis, an ? *Plukn. Phyt. Tab.*
119. Fig. 2.

2. *Spicis constantibus è Locustis compositis,*
seu pluribus uno folliculis in calyce biglu-
mi mutico contentis, aristatis, in spicas
beteromallas dispositis.

Gramen Dactylon Madraspatanum spicis pi- 5.
losis. *Mus. Petiv.*

3. *Spicis compositis è Locustis Compositis*
muticis, uno versu dispositis glabris, Locu-
stis duabus unicapi denticulo insidenti-
bus, quarum altera nulli, altera autem
pediculo insidet.

Gramen Dactylon Arundinaceum, locustis
B 3 muti- 1.

muticis majoribus, spicis articulatis. Nob. Gr. erectum ramosum arundinaceum myuros, Scherrardi.

4. *Spicis compositis è Locustis simplicibus muticis, Locustis duabus unis capi denticulo insidentibus, quarum altera nulli, altera autem brevi pediculo insidet.*

1. Gramen Dactylon folio latiore C. B. Pin. 8. Th. 114. Inst. 520. Graminis genus, dens canis III. vel primum Sancti Galli crus. I B. II 444. Ischænum, Gramen sanguinarium I. Tabern. Ic. 222. ab hoc, ut fatetur C. Bauhinus in Theatro. Gramen Dactylon esculentum. C. B. nil nisi cultura differt.

2. Gramen Madraspatanum majus, cuius Locustæ spinulis eleganter armatæ sunt, an Tsiama-Pullu, Hort. Malab. Vol. 12. Tab. 41. pag. 75.

5. *Spicis compositis è Locustis simplicibus brevibus, muticis, uno versu dispositis glabris.*

1. Gramen Dactylon radice repente, sive officinarum. Inst. 520. Gr. Dactylon folio arundinaceo majus C B. Theat. 111. Gr. Dactylon folio arundinaceo, majus, aculeatum fortè Plinio C B. Pin. 7. Gr. repens cum panicula Graminis Manæ. I. B. II. 459. Gr. legitimum Clus. Hist. CCXVII. Gr. crucis, seu cruciatum tetradactylon. Barrel. Ic. 753. I.

Gramen Dactylon arundinaceum vulgatissimum majus. S.B. 7. 305. circa Madraspatan. Petiv. 2.

6. Spicis compositis è Locustis compositis, seu è duobus, tribus, quatuor aut pluribus folliculis biglumibus in calyce biglumi mutico alternatim sitis, constantibus, & spicas heteromallas efficientibus.

Gramen Dactylon Americanum minus. 1.

Gramen Dactylon Ægyptiacum C. B. Pin. 7. 2.
Theatr. 110. Gramen crucis sive Nejemelm salib.
IB. II. 460 calycis gluma alterutra in apicem recurvum aristæ formem terminatur.

Gramen Δισαχυόφορον. Column. Part. I. 339. 3.
Gramen Dactylon Madraspatanum pumilum spicis geminis crassis, an Gr. δισαχυόφορον Col. Petiv. Gramen parvum Gangeticum, spicâ gemella habitiori Pluken. Phytogr. Tab. 91. Gramen spica gemina millepedæ simili C. B. Pin. 9. Tb. 133. alterutra calycis gluma se habet ut in priore.

Gramen Dactylon Indicum esculentum, spica articulata Ambrosini. Gr. Dactylon maximum Americanum Pluken. & Catal. Hort. Reg. Paris. 4.

7. Spicis Loliaceis, seu quarum scapo denticulato alternatim adnascuntur Locustæ simplices, breves, muticæ, spicam teretiusculam componentes & myosuram.

Gramen Dactylon Madraspatnum, spicis articulatis Myosuris, locustis parvis Nob. Phœ-

nix Madraspatana , spicis plurimis è singulis
geniculis S.B. 7. 303.

8. *Spicis Loliaceis , seu quarum scapo den-
ticulato alternatim adnascuntur , Locustæ
compositæ è pluribus uno folliculis scapo
Locustæ alternatim adnatis , spica
disticha.*

1. *Gramen Dactylon pumilum Malabaricum ,
spicis Loliaceis in acutam spinam terminatis.
Nob. Spartum avenaceum pumilum Malabari-
cum. S. B. 7. 315.*

9. *Spicis Miliaceis , seu quarum scapo ad-
nascuntur Locustæ simplices , breves , subro-
tundæ & paulisper ventricosæ , semine
miliaceo , Locustis vel aristatis ,
vel muticis.*

1. *Milium Madraspatanum aristatum , foliis &
panicula villosis. Petiv. Mus.*

Gramina Polystachia DACTYLLO AF- FINIA.

1. Hæc à Dactyloideis differunt, spicis inordina-
tim scapo seu culmo adnatis & in spicam quan-
dam longam dispositis , non ramosis.

1. *Spicis Dactyloideis heteromallis similibus,
constantibus ex locustis scapo suo ex uno sal-
tem latere adnatis , compositis , seu pluri-
bus uno folliculis in calyce biglumi alter-
natim locatis.*

Gra-

Gramen Filiceum Madraspatanum spicâ te-
nuiore. SB. 7. 307.

2. *Spicis Loliaceis veluti similibus, seu con-*
stantibus è Locustis alternatim scapo adna-
tis, compositis, seu pluribus uno folliculo
in calyce biglumi alternatim sitis.

Gramen Pratense spicis multiplicibus utrius- I.
que Indiæ. Petiv.

Gramina inter spicata & Paniculata media
& veluti ANOMALA.

I. CORNUCPIOIDES.

Tubi, unus, aut uno plures, ex utriculo quodam prodeunt, principio angusti, sensim autem dilatati, cornu ad instar inflexi, in oram serratam tubæ formem dilatati, è cuius sinu prominent aliquantum Locustæ aliquot simplices, constantes è calyce biglumi mutico, in cuius sinu folliculus uniglumis, semen oblongum claudens.

Gramen Orientale vernum, in uidis proveni- I.
ens, capitulo reflexo Sherardi. Tab. Petiv.

2. *Locustis peculiaris structuræ : In quarum*
calyce uniglumi ampliusculo, folliculus conti-
netur uniglumis, in tres lacinias divisus, qua-
rum duæ tertia longiores sunt, earum altera
cuidam veluti articulo insidentem habet glu-
mam exiguum mucronatam, altera autem fol-

liculum è tribus glumis compositum, qui (ut videtur:) sterilis est: In sinu harum trium laciniarum residet folliculus è tribus glumis compositus, quarum maxima cochlearis instar excavata, in acutum mucronem terminata, è sinu suo interiori emittit aristam recurvam: reliquæ duæ glumæ oblongæ, angustæ sunt & membranaceæ.

Schoenanthus avenaceus procumbens Madraspatanus Bupleuri facie. Petiv. Mus.

GRAMINA PANICULATA.

Horum proprium est, habere comam summis culmis insidentem, ramosam, nunc laxiorem magisque sparsam, nunc contractiorem, & in densam quandam veluti spicam dispositam, quæ tamen è ramusculis constat in alios laterales subdivisis, quibus Locustæ insident, quod paniculatis graminibus proprium.

Glumarum autem seu squamarum singuli in paniculis uni pedicello insidentes fasciculi, *Locustæ* vocantur, quæ tamen duplicitis generis sunt; aliæ etenim sunt *Simplices*, *Compositæ* aliæ, omnes tamen eandem prorsùs structuram agnoscunt: commune etenim earum involucrum efficiunt glumæ communiter duæ, rarissimè plures aut pauciores, steriles & cassæ, in quarum sinu reliquæ latitant partes; Hinc etiam hæ glumæ, cum idem quod in floribus plerisque calyx, præstent officium, haud ineptè, ut credo, *Locusta-*
rum

rum calyx, dici poterunt, quod utut novum, haud tamen absolum videbitur: ubi notandum, quod & hac significatione in præcedentibus frequenter simus usi.

Simplices autem *Locustæ* sunt illæ, quarum calyx biglumis, in sinu suo continet glumas alias duas se mutuò amplexantes, & stamina floris, semenque in earum sinu contenta, tegentes, quæ *Folliculi* vel *Utriculi* nomine veniunt.

Locustæ verò *Compositæ* sunt, quarum calyx biglumis communiter, in sinu suo continet folliculos biglumes, uno plures, qui vel *eidem basi insident*, vel *alternatim* scapo, ex infimo calyce surgenti, *adnascuntur*, ita ut unius basis alterius basi altiore paulò situm obtineat.

GRAMINA PANICULATA, LOCUSTIS SIMPLICIBUS.

seu

Quarum calyx biglumis unicum Folliculum includit.

I. CALYCE BIGLUMI MUTICO, seu non ARISTATO, claudente.

A. *Folliculum biglumem muticum in pappo delitescentem, plerunque tenuem membranaceum.*

Gramen Arundinaceum, panicula molli spadicea majus C B. Th. 94. Pin. 7. Agrost. Prodr. pag. 21. Tab.

21. *Tab. V. Gramen plumosum Lobelii, spica candida & serici modo lucens. I. B. II. 476. Gr. tomentosum & acerosum, calamagrostis querundam, & vulgi Gramen plumosum. Lob. Ic. 6. Gr. dumetorum panicula acerosa, semine papposo, Ray Hist. 1287. Gr. paniculatum Arundinaceum, panicula densa spadicea. Inst. 523.*

2. *Gramen Arundinaceum, panicula molli, spadicea minus C. B. Pin. 7. Th. 95.*

3. *Gramen Arundinaceum, Paniculatum montanum, panicula spadiceo viridi, semine papposo. It. Alp. 1709.*

4. *Arundo Tyberina vulgaris D. Scherardi. Ray Hist. III. 615.*

2. *Folliculum biglumem muticum plerunque splendentem, brevi ad basin pappo hirsutum.*

Gramen aquaticum paniculatum Phalaridis
1. *semine. Inst. 523. Gr. Arundinacem acerosa gluma nostras Park. Th. 1273. Ray Hist. 1280. Gramen arundinaceum spicatum C. B. Pin. 6. Th. 94. Gr. paniculatum aquaticum latifolium C. B. Pin. 3. Theatr. 40. an & huc referendum dubito? Gramen Arundinaceum calamagrostis dictum spica multipli C. B. Pin. 6. Theat. 92.*

Gramen paniculatum aquaticum Phalaridis
2. *semine, folio variegato. Inst. 523. Gr. paniculatum, folio variegato C. B. P. Pin. 3. Theat. 37. Gr. striis pictum I. B. II. 476. Gr. sulcatum vel striatum album. Lob. Ic. 4.*

3. Caly-

3. *Calycis glumis angustis, locustellam lineam unam circiter longam efficientibus, folliculo tenui parvo, plerunque membranaceo, mutico.*

Gramen radice repente, panicula delicata spadiceo viridi. Nob. Gr. Camerarii repens IB. II. I.

458.

Gramen Caninum supinum minus. C. B. Pin. 2.
I. Th. 13. Gr. parvum repens purpurea spica IB.

II. 459.

Gramen montanum panicula spadicea delicate 3.
tiore C. B. Pin. 3. Prodr. 12. Theatr. 36. IB. II.

476.

Gramen radice repente, panicula densa spicata spadiceo viridi, locustis exiguis muticis. 4.

Nob.

Gramen Minimum palustre, panicula spadicea delicate tenui folium, semine exiguo rotundo. Nob. 5.

4. *Calycis glumis exiguis brevissimis, folliculo lineam unam vix longo mutico, locustis in ramulis densissime congestis, ut panicula è meris spicis composita videatur.*

Amourettes Madraspatana cristata major, spica longiore viscosa. S. B. 7. 302. I.

5. *Calycis glumis ampliusculis, locustellam lineam unam circiter longam efficientibus, semine miliaceo, splendente.*

Gramen

1. Gramen sylvaticum panicula miliacea sparsa
C. B. Pin. 8. Theat. 140. Gramen miliaceum Lo-
belii I B. II. 462. Miliaceum Gramen Lob. Ic. 3.
2. Gramen paniculatum alpinum latifolium, pa-
nicula miliacea sparsa. It. Alp. 1709.
6. *Calycis glumis parvis brevissimis, follicu-*
lo lineam unam circiter longo, in cuius sinu
floris stamina, seménque splendens milia-
ceum, membranula tenuissima discreta
delitescunt.
1. Milium Salavvaccense grano minore. S.B. 516.
1. s. pl. 202.
2. Milium Madraspatanum vulgare , panicula
non aristata lave. Mus. Petiv. 565.
7. *Locustis in sericea delicatáque lanugine*
delitescentibus.
1. Gramen Arundinaceum plumosum album
C. B. Prodr. 14. Theat. 95. Gr. Arundinaceum ra-
mosum , plumosum album C. B. Pin. 7. Gr. pa-
niculatum Arundinaceum ramosum panicula
densa sericea Inst. 523. Arundo farcta vallium
Ravennæ Zanoni.
2. Arundo Madraspatana , panicula sericea al-
bissima. S. B. 7. 268.
8. *Calyce biglumi mutico claudente follicu-*
lum biglumem, aliquando etiam triglu-
mem longum, muticum, ad basin brevi
pappo hirsutum. Gra-

Gramen spicatum secalinum maritimum maximum, spica longiore. *Inst.* 518. Gramen spar-
teum spicatum, foliis mucronatis longioribus, vel spica secalina. *CB. Pin.* 5. *Theatr.* 67. Spartium spicatum pungens Oceanicum. *IB. II.* 511. Spar-
tum herba III. Maritimum *Clus. Hist.* CCXXI.

**B. Calyce biglumi mutico claudente FOLLI-
CULUM BIGLUMEM ARISTATUM.**

a. Unica arista donatum.

**I. Arista prodeunte ex alterutrius glumæ
dorso propè ejusdem basin.**

Gramen parvum paniculatum alpinum, pani-
cula spadicea, aristatum, *Agrost. Prodr.* pag. 22.
Tab. IV.

Gramen paniculatum, capillaceo folio, lo-
custis parvis, spadiceo fuscis, aristatis. *Nob.*

Gramen paniculatum supinum, ad infima culorum genicula, foliorum capillarium fasci-
culis donatum. *Nob.* Gr. Caninum supinum paniculatum folio varians. *C. B. Pin.* I. *Theat.* 12. Graminis primi Dioscoridis species minima Thalij.

Gramen à Gramine pratensi spica ferè arun-
dinacea glumis parùm aristatis differens. *Breynij.*

**2. Arista prodeunte ex alterutrius folliculi
glumæ dorſi circiter medio.**

Gramen caninum vineale *C. B. Pin.* I. *Prodr.*
I. Theat. 11. *IB. II.* 458.

3. *Arista prodeunte ex alterutrius glumæ dorso, paululum infra dictæ glumæ apicem.*

1. Gramen segetum altissimum panicula sparsa.
C. B. Pin. 3. Th. 34. Gramen capillatum IB. II.
462. Gramen capillatum paniculis viridantibus & rubentibus IB. Inst. 524. malè apud Rajum. Hist. 1283. sub titulo *Graminis segetum panicula arundinacea*. C. B. occurrit.
2. Gramen arvense, paniculatum, spica interrupta. Vaillant.

4. *Arista prodeunte ex ipso alterius glumæ apice, folliculo longiori villoso.*

1. Gramen Arundinaceum, panicula densa, viridi argentea splendente aristata. It. Alp. 1709.

5. *Arista prodeunte ex ipso alterius glumæ apice, folliculo brevissimo parvo.*

1. Gramen serotinum arvense panicula contracta pyramidali. Ray Syn. 259. arvense spica laxa pyramidali. Ray Hist. 1288.

b. *Calyce biglumi Mutico claudente folliculum biglumem Aristatum, DUP LICI ARISTA DONATU M.*

1. *Panicula heteromalla, seu unoversu disposita.*

1. Gramen panicula pendula aurea C. B. Pin. 3.
Theat.

Theat. 33. Gramen aureum Dalechampii, Hist.
Lugd. Gr. Sciurum, seu Aiopecurum minus, he-
teromalla panicula. Barrel. Ic. 4. Gr. Barcinonen-
se panicula densa aurea.. Inst. 523.

*II. Calyce biglumi Aristato, claudente Folli-
colum biglumem.*

*Utraque calycis gluma in filamentum aristi-
forme terminata, gluma folliculi majore
abeunte in longissimam ac tortilem
aristam.*

a. *Nudam, sensimque attenuatam.*

Festuca junceo folio C.B. Pin. 9. 66. Prodr. Th.
145. I.B. II. 480. à qua non distingo, Festu-
cam longissimis aristis C.B. Pin. 10. Theat. 153.

Spartum spica & setulis tenuissimis, caudam
equinam æmulantibus Bocc. Mus. Tab. 97.

b. *Lanugine sericea veluti disticha pennatam.*

Gramen Spicatum aristis pennatis. Inst. 518.
Gr. Sparteum pennatum C.B. Pin. 5. Theat. 70. Gr.
pennatum, aliis spartum I.B. II. 512. spartum
Austriacum pennatum Clus. Hist. CCXXI. Gr.
sparteum pennatum majus. Barrel. Ic. 46.

2. *Utraque calycis gluma, paulò infraapicem
membranaceum, emitte aristam rectam,*

locustis parvis subtilissimis, densissimè congestis.

1. Gramen Alopecuros minus spica longiore. C. B. Pin. 4. Theat. 57. Panicum maritimum spica longiore villosa. Inst. 515. Cauda vulpis Montpelienium, Alopecuros Theophrasti, Lob. Ic. 45. Gr. Alopecuron minus, spica virescente divulsa. Barrel. Ic. 115. I.
2. Gramen Alopecurum majus, spicâ virescente divulsa, pilis longioribus. Barrel. Ic. 115. II. Alopecuros altera Anglica, maxima, paludosa, sive Gramen Alopecuroides maximum. I. B. II 474. Alopecuros altera, maxima, Anglica, Parkins, Th. 1166. Alopecuros altera maxima Anglica paludosa Gerardi. 87. Ray Catal. Engl. Hist. Pl. 1266. Synops. 183.

**GRAMINA PANICULATA,
LOCUSTIS IN EADEM PAN-
NICULA nunc simplicibus, nunc
Compositis.**

*Folliculo nunc unico nunc dupli, alternatim in caly-
ce biglumi locato, aristato, & in pappo veluti-
delitescente.*

1. Gramen palustre paniculatum minus C. B. Pin. 3. Prodr. 16. Theat. 39.

**GRAMINA PANICULATA LO-
CUSTIS COMPOSITIS**

Seu

Plures uno folliculos in calyce continentibus.

I. Locustis muticis, seu non Aristatis.

A. Folliculis in calyce biglumi mutico longiori aut ex toto latentibus, aut apicibus suis parum saltem ultra eundem producatis, alternatim sitis.

I. Densa delicataque lanugine papposa circumdati.

a. Duobus tribusque plerumque.

Arundo sativa quæ Δόναξ Dioscoridis C. B. Pin. I.
17. Theat. 271. Arundo maxima & hortensis IB. II.
486. Arundo domestica, calamus Cyprius.
Tabern. Ic. 253.

Arundo farcta Rheni Bononiensium. Zanoni. 2.

b. Folliculis quinis aut senis in calyce biglumi.

Arundo vulgaris sive Φεγγυλτης Dioscoridis. I.
C. B. Pin. 17. Arundo vulgaris C. B. Th. 269.
Arundo vulgaris palustris IB. II. 485. Hanc
in horto quodam Publico cultam vidi sub titu-
lo Graminis arundinacei ramosi plumosi albi. C. B.

Arundo media vulgaris, foliis & culmo in 2.
summo fusiforme corpus componentibus. Nob.

2. *Folliculis in calyce biglumi glabris, aut parum saltem hirsutis, duobus, tribus, quatuorve.*

a. *Panicula sparsa laxaque.*

1. Gramen Alpinum paniculatum minus, panicula spadiceo viridi elegans. *Agrost. Prodr. pag. 19. Tab. IV.*

2. Gramen paniculatum angustifolium alpinum, locustis rarioribus & angustioribus, non aristatis. *Agrost. Prodr. pag. 18. Tab. II. Gr. Nemorosum panicula laxa, radice repente. Jussieu. Gr. paniculatum sylvaticum angustifolium, geniculis nigris, panicula delicatiore minus sparsa. Breynij.*

3. Gramen cirrosa & villosa spongia ad singula genicula donatum, paniculatum alpinum *Bocconi.* Gramen alpinum, globulis ad genicula flaves centibus. *Læl. Triumfetti. à quo Bocconus, suppresso Triumfetti nomine, hoc gramen, juxta cum aliis plantis novis, accepit & publicavit.*

b. *Panicula densa spicata.*

1. Gramen spica cristata subhirsutum. *C. B. Pin. 3. 19. in Prodr. Theat. 43.*

2. Gramen pumilum, hirsutum, spica purpuro-argentea molli D. Dale. *Ray Hist. 1265. Gramen avenaceum lanuginosum angustifolium, panicula spicata, compacta, purpuro argentea, locustis non aristatis. Breynij.*

Gramen spicatum secalinum foliis angustis-
simis, brevissimis, mucronatis, glaucis, spica
divulsa. *Breynij.*

Gramen Valesianum tenuifolium, panicula 4.
spicata, viridiargentea, splendente. *Nob.*

3. *Folliculis in calyce biglumi accuminato, gla-
bris, tribus, quatuor & quinque, Locus-
tis tumidiusculis.*

Gramen Montanum avenaceum, locustis mu- 1.
ticis tumentibus pilosum *It.* *Alp.* 1709. Gr.
avenaceum parvum procumbens, paniculison
aristatis. *Ray Hist.* 1288. *Synop.* 266.

4. *Locustis tumidiusculis, tribus quatuorve
folliculis constantibus, quorum supremus
truncatus est, è glumis compositus.*

a. *Folliculis glabris.*

Gramen Avenaceum, locustis rubris, monta- 1.
num. *C. B. Pin.* 10. *Prodr.* 20. Gr. Montanum
avenaceum, Locustis rubris. *C. B. Theat.* 154. *Ray*
Hist. 1289. Gramen Locustis rubris *IB. II.* 434.

Gramen avenaceum locustis rarioribus. *C. B.* 2.
Pin. 10. *Theat.* 155. Gramen avenaceum rariore
grano, nemorense, Danicum *Lobelii.* *It.* *IB. II.*
434. haud multum differre credo, à Gramine
avenaceo nemoroſo glumis rarioribus ex fusco
xerampelinis. *Ray Hist.* 1289.

Gramen Avenaceum angustifolium panicula 3.
pyramidalis. *Barrel. Icon.* 95. I.

b. *Folliculis lanuginosis seu pilosis.*

- I. Gramen Avenaceum spica simplici, locustis densissimis, candidatus & lanuginosis. *Inst.*
 524. Gramen avenaceum montanum lanuginosum. *C. B. Theat.* 10. 156. Gr. cum Locustis parvis candidis pilosis, semine avenaceo. *IB. II.*
 434. Gr montanum Avenæ semine *Clus. Hist. rar.*
Gr avenaceum Tabern. Ic. 207.

B. Locustis muticis : Folliculis in calyce biglumi breviorc alternatim sitis, & apicibus suis alternatim ultra calycem, squamarum sibi invicem incumbentium more productis.

Idem hoc sibi, verosimiliter, vult, quod Rajo *squamsum* esse, sunt etenim hæ locustæ plerunque compressiusculæ dum clausæ adhuc sunt, aliquando & tumidiusculæ & inflatae, & à medio circiter ventre, aut etiam basi latiori, sensim in mucronem, nunc magis, nunc minus fastigiatæ, supremi folliculi apice locustam terminante, ipsa autem mucronis, vel Locustæ terra, ab alternatim sitorum folliculorum apicibus formantur, quam formam tamen Locustæ plerunque Floris tempore, dum à se invicem, folliculi aperti, secedunt, amittunt.

I. *Folliculis paucioribus, duobus nempe, aut duobus tribusque in Locustis in eadem panicula sitis.*

I. Gramen Miliaceum aquaticum, *Ray Syn. 255.*
Gr.

Gr. Miliaceum fluitans suavis saporis *Merrett.*
 Gr. Caninum supinum paniculatum dulce. *C. B.*
Pin. I. Prodr. 2. Theat. 13. IB. II. 459.

Gramen pratense paniculatum majus. *C. B. 2.*
Theat. 28. Gr. pratense paniculatum majus la-
tiore folio, πότε Theophrasti. C. B. Pin. 2. Gra-
men pratense I. Dod. pempt. 560.

Gramen pratense paniculatum majus angu- *3.*
stiore folio. C. B. Th. 29. Pin. 2. Prodr. 5. IB. II.
461.

Gramen paniculatum angustifolium monta- *4.*
num, panicula densa locustis parvis muticis.

Gramen pratense paniculatum medium. *C. B. 5.*
Pin. 2. Theat. 30. Gramen pratense minus. I. B. II.
542.

Gramen pratense paniculatum medium, an- *6.*
gustiore folio. C. B. Breynio.

2. *Folliculis pluribus, nempe duobus, tribus*
& quatuor, vel tribus, quatuor & quinque,
ad octo usque, densius alternatim sitis, & in
locustam, ratione quantitatis folliculo-
rum, breviusculam dispositis.

a. *Panicula sparsa.*

Gramen pratense paniculatum majus, foliis *1.*
præter culmum angustioribus, in culmo latiori-
bis. Nob.

Gramen paniculatum aquaticum angusti fo- *2.*
lium.

- lium, panicula speciosa, locustis parvis. Nob. an^o
Gramen palustre panicula speciosa. C. B. Pin. 3.
 15. in Prod. Theat. 39?
3. **Gramen Xerampelinum** miliacea prætenui
 sparsaque panicula, sive Xerampelino conge-
 ner, arvense, æstivum, Gramen minutissimo se-
 mine. Lobel. Illustr. 14. Inst. 522.
4. **Gramen alpinum** paniculatum majus, pani-
 cula speciosa variegata. Prodr. Agr. p. 20. Tab. III.
 Gr. elegans paniculatum ex Gotthardo monte.
 Fratr. Οὐρεσιφ. MSC. 1705.
- b. *Locustis in densam veluti spicam dispositis.*
1. **Gramen Caninum maritimum** spicatum. C B.
 Pin. 2. Prodr. 2. Theat. 17.
2. **Gramen Caninum maritimum** spicatum, fo-
 liis & Locustis villosis. Nob.
3. **Gramen Madraspatanum** spicatum minus, fo-
 liis glabris, Locustis villosis. Nob. Gr. Madra-
 spatanum minus Eryngij capitulis. Petiv. Mus.
3. *Folliculis tribus, quatuor, quinque, etiam
 ad novem, laxius paulò & in locustam lon-
 giusculam pulchellam, veluti disticham
 dispositis, æquali spatio uno supra
 alterum scilicet, prominente.*
4. **Gramen pratense** paniculatum minus C B. Th.
 30. minus album. C. B. Pin. 3. Theat. 31. Gr. pa-
 niculatum minus album. Tabern. Ic. 206. IB. II.
 465.

Gramen pratense paniculatum minus rubrum 2.
C. B. Pin. 3. Theat. 31. Gr. paniculatum minus
rubrum. Tabern. Ic. 207. I. B. II. 465. Gr. pani-
culatum elegans paniculis ex spadiceo, viridi, &
argenteo variegatis. Agrost. Prod. pag. 20: Tab. III.

Gramen palustre paniculatum altissimum. 3.
C. B. Pin. 3. Theat. 38. Gr. aquaticum panicu-
latum harundinaceum Tabernæ montani. IB. II.
481. & Gr. majus aquaticum Lobelii. IB. II. 481.

Gramen paniculis elegantissimis minimis. 4.
Inst. 522. Gr. amoris alterum paniculis mino-
ribus & angustioribus, magisque sparsis. Ray Syl-
log. 136. Hist. Pl. 1275 Gr. Phalaroides sparsa
Brizæ panicula minus. Barrel. Ic. 44. II.

Gramen paniculis elegantissimis majus, locu-
stis purpureo spadiceis minoribus. Nob. Gr. al-
terum paniculis elegantissimis purpurascen-
tibus ac minoribus. Læl. Triumf. in Schedula.

2. *Folliculis biglumibus pluribus, angustis,
densissimè sitis, in Locustas oblongas com-
pressiusculas, distichas, & veluti Fili-
cinas pulchras dispositis.*

a. *Culmo tereti.*

Gramen paniculis elegantissimis seu ἐγαγρόσις 1.
majus. C. B. Pin. 2. Gr. paniculis elegantissimis C. B.
Th. 25. Gramen amoris dictum. I. B. II. 470. Gr.
paniculatum sativum Heragrostis. Tabern. Ic. 204.
Gramen Amourettes Clus. Hist. Hisp. & Hist. rar.
Gr. Eranthemum seu ἐγαγρώσις Phalaroides pa-

niculatum, multiplici tenui Bryzæ spica. *Barrel.*
Ic. 43.

2. Amourettes Bengalensis, paniculis majoribus.
Petiv. Gazoph. Cat. pag. 953.
3. Gramen pratense Madraspatanum panicula longissima. *S. B. Lib. 7. pl. 274.*
4. Amourettes Madraspatana, panicula minus sparsa, locustis perexiguis. *S. B. 7. 293.*
 - b. *Culmo compresso.*
1. Gramen paniculatum radice repente culmo compresso, locustis distichis pulchellis. *Nob. Gr.*
Radice repente caule compresso. Vaillant.

5. *Folliculis biglumibus, pluribus, laxius sitis, in Locustas spicæformes teretiusculas in sicca planta frequenter etiam veluti distichas pulchellas dispositis.*

- a. *Folliculis brevioribus, obtuse mucronatis.*
1. Gramen aquaticum fluitans multiplici spica "Aγεσις ποταμιῶν" *C. B. Pin. 3. Theat. 41. Gr.* paniculatum aquaticum fluitans. *Inst. 521. Gramen aquaticum cum longissima panicula. I B. II. 490. Gr. fluviatile Tabern. Ic. 216. Gramen aquis innatans. Lob. Ic. 14. Gr. miliaceum aquaticum Bryzæ locustis semine rufo. Barrel. Ic. 7.*
 - b. *Folliculis longioribus acuminatis, locustis spicæformibus teretiusculis in sicca planta inordinatè plerumque distichis.*

Gramen Loliaceum panicula multiplici & spicata *Inst.* 516. Phœnix multiplici spicata panicula. *Park. Theat.* 1145. *Fig.* 1146.

Gramen paniculatum elatius, paniculis seu spicis muticis squamosis. *Ray Catal. Ang. Ec.* pag. 153.

6. Folliculis pluribus, quorum glumæ exteriore, ampliores, cochlearis ad instar excavatæ se mutuò amplectuntur, & in locustas tumidiusculas, pulchras disponuntur,
GRAMINA TREMULA dicta.

Gramen tremulum maximum C. B. *Pin.* 2. **I.** *Prodr.* 5. *Theat.* 24. Gr. paniculatum locustis maximis candidantibus tremulis, *Item*, Locustis maximis phœniceis tremulis. *Inst.* 523. Gr. tremula panicula longiore & laxiore, colore candidante. *Clus. Cur. post. in 4. pag.* 71. Gr. amabile tremulum maximum panicula spadicea. *Virid. Lusit.* Gr. tremulum fusco seu fumigato colore. *Clus. Cur. post. in Fol. pag. 38.* Gr. tremulum maximum *I B. II.* 470. Gr. phalaroides majus ferruginea nutante panicula. *Barrel. Ic. 15. I.* ab hoc non nisi proceritate, & Locustarum paucitate differt, *Gramen tremulum majus panicula magna.* *C. B. loc. cit.* hinc à nostro non separandum.

Gramen tremulum majus C. B. *Pin.* 2. *Theat.* 2. **2.** Gr. tremulum. *IB. II. 469.* Gr. leporinum, Gramen tremulum. *Tabern. Ic. 231.* Gr. paniculatum majus, locustis magnis candidantibus tremulis, *item* phœnceis tremulis. *Inst.* 523. Gr. tremulum,

Ium, seu Phalaroides minus, lata sparsa panicula. *Barrel. Ic. 16.*

3. Gramen tremulum minus panicula parva *C.B.*
Pin. 2. Prodr. 4. Theat. 24. Gr. tremulum minus.
IB. II. 470. Gr. paniculatum minus, locustis parvis tremulis. Inst. 524.
4. Gramen tremulum Orientale spicatum annum. *Scherardi.*
7. *Folliculis paucioribus, duobus tribusque, locutas ante explicationem angustas, acutæ, in coni formam convolutas, post evolutionem autem facile deciduas efficientibus: culmo enodi.*
1. Gramen paniculatum autumnale, panicula ampliore ex viridi nigricante. *Inst. 521. Gr. arundinaceum enode majus montanum C. B. Pin. 7. Theat. 96. Gr. harundinaceum enode IB. II. 481. Gr. harundinaceum montanum. Tabern. Ic. 231.*
2. Gramen Arundinaceum enode montanum, panicula longissima, locustis angustissimis. *Nob.*
3. Gramen Arundinaceum enode minus sylvaticum. *C. B. Pin. 7. Theat. 97. Gramen arundinaceum enode minus. IB. II. 481. Gr. paniculatum autumnale, panicula angustiore ex viridi nigricante. Inst. 521. Gr. pratense serotinum, panicula longa purpurascente. Ray Hist. 1288. Synops. 260.*

8. Folliculis paucioribus in foliola tenuia ab euntibus, seu Locustis foliaceis proliferis.

Gramen arvense angustifolium, panicula den-
sa foliacea, foliolis in panicula angustissimis. **1.**
Nob. Gr. arvense panicula crispa. *C. B. Pin.* 3.
Prodr. 6. *Theat.* 32. Gr. cum panicula molli ru-
bente. *IB. II.* 464. Gr. paniculatum proliferum.
Inst. 523. *Hist. plant. Paris.* 86.

Gramen paniculatum latifolium, panicula 2.
densa foliacea, foliolis in panicula angustissi-
mis. *Nob.*

Gramen alpinum latifolium, panicula laxa 3.
foliacea, foliolis in panicula paucioribus & ma-
ge crispis. *Nob.* Gr. montanum Cambro-Brittanicum,
spica foliacea graminea majus & minus.
Ray Meth. Gram. 178.

Gramen paniculatum sparteum alpinum, pa- 4.
nicula angusta spadiceo viridi proliferum. *Agrost.*
Prodr. pag. 21. *Tab. I.*

GRAMINA PANICULATA,
LOCUSTIS COMPOSITIS,
seu

*Plures uno folliculo in calyce biglumi mutico
continentibus.*

II. LOCUSTIS ARISTATIS.

**A. Aristis articulatis tortilibus, recurvis,
Locustarum pedibus similibus.**

I. *Omnibus ejusdem Locustæ Folliculis Aristatis.*

a. *Folliculis duobus, eidem veluti basi insiden-tibus.*

- Gramen paniculatum minimum molle. *Bot.*
 1. *Monsp. App. Gr. paniculatum Locustis parvis purpuro argenteis annum. Ray Syn. 258. Hist. 1286. Caryophyllus arvensis glaber minimus. C. B. Prodr. 105. XI. Gr. avenaceum capillaceum, minimis glumis minimum. Breynij. Gr. parvum præcox panicula laxa canescente. Ray Syn. 260. Catal. Plant. Angl. 153. Gr. phalaroides sparsa panicula minimum angustifolium. Barrel. Ic. 44. I.*
2. Gramen avenaceum paniculatum alpinum, foliis capillaceis brevibus locustis purpuro argenteis, splendentibus & aristatis. *Agrost. prod. pag. 23. Tab. IV.*

3. Gramen alpinum nemorosum paniculatum, foliis angustissimis, locustis splendentibus aristatis. *Prodr. Agrost. pag. 24. Tab. VI. Gr. nemorosum paniculis albis capillaceo folio C B. Theat. 97. Prodr. IB. II. 496. Gr. avenaceum capillaceo folio, panicula ampliore, locustis splendentibus. Inst. 525.*

b. *Folliculis duobus alternatim sitis, seu quorum basis una, altera paulò altiore situm obtinet.*

- I. Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis. *C. B. Pin. 10. Theatr. 155. Gr. nemorale avenaceum alterum, ex fusco Xerampelinum & Luci-*

& Lucidum Danicum. *Lob. Adv. Part. II. IB.*
II. 463.

Gramen pratense villosum , panicula densa, 2.
ex argenteo dilutè spadicea vel fusca. *Nob.*

Gramen Avenaceum paniculatum alpinum 3.
humile, Locustis in spicam collectis varicolorebus aristatis. *Agrost. Prodr. pag. 24. Tab. VI.*

Gramen Avenaceum alpinum paniculatum , 4.
capillaceo folio , Locustis simplicibus , purpureo spadiceis. *Nob.*

Gramen avenaceum capillaceum minoribus 5.
glumis argenteis , foliis longioribus. *Breynij.*

c. *Folliculis duobus tribusque in eadem panicula , alternatim sitis.*

Gramen Avenaceum pratense , elatius , panicula flavescente , locustis parvis. *Ray Hist. 1284.* 1.

d. *Folliculis duobus , tribus , plerumque tamen quatuor in eadem panicula , Locustam unam efficientibus.*

Gramen Aanaceum pratense , elatius , panicula densa flavescente , Locustis majoribus , villosum. *Nob.* 1.

e. *Folliculis longioribus , angustis , alternatim sitis , Locustas majores & longiores efficientibus.*

Gramen Avenaceum , panicula purpuroar- 1.
gentea splendente D. Doodi, *Ray Hist. 1909. Gr.*
avenaceum

avenaceum glabrum panicula purpuro argentea
splendente D. Doody, *Ray Synops.* 262. cui & ob
exiguam differentiam, etiam jungo: Gramen
Avenaceum panicula purpuro argentea splen-
dente, montanum. *It. Alp.* 1709.

2. Gramen avenaceum panicula argentea splen-
dente. *Breynii.*

3. Gramen avenaceum alpinum glabrum angu-
stifolium, Locustis aristatis in spicam, disposi-
tis. *Nob.*

4. Gramen avenaceum angustifolium, alpinum
spicata panicula, ex purpureo, viridi & argen-
teo variegata. *It. Alp.* 1709. Gramen avenaceum
montanum, spica simplici, aristis recurvis. *Ray*
Hist. 1290.

5. Gramen avenaceum paniculatum alpinum,
Locustis varicoloribus majoribus aristatis. *A-*
groft, Prodr. pag. 23. *Tab. III.*

2. *Non omnibus ejusdem Locustae folliculis*
aristatis.

a. *Folliculis duobus eidem basi insidentibus.*

1. Gramen paniculatum, purpuro argenteis Lo-
custis delicatissimis. *Nob.* Gramen avenaceum
sparsa panicula speciosa Locustis minimis. *Mo-*
ris. Part. III. 215. Ray Hist. III. 611.

b. *Folliculis duobus alternatim sitis.*

1. Gramen pratense paniculatum molle. C. B.
Pin.

Pin. 2. Prodr. 5. Theat. 27. Gramen lanatum Dalechampii. *Hist. Lugd. IB. II* 466. Hujus aristæ intra calycem, unci seu hami ad instar reflectuntur & absconduntur.

Gramen Caninum, paniculatum, molle. *Ray 2.*
Hist. 1285. à priori differt, foliis non lanatis, glabris, aristisque ultra calycem protensis.

c. *Folliculis tribus, eidem veluti basi insidentibus, quorum bini extremi, aut extremorum alteruter saltem, aristatus est.*

Gramen paniculatum odoratum. *C. B. Pin. 3. 1.*
Theat. 36. Gramen Mariæ Borussorum. *I. Loes. Flor. Pruss.* ubi icon satis laudabilis.

3. *Nunc Omnibus, nunc aliquibus ejusdem Locustæ folliculis aristatis.*

a. *Folliculis duobus.*

Gramen nodosum, avenacea panicula. *C. B. 1.*
Pin. 2. Prodr. 3. Theatr. 18. Gramen nodosum. *IB. II. 456.* Gr. bulbosum, nodosum. *Lob. Ic. 23.*

Gramen avenaceum, elatius, juba longa, splendente. *Ray Meth. Gram.* 2.

b. *Folliculis duobus aut tribus, quorum inferiores aristati sunt.*

Gramen avenaceum, utriculis lanugine flavescentibus. *Inst. 525.* Festuca utriculis lanugine flavescentibus, Ægilops Dioscoridis. *C. B. Pin. 10. Th. 149.* Ægilops quibusdam, aristis recurvis,

vis, sive Avena pilosa. I.B. II. 433. Festuca dumetorum, utriculis lanagine flavescentibus. Barrel. Ic. 75. II.

2. Gramen Avenaceum, lanuginosum, utriculis lanagine flavescentibus. Nob. hujus Locustæ communiter duobus gaudent utriculis aristatis.

B. Aristis quidem articulatis, sed in filamentum apice crassescens terminatis. Folliculis aristatis duobus, alternatim sitis.

I. Gramen foliis junceis, oblongis, radice alba. C.B. Pin. 5. Theatr. 72. Gramen juncum Dallechampii. Hist. Lugd.

2. Gramen foliolis junceis radice jubata. C. B. Pin. 5. Theat. 74. Gramen sparteum variegatum C. B. Pin. 5. Theat. 72. Gramen exile, durius, Norvegicum aut Danicum, scopario Gramini cognatum. Lob. Adv. part. alt.

C. Aristis rectis, seu non articulatis.

I. Omnibus Locustarum folliculis aristatis.

a. Aristis è dorso glumarum basi exeuntibus, folliculis duobus alternatim sitis.

I. Gramen segetum panicula arundinacea. C.B. Pin. 3. Theat. 35. Inst. 524. Gramen agrorum Lobelii. I.B. II. 461. apud Rajum, Hist. 1283. satis pulchrè descriptum, sub titulo *Graminis altissimi segetum, panicula sparsa*. C.B.

b. Aristis è dorso, paulò infra apicem glumarum exterioro-

teriorum in folliculis singulis, aut ex earum apice obtuso, vel ultra Aristarum originem producto, bifido, plerunque membranaceo, prodeuntibus.

1. Locustis brevioribus, complanatis folliculis angustis, brevioribus aristis donatis.

Gramen spica cypressiforini aspera. Hort. Cath. 1.

Gramen Typhoides molle. C. B. Pin. 4. Theat. 2.

50. Gramen Alopecuroidi accedens, & phalaridi, spica longiuscula, folio lanuginoso. IB. II.

474. Gr. Alopecuroides. Lob. Ic. 8. Gr. spicatum, spica cylindracea, molli & densa. Inst. 520. Gr. Alopecurum viridi & molli spica. Barrel. Ic. 123. I.

Gramen Alopecuroides maximum I. B. spica divisa. Scherardi. 3.

2. Locusiis longioribus, teretiusculis.

Gramen panicula spicata, villosum, locustis villosis. Nob. 1.

3. Locustis longioribus, majoribus & amplioribus, ventricosis, spicæformibus, nunc teretiusculis, mucronatis, pleniore autem maturitate & in sicca planta, frequenter veluti distichis.

Festuca Graminea, glumis hirsutis. C. B. Pin. 1.
9. Theat. 143. Gramen Gros Montbelgardenium.
IB. II. 438.

Festuca Graminea, glumis glabris, C. B. Pin. 9 2.

Theatr. 144. Gr. Gros Montbelgardenium, spicis glabris. *IB. II.* 438.

3. *Festuca graminea*, *glumis vacuis*. *C. B. Pin.*
9. Theat. 144. *Gr. avenaceum, locustis amplioribus, candidantibus, glabris & aristatis.* *Inst.* 525.
Gr. phalaroides majus, acerosum, nutante spica.
Barrel. *Ic.* 24. I.
4. *Gramen avenaceum, villosum, locustis amplioribus, viridantibus, margine argentea cinctis.*
Nob. Festuca graminea, nemoralis, latifolia, mol-
lis. *C. B. Pin.* 10. *Theat.* 144.
5. *Gramen avenaceum locustis villosois, angustis, candidantibus & aristatis.* *Inst.* 526. *Gr. murorum, spicis pendulis, angustioribus.* *Hist. Plant. Paris.* 91. *Festuca avenacea hirsuta, paniculis minus sparsis.* *Ray Hist.* 1289. *Gramini murali Dalechampij simile, si non idem.* *IB. II.* 438.
- c. *Aristis ex apice ipso glumarum, in folliculis, exteriorum, sensim angustato productis.*
- I. *Folliculis longis, angustis, locustas tenuisulas quandoque, pleniore tamen maturitate, distichas efficientibus.*
1. *Gramen Bromoides pratense, foliis praeter culmum angustissimis, rara lanugine villosois.*
Nob. Festuca pratensis lanuginosa. *C. B. Pin.* 10.
Theat. 148.

Gramen Bromoides paniculatum, foliis & 2.
culmo villosis. Nob.

Gramen Avenaceum, panicula sparsa, Locustis 3.
majoribus & aristatis. Inst. 526. Festuca avena-
cea sterilis elatior. C.B. Pin. 9. Festuca Avenacea
sterilis elatior, seu Bromos Dioscoridis. C.B. Theat.
145. Ægilops Matthiolo forte. I B. II. 439.
Bromos herba, Dod. Pempt. 540. Gramen Fe-
stucæ sterile elatius. Hist. Plant. Paris. 91.

Festuca Avenacea sterilis humilior. C.B. Pin. 4.
9. Theat. 148.

Gramen Bromoides pumilum, Locustis erec-
tis majoribus aristatis. Nob. Bromoidis sterilis, ereda 4.
panicula, majoris Icon apud Barrel. Ic. 76. I. opti-
me hoc Gramen repræsentat.

Gramen Bromoides, Locustis maximis, lanu- 5.
ginosum, Italicum. Nob.

2. *Folliculis angustis, se invicem amplexan-
tibus, Locustas plerumque teretiusculas
efficientibus.*

Festuca Graminea effusa juba. C.B. Pin. 9. Prod. 1.
66. Theat. 144.

Gramen Bromoides, montanum, hirsutum, 2.
panicula minus sparsa, corniculata. Nob.

Gramen Bromoides, aquaticum, latifolium, 3.
panicula sparsa, tenuissimè aristata, Nob.

Gramen Bromoides, panicula sparsa, locustis 4.
minoribus, aristatis, Nob. an Gramen Avenaceum

panicula sparsa locustis minoribus & aristatis,
Inst? Breynio.

5. Gramen avenaceum panicula, sparsa, locustis minoribus, non aristatis. Breynio. Hanc speciem, cum facies ejus externa, priori sit similis, ut ad classem proximè sequentem potius pertineret, heic locare potius volui.

II. *Non omnibus ejusdem paniculae Locustis, vel ejusdem Locustae folliculis non omnibus aristatis. Aristis brevissimis ex apice ipso glumarum, in folliculis, exteriorum prodeuntibus.*

1. Gramen Arundinaceum, locustis viridi-spadicis, loliaceis, breviùs aristatis. Nob. an Gramen Arundinaceum aquaticum, panicula Avenacea Ray Synops. 254?
2. *Huc jure pertinet prioris Classis spec. 5. Gramen avenaceum, panicula sparsa, locustis minoribus, non aristatis, Breyn. utpote cujus locustæ plerumque arista unica brevissima donantur.*

Gramina Paniculata, Locustis compositis, Aristatis, Panicula circa culmum quaqua-versum sparsa.

LOCUSTIS NUDIS, seu CALYCE BIGLUMI CARENTIBUS

Compositis è Folliculis aliquot diversæ structure.

Ægliops

Ægliops Bromoides juba purpuralcente. *IB.* 1.
II. 436. Gr. sparteum Festuceum, seu Ægliops
 spartea, villosa. *Barrel.* *Ic.* 18. *II.* Singulas Locustas componunt folliculi quatuor, quorum
 duo nulli pediculo innituntur, horum unus biglumis, cuius gluma exterior rigida, ad mar-
 gines brevibus rigidisque pilis, veluti spinulis
 quibusdam hispida, sensimque in mucronem
 & duas aristas breves valde, inæquales, rectâ
 exeentes, terminatur: alter autem itidem bi-
 glumis, cuius gluma exterior & amplior, ari-
 stam e dorso infra apicem suum membrana-
 ceum emittit, plus quam semuncialem, articu-
 latam, articulo prope originem suam existen-
 te, glumæ autem alterius vicem præstat arista
 tortilis & recurva sesquiuncialis aut biuncia-
 lis ferè, quæ reliquarum aristarum longissima
 est, interque omnes folliculos veluti media pro-
 minet, & exporrigitur, sed versus basin valde
 tenuis & tenera. Reliqui duo folliculi pediculo,
 quælibet, insident tres circiter lineas longo, tri-
 bus glumis constantes, quorum gluma exterior
 sensim in acutum tenuemque mucronem, aris-
 tamque non tortilem, ferè semuncialem termi-
 nat, folliculo suo calycis vice serviens, hujus
 varietas etiam datur, *juba alba*, folliculis scilicet
 duobus, qui pediculis insident, prorsus albis,
 qualem *D· Scherardus Smyrna* misit.

Gramina Paniculata, Locustis Compositis
PANICULA HETEROMALLA,

Seu

VERSUS ALTERUTRUM LATUS SPECTANTE.

Horum Graminum proprium est , paniculam habere ita constructam , ut quidem ramuli ejus alterno etiam situ è culmis plerunque orientur , sed ita tamen in directione sua protendantur , ut alterutram partem culmi communiter prorsùs nudam relinquant , nullisque vel ramulis vel locustis obsitam , suntque .

1. *Locustis muticis , seu non Aristatis : Horum proprium est , habere Locustas Loliaceorum Locustis structura similes , calyce biglumi donatas.*

1. *Gramen panicula multiplici majus. C. B. Fin. 3. Prodr. II. Theatr. 31. Gr. arvense, filicina, duriori panicula gracilius. Barrel. Ic. 49. Gr. angustifolium spicis duris viridibus Musci filicini instar. Lel. Triumf. Cat ap. Fr. p. 64. Gr. pumilum Loliaceo simile. Ray Syn. 250. species saltem minor est , cæterum ejusdem structuræ , Gramen panicula multiplici minus. C. B. loc. cit. huc etiam pertinet. Gramen exile duriusculum in muris & aridis proveniens. Ray Syn. 259.*

2. *Gramen exile duriusculum maritimum. Ray Hist. 1287. Gramen minimum. I B. II. 469. quod à priori differt paniculis angustissimis & velu-*

veluti spicatis, locustis item crassioribus, & culmis firmioribus bi-aut triuncialibus.

Gramen Loliacea panicula ramosa maritimum. C. B. Theat. 130. Gr. maritimum panicula Loliacea. C. B. Pin. 9. Prodr. 63.

Gramen capillaceum locustellis pennatis non aristatis. Ray Hist. 1288. Syn. 260. Gr. foliolis junceis brevibus, radice nigra & alba. C. B. ex sententia Roberti. Ray Syn. 260.

Gramen paniculatum elatius, spicis oblongis muticis squamosis. Ray Hist. 1286. Gr. montanum, foliis capillaceis, longioribus, panicula heteromalla, spadicea & quasi Amethystina. Nob.

Gramen alpinum, latifolium, panicula heteromalla spadicea, Locustis pennatis. Nob.

2. Locustis Aristatis. Locustarum follicularum exteriores glumæ in aristas abeunt rectas.

1. Calyce manifestè biglumi, mutico donatis.

Gramen foliolis junceis brevibus majus, radice nigra. C. B. Pin. 5. Prodr. 34. Theat. 73.

Gramen foliolis junceis brevibus majus, radice nigra, panicula delicatiore. Breynii.

Gramen foliolis junceis brevibus minus. C. B. Pin. 5. Theat. 73. Gramen cristatum, radiculis nigricantibus. Flor. Pruss. 110. hujus figura Bauhiniana multò præstantior.

4. Gramen foliolis junceis brevibus minus, panicula delicatiore, flosculis purpurascenscentibus. *Breynii.*
5. Gramen foliolis junceis brevibus glaucis, radice nigra, panicula purpurascenscente. *Breynij.*
6. Gramen pratense panicula duriore laxa, unam partem spectante *Ray Hist.* 1285. Gramen tenueruntiusculum & penè juncatum. *IB. II.* 463.
7. Gramen Alpinum pratense, panicula duriore laxa, spadicea, loculis majoribus. *Nob.*
8. Gramen pratense paniculatum elatius, panicula laxa heteromalla. *Nob.*
9. Gramen Bromoides, panicula heteromalla, longioribus aristis donata. *Nob.*
10. Gramen Bromoides, pumilum, juncifolium longius aristatum. *Nob.*
2. *Calyce biglumi quidem, sed altera gluma minima, vixque plerumque observabili, altera mutica.*
11. Gramen Festuceum Myurum elatius spica heteromalla gracili. *Barrel. Ic. 99. II.*
2. Gramen festuceum, Myurum, minori spica heteromalla. *Barrel. Ic. 99. I. Gr. murorum spica longissima. Ger. Em. Ray Hist. 1286. Gr. spica nutante longissima. Park. Theat. 1162.*
3. Gramen Bromoides, festacea tenuique panicula minus. *Barrel. Ic. 76. II.*

3. *Calyce biglumi quidem, sed altera gluma minima vixque observabili, altera Aristata.*

Gramen paniculatum Bromoides minus, pa-
niculis aristatis, unam partem spectantibus. Ray
Hist. 1287. 1.

Gramen festuceum pumilum panicula hetero-
malla, Locustis majoribus longius aristatis. Nob. 2.

4. *Calyce biglumi nunc mutico, nunc in apices breves, aristæformes terminato, Locustis in paniculam divulsam densius congestis.*

Gramen spicatum folio aspero. C. B. Pin. 3. 1.
Prodr. 9. Thiat. 45. Gr. asperum. I. B. II. 467. Gr.
spicatum Dalecha mpii, Hist. Lug 427. Gr. pa-
niculatum spicis crassioribus & brevioribus. Inst.
521. Gr. spicatum folio aspero, spica grumosa
longiore. Idem spica breviore. Barrel. Ic. 26. I. II.
Hujus etenim Graminis ramuli in panicula nunc
breviores sunt, & in angustam veluti longam-
que, interruptam tamen, spicam dispositi: ple-
rumque tamen longiores sunt & latius expan-
si, quibus insident Locustæ densè dispositæ, bre-
vissimis aristis donatæ.

GRAMINA RELIQUA

Structura à prioribus differentia,

ET

ET

GRAMINIBUS AFFINIA.

I. LINAGROSTIS, seu GRAMEN
PAPPOSUM.

Spicas, hæc Gramina, ferunt compositas è squamis imbricatim positis & axi circumquaque densè adnatis, è quarum sinubus ab initio veris prodeunt stamina floris subtilissima, apicibus onusta, & unà cum iisdem, vel paulò post, filamentosa, sericea tenerrimaque lanugo, seu pappus, spicas ipsas vel densius vel rarius lanuginosam efficiens, in quorum filamentorum papposorum sinu tandem residet semen oblongum, triquetrum.

I. *Spica unica, nullo eidem subjacente folio, vel glumis calycis vice fungentibus, summo culmo insidente.*

1. Juncus alpinus, capitulo lanuginoso, seu Schœnolaguros. C. B. Pin. 12. Prodr. 7. Juncus alpinus capitulo lanuginoso. C. B. Theat. 188. Juncus alpinus cum cauda leporina. IB. II. 514. Agrost. Prodr. pag. 26. Tab. VII.
2. Juncus alpinus, capitulo tomentoso, majori, an Gramen tomentosum Alpinum & minus C. B. Pin. 5. Prodr. 28. Theat. 62? Agrost. Prodr. pag. 27. Tab. VII.
3. Linagrostis juncea, alpina, capitulo parvo, tomento rariore. Nob. Juncus alpinus Bombycinus.

nus. C B. Pin. 12. Prodr. 6. Theat. 188. IB. II. 515.
Agrost. Prodr. pag. 27. Tab. VIII.

2. *Spicis pluribus, longioribus pediculis insidentibus, in paniculae modum sparsis, duobus tribusque foliolis paniculae subjectis.*

Linagrostis panicula ampliore. Inst. 664. Gramen pratense, tomentosum, panicula sparsa. C. B. Pin. 4. Gr. tomentosum, pratense panicula sparsa. C. B. Theat. 60. Gnaphalium Tragi, sive juncus Bombycinus. IB. II. 514. Gnaphalium Tragi, Pappanthemon dixeris, Gesneri Not. MSC. ad Tragum. Linum pratense. Tabern. Ic. 250. Gramen pratense junceum, nutante, ampla, sparsa & bombycina panicula. Barrel. Ic. 12.

Linagrostis panicula minore. Inst. 664. 2.

Linagrostis palustris, angustifolia, panicula, sparsa pappo rariori. Nob. Folia habet, crassiuscula, rigidiuscula & concava, sensim in acutum mucronem terminata, vix lineam unam lata, dodrantalia, quandoque & ferè pedalia; Spicæ angustæ, raro valde, sed longo pappo donatæ, qui brevi vel decidit vel avolat: primo statim vere, locis palustribus reperitur. 3.

II. JUNCOIDES.

Graminis genus est, Junci gerens florem Hexapetalon plerunque, rosaceum, qui sex petalis in orbem positis constat, nunc æqualibus, nunc inæqualibus, alternatim sitis, intra hæc petala pistil-

pistillum stamina circumstant, apicibus onusta. Pistillum triquetrum, angulis saepe rotundatis donatum, maturitate dehiscens in tres valvas, & mediantibus septis, per medium valvarum longitudinem procedentibus, in tria loculamenta divisum, in quorum singulo vel semen unicum oblongum, vel plura exigua & minuta. Ipse flosculus, calyce nonnunquam sustentatur ex duabus plerunque, aliquando & pluribus glumulis constante. *Juncoides* à Junco distinguitur foliis, vel circa radicem stylum vestientibus, vel in ipso stylo ex quibusdam veluti geniculis oriundis, qui in Junco sunt enodes prorsus & foliis carentes, suntque.

I. Foliis verè Gramineis, culmos vestientibus.

1. *Juncoides villosum capitulis Psyllii. Nob. Gr. hirsutum capitulis Psyllii. C.B. Pin. 7. Theat. 103. Gramen Luzulæ minus. I.B. II. 493. Gramen exile hirsutum Cyperoides Lobelii. I.B. II. 493. Juncus villosus capitulis Psyllii. Inst. 246.*
2. *Juncoides hirsutum, capitulo glomerato. Nob. Gramen hirsutum, capitulo globoso. C.B. Pin. 7. Theat. 104. Gramen capitulo lucido globoso Tabernæmontani. I.B. II. 468.*
3. *Juncoides, vel Gramen hirsutum, nemorosum angustifolium, paniculis obscurè rufescens. Agrost. Prod. pag. 25. Tab. VI.*
4. *Juncoides latifolium, alpinum, glabrum, panicula sublutea, splendente. Nob. Folia duas vel duas*

duas cum dimidia lineas lata, duas & amplius, uncias longa, in acutum mucronem terminata, glabra, panicula ex flosculis parvis luteis, vel dilutè luteis constat.

Gramen hirsutum latifolium minus. C.B. Pin. 4.
7. Theat. 101. Gramen rore lucidum nemorense,
sive Luzulæ. IB. II. 492.

Gramen nemorosum hirsutum latifolium ma- 6.
jus. C.B. Pin. 7. Theat. 107. Ray Hist. 1292. Gra-
men Luzulæ maximum. IB. II. 493.

Gramen hirsutum angustifolium majus. C. B. 7.
Pin. 7. Theat. 105. an Gramini Luzulæ affine, flo-
re albo. IB. II. 492. ?

Gramen nemorosum hirsutum angustifolium 8.
minus. C.B. Pin. 7. Theat. 106. Gramini Luzulæ
affine, flore albo. IB. II. 492. Juncus angustifo-
lius villosus, floribus albis, paniculatis. Inst. 247.
à priori differt flosculis candidissimis, cùm prio-
ris sint ex candido subfusci: Nota etiam, ulti-
mas has duas species, habere flores hexapeta-
los irregulares, tribus nempe minoribus petalis,
reliquisque majoribus, alternatim sitis, con-
stantes.

Gramen hirsutum elatius, panicula juncea 9.
compacta. Ray Syn. Gr. nemorosum, hirsutum,
majus angustifolium. Parkins.

Juncoides angustifolium glabrum, panicula 10.
sparsa. Nob. Gr. juncoides junci sparsa panicula.
Parkins. Theat. 1190.

2. *Foliis excavatis, crassiusculis, pluribus circa Radicem, stylo nudo.*

1. Gramen junceum foliis & spica junci. C.B. Pin.
5. Theat. 78. Juncus parvus cum pericarpiis roundis. IB. II. 522.

3. *Foliolis quasi junceis, tenuissimis.*

1. Juncoides alpinum, flosculis junci glomeratis atrofuscis. Nob. Juncus alpinus capitulo glomerato è nigro splendente. Fratr. It. Alp. I. pag. 36. Tab. V. Fig. 2.

2. Juncoides alpinum, trifidum. Nob. Juncus acuminne reflexo trifidus. C. B. Prodr. 22. Theat. 185. Juncus acuminne reflexo minor vel trifidus. C. B. Pin. 12. Juncus trifidus. IB. II. 521. Tres illi styli, in quos dividuntur culmi, nîl aliud sunt, quàm foliola tenuissima, superiore parte excavata, vagina sua, stylos aliquantulum, inde à nodulo geniculiformi, unde oriuntur, involventia.

4. *Flore plerunque hexapetalo regulari, foliis capillaribus, junceis, seminibus minutissimis.*

1. Gramen nemorosum calyculis paleaceis erectum. C.B. Pin. 7. Theat. 100. Holostium Matthioli junceum. IB. II. 510. Juncus palustris humilior erectus. Inst. 546. Gramen bufonium erectum angustifolium minus. Barrel. Icon. 263. II. Idem majus Ejusd. Icon. 264.

2. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, repens

pens. C. B. Pin. 7. Theat. 99. Juncus palustris humilior repens. Inst. 247. Gramen bufonium supinum mollius, seu umbellatum. Barrel. Icon. 93.

Juncoides calyculis paleaceis glomeratis folio 3.
varians. Nob. Inter folia capillaria, styli surri-
guntur, quorum extremitas sustinet fasciculum
foliorum circiter uncialium, subtilissimorum &
veluti cirrosorum, ex quodam veluti nodulo
oriundorum, inter flosculorum glomeres ple-
runque etiam aliquot prodeunt foliola similia
prioribus, cirrosa: quæ foliola hoc nostrum di-
stinguunt à Gramine bufonio glomeratis utriculis.
Barrel. Icon. 94.

5. *Foliis junceis seu tubularibus, nodulis, &*
quibusdam veluti articulis seu genicu-
lis distinctis, seminibus minutissimis.

Gramen junceum folio articulato aquaticum 1.
C B. Pin. 5. Prodr. 12. Theat. 76. Juncus foliaceus
capsulis triangulis. I. B. II. 521. Juncus foliis
articulosis, floribus umbellatis. Inst. 247. Gra-
men aquaticum. Tabern. Icon. 214.

Gramen junceum folio articulato cum utri- 2.
culis. C. B. Prodr. 12. Juncus foliaceus capsulis
triangulis cum utriculis. I B. II. 521. Juncus
foliis articulosis, floribus umbellatis cum utri-
culis. Inst. 247.

Juncoides alpinum folio articulato. Nob. Gra- 3.
men junceum, foliis habitioribus & crassioribus
alpinum. Fratr. Hoc quoad flores suos illud ha-
bet peculiare, quod duo vel plures simili, uni
ramu-

ramulo aut pedicello insidentes nascantur, in calyce quodam veluti communi, è duabus aut tribus glumis latiusculis composito.

4. Gramen junceum folio articulato sylvaticum.
C. B. Pin. 5. Theat. 75. Juncus nemorosus folio articuloſo. Inst. 247. Gramen junceum sylvaticum. Tabern. Icon. 223.

JUNCUS.

Quoad florū, vasculorūmque seminalium structuram cum *Juncoide* ex toto convenient Junci: floſculi etenim hexapetali Rosacei, qui in quibusdam speciebus calyce biglumi aut squamoso ſuſtentantur, ſinguli, vel plures ſimul, vascula ſeminalia ejusdem prorsū ſtructuræ ac in *Juncoide*: ſemina autem loculamentis inclusa, minutissima ſunt. Differt autem *Juncus* à *Juncoide* ſcirpis rotundis prorsū enodibus & nudis, propè radicem plerumque tunicis foliorum vicem gerentibus acuminatis, raro autem foliis veltitis, quæ autem nihil aliud ſunt quam alii ſcirpi juncei ſeu rotundi medulla repleti nunc densiori nunc laxiori, juxta ſcirpos aut ſtylos floriferos nati. Florum item juba, ſeu panicula ex ipſorum ſcirporum quadam fissura prodit, ſuntque.

1. *Juncus acutus maritimus capitulis forgi. C. B. Theat. 173. Inst. 246. Parkins. Theat. 1193. Juncus pungens, ſeu juncus acutus capitulis Sorghi, IB. II. 520. Juncus maritimus ſpica ſubrotunda glumosa. Barrel. Icon. 203. II.*
2. *Juncus acutus maritimus Anglicus. Parkins. Theat.*

Theat. 1193. à priori differt stylis seu calamis tenuioribus, vix lineam crassitie sua superantibus, quæ in priori duarum vel trium linearum est: Capitula in priori majora, & florum petala ad dimidiam circiter vasculi seminalis altitudinem solummodo pertingentia, in hoc autem flosculi vasculum seminale tegunt integrum, panicula item in priori densior, multoque brevioribus pediculis insidet: in hoc autem magis sparsa, longisque ramis ac pediculis innata.

Juncus lœvis panicula sparsa major. *C. B. Pin.* 3.
 12. *Theat.* 182. Huc potius Synonymi loco vocandus *Juncus Matthioli*. *IB. II.* 520. utpote cui medullam laudatissimus Author tribuit farctam, qualem & hic habet.

Juncus lœvis panicula conglomerata. *Nob.* 4.
 Juncus lœvis alter. *C. B. Pin.* 12. Junci genus medulla prorsus nivea. *IB. II.* 508. Stylos hic profert duros, nitidos & splendentes crassiusculos, medulla farctos ellychniis formandis aptissima: duas vel quatuor uncias infra mucronem panicula prodit parva, conglomerata, densaque; stylorum plurimi steriles sunt & non floriferi. Huc pertinet etiam *Juncus panicula non sparsa*.
C. B. Theat. 183.

Juncus nemorosus mollis, panicula sparsa. *Nob.* 5.
 stylos profert valde debiles, versus terram reclines, cortice constantes prætenui, medullaque rarissima, telis aranearum quasi simili, nivea repletos, spithamali aut pedali infra stylorum mucronem, spatio, exit panicula rara, sparsa, parva.

6. *Juncus aquaticus*, medulla ferè destitutus, panicula sparsa. *Nob.* Calami tres circiter lineas, dum compressi sunt, lati, lèves, infirmi, cortice tenui donati, medulla alba rarissima & laxissima, cortici adhærente repleti, panicula densa, sparsa, flosculis parvis constans, ad spithamæ longitudinem infra acutum mucronem stylorum erumpens.
7. *Juncus acumine reflexo alter.* C. B. Pin. 12. *Theat.* 185. Calami valdè tenues, quorum cortex durus crassiusculus striatus exiguum cavitatem relinquit: medulla nivea, cellulas quasdam angustas ad axin calami transversim positas efficiens, panicula longiusculis ramulis insidens, sparsa.
8. *Juncus acutus panicula sparsa.* C. B. Pin 12. *Theat.* 176. *Juncus panicula arundinacea.* IB. II. 520. & *Juncus foliaceus.* IB. II. 521. Styli striati, ex viridi glauci, cortice crasso tenaci, vimineis operibus apto donati, medulla rara in cellulas divisa lineam circiter longas; Vascula seminalia nigra aut spadicea, petalis florum pallidis tecta, lineam cum dimidia circiter longa: mucro stylorum acutus pungens, ad palmi, & plus quam pedis quandoque longitudinem ultra paniculam protensus, huc forsam etiam vocandus, *Juncus acumine reflexo major.* C. B.
9. *Juncus lèvis panicula sparsa minor.* C. B. Pin. 12. *Theat.* 183. calami seu styli tenues admodùm, tertiam lineæ partem circiter dum compressi sunt lati, tres quatòrve uncias alti, quandoque semipedem: unciam unam vel duas infra mucro-

crone ex styli fissura prodit panicula, ex tribus, sex aut octo flosculis constans, cum hoc confer, & si lubet eundem fac *Juncellum omnium minimum Chamæschænon* *Lob.* *Adv. Ray Hist.* 1305. Item *Juncum parvum calamo supra paniculam longius producto.* *Ray Hist.* 1305.

JUNCO AFFINIS.

Pertinentes huc species primo intuitu junci florem capitulis suis æmulantur, quæ tamen nihil aliud sunt quam locustæ ex aliquot squamis, seu glumis constantes, vel dense congestæ, vel pediculis longioribus innixæ & laxius sitæ: quæ, vel etiam pediculi, prodeunt ex sinu duorum, plerunque foliorum ad basin, vaginæ vel folliculi instar ampliatorum alternatim plerunque sitorum, ex glumarum sinu autem prodeunt stamina floris, & in eo latet semen: cæterum folia non quidem juncea seu cylindracea, sed sufficiata, crassiuscula, medulla juncea farcta, culmus enodis.

Junco affinis capitulo glomerato nigricante. 1.
Nob. *Juncus Lithospermi semine.* *Moris. Hort.*
Bles. Magnol. Bot. Monsp. p. 145. *Ray Hist.* 1305.

Junco affinis, panicula laxa seu longioribus 2. pediculis insidente. *Nob.* *Gramen junceum semine acuminato.* *Flor. Pruss.* *Juncus montanus palustris.* *Ray Syn.* 272.

CANNA.

Notæ sunt, *Calamus lignosus teres*, panicula è spicis seu julis composita, constantibus è squa-

mis imbricatum positum, in quarum sinu flosculus Monopetalos multifidus, in cuius sinu stamna apicibus onusta & semen.

- I. *Canna Capitis Bonæ spei*, spicis juliformibus atrofuscis. *Nob. Juncus è Capite Bonæ spei*, paniculis fuscis juliformibus. *Petiv. Mus.*

SCIRPUS.

Notæ sunt : Culmi seu calami enodes rotundi, aut compressi, medulla fungosa, juncea facti ; capitula seu spicæ, vel ex ipsis stylis junctorum more erumpentes, aut in summitate stylorum positæ, in alis quorundam veluti foliolorum duorum, aut plurium; quæ capitula vel spicas æmulantur compositas è squamis imbricatum vel etiam alternatim positis, inter quas prodeunt stamina floris & in quibus reconditur semen, quæ spicæ si sparsæ sunt & longioribus quibusdam pediculis insident, *Scirpum paniculatum* efficiunt; si autem spica unica summos culmos terminat, tunc *scirpus spicatus* dicitur; si verò spicæ plures in foliorum aliquot sinu, in quoddam veluti capitulum conglomerantur, *Scirpus capitatus* audit.

I. *Scirpus paniculatus*, è cuius calamo junceo, tereti, infra mucronem prodeunt pediculi nunc longiores nunc breviores, spicas squamosas, teretes, mucronatas, imbricatas, sustinentes.

- I. *Scirpus palustris altissimus*. *Inst. 528. Juncus maximus seu scirpus major. C. B. pin. 12. Juncus*

cus maximus seu *scirpus*. C. B. *Theat.* 178. *Juncus maximus* *Holochoenos*. I.B. II. 522. *Auctorum* haec tenus nemo observavit foliorum fasciculos illos, qui juxta calamos plerunque assurgunt aquæ immersi; quæ folia bipedalis & tripedalis quandoque longitudinis sunt valde flexilia & aquæ motu levissimo hinc illinc fluctuantia, dilutè viridia, glabra crassiuscula, medulla cellulosa farcta, lineam unam cum dimidia aut duas lata.

Scirpus palustris humilior. Nob. *Juncus* sive 2. *scirpus medius*. C. B. *Pin.* 12. *Theatr.* 181. *Juncus sylvaticus*. *Tabern.*

Scirpus omnium minimus capitulo breviori. 3. *Inst.* 528. an? *Juncellus* *inutilis* seu *Chamæschænos*. C. B. *Prodr.* 22 ? cuius Radix fibrosa capillacea alba, calami seta equina paulò crassiores, è cuius stylis, lineas duas, tres, quandoque & sex infra eorundem apicem, prodeunt spicæ parvæ, duæ, tres, quatuóre, squamulis exiguis imbricatim positis constantes, folia item juxta stylos nascuntur, eosque etiam in infimo vestiunt, altitudine stylis paria & ejusdem cum iis crassitie.

2. *Scirpus paniculatus*, è cuius calami compressi summo éque sinu foliolorum aliquot vaginæformium, prodeuntibus pediculis, insident spicæ imbricatae.

Scirpus Madraspatanus, spicis Conoidibus 1. fuscis. Nob. *Juncus Coniferus Madraspatanus* minor capitulis oblongis. S. B. 7. 300.

3. *Scirpus spicatus, styli summitatem terminante spica oblonga, vel subrotunda, tereti, sensim in mucronem fastigiata, composita è glumis pluribus undiquaque axi adnatis, imbricatim positis, interquas latet semen.*

1. *Scirpus equiseti capitulo majori. Inst. 528. Juncus capitulis equiseti major scirpis latioribus C.B. Pin. 12. Juncus Equiseti capitulis scirpis triplo latioribus. C.B. Theat. 187. Juncus capitulis longis seu clavatus. IB. II. 523. scirpi sesqui pedales & bipedales, in jmo lineam cum dimidia aut duas etiam lineas latitudine adæquantes, dum compressi sunt, spicæ lineas quinque aut sex longæ.*
2. *Scirpus Equiseti capitulo majori alter. Nob. Juncus equiseti capitulis major scirpis triplo angustioribus. C. B. Pin. 12. Juncus equiseti capitulis scirpis triplo angustioribus. C. B. Theat. 187. Calami seu scirpi spithamales & pedales circiter, lineam circiter dimidiam latitudine adæquantes, spicæ lineas quatuor aut quinque longæ sunt.*
3. *Juncus Equiseti capitulis alter Parkins. Theat. 1196. à prioribus differt radicibus nigricantibus per transversum repentinibus, fibris nigricantibus aut fuscis firmatis, styli valdè tenues, quatuor aut quinque uncias longi : spicæ quatuor circiter lineas longæ.*
4. *Scirpus Madraspatanus spica subrotunda è glumis*

glumis amplis composita. *Nob.* *Juncus Madraspatanus Equiseti capitulis major.* *Mus.* *Petiv.*

4. *Scirpus spicatus, stylorum summitate terminata in spicam brevissimam, è paucioribus squamis, eandem non adeò imbricatam efficientibus, composita, inter quas semen. Squamæ infimæ harum spicarum communiter reliquarum maximæ sunt, easque veluti in sinu suo abscondunt.*

Scirpus montanus capitulo breviore. *Inst.* 528. **1.**
Juncus montanus cum parvis capitulis luteis.
I.B. II. 523. An *juncus parvus palustris cum parvis capitulis Equiseti.* *Ray Hist.* 1306. **N. 24?**

Juncelli omnium minimi capitulis Equiseti. **2.**
Plot. Hist. Nat. Ox. Ray. Hist. 1306. *Quorsum & refereo Juncum parvum palustrem cum parvis capitulis Equiseti.* *Ray Hist.* 1306. **N. 22.** Hic unciales, biunciales, imò, & palmares emittit stylos prætenues, seta equina paulò crassiores; spicæ duas tresque lineas longæ, compositæ è squamis atrofuscis margine dilutiori cinctis, inter quas stamina floris subfusca prodeunt, apicibus onusta. Folia altitudine calamis vel paria vel paulò breviora, ejusdem cum calamis tenuitatis.

Scirpus equiseti capitulo minori. *Inst.* 528. **Jun-**
cellus capitulis equiseti minor & fluitans. *C. B.*
Pin. 12. *Juncellus capitulis equiseti fluitans.* *C.B.*
Theat. 187. *Prodr. pag.* 23.

4. *Scirpus minimus* capitulo squamoso breviori & crassiori fusco. *Nob.* Radix capillaribus fibris fuscis firmata, calami prætenues palmares & spithamales, nonnunquam & paulò altiores, folia stylis altitudine paria, sed tenuiora, angustissima, ad margines digitis deorsum ductis aspera: spicæ dum semen gerunt crassiusculæ, lineas duas aut duas circiter cum dimidia longæ; squamæ eas componentes acuminatæ castanei coloris, margine membranaceo dilutiori cinctæ.

5. *Scirpus capitatus*, *spicis plurimis squamosis*, è *glumis imbricatim axi alternatim adnatis compositis*, in summo scirpo in sinu duorum plurimumque foliorum densè conglomeratis.

1. *Scirpus maritimus* capite glomerato. *Inst. 528.*
Gr. *Cyperoides maritimum* *C. B. Pin. 6. Theat.*
91. *Juncus maritimus.* *Lobel. Icon. 87.* tria communiter folia capitulo subjacent.

2. *Scirpus Madraspatanus* capitulo squamoso subrotundo. *Nob.* *Juncus stellatus Madraspatanus*, *capitulis conoidibus squamosis.* *S. B. 7. 316.*

3. *Scirpus minimus*, *capillaceo folio, Madraspatanus*, *capitulo parvo.* *Nob.* *Juncus Madraspatanus capitatus minor.* *S. B. 7. 297.*

4. *Scirpus parvus Madraspatanus*, *capitulo glomerato fusco.* *Nob.* *Juncus Madraspatanus capitatus major.* *S. B. 7. 304.*

SCIRPOIDES.

Styli seu calami juncei, glomeres nunc unus, nunc plures pediculis insidentes, & ex ipsorum stylorum lateribus erumpentes, duri muscosi, compositi è locustis densissimè confertis, compositis è squamulis pluribus brevibus, in quarum sinu semina triquetra, hoc Genus à reliquis distinguunt.

Scirpoides maritimum capitulis sparsis glo- 1.
meratis. Nob. Juncus acutus maritimus capitu-
lis rotundis. C. B. Pin. 11. Theat. 174. Juncus acu-
tus maritimus alter. Parkins. 1194. Scirpus ma-
ritimus, capitulis rotundioribus, glomeratis. Inst.
528. Holoschænus, Hist. Lugd. 987.

Scirpoides acutum maritimum capitulo glo- 2.
merato solitario. Nob. Calami duri juncei tenues,
lineam unam crassitie haud adæquantes, semun-
ciam, frequentius & semipedem infra acutum
& plerunque versùs inferiora reflexum vel pro-
tensum mucronem, globulus est, ex Locustis
modo dicto densissimè congestus, durus, cui
subjacet foliolum semunciale aut unciale jun-
ceum, versùs inferiora reflexum.

Cùm horum juncorum capitula non constent
è squamis sibi invicem superimpositis, sed ex- 3.
Locustis constent squamosis separatim & den-
sissimè nascentibus, mirari meritò subit, Tour-
nefortium primam speciem ad scirpos retulisse.

PSEUDO CYPERUS.

Ob folia carinata Cyperorum foliis similia, culmum autem rotundum, *Pseudo Cyperum* voco hoc genus, cuius præterea notæ sunt; Panicula Locustis constans angustis, acuminatis, è squamis aliquot constantibus imbricatim positis, quarum infimæ seu extimæ plerunque cassæ sunt & steriles, undiquaque scapo adnatae, in ultimarum tandem sinu verò latitant, stamina floris, & postea semen unicum, quod cirrosa aliquot filamenta per Locustarum mucronem emittit, plena autem maturitate in capsula triquetra continetur sphæricum.

- I. *Pseudo Cyperus palustris*, foliis & Carina serratis. *Nob. Gramen Cyperoides altissimum*, foliis & carina serratis. *Bocc. 72. Cyperus longus inodorus*, *Germanicus. C. B. Theat. 121. Pin. 14. Scirpus palustris*, altissimus, foliis & carina serratis. *Inst. 528.*

CYPERUS.

Notæ sunt, culmus triangulus communiter, aut compressus etiam, folia bina, terna, aut etiam plura paniculæ summo calamo insidenti substrata, panicula è spicis constans, compositis è squamis nunc alternatim axi proprio adnatis, aut etiam circumquaque & imbricatim positis, in quarum sinu latitat semen plerunque nudum, triquetrum.

I. Spicis pulchellis, constantibus è glumis simplicibus axi alternatim utrinque adnatis, ita ut spicam vel disticham, vel distichæ similem efficiant, culmo triangulari.

Cyperus odoratus, radice longa, seu Cyperus officinarum. C. B. Pin. 14. Inst. 527. Cyperus longus odoratus. C. B. Theat. 216. Cyperus panicula sparsa, speciosa. IB. II. 501. differt panicula magis minùsque sparsa, seu spicis nunc longioribus pediculis, insidentibus & laxius sitis, nunc autem brevioribus, & tunc etiam spicæ densius veluti conglomerantur; primus quod noverim hanc differentem speciem in herbario suo sicco annotavit Vir diligentissimus. Lel. Triumfettus, circa Bononiam locis palustribus natam

Cyperus rotundus, esculentus, angustifolius. 2. C. B. Pin. 14. Theat. 222. Inst. 527. Thras. IB. II. 504. Dulcichinum. Dod. Pempt. 340. Radicis fibris in extremitate hinc inde adhærent globules quidam angulosi vel subrotundi, qui quandoque basi sua, in tres quasdam brevissimas protuberantias, tripodis adinstar, terminantur.

Cyperus parvus, panicula è rubro fusca, conglomera. Nob. Gramen Cyperoides, spica globosa, divisa. Lel. Triumf. in Herb. sicco. Spicæ distichæ pulchræ è fusco quodammodo rutilantes, è glumis angustis alternatim sitis compositæ, lineas tres quatuorve longæ, in densum veluti capitulum conglomerantur, radix parva fibrosa fusca vel nigricans.

4. *Cyperus minimus*, panicula sparsa, nigricante. *Inst.* 527. *Gramen Cyperoides minus*, panicula sparsa, nigricante. *C. B. Pin.* 6. *Gr. Cyperoides minus*, panicula sparsa, obsoletè nigricante. *C. B. Theat.* 88. *Gramen parvum pulchrum*, aliud, panicula compressa, nigricante. *IB. II.* 471.
5. *Cyperus minimus*, panicula sparsa, subflavescente. *Inst.* 527. *Gr. Cyperoides minus* panicula sparsa, subflavescente. *C. B. Pin.* 6. *Gr. Cyperoides minus*, panicula sparsa, subflava. *C. B. Th.* 88. *Gramen pulchrum*, parvum, panicula lata, compressa. *IB. II.* 470. Hoc duplex est, *majus* & *minus*; Hoc unciale & biunciale foliis donatum angustissimis plerunque capillaribus, culmi in summo sustinent paucilimas spicas distichas, frequenter etiam unicam solummodo.
6. *Cyperus enodis*, nudus, culmis è vaginis brevibus prodeuntibus, spicis tenuioribus. *Nob.* Ex radice, ut videtur crassa surgunt vaginæ plures invicem per series juxta positæ, unciales fere, quasi truncatæ, fuscæ, è quarum singula prodit calamus tenuis triqueter, nudus & enodis, summo sui in sinu trium foliorum sustinens paniculam laxam quidem, sed non latè sparsam, è spicis valde angustis, distichis similibus, tres vel quatuor fere lineas longis, compositam.
7. *Cyperus Filicinus medius*, panicula comosa è Madraspatan, an *Mulen. Pullu. Hort. Malab.* Vol. 12. Tab. 54. pag. 101? *Petiv.*
8. *Cyperus filicinus medius*, panicula sparsa è Madraspatan. *Petiv Mus.*

Cyperus Madraspatanus, panicula speciosa ramosissima. Petiv. Mus. panicula hujus laxa, spicæ exiguae, lineam unam aut unam cum dimidia longæ, valdè angustæ, è glumis alternatim scapo adnatis, valdè parvis, in obtusiusculum mucronem terminatis compositæ. 9.

Cyperus Madraspatanus, paniculis semen Santonici æmulans. Petiver. Spicæ hujus elegantissimæ sunt, distichæ, lineas duas aut duas cum dimidia longæ, compositæ ex alternatim sitis glumis vix dimidiata lineam longis, obtusiusculis, fuscis, in quarum sinu semen castanei coloris, triquetrum, parvum. 10.

Cyperus Orientalis radice olivari, spicis longis, è spadiceo purpurascens. Nob. Trasi orientalis, radice olivari. S. B. 7. 249. Paniculæ spicæ sesquiuncialibus & biuncialibus pediculis insident, lineas octo, vel decem longæ, unam latæ, veluti distichæ, compositæ è glumis alternatim scapo adnatis, lineam unam cum dimidia ferè longis, in acutum mucronem terminatis, è spadiceo purpurascens, margine tenui albo cinctis. 11.

Cyperus Borneacus limonii panicula. S. B. 7. 296. panicula valdè laxa, ramulis per inæqualia breviaque intervalla adnascuntur spicæ lineas tres quatuorve longæ, valdè angustæ, laxæ, scapi etenim denticulis lineam ferè dimidiata ab invicem remotis alterno situ, adnascuntur glumæ linea dimidia paulò longiores, valdè angustæ, in obtusum mucronem terminatæ, quæ in sinu

sinu suo quælibet continent semen angustum li-
neam unam ferè longum, triquetrum.

2. *Spicisteriusculis, mucronatis, minori-
bus, lineas scilicet duas circiter longis, è
squamis imbricatim positis, seu axi
medio circumquaque adnatis
constantibus.*

a. *Calamo triangulo.*

1. *Cyperus Gramineus. I.B. II. 504. Gramen
Cyperoides miliaceum. C.B. Pin. 6. Theat 90. Cy-
perus Graminea sive miliacea. Lobel. Icon. 79.*

b. *Calamo Compresso, vel etiam aliquatenus
complanato, subtereti.*

1. *Cyperus Madraspatanus, calamo compresso,
spicis minoribus fuscis. Nob. Juncus Madraspa-
tanus, squamis tortilibus minoribus. Petiv. S.B.
7. 300.*

2. *Cyperus minimus, panicula maxima, radice
odora, repente. Inst. Coroll. 39.*

3. *Spicis teretibus, longioribus, semunciam
& unciam, scilicet unam longis, è squamis
undi quaque axi adnatis, & imbricatim
positis constantibus, culmo
triquetro.*

4. *Cyperus panicula sparsâ, è spicis longiori-
bus, tenuoribus, teretibus composita. Nob. Cy-
perus vulgatior panicula sparsa. Inst. 527. Gra-
men*

men Cyperoides panicula sparsa majus. C. B. Pin.
 6. *Theat.* 86. Gramen Cyperoides vulgatius
 aquaticum. *I. B. II.* 495. Pediculi aliquot, unciales,
 & biunciales, sustinent, quilibet, spicas
 duas, tres, ad sex usque, fuscas aut ex fusco
 spadiceas, semunciam, unciamque longas, aut
 paulò etiam longiores, lineam unam circiter
 cum dimidia lata, teretes, mucronatas, imbricatas.
 Inter dictos autem pediculos, medius spicarum
 similiū glomus, ex aliquot spicis compositus,
 culmi summo innatus.

Cyperus panicula compacta, è spicis teretibus,
 crassioribus composita. *Nob.* Pediculi quibus
 spicæ insident, ob brevitatem suam veluti latent,
 quandoque ad summum tres unciae quadrantes
 longi, qui spicas in summo sui sustinent tres
 communiter, sex, septem, quandoque & octo
 lineas longas, duas lineas lata, teretes, in obtusum mucronem terminatas, fuscas, aut ex fusco
 spadiceas, imbricatas, compositas è glumis latioribus,
 plerunque apice laciniato donatis, in stag-
 nis Liburno Hetruriæ vicinis, Majo floret.

4. *Squamis tenuibus, angustis, in capitulum
 subrotundum, in sinu aliquot foliolorum situm, densè collectis.*

Cyperus Madraspatanus minimus Xanthoides.
Petiv. perpusilla plantula est, unciam unam al-
 titudine vix superans, culmi prætenues, trique-
 tri in quorum summo quatuor plerunque foliola
 angustissima, tres quatuorve lineas, etiam se-
 munciam

munciam longa, in quorum sinu globulus unicus pisi circiter magnitudine, compositus è squamis angustis, in tenuem mucronem, aliquantisper reflexum terminatis, densè & imbricatim congestis, quo fit, ut Xanthii capitulum æmuletur.

SCIRPOCYPERUS.

Calamus seu Culmus triqueter, hoc plantæ genus ad Cyperum revocaret, junceus autem medullaque fungosa refertus cum sit, nudus item & enodis, ad scirpum pertineret, hinc *scirpo Cyperi* nomen, præcipue, cum in utroque genere etiam adsint spicæ squamosæ nunc disticha forma, nunc imbricata conspicuæ, in squamarum quarumlibet sinu semen: Adde quòd spicæ ex ipsis calainis infra summitatem prodeant, prout in juncis & scirpis aliquibus fieri consuevit.

- I.** *Spicarum glumis scapo proprio alternatim adnatis, spicam disticham efficientibus.*
- II.** *Scirpo Cyperus panicula glomerata è spicis distichis composita. Nob. Cyperus maritimus, capitulis glomeratis. Inst. 527. Juncus acutus, maritimus, caule triangulo. C. B. Pin. II. Prodr. 22.*
- 2.** *Spicarum glumis amplis, alternatim axi adnatis, in quarum sinu semen triquetrum, tribus glumis membranaceis circumdataum.*
- III.** *Scirpo Cyperus Madraspatanus, spicis pallidè fuscis*

fuscis. Nob. *Juncus Madraspatanus* ferè tricephalos, squamis tortilibus dentatus. *Mus. Petiv.*

3. *Spicarum glumis axi circumquaque adnatis, & imbricatim positis, spicas teretiusculas efficientibus.*

Scirpo *Cyperus panicula glomerata*, è spicis 1. imbricatis composita. Nob. convenit forsan cum *Junco acuto, maritimo, caule triquetro, maximo, molli, proceriori, nostrate. Plukn. Phytogr. Ray. Syn. 272.* decernant ij, quibus Author prædictus ad manus est, *Helveticus hic noster est, in paludosis Agri Tigurini natus.*

Scirpo *cyperus Madraspatanus*, spicis parvis 2. imbricatis. Nob. *Juncus Madraspatanus minor. S. B. 7. 261.*

CTPEROIDES.

Notæ hujus generis sunt, culmi triquetri, spicæ squamosæ, seu è pluribus glumis axi proprio adnatis constantes, vel floriferæ & steriles, vel seminiferæ, quarum posteriores vel in eadem planta cum primis junguntur, vel solæ sunt. Spicæ autem floriferæ constant è squamis seu glumis imbricatim positis, seu axi circumquaque adnatis, è quarum sinu prodeunt stamina floris, apicibus onusta, spicæ verò seminiferæ constant è glumis, in quarum singularum sinu folliculus, cum semine inclusio, plerunque triquetro. Adde, quod spicæ, si plures unâ sint, non in summo culmo eodemque loco orientur, sed per culmum

ipsum spatiis ab invicem distinctis ex foliorum
communiter ala prodeant.

**A. CYPEROIDEA POLYSTATA-
CHTA**, spicis, floriferis & seminiferis.
Hæc pluribus unâ constant spicis, in eo-
dem culmo per inæqualia ejus spatia nas-
centibus, quarum summarum una,
aut una plures, floriferæ sunt &
steriles.

I. Spica unica cassa seu florifera in cul-
mi summitate posita.

a. Spicis seminiferis laxis, seu è follicu-
lis laxius sitis compositis, tenuibus.

I. *Vel nulli vel brevi pedicello insidentibus,*
in folioli membranacei vaginæformis
sinu, veluti sessilibus.

I. Cyperoides montanum, humile, angustifo-
lium culmo veluti folioso, spicis obsesto. Nob.

2. Cyperoides longifolium, culmo pumilo, ve-
luti folioso, spicis tenuibus spadiceis. Nob.

2. *Pediculis insidentibus, qui prodeunt è si-*
nu vaginæ membranaceæ, aut in nullum,
aut etiam brevissimum foliolum
terminatæ.

I. Gramen Cyperoides, polystachion, mini-
mum

mum, spicis per maturitatem albicantibus. Ray.
Hist. 1295. Gramen sylvaticum, angustifolium,
spica alba. C. B. *Theat.* 47. Hoc plena maturita-
te *Rajanum* est, primo autem vere, ubi propullu-
lare incipit, spicāmque saltem promit florife-
ram, summo culmo insidentem, *Baubinianum*
est, adeò facie, diversis maturitatis suæ gradi-
bus, ludit diversa.

3. *Pediculis insidentibus, vel etiam ex iis-
dem pendulis, qui prodeunt è sinu foliorum,
per inæqualia culmi spatia natorum.*

Cyperoides latifolium, hirsutum spicis te-
nuissimis. Nob. 1.

Cyperoides angustifolium, alpinum, spica, 2.
spadicea, tenuiore. Nob.

Cyperoides alpinum, spicis seminiferis tenuio-
ribus atrospadiceis. Nob. 3.

Cyperoides alpinum, angustifolium, spicis 4.
laxis, spadiceo viridibus. Nob.

Cyperoides alpinum angustifolium, spicis se-
miniferis, tenuibus, fusco viridibus. Nob. 5.

Gramen Cyderoides sylvarum tenuius spica-
tum. Parkins. *Theatr.* 1171. Lobel. *Illustr. Stirp.* 60.
Ray *Syn.* 266. *Hist. Pl.* 1295. 6.

1. Spicis seminiferis densioribus, seu
gronis imbricatim axi circumjacenti-
bus constantibus.

I. Nullis pediculis communiter insidentibus.

- a. *In ala membranarum vaginæ formium, quandoque in brevia foliola terminatarum, veluti sessilibus.*
- 1. *Cyperoides montanum, foliis angustis parvis, spica spadicea divisa. Nob.*
- 2. *Cyperoides alpinum foliis caryophyllæis, spicis brevibus è nigricante & albido variis. Nob.*
- 3. *Cyperoides angustifolium montanum, foliculis seminum villosis. Nob. Gramen spicatum angustifolium montanum. C. B. Theat. 47.*
 - b. *In ala foliorum, per culmum nascentium, veluti sessilibus.*
- 1. *Cyperoides sylvaticum angustifolium, spicis parvis, tenuibus, spadiceo viridibus. Nob.*
- 2. *Cyperoides palustre aculeatum capitulo breviore. Inst. 529. Gramen palustre aculeatum Germanicum vel minus, C. B. Pin. 7. Gramen palustre echinatum. Lob. Ic. 15. IB. II. 497.*
- 3. *Cyperoides angustifolium, spicis sessilibus in foliorum alis. Inst. 530. Gramen Cyperoides angustifolium, spicis sessilibus in foliorum alis. Ray Hist. 1295.*
- 2. *Pediculis quibusdam è foliorum per culmum nascentium alis predeuntibus, insidentibus.*

a. *Surrectis.*

Cyperoi-

Cyperoides alpinum pumilum, spicis spadiceo viridibus, brevioribus & crassioribus. *Nob.*
Gr. Cyperoides angustifolium, spica spadiceo-viridi, minus alpinum, spicis brevioribus & habitioribus. *Fratri in Herb. Sicc.*

Cyperoides polystachyon, flavicans, spicis brevibus, propè summitatem caulis. *Inst. 530.*
Gramen Cyperoides polystachyon, flavicans, spicis brevibus, propè summitatem caulis. *Ray Hist. pl. 1294.*

Cyperoides spicis parvis longè distantibus. *3.*
Inst. 530. Gramen Cyperoides, spicis parvis, longissimè distantibus. *Ray Hist. 1295.*

Cyperoides alpinum, Caryophyllatæ foliis, spicis teuibus, è fusco rufescentibus. *Nob.*

Cyperoides spicis viridibus, brevibus, è squamis angustioribus compositis, latifolium. *Nob.*

Cyperoides alpinum, pumilum, spicis exalbicante & spadiceo variis. *Nob.*

Gramen spicatum angustifolium montanum. *7.*
C. B. foliis brevioribus. *Breyn.*

b. *Ex iisdem pendulis.*

Cyperoides spica pendula breviore. *Inst. 529. 1.*
Gramen Cyperoides, spica pendula breviore. *C. B.*
Pin. 6. *Gr.* Cyperoides spica pendula breviore majus. *C. B. Theat. 85.* Pseudo Cyperus Lobelii, spicis vel paniculis pendentibus ex longis pediculis. *IB. II. 496.* Pseudo Cyperus, *Dod. Pempt.*

2. *Cyperoides spica pendula breviore, squamis, è spadiceo, vel fusco rutilante viridibus. Nob. Gr. Cyperoides spica pendula breviore minus. C. B. Theat. 85.*
3. *Cyperoides spica pendula, longiore & angustiore. Inst. 529. Gramen Cyperoides, spica pendula, longiore & angustiore. C. B. Pin. 6. Prodr. 13. Theat. 85. Ray Hist. 1294. Gramen Cyperoides, latifolium, typha pendula longiore. Barrel. Ic. 45.*
2. *Spica unica cassa florifera, non in summitate culmi, sed infra spicam unam seminiferam posita : Spicis seminiferis laxis, è glumis alternatim scapo adnatis compositis, in quarum sinu folliculi cum semine triquetro.*
1. *Gramen Caryophyllum, montanum, spica varia. C. B. Theatr. 48.*
2. *Gramen Caryophyllum, nemorosum, spica multiplici. C. B. Theatr. 47. Gramen parvum sylvaticum, paniculis forma pedum avium. I. B. II. 497.*
3. *Spicarum summarum nunc unica florifera, nunc etiam duabus, vel etiam spica una alteraque è supremis, ex parte florifera cassa, & seminifera.*
1. *Cyperoides palustre angustifolium, spicis habitoribus spadiceo viridibus. Nob.*

4. Spica unica vel dupli , cassa florifera , summitati culmi nunc insidente , nunc prorsùs absente , vel spicis floriferis pluribus , culmis aliis insidentibus , spicis nullis pediculis innixis.

Grauen Cyperoides , spica è pluribus spicis I. mollibus composita. Ray Hist. 1295. Hoc à Gramine Cyperoide, palustri , spica divulsa. C. B. & Gramine Cyperoide ex monte Ballon spica divulsa. I. B. nulla alia differt nota , quam foliolo infimæ spicæ subiecto , quod in hoc nostro gluma latiuscula est in brevissimum & tenui valde foliolum terminata.

5. Spicarum supremarum , una pluribus , floriferis cassis , reliquis seminiferis.

Cyperoides latifolium , spica rufa , sive caule I. triangulo. Inst. 529. Grauen Cyperoides latifolium spica rufa , sive caule triangulo. C. B. Pin. 6. Theat. 83. Grauen Cyperoides cum paniculis nigris. I. B. II. 494. Grauen Cyperoides Lobel. Icon. 11. Forsan & huc vocandum, Grauen Typhoides spica multiplici. C. B. Theat. 54.

Cyperoides nigro luteum , vernum , minus. 2. Inst. 529. Grauen Cyperoides foliis caryophylleis vulgatissimum. Ray Hist. Pl. 1293. Graminis nigro lutei verni varietas minor. I.B. II. 494.

Cyperoides latifolium , spica spadiceo viridi , 3.
F 5 majus

majus. *Inst.* 529. *Gramen Cyperoides, latifolium, spica spadiceo viridi majus.* *C. B. Pin.* 6. *Prodr. I3. IB. II.* 495.

4. *Cyperoides palustre, latifolium, spicis teretibus, erectis, ex terreo obscurè fuscis. Nob.*
5. *Cyperoides palustre, spicis purpureo spadiceis, tenuibus pediculis insidentibus. Nob.*
6. *Cyperoides vesicarium, spicis viridantibus vel, subfuscis. Nob.* *Cyperoides vesicarium glabrum spica pendula longiore. Inst. 530. Hist. Plant. Paris.* p. 263. cum hoc nostro idem facimus, optimè conveniente descriptione, utut in aliquibus desiderentur pediculi sesquiunciales, aut bunciales, quibus spicas insidere dicit.
7. *Cyperoides polystachion, spicis teretibus erectis. Inst. 529. Gramen Cyperoides, polystachyon, majus, spicis teretibus erectis. Ray Synops. 265. Hist. Plant. 1294. Gramen Cyperoides, angustifolium, spicis longis, erectis. C. B. Pin. 6. Theat. 84. Gramen palustre majus. Lobel. Icon. 11. Hujus datur species sesquipedalis & bipedalis, & altior folia proferens pedalia & sesquipedalia, tres circiter lineas lata, spicas ferens, duas trésque uncias longas: Alia est pedalis, aut paulò altior, folia proferens spithamalia & pedalia, duas circiter lineas lata, spicas ferens unciales & sesquiunciales. Tertia tandem spithamalis altitudinis est, cujus folia vix lineam lata, palmaria & spithamalia, spicas unciales circiter, proferens.*

Cyperoides Polystachion, languinosum. *Inst.* 8.
529. Gramen Cyperoides polystachyon lanuginosum. *Ray Synops.* 265. *Hist. Plant.* 1294. Gramen spicatum foliis & spicis hirsutis mollibus. *C. B.* *Theat.* 48.

6. Spicis floriferis cassis destituta.

a. *Spicis prope summitatem culmi, pediculis insidentibus.*

Cyperoides alpinum pulchrum, foliis caryophyllæis, spicis atris tuimentibus. *It. Alp.* 1709.

b. Versus summitatem culmi laxius dispositis.

1. *Spicis brevissimis.*

Gramen Cyperoides spicatum minimum, spica divulsa aculeata. *Ray Hist.* 1298. Gramen sylvaticum. III. Tab. parvum tenuifolium cum spica aculeata. *I. B. II.* 509. Gramen nemorosum spicis parvis asperis. *C. B. Theat.* 100.

2. *Spicis longioribus & laxioribus.*

Cyperoides polystachyon, spicis laxis paniculam veluti componentibus. *Nob.*

c. *In spicam oblongam interruptam, dispositis.*

Gramen Cyperoides spicis minoribus, minus que compactis. *C. B. Pin.* 6. *Theatr.* 87. Gramen Cyperoides spicatum minus. *Ray Hist. Pl.* 1297.

d. *In*

d. *In spicam veluti disticham dispositis.*

1. Gramen Cyperoides, spica simplici, compressa disticha, *Pluknet. Ray Syn.*

e. *In spicam brevem, unicam, veluti in capitulum quoddam collectis.*

1. Gramen Cyperoides juncifolium, spica simplici in summitate culmi, atrofusca. *Nob.*

2. Cyperoides alpinum, tenuifolium, spica brevi ferruginea. *Nob.*

3. Gramen alpinum, enode, spica parva subrotunda ferruginea. *Agr. Prodr. pag. 18 Tab. IV.*

B. CYPEROIDEA MONOSTACHYIA.

Horum proprium est, habere spicam unicam, summo culmo insidentem imbricatam, è squamis axi circumquaque adnatis compositam, in quarum sinu aut floris stamina, aut semen.

*Spica in eodem cespite nunc florifera & cassa,
nunc seminifera.*

I. Gramen Cyperoides spica simplici cassa. *Ray Synops. 267.* Gramen Cyperoides seminibus deorsum reflexis puliciformibus. *Ray Hist. Plant. 1298.*

C. CYPEROIDEA PANICULATA.

Horum notæ sunt, ramuli è culmo erumpentes, quibus insident spicæ exiguæ plures, è pluribus squamis constantes, in quarum singulærum sinu semen latitat.

I. *Panicula constante è pluribus ramulis,
qui -*

quibus alternatim adnascuntur spicæ, è squamis imbricatim positis constantes, in quarum sinu folliculus cum semine.

Gramen Cyperoides spica longiore laxa. Ray I.
Hist. 1296. Cyperus alpinus, longus, inodorus,
panicula ferruginea, minus sparsa. Agrost. Prod.
Tab. VIII. pag. 27.

2. *Panicula constante è ramulis diversis disfisisque culmi locis oriundis, sustinentibus paniculam, quilibet, densam veluti umbellatam, è locustis, aliquot glumis seu squamis constantibus, compositam, in quarum sinu unum alterumque semen, in sinu aliquot filamentorum sessile.*

Gramen Cyperoides palustre Leucanthemum I.
Ger. Emac. L. I. Cap. 22. N. 7. Ray Hist. 1295. huc
forsan pertinet, Gramen palustre juncum racemo-
so semine. C. B. Theat. 74.

CYPEROIDI AFFINE.

Hujus generis sunt omnia illa Gramina, quæ
quidem spicas habent è squamis undiquaque axi
adnatis compositas, vel capitula è spicis parvis,
seu Locustis composita, pluribus squamis axi
circumquaque adnatis constantibus, sed quæ cul-
mo gaudent non triquetro sed teretiusculo, spi-
cisque cassis floriferis destituuntur.

Gramen Madraspatanum, hirsutum, glome- I.
rulis echinatis. S. B. 7. 262.

Gramen Madraspatanum, conoidibus squa- 2.
mosis. Petiv.

Vocum & terminorum, in hac Gra-
minum Methodo occurrentium,
Explicatio.

Ala, Sinus est inter culmum foliumque situs,
seu ipse angulus, qui à concursu culmi & fo-
liorum formatur.

Apices, sunt particulæ illæ, pulvere quodam
plerumque minutissimo aut conspersæ, aut fœ-
tæ, ipsis staminibus floris, seu subtilissimis qui-
busdam veluti filamentis appensæ, quæ & *Rajo*
Antberæ vocantur.

Arista, filamentum est tenue, imò à basi sua
sensim attenuatum, plerunque asperum, si nem-
pe digiti deorsùm ducantur, quod exit diversis
glumarum locis, vel ex ipso nempe glumarum
apice, vel è dorso statim infra apicem, vel è me-
dio dorso, vel ex ipsa glumarum dorsi basi, quan-
doque etiam, sed rarò, prodit ex ipsa glumarum
cavitate. Hæ duplicitis generis sunt, aliæ etenim
sunt, *Rectæ*, quæ ab initio sui sensim attenuan-
tur, aliæ *Articulatæ*, quæ Locustarum pedibus
figura similes sunt, ita etenim, veluti si quadam
donatæ essent articulatione, inflectuntur, harum
pars inferior usque ad flexuram spiraliter intor-
ta est, pars superior autem rectâ extenditur,
sensimque Rectarum more attenuatur, hæ aristæ,
minimo humiditatis sensu, imo solo oris flatu,
circumrotantur.

Axis, idem quod *Scapus*. Vid. *Scapus*.

Calyx,

Calyx, hanc vocem ex reliqua re Herbaria mutuo sumere fuimus coacti, ad designandas glumas steriles illas & cassas, quæ Locustis spicarum & panicularum, earumque folliculis, basesos veluti communis loco inserviunt, ac re ipsa calycis vice funguntur, haud aliter prorsus quam floris calyx in reliquis plantis: hic à multitudine glumarum dicitur *uniglumis*, *biglumis*, aut *triglumis*.

Carina, sulcus est in acutum angulum excavatus, qui per Graminum quorundam, speciatim Cyperini Generis, foliorum medium longitudinem excurrit, carinæ navis adinstar, & folia sulco tali donata, vocantur *Carinata*.

Culmus, in Graminibus idem est ac *Caulis* in plantis reliquis, & *Caudex* in arboribus, item *stylus* vel *Calamus* in juncis, estque calamus ille à radice usque ad spicam vel paniculam, Graminum & Cerealium fructum, protensus.

Folia, sunt eæ Graminum partes, quæ culmum, prout & folia in reliquis plantis, caules & ramos, vestiunt, communiter longa, angusta, planaque sunt, vel ex ipsa radice oriunda, cespites veluti quosdam efficientia, vel ad singula culmorum genicula oriunda singula, & hæc communiter duabus partibus constant, *superiore*, quæ folium est, & inferiore quæ *vagina* dicitur, hæc etenim vaginalæ in modum culmum ambit, eumque in cavitate sua recondit.

Folliculus, idem quod *Utriculus*, est illa Locustarum pars, quæ ex una, duabus, tribus,

aut

aut ad summum quatuor constat glumis , & ē
cujus sinu prodeunt stamina floris , & in qua po-
stea reconditur semen , hic pro multitudine glu-
marum vocatur *uniglumis* , *biglumis* , *triglumis* ,
quadriglumis , sed communiter *Folliculus* quivis,
duabus glumis constat.

Geniculum , idem quod *Articulus* , seu *Nodus* ,
qui Graminum culmos in quasdam veluti par-
tes ab invicem distinguit , quorumve aliquot
communiter in uno eodemque Culmo inveni-
untur hinc *Culmus geniculatus* dicitur , idem quo-
que convenit *Radicibus* , quæ ob articulos , qui-
bus per intervalla distinguuntur , etiam *Genicu-
lates* dicuntur. Culmi autem nullis geniculis di-
stincti , vocantur *Enodes*.

Gluma , idem quod *Squama* , unica est mem-
branosa aut veluti cartilaginea squama , folli-
culos vel utriculos componens , plerunque ca-
vitate , in cymbæ cujusdam formam efformata
prædicta , vel etiam veluti plana ; hac significa-
tione utor , ut *glumam* à *folliculo* vel *utriculo* , qui
pluribus una plerunque constat glumis aut squa-
mis , distinguam , hactenūs etenim consuetus Bo-
tanorum mos fuit , ut gluma idem commu-
niter significaret quod folliculus , utut autem
folliculus ex. gr. *biglumis* ita constructus sit , ut
flosculum quendam Monopetalum , ad basin us-
que bifidum repreäsentet , nihil obstat , quin
duas ejus glumas seu valvas separatim conside-
rare quis possit , habet autem suas gluma quæ
libet partes : *Glumarum* etenim *dorsum* est ea mar-
ginibus ejus intermedia pars , quæ partem eorun-
dem

dem convexam exteriorem efficit : *Venter* autem est pars ea, quæ ipsas efficit margines, è diversis dorsi glumarum partibus, aristæ communiter prodire consueverunt.

Imbricatus, *imbricatim positus*, de glumarum vel Folliculorum situ adhibetur hic terminus, cùm gluma vel folliculus duorum aliorum commissuram tegit, prout id in tectorum tegulis & imbricibus, pisciumque squamis, fieri consuevit.

Locusta, integrum est, in spicis paniculisque corpus quoddam, quod è folliculo vel unico, vel pluribus componitur, & propriæ cuidam vel basi, vel pedicello nunc longiori, nunc breviori, innititur, proprioque suo plerunque calyce gaudet: si unicus adest folliculus, id est unicum ieminis involucrum, *Locusta* vocatur *Simplex*, si plures uno, *Composita* audit, quæ si grandiores sint & ex pluribus folliculis compositæ, *Spicæ* etiam *partiales*, vel *Locustæ Spicæformes* vocantur, si autem calyce, seu glumis casulis & sterilibus destituantur, *Locustæ nudæ* cluent.

Muticus, idem quod *non aristatus*, seu *aristis carens*.

Panicula, Vid. Notas Graminibus præfixas.

Scapus, idem quod *Axis*, & aliis *Columen*, est ea summi Culmi pars, quæ spicæ vel etiam paniculæ alicujus medium occupat, cui locustæ circumquaque, vel etiam ad latera affiguntur, qui scapus, si in plura veluti internodia distinc-

tus, & flexibus ita incurvatus est, ut per intervalla quidam veluti promineant denticuli, qui Locustarum bases sunt, *scapus* seu *Axis denticulatus* vocatur. Eadem Axeos seu scapi significatio utimur, in attenuata illa prolongatorum pediculorum parte, cui alternatim in Locustis adnascuntur folliculi, quæ pars, *Locustarum scapus* aut *axis* vocatur.

Spicatus, de graminibus spicas ferentibus dicitur, suntque ea omnia, quæ corpus unum, vel etiam plura oblonga proferunt, ita ex Locustis coagmentata, ut eæ vel scapo medio, seu Axi suo, aut immediatè, aut brevissimo innixæ pediculo, adnascantur, vel si Locustæ ita densè sunt coagmentatæ, ut nulla ramorum, quibus Locustæ innascuntur, vestigia cernantur.

Squama, idem quod *Gluma*.

Vagina, est theca illa, seu in cylindrum cavum convoluta inferior foliorum pars, quæ culmum obvolvit, eumque, veluti vagina gladium, in sinu suo recondit.

Utriculus, idem quod *Folliculus*.

Mensurarum, ubicunque occurrit mentio, *pedum* scil *unciarum*, *linearumve*, illud omne de mensuris Parisinis intelligendum, de pede scilicet qui vocatur *Pied du Roy*; cuius ad præcipuorum Europæ populorum pedem, ratio, seu proportio, apud diversos notatur, & nota hinc esse supponitur.

ADDENDA.

Post elaboratam Methodum adhuc ad manus meas pervenerunt, duo Graminum spicatorum Genera, ipsi Historiæ, suis, quodlibet, locis inserita, quæ & heic Additamenti loco adjungo.

Post *Gramina spica secalina* pag. 6. locari debuisset Genus *Graminum Spica Secalinæ Affini*; singulis scapi denticulis insidet Locusta, composta è calyce biglumi, aristato, glumis ad latera folliculi positis, in quarum sinu folliculus biglumis, ventre suo versùs scapum spectans, cuius major & exterior gluma in aristam apice suo desinit, cuius species, unica.

Gramen secalino affine, spica angustissima, Locustis simplicibus, Aristatis. Nob. apud Morisonum occurrere hoc Gramen mihi dictum, cùm autem ad manus non sit Author, sine præjudicio laudatissimi Authoris, meum nomen apposui.

In Graminibus Typhinis, primæ Clasfis, pag. 13. Gramen secundum, seu *Typhoides asperum primum*, C. B. idem est cum 4. seu Gr. *Typhoide spica angustiore*. C. B. Breynii.

Post *Gramina Typhina* pag. 14. locari debuisset Genus *Graminum Typho Phalaroideorum*, quorum spica angusta, lineas duas aut tres latitudine non excedens, teres, Cylindracea, *Typhoideorum* Graminum spicæ, forma externa, similis, à *Typhoideis* autem differt Locustis utrinque mucronatis, seu è lato ventre in mucronem,

basi & apice, contractis, item quod calycis glutæ aristis prorsus careant, & muticæ sint, & hinc corniculis destitutæ, species hactenùs mihi est unica.

Gramen Typhinum, minori spica phalaridis, du-
riore, subfusca. Barrel. Icon. 14. II.

Post *Gramina Paniculata, Locustis simplicibus.*
pag. 34. inseri debuisset Genus aliud, *Graminum nempe Paniculatorum Locustis simplicibus, partim Aristatis, partim muticis in eadem panicula,* cuius species est unica.

Gramen Arundinaceum, paniculatum, Locustis par-
tim muticis, partim aristatis. Nob. Cujus hæ notæ
sunt, quæ illud à Graminibus reliquis omnibus distingunt. Ramulis Paniculæ primariis & secundariis, Locustæ densè innascuntur, ex cuiuslibet Locustæ basi oriuntur pediculi duo, lineam cum dimidia circiter longi, quorum quilibet sustinet Locustam, vel aristatam vel muticam, quandoque utraque mutica est, præsertim in extremitate rāmularum, alias autem altera aristata est, hæ diversæ sunt structuræ. *Aristatæ etenim Locustæ, duas lineas longæ, è duabus constant glumis cartilagineis, ex paleaceo & castaneo diluto variis, acuminatis, in quarum sinu folliculus, gluma constans tenui, membranacea, alterius autem glumæ vicem præstat arista tortilis, recurva, quatuor aut sex lineas longa. Muticæ Locustæ duas lineas longæ sunt, angustæ, mucronatæ, in calyce earum biglumi continetur folliculus, duabus constans glumis, angustis valde, tenuibus, membranaceis, in quarum sinu*
ftamina

stamina floris , prout & in folliculo aristatarum Locustarum. Hoc ex *Horto Regio Parisino* mihi communicavit. *D. Jussieu*, sed nomen appositum interiit , meum apposui sine præjudicio Inventoris, ni fallor , velut Gramen à Morisono scriptum exhibuit, quo Authore hactenùs careo.

Authoritatum , in hac Methodo occurrentium , brevis explicatio.

Agrost. Prodr. Agrostographiæ Helveticæ Prodromus , Authoris.

Ambros. Ambrosini Phytologia.

Barrel. Ic. Barrelieri icones.

Robert. Hist. Oxon. Roberti Historia Oxoniensis.

Bocc. Mus. Pauli Bocconi Museo di piante.

Bot. Monsp. Botanici Monspeliensis , it. ejusd.
Appendices duo , Petri Magnol.

Breyn. Joh. Philippus Breynius Godanensis, Jacobi filius.

C. B. Pin. Caspari Bauhini Pinax.

C. B. Prod. Caspari Bauhini Prodromus.

C. B. Phytop. Caspari Bauhini Phytopinax.

C. B. Theat. Caspari Bauhini Theatrum Botanicum.

Cæsalp. Andreas Cæsalpinns.

Catal. Læl. Triumf. ap. Fratrem. Lælii Triumfetti Catalogus Plantarum apud Fratrem.

Clus. Hisp. Caroli Clusii Historia plantarum per Hispanias observatarum.

Clus. Hist. Caroli Clusii Historia rariorum plantarum.

Clus. Cur. Post. Caroli Clusii Curæ posteriores.

Column. Sc. Fabii Columnæ ēκφρασις, & Phyto-
basanos.

Dod. Pempt. Remberti Dodonæi Stirpium Histo-
riæ pemptades Sex.

Flor. Pruss. Joh. Lœselii Flora Prussica, per Joh.
Gottsched.

Fratr. Οὐρεσιφ. J. Jac. Scheuchzeri Οὐρεσιφοίτης
Helveticus.

Fratr. Οὐρεσιφ. MSC. Joh. Jac. Scheuchzeri Iti-
nera Alpina MSCta.

Ger. Emac. Gerardus Emaculatus.

Gesn. Not. MSC. Conradi Gesneri Notæ Manu-
scriptæ ad Authores Botanicos.

Hist. Lugd. Historia plantarum Lugdunensis.

Hist. Plant. Paris. Pitton de Tournefort Histoire
des plantes aux environs de Paris.

Hort. Cath. Francisci Cupani Hortus Catholicus.

Hort. Malab. Hortus Malabaricus.

I. B. Johannis Bauhini Historia Plantarum uni-
versalis.

Inst. Jos. Pitton Tournefort Institutiones Rei
Herbariæ.

It. Alp. 1709. Joh. Scheuchzeri Iter Alpinum
Anni 1709. Academiæ Regiæ Parisiensi
narratum.

Jussieu. Antonius de Jussieu.

L&l. Triumf. Lælius Triumfetti.

Lob. Ic. Lobelii Icones stirpium.

Lob. Illustr. Matthiæ de Lobel stirpium illustra-
tiones.

Lob. Adv. Matthiæ de Lobel, stirpium Adversa-
ria nova.

Matth.

**Matth. Petri Andreæ Matthioli Commentarii in
Dioscoridem.**

**Mor. Hist. Oxon. Roberti Morisson Historiæ Oxo-
niensis pars 2. pars 3. quæ & occurrit sub
titulo *Robert Hist. Oxon.***

**Parkins Theat. Parkinsoni Theatrum Botanicum.
Petiv. Mus. Gazoph. Petiverii Musæum vel Gazo-
phylacium.**

**Plot. Hist. Nat. Ox. Plot Historia Naturalis Oxo-
niensis Territorii.**

Plukn. Phytogr. Pluknetii Phytographia.

Plukn. Alm. Pluknetii Almagestum Botanicum.

Plukn. Amalh. Pluknetii Amaltheum Botanicum.

Ray Cat. Angl. Johannis Ray Catalogus, Plantarum Angliæ & Insularum adjacentium.

Ray Hist. Johannis Ray Historia Plantarum.

Ray Synops vel Syn. Johannis Ray Synopsis.

Ray Meth. Gram. Joh. Ray Methodus Graminum.

**Ray Syll. Joh. Ray Sylloge plantarum extra Brit-
tannias nascentium.**

S. B. Samuel Brovvn.

Scherard. Guillelmus Scherardus.

Tabern. Ic. Tabernæmontani Icones.

Thal. Thalii sylva Hercynia.

Vaillant. Sebastianus Vaillant.

**Virid Lusit. Gabrielis Grisley Viridarium Lusi-
tanicum.**

Zanon. Historia Botanica di Giacomo Zanon.

Methodi quam brevissima Synopsis.

Gramina Spica Triticea Simplici. Pag. 1.

- - - Spica Triticea spuria Simplici. 3.
- - - Spica Hordeacea Simplici. 3.
- - - Spica Simplici Hordeacea Singulari. 5.
- - - Spica Simplici Secalina. 5.
- - - Spica Simplici Secalinæ affini in Ad.
- - - Spica Simplici Loliacea. 6.
- - - Spica Simplici Loliacea, **Corniculata** dicta. 8.
- - - Spica Simplici Loliacea spuria. 9.
- - - Spicata, Panicea dicta. 10.
- - - Spica Simplici Phalaroidea dicta. 11.
- - - Alopecuroidea dicta. 12.
- - - Typhina, aut Typhoidea dicta. 13.
- - - Typho-Phalaroidea. in Addend.
- - - Myosuroidea dicta. 14.
- - - Echinata seu Spinosæ. 15.
- - - Cristata dicta. 16.
- - - Anomala. 17.
- - - Polystachia, Dactyloidea dicta. 20.
- - - Dactylo affinia. 24.
- - - Inter spicata & paniculata media, quæ sunt
 1. Cornucopioidea. 25.
 2. Locustis peculiaris structuræ. 25.
- - - Paniculata - - - 26. & quidem
 1. Locustis Simplicibus. 27.
 2. Locustis in eadem panicula nunc Simplicibus nunc Compositis. 34.

3. Locustis Compositis muticis. 35.

4. " " Aristatis. 45.

5. Aristatis nudis seu calyce de-
stitutis. 54.

6. Panicula Heteromalla , seu ver-
sus alterutrum latus spectan-
te. 56.

- - - Reliqua, & Graminibus affinia, & qui-
dem.

1. Linagrostis seu Gramen pappo-
sum. 60.

2. Juncoides. 61.

Juncus. - - - - 66.

Junco affinis - - 69.

Canna - - - - 69.

Scirpus - - - - 70.

Scirpoides - - - - 75.

Pseudo Cyperus - - 76.

Cyperus - - - - 76.

Cyperoides - - - - 83.

Cyperoidi affinia - 93.

Errores , ex festinatione commissos ,
 Benevolus Lector , sequentes
 emendet.

- Pag. 1. lin. 3. *pro Batanicos*, *lege*, *Botanicos*.
 Pag. 2. lin. 20. *pro arundinaccum*, *lege*, *arundinaceum*.
 Pag. 3. lin. 16. *dele*, *Festuca altera capitulis duris*. C. B.
 & loco 151. *pone* 152.
 Pag. 6. lin. 10, *pro propriæ*, *lege*, *proprio*.
 lin. 14. *post* *parte*, *pone*, *plerunque*.
 Pag. 7. lin. 19. *pro Gramineum*, *lege*, *Gramineum*:
 lin. 25. *pro I. II. lege*, *II. III.*
 Pag. 8. lin. 25. *pro denticulatæ*, *lege*, *denticulato*.
 Pag. 9. lin. 5. *pro denticulatæ*, *lege*, *denticulato*, & *pro*
 muticis, *lege*, *Aristatis*.
 lin. 25. *post* *Loliaceum*, *pone*, *junceuni*.
 lin. 27. *pro minimum*, *lege*, *marinum*.
 Pag. 10. lin. 9. *pro fungente*, *lege*, *fungentis*, *post hoc pone*, *qui*
 & aliquando duplici gluma constat.
 Pag. 11. lin. 3. *pro Gramen*, *lege*, *Gramen*.
 lin. 22. *pro perpcndicularis*, *lege*, *perpendicularis*.
 lin. 24. *pro accuminatum*, *lege*, *acuminatum*.
 Pag. 13. lin. 23. *pro 474*. *lege*, 472.
 Pag. 14. lin. 3 *post* I. B. *pone*, II.
 Pag. 15. lin. 10. *pro Mutico*, *lege*, *Aristato*, ubi notandum,
 Aristam folliculi, ita in calycis glumis quandoque
 latere, ut primo examine visum meum effugerit.
 Pag. 17. lin. 11. *pro segentibus*, *lege*, *tegentibus*.
 lin. 14. *pro Plin.* *lege*, *Pin.*
 Pag. 19. lin. ult. *pro denticulatæ*, *lege*, *denticulato*.
 Pag. 22. lin. 23 *pro solio*, *lege*, *folio*.
 Pag. 28. lin. 19. *pro Arundinacenm*, *lege*, *Arundinaceum*.
 Pag. 37. lin. 6. *pro accuminato*, *lege*, *acuminato*.
 Pag. 41. lin. 10. *pro minimm*, *lege*, *minimum*.
 Pag. 51. lin. 16. *pro Locustis*, *lege*, *Locustis*.
 Pag. 57. lin. 16. *pro fulliculis*, *lege*, *folliculis*.
 Pag. 64. lin. 4. 5. *pro roundis*, *lege*, *rotundis*.
 Pag. 85. lin. 7. *pro diversis*, *lege*, *diversis*.
 Pag. 90. lin. 25. *pro solia*, *lege*, *folia*.
 in vocum explic. voce *Gluma*, lin. 13. *pro repreſen-*
 tet, *lege*, *repræſentet*.