

- Digitalisierte Fassung im Format PDF -

Spicilegium florae Lipsicae.

Johann Christian Daniel von Schreber

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](#) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

D. IO. CHRIST. DAN. SCHREBERI

SER. MARGGR. BRAND. ONOLZB. ET CVLMB. CONSIL. AVL.
MED. BOT. ET OEC. P. P. O. IN ACAD. ERLANG. ACAD. N. C.
ET HIST. GÖTTING. SOC. BOT. ET GEORGOPH. FLORENT.
OEC. LIPS. ET VDIN. SOD.

SPICILEGIVM
FLORAE
LIPSICAE.



LIPSIAE,
PROSTAT IN BIBLIOPOLIO DYKIANO
c:
1771.

N^o 10

75

V I R O
ILLVSTRI, EXCELLENTISSIMO
ET EXPERIENTISSIMO
CHRISTIANO GOTTLIEB
LVDWIGIO,

PHIL. ET MED. D. IN VNIV. LITT. LIPSIENSE
THERAP. P. P. O. ORD. MED. DECANO PERP.
ACAD. DECEMVIRO, COLL. MAI. PRINCIP. ET
COLL. B. M. V. SOD. ACAD. R. BORVSS. SC. SOC.
OECON. LIPS. ET PHYS. BOT. FLOR.
SOCIO

S.

Viginti elapsi sunt anni, ex quo illustr.
BOEHMERI, nunc Prof. Vitem-
bergensis dignissimi, *Flora Lipsiae indigena*
prodiit, T V O potissimum consilio a Viro
doctissimo adornata, obseruationibusque et
T V I S ET H E B E N S T R E I T I I ET G L E-
D I T S C H I I ita locupletata, vt nihil fere
plantarum circa Lipsiam sponte nascentium
desiderari, nihilque vltierius addi posse vi-
deretur.

Vix igitur mihi, cum ad lustrandas agri
Lipsiensis diuitias accederem, spes aliqua

superesse poterat, vnam alteramque plantu-
lam detegendi, quae tot attentos rerum na-
turae scrutatores, eoque nomine clarissimos,
latere potuerit. Verum enim vero ea stir-
pium est conditio, vt non omnes vbiique
vna nascantur, vbi locus illarum genio
aptus deprehenditur, sed nonnullae passim
in recessus quosdam et latebras se quasi ab-
scondant, vbi non eruuntur, nisi casu et
fortuito in eas incidas. Deinde quilibet
ager, quod ad plantarum prouentum atti-
net, non idem semper, sed variis mutationi-
bus obnoxius deprehenditur, intra paucos
saepe annos euenientibus, ita vt plantae an-
tehac domesticae euaneant, aliae contra
peregrinae accedant, et quasi ciuitatis ius
sibi vindicent. Ventis enim, et aquarum
fluctibus, atque cum ipsis adeo frumentis
peregre allatis herbarum nouitarum semi-

na simul adferri solent, quae, solum natale
conueniens nocta, facile se multiplicant et
propagant. Aliae e contrario variis soli na-
talis vicissitudinibus, aquarum impetu, pe-
corum frequenti morsu extirpantur. Alias
denique non omni anno prouenire, et nunc
rarius nunc frequentius denuo nasci, notis-
fima res est. Haec omnia mecum reputans,
et Florae Lipsiensis paullo aliam, quam
quae illustr. BOEHMERI temporibus fuit,
faciem animaduertens, non omnem spem,
nouarum plantarum potiundarum amisi.
Nec defuit mihi inquirenti nouarum ciuium
numerus, quarum obseruatione adeo dele-
ctatus sum, ut plures detegendi cupido in
dies cresceret, mihique incitamento esset,
ut per omne illud tempus, quod Lipsiae
consumsi, non modo loca iam a VOBIS aliis-
que perlustrata, denuo sub examen reuo-

carem, et in minimas praesertim plantas
operam qualemcumque meam conferrem,
sed etiam agros, prata, paludes, ripas, ne-
mora penitus perquirerem, quae vos intra
Florae Lipsiensis confinia, ad milliaris vnius
distantiam ab illustr. BOEHMERO constitu-
ta, intacta reliquisse, credibile erat. Quin
his non contentus, limites eius versus Oc-
cidentem, ut clar. BOEHMERVS versus
Orientem, paullo longius proferre, agrum-
que Ketschauicum, plantas maritimas alibi
rariores alentem, ditioni Florae Lipsiensis
subiicere non dubitaui, quod ad augendum
accessionum numerum multum omnino con-
tulit.

In hoc studio occupato magno mihi fuit
et incitamento et adiumento amicorum quo-
rundam, litterarum caussa tum Lipsiae com-
moran-

morantium consortium, qui in conquerendis plantis me sibi ducem elegerant, e quibus generosissimum ab E R M E S, Liuonum, Ser. Sax. Electoris Cubicularium, Clariss. F A^s B R I C I V M , iam Hafniae Oeconomics Professorem celeberrimum, H. L. W E R G E N I V M denique nominasse sufficiat, virum, a cuius acumine ingenii et indefessa diligentia fausta quaevis scientiae naturali augurari licuisset, nisi praematura mors illum nobis eripuisset.


Cum autem, ut humana fert conditio, non omnes Lipsiensis agri stirpes folus legere potuerim, non reticendi sunt, qui de quibusdam a me neglectis certioreme me facere voluerunt; Inter quos primo loco nominandus venit vir plantarum peritia inter summos Botanicos eminens, illustr. C A S I-

MIRVS CHRISTOPHORVS SCHMIDELIVS Ser. Principi nostro a consil. auiae intimioribus et Archiater , ob multa in me collata beneficia mihi venerandus, qui plurium rariorū patriae stirpium notitiam mihi impertire voluit, quam et in colligen- dis Lipsicis mihi profuisse ingenue fateor. Praeterea et multorum TVORVM discipu- lorum amicitia mihi fuit emolumento , vt clariss. HEDWIGII M. D. Practici Chem- nicensis meritissimi ; KAPPII M. D. Li- psiensis; AD. IVL. BOSII, M. D. et Prof. Vitemb. rebus humanis prae mature exempti ; et qui adhuc Lipsiae versantur, clariss. PON- LII, A. M. et KNOLLI M. B. quibus va- rias stirpes a me praetermissas acceptas refero.

Non

Non tamen facile de componendo Flo-
rae Lipsiensis supplemento cogitasse, nisi
TU, VIR ILLVSTRIS, mihi auctor fuis-
ses, ut hunc laborem in me suscipierem.
Voluntati **TVAE** ut obsequerer, maxime
me commouit cum multitudo beneficiorum,
quibus me adficere voluisti et reuerentia,
quam eo nomine **TIBI** debeo, tum spes
quaedam alicuius commodi, quod exinde
in rem herbariam redundare possit. Ex
aduersariis igitur collegi plantas operi Boeh-
meriano addendas, quas ita illi accommo-
daui, ut et ordo et nomina eidem, quantum
opus fuit, responderent; his aliquas inter-
spersi apud clar. **BOEHMERVM**, iam oc-
currentes, sed ex nuperis obseruationibus
accuratius a me definitas.

Accipe igitur, VIR ILLVSTRIS,
hunc libellum ea benevolentia, qua semper
erga me vsus es, quaque non solum et hor-
tum et βιβλιοταμεῖον TVVM, vtrumque in-
structissimum, mihi aperuisti, sed insuper
etiam et re et consiliis me adiuuisti, mihi-
que fauere perge. Vale. Dabam Erlangae
d. ix. Iul. cIcI CCLXXI.



CLASSIS I.

Plantae flore perfecto, simplici, monopetalo, regulari.

TRIANTHERA MONOSTYLA.

4. 5. IRIS (*sibirica*) corollis imberibus, germinibus trigonis, caule tereti, foliis linearibus. *Linn. sp. pl. p. 57. Gmel. sib. 1. p. 28.*
Iris foliis linearibus, caule subnudo, petalis reflexis imberibus venosis, tubarum arcu acuminato.
Hall. hist. n. 1259.

Iris angustifolia 2. *Clus. hist. 1. p. 227.*

Blauer Schwertel.

In pratis humidis *im Rosenthale* RVPP. reliquisque locis ab ill. BOEHMERO indicatis.

TETRANTHERAE MONOSTYLA.

12. GALLIVM (*glaucum*) foliis octonis linearibus subtus glaucis, pedunculis elongatis dichotomis summo caule floriferis, caule glauco laevi. *Linn. sp. pl. p. 156.*

A

Galli-

CLASSIS I. PLANTAE

Gallium saxatile glauco folio. *Bocc. mus. 2. p. 172. t. 116.*

Frequentius in finitimae Thuringiae montosis occurrit, vere et initio aestatis florens, perennis.

13. GALLIVM (*sylvaticum*) foliis octonis laevibus subtus scabris: floralibus binis, pendunculis capillaribus, caule laevi. *Linn. sp. pl. p. 155.*

Gallium caule terete, foliis octonis ellipticis *Hall. hist. n. 712.*

Im Bieniz plurimisque reliquis nemoribus v. g. ad Sommerfeld, Zwenka &c.

Caulis erectus. Saepe ab imperitis pharmacopoliis male pro Matrisilva venditur.

886. GALLIVM (*rotundifolium*) foliis quaternis ovatis aculeato-ciliatis, seminibus hispidis. *Linn. sp. pl. p. 156. var. β.*

Gallium foliis quaternis ovatis laevibus obtusis, panicula dichotoma, seminibus hispidis. *Linn. sp. pl. 1. p. 108. Scop. carn. 344. no. 9.*

Gallium foliis quaternis, petiolis longissimis brachiatis, seminibus hirsutis. *Hall. hist. n. 727.*

Rubia quadrifolia s. rotundifolia laevis. *Baub. pin. 334. prodr. 145.*

Rubia quadrifolia, semine duplice hispido. *Baub. hist. 3. p. 718. Moris. hist. 3. p. 329. f. 9. t. 21. f. 4.*

Cruciata minor glabra, molluginis folio. *Barr. ic. 324.*

In der Tigriz bey Diben. *Dn. BEYLICH, pharm. cop. Meuselwizens.*

MONOPETALAE REGVL. 3

887. GALLIVM (*uliginosum*) foliis senis lanceolatis retrorsum ferrato - aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu maioribus.
Linn. sp. pl. 153. fl. suec. 2. n. 127. Gmel. sibir. 3. p. 168.

Gallium caule subaspero, foliis senis elliptico - lanceolatis aristatis Hall. hist. n. 713.

Gallium aquaticum, flore albo. Barrel. ic. 82

Gallium album minus. Vaill. paris. 78.

Rubia quaedam minor. Baub. hist. 3. p. 716.

In pratis paludosis ad Schoenfeld.

888. GALLIVM (*asperum*) foliis septenis cauleque inferne pubescentibus, paniculae ramis strictis dichotomis.

Gallium foliis senis et novenis subasperis spinula terminatis. Hall. enum. p. 460. hist. n. 715.

Gallium album supinum multicaule angustifolium polyspermum. Rupp. jen. 3. p. 4.

In editioribus aridis ad Lindenthal, am Bieniz.

Caules debiles basi tantum ramosi, angulati, pubescentes, summitatibus laevibus. Folia pleraque septena linearia, apice paullo latiora, inferiora sena, at infra et ramulorum sterilium quina, spatulata; omnia carinata, mucrone rigido terminata, villis molliusculis pubescentia; suprema sub panicula iterum fere quina, linearia, minuta, laevia. Paniculae rami elongati stricti, divergentes, dichotomi. Flores parvi albi.

889. ASPERVLA (*cynanchica*) foliis quaternis linearibus: superioribus oppositis stipulatis, caule erecto, floribus quadrifidis.
Linn. sp. pl. 151.

CLASSIS I. PLANTAE

Asperula minima. *Gesn.* op. 1. p. 122. t. 157.

Gallium montanum latifolium cruciatum. *Col. ecphr.*
1. p. 296. t. 297. f. 1.

Gallium album minus. *Tab. ic.* 151.

Rubeola vulgaris quadrifolia laevis, floribus purpu-
rascentibus. *Tourn. inst.* 130.

Rubeola Tournefortii. *Rupp. jen.* 3. p. 7.

Rubia cynanchica. *Bauh. pin.* 333. *bist.* 3. p. 723.

In versuris tenui gramine vestitis ad Ketschau.

Stipulae inter folia superiora oppositae, ovatae,
acuminatae, minimae.

890. **PLANTAGO** (*media*) foliis ovato - lan-

ceolatis pubescentibus, spica cylindracea,

scapo tereti. *Linn. sp. pl.* 163.

Plantago latifolia incana. *Bauh. pin.* 189.

Plantago maior incana. *Clus. bist.* 2. p. 109. *Lob. ic.*
1. p. 304.

Plantago media. *Cam. epit.* 262. *Dod. pempt.* 107.

Plantago maior hirsuta, media a nonnullis cogno-
minata. *Bauh. bist.* 3. p. 504.

In siccioribus ubique, ad vias, semitas &c.

891. **PLANTAGO** (*maritima*) foliis semicy-
lindraceis integerrimis basi lanatis, scapo
tereti. *Linn. sp. pl.* 165.

Plantago marina. *Lob. ic.* 306. *Tab. ic.* 733.

Plantago maritima, foliis gramineis. *Rupp. jen.* 3.
p. 88.

Coronopus maritima maior. *Bauh. pin.* 190.

Ic. Oed. dan. t. 243.

Ad Salinas bey Ketschau.

MONOPETALAE REGVL. 5

892. CENTVNCVLVS (*minimus*) Dill. sp.
161. gen. 112. Eph. nat. cur. cent. 5. app. 92.
t. 10. f. 31.

Centunculus foliis alternis. *Gerard. gallopr.* 306.
Anagallidastrum exiguum, foliis lanceolatis alternis.

Mich. gen. 14. t. 18.

Anagallis paludosa minima, foliis rotundis alternatis.
Vaill. parif. 12. t. 4. f. 2.

Alsine palustris minima, flosculis albis. *Menz. pugill.*
t. 4. f. 5.

Icon *Oed. dan.* t. 177.

In agris arenosis ubique, praesertim locis sub-humidis.

Folia caulina inferiora opposita sunt.

PENTANTHERÆ MONOSTYLAE.

893. ANAGALLIS (*caerulea*) caule procumbente, foliis ovato-lanceolatis, corollis ferratis, calycis foliolis subulatis. *Hall. hist. n. 626.*

Anagallis caeruleo flore. *Baub. pin. p. 252. Tourn. inst. 141.*

Anagallis flore caeruleo femina. *Baul. hist. 3. p. 369.*

Anagallis femina. *Dod. pempt. 32. Camer. epit. 395.*

Blaues Gauchheil.

In agris rarius. *Am Gickerlingsberge.*

38. PRIMVLA (*elatior*) foliis dentatis rugosis, limbo corollarum plano. *Linn. sp. pl. 204.*

Var. Primula (*acaulis*) -- scapo nullo. *Linn. ibid.*

Primula veris pallido flore humilis. *Clus. hist. 1. p. 302.*

Icon *Oed. dan.* t. 194. *Blackw. herb. t. 52.*

Im Rosenthale passim, sed rarius.

Varietas Primulae veris pallido flore elatioris *Clus.*
absque omni dubio est, ex cuius semine ortam
saepius vidimus.

894. CAMPANVLA (*patula*) foliis strictis:
radicalibus lanceolato - ovalibus, panicula
patula. *Linn. sp. pl. 232. Hill. brit. p. 106.*
t. 106. f. 1.

Campanula caule brachiato, foliis lanceolato - linearibus
glabris, petiolis paucifloris nudis. *Hall. hist. n. 698.*

Campanula esculentae facie, ramis et floribus patulis.
Dill. elth. 68. t. 58. f. 68.

Icon *Oed. dan. t. 373.*

In pratis ubique, fl. Iun. Iul. biennis.

895. CAMPANVLA (*Cervicaria*) hispida, capitulo terminali, floribus sessilibus, foliis lanceolato - linearibus undulatis. *Linn. it.*

Oel. p. 115. fl. suec. 191. c. descr. sp. pl. p. 235.

Campanula caule simplici aspero, foliis lingulatis
asperis, floribus capitatis. *Hall. hist. n. 686.*

Campanula foliis et spica longissimis, floribus et
spica sessilibus in ala congestis *H. Gmel. sibir. 3.*
p. 157. t. 31.

Campanula alpina altissima, hirsuto parvo flore.
Tourn. inst. no. Segu. veron. 3. p. 102. descr.

Campanula foliis echii. *Baub. prodr. 36. c. fig. plantae humilioris.*

Rapunculus sylvestris caeruleus umbellatus maior.
Thal. hercyn. ic. 8. f. 1.

Trachelium altissimum hirsutum asperius, foliis angustis, floribus parvis. *Baub. hist. 2. p. 801. c. f. plantae procerioris. Raj. hist. 1. p. 734.*

Im Oberholze bey Oelschau und Stoermthal, im Bienitz
perennis fl. Aug.

MONOPETALAE REGVL. 7

Altitudo cubitalis, humanam tamen staturam non-nunquam aequat. Radix, ex observatione Gmelini, sapida.

896. CAMPANVLA (*rapunculoides*) foliis ovato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis. *Linn. sp. pl. 234.*

Campanula caule tereti, foliis ovato-lanceolatis hispidis, floribus solitariis secundis pendulis. *Scop. carn. 260.*

Campanula foliis cordato-lanceolatis hirsutis, petiolis unifloris. *Hall. hist. n. 692.*

Campanula repens, flore minore caeruleo. *Baub. hist. 2. p. 806.*

Campanula hortensis rapunculi radice. *Baub. pin. 94. Moris. hist. 2. p. 460. f. 5. t. 3. f. 32.*

Ad sepes in editioribus supra Markkleberg, in dem Rosenthalc aliisque nemoribus ad Plissam, in hortis vitium frequens, molestum.

Radicibus admodum reptat, quae esculentae sunt.
DOD.

897. CAMPANVLA (*rotundifolia*) foliis radicibus reniformibus, caulinis linearibus. *Linn. sp. pl. 232. Gmel. sib. 3. p. 161.*

Campanula foliis serratis, radicalibus cordatis, caulinis lanceolatis. *Hall. hist. n. 701.*

Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Baub. pin. 93. Lob. ic. 328. Moris. hist. 2. p. 456. f. 5. t. 2. f. 17.*

Campanula sylvestris minima. *Dod. pent. 167.*

Rapunculus sylvestris minor. *Tab. ic. 409.*

Icon *Oed. dan. t. 489.*

In acclivibus siccioribus ad viam qua itur versus Gonnelwiz, um den Bieniz, in colle templi S. Thecla^e vulgo Tigelkirche, auf der Wiese hinter Apels Garten.

898. SAMOLVS (*valerandi*). Linn. sp. pl. p. 243.

Hall. hist. n. 707.

Samolus valerandi. Baub. hist. 3. p. 780. Tourn. inst. 143.

Anagallis aquatica rotundo folio non crenato.
Baub. pin. 252.

Veronica aquatica folio rotundo non crenato.
Moris. hist. 2. p. 323. f. 3. t. 24. f. 28.

Ignota ex Bauhini siccis. Gesn. op. 1. p. 122. t. u6.
Icon Oed. dan. 189.

In rivulis salfis ad salinas *bey Ketschau.*

Stamina laciniis corollae opposita, ut in Primula af-

finibusque.

Capsula circumscissa, ut in Anagallide.

POLYANTHERAE

MONOSTYLA E.

899. LAVATERA (*thuringica*) caule herbaceo,
foliis summis hastatis calycibusque acutis,
pedunculis solitariis uuifloris.

Lavatera caule herbaceo, fructibus denudatis, caly-
cibus incisis. Linn. sp. pl. 973.

Malva montana mollis et incana, flore majore.
Rupp. jen. 3. p. 15.

Althaea flore majore. Baub. pin. 316.

Var. Malva palustris mollis et incana, laciniato folio.
Rupp. jen. 3. p. 15. Buxb. hal. 207.

In sepibus ad Wolkwiz invenit Jll. GLEDITSCH;
varietatem ad Haenichen olim observavit, Jll.
SCHMIDEL.

TRISTYLA E.

900. EVPHORBIA (*platyphyllos*) umbella
quinquefida: trifida: dichotoma, invo-
lucris

MONOPETALAE REGVL. 9

lucris carina pilosis, foliis ferrulatis lanceolatis, capsulis verrucosis. *Linn. sp. pl. 660. descr.*

Euphorbia umbella quinquefida: bifida, involucellis cordatis ferratis, foliis lanceolatis obtusis, floribus sessilibus, capsulis tuberculosis. *Scopoli carn. 431. n. 3. descr.*

Tithymalus foliis lanceolatis serratis, stipulis floralibus cordatis, capsulis asperis: lineis laevibus divisus. *Hall. hist. n. 1053.*

Tithymalus arvensis latifolius germanicus. *Bauh. pin. 291. Moris. hist. 3. p. 343, f. 10. t. 3. f. 1. mala. Tithymalus platyphyllos. Fuchs. hist. 813. Bauh. hist. 3. p. 670.*

Ad margines stagnorum ad *Burghausen*, *Ketschau*, *Frankenheim* et alibi *Martisburgum* versus. annua fl. exeunte aestate.

Umbella magis quam reliquarum diffusa. Planta graveolens, tota viridi-flavescens. *Folia* basi flexuosa. *Petala* lutea, senescentia rubescunt.

901. EVPHORBIA (*Esula*) umbella multifida: bifida, involucellis subcordatis, petalis sub-bicornibus, ramis sterilibus foliis uniformibus. *Linn. sp. pl. 660.*

Tithymalus foliis linearibus, petalis emarginatis. *Hall. hist. n. 1046.*

Esula minor. Dalech. hist. 1653. Dod. pempt. 374.

In agris humidis ad *Naumbos*. D. BRÜCKNER *pharm.* Summitates plantae tritae cuti impositae enormes excitant tumores, experimento rusticorum carniolicorum saepe funesto apud *Scop. l. c.*

C L A S S I S II.

Plantae flore perfecto, simplici, monopetalō
irregulari.

D I A N T H E R A E
M O N O S T Y L A E.

902. VTRICVLARIA (*vulgaris*) nectario co-
nico, scapo paucifloro. *Linn. Fl. Suec.* 28.
sp. pl. 26. Hall. hist. n. 290.

Lentibularia. *Riv. mon. 78. Dill. gen. 15.*

Lentibularia maior. *Vaill. aet. gall. 119.*

Millefolium aquaticum lenticulatum. *Baub. pin. 141.*

Icon *Oed. dan. 138.*

In stagno *an den Schönfeldischen Wiesen* et in scro-
biculis aqua stagnante repletis in alneto ibidem; Fl.
Junio perennis.

Radices nullae. Differt ab *utricularia nectario carina-
to* L. spinulis capillaribus minimis in margine foliorum,
observante Ill. D. D. SCHMIDELIO Ser. March. Bran-
denb. Onold. et Culmb. a consil. aul. sanctioribus.

903. VERONICA (*longifolia*) spicis terminali-
bus, foliis oppositis lanceolatis ferratis acu-
minatis. *Linn. hort. upf. 7. Fl. Suec. 9. sp. pl. 13.*

Veronica spicata. *Riv. mon. t. 171. bon. Rupp. jen.*

3. p. 245.

In nemoribus, *im Rosenthaler, bey Raschowitz &c.* Fl.
aestate, perennis.

904. VERONICA (*montana*) racemis lateralili-
bus paucifloris, calycibus hirsutis, foliis ova-
tis rugosis crenatis petiolatis, caule repen-
te. *Linn. amoen. acad. 4. p. 263. sp. pl. 17.*
Chamae-

CLAS. II. PLANT. MONOP. IRREG. II

Chamaedry spuriae adfinis rotundifolia scutellata.

Bauh. pin. 249.

Alysson montanum. Column. ecphr. i. p. 289. t. 288.

Veronica rotundifolia, scutellata aut biscutata, hederae folio. Moris. hist. 2. p. 231. f. 3. t. 23. f. 15.

Veronica caule procumbente, foliis hirsutis cordatis obtusis, racemis paucifloris. Hall. hist. 539.

In umbrosissimis im Rosenthale. Fl. Maio.

Caulis saepe praelongus. Folia rarius pilosa, saepe tota fere glabra.

905. VERONICA (*verna*) floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus. Linn. fl. Suec. 23. sp. pl. 19.

Veronica humilis erecta montana, flore parvo caeruleo. Dill. app. 38.

Veronica montana Riv. mon. 96.

Veronica foliis ovatis tripartitis et quinquepartitis, floribus brevissime pedunculatis. Hall. hist. 552.

In apricis aridis ad templum S. Theclae; Fl. vere, annua.

TETRANTHERAE

MONOSTYLA E.

906. TEVCRIVM (*Scorodonia*) foliis cordatis ferratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. Linn. sp. pl. 789.

Chamaedrys foliis cordatis productis, spicis longissimis nudis heteromallis. Hall. hist. n. 287.

Scorodonia. Riv. mon. t. 12.

In der Tigliz bey Düben. Dn. BEYLICH. Fl. aestate, perennis.

CLASSIS II. PLANTAE

907. STACHYS (*arvensis*) verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis, corollis longitudine calycis, caule debili. *Linn. Syst. nat.*

2. p. 395.

Stachys arvensis minima. *Riv. mon. t. 27.*

Trixago foliis ovatis cordatis rotunde dentatis hirsutis. *Hall. hist. n. 231.*

Sideritis alsines trixaginis folio. *Bauh. pin. 233. prodr. III.*

Marrubiastrum vulgare. *Tourn. inst. 190.*

Lamium paludosum belicum. *Herm. lugd. p. 351. t. 353.*

In agris humidiusculis ad Trachenau. Fl. Jul. Aug. annua.

908. CARDIACA (*Marrubiastrum*) foliis ovatis lanceolatisque ferratis, calycibus sessilibus spinosis. *Linn. sp. pl. 817 sub LEONVRO.*

Cunila foliis ovatis dentatis verticillis multifloris, *Hall. goett. 334. descr.*

Marrubiastrum angusto cardiacae folio viridi. *Bocc. mus. 2. p. 136. t. 98.*

Stachys folio cardiacae. *Riv. mon. Rupp. jen. 3. p. 227.*

Im Rosenthaler inter frutices, lecta ab Ill. LUDWIGIO.
Fl. Aug. perennis.

909. MENTHA (*Pulegium*) floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulis subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. *Linn. sp. pl. 807.*

MONOPETALAE IRREGVL 13

Mentha caule prostrato, foliis subrotundis obiter dentatis, staminibus exsertis. *Hall. hist. n. 221.*

Pulegium. *Fuchs. hist. 228. Rivin. ord. t. 23. Blackw. herb. t. 302.*

Poley.

In inundatis circa stagnum *ad Leutsch.*

Infusum cum vino albo emmenagogum praestantis- simum, observante perill. HALLERO.

910. MELAMPYRVM (*cristatum*) spicis qua- drangularibus: bracteis cordatis compa-ctis denticulatis imbricatis. *Linn. sp. pl. p. 842.*

Melampyrum luteum angustifolium. *Baub. pin. 234.*

Melampyrum luteum linariae folio. *Baub. prodr. 112.*

Melampyrum angustifolium cristatum, spica quadra- ta, flosculis ex luteo pallescentibus. *Pluk. alm. 249. t. 99. f. 2.*

Melampyrum cristatum. *Baub. hist. 3. p. 440. Riv. ord. t. 81.*

In nemorosis *im Bieniz, Universitätsholze.* D. KNOLLE.

Fl. aestate, annum.

911. MELAMPYRVM (*pratense*) floribus se- cundis lateralibus: coniugationibus remo- tis, corollis clausis. *Linn. sp. pl. 843.*

Melampyrum luteum latifolium. *Baub. pin. 243. Tourn. inst. 173.*

Melampyrum foliis infimis integerrimis, mediis dentatis, floralibus hastatis. *Hall. hist. n. 308.*

In umbrosis *im Bieniz, ad Lindenthal, Breitenfeld,* et in aliis circuli *Lipsiensis* nemoribus, ubi saepius occurrit corollis rubellis, ad labium sanguineis.

912. MELAMPYRVM (*sylvaticum*) floribus se-
cundis lateralibus, coniugationibus remo-
tis, corollis hiantibus. *Linn. sp. pl. 843.*

Melampyrum foliis integerrimis, floribus hiantibus.
Hall. hist. n. 307.

Icon Oed. fl. dan. t. 145.

In nemorosis im Oberholze. Fl. aestate annua.

913. ANTIRRHINVM (*Cymbalaria*) foliis cor-
datis quinquelobis alternis, caulis pro-
cumbentibus. *Linn. sp. pl. 851.*

Cymbalaria *Matth. comm. p. 1124. Dalech. hist. p. 1322. Baub. hist. 3. p. 685. Lob. ic. 615. Cam. epit. 860. Riv. ord. t. 86.*

In muris im Casp. Bosischen Garten, sponte, copio-
se. Fl. aestate. annua.

C L A S S I S III.

Plantae flore perfecto, monopetalo, compo-
sito, tubulofo.

STAMINIBVS IN ANTERAM CYLINDRACEAM COALITIS.

914. BIDENS (*minima*) foliis lanceolatis sessili-
bus, floribus seminibusque erectis. *Linn.
sp. pl. 1165.*

Verbesina minima. *Dill. giss. 167. app. 66. Rai. angl.
3. p. 188. t. 7. f. 2.*

Icon Oed. fl. dan. t. 313.

In agris arenosis udis nach Schönfeld, auch in der
Thongrube vorm Petersthore. annua.

MONOPETALAE TVBVLOSÆ. 15

Procul dubio varietas tantum speciei 187. s. *Bidentis tripartitae* est, cum saepe inter hanc occurrat et quo procerior est, eo magis laciniata folia habeat.

915. CARDVVS (*polyacanthos*) foliis decurrentibus sinuato-pinnatifidis margine spinosis, calycibus solitariis pedunculatis erectis villosis. *Linn. sp. pl. 1150. n. 4.*

Carduus caule crispus. *Baub. hist. 3. p. 59.*

Carduus spinosissimus vulgaris, Polyacantha Theophrasti. *Lob. ic. 21.*

Polyacantha Theophrasti. *Tab. ic. 701. bona.*

Ad margines viarum, agrorum, in cultis frequens.

Fl. Iul. Aug. perennis.

Synonymon Bauhini quoad iconem et descriptionem absque dubio ad hunc neque ad *C. crispum L.* spectat; quem tamen in descriptione cum illo confudisse videtur. *Carduus acanthoides I. B. 3. p. 59.* longe alia procul dubio planta est; quam ob rem nostrae, quae *C. acanthoides L.* est, nomen triviale immutavimus, ne cum Bauhiniana confundatur.

197. CARDVVS (*tuberifer*) foliis petiolatis subdecurrentibus subpinnatifidis spinosis, caule inermi, floribus solitariis. *Linn. sp. pl. 1154.*

Acanthus sylvestris alter. *Dalechamp. hist. 2. p. 1444.*
cum fig. bene plantam nostram exprimente.

Am Bieniz; in pineto ad Lindenthal.

CLASSIS IV.

Plantae flore perfecto, monopetalo, lingulato.

916. HIERACIVM (*dubium*) foliis integris ova-to-oblongis, stolonibus repentibus, sca-po nudo multifloro. *Linn. sp. pl. 1125. fl. Suec. 698.*

Pilosella major repens minus hirsuta. Baub. pin. 262.
In siccioribus tenui gramine vestitis passim.

917. HIERACIVM (*paludosum*) caule panicula-to, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. *Linn. sp. pl. 1129. Gort. ingr. 123.*

Hieracium foliis glabris dentatis: imis petiolatis, superioribus amplexicaulibus. Hall. hist. n. 45.

Hieracium latifolium glabrum ex valle griesbachiana.
Baub. hist. 2. p. 1033.

In pratis nemorosis paludosis: ad Abtnauendorf in aliecto; ad Leutsch; Im Universitätsholze. Fl. Jun. perennis.

918. CREPIS (*biennis*) foliis runcinato-pinnatifidis scabris: basi superne dentatis, calycibus muricatis. *Linn. sp. pl. 1136.*

Hieracium maximum chondrillae folio asperum.
Baub. pin. 127. prodr. 64.

Hieracium erucae folio hirsutum. Baub. hist. 2. p. 1025.

CLASSIS IV. PLANTAE MON. &c. 17

In graminosis ubique, *auf den Stadtwällen*, in pratis siccioribus, agrorum limitibus &c. Fl. Iul. biennis.

918. LACTVCA (*saligna*) foliis hastato-linearibus sessilibus carina aculeatis. *Linn. sp. pl. 1119.*

Lactuca sylvestris altera, angusto saligno folio, costa albicante. *Rupp. jen. 3. p. 207. t. 4. optima.*

Chondrilla viscosa humilis. *Baub. pin. 130. prodr. 68.*

Endivia minor lactucina spinosa. *Barr. ic. 136.*

In muris collapsis *Lipsiae. BVRSERVS aet. upf. 1724. p. 501. LINN. amoen. 1. p. 150. n. 59.* In scrobibus inter *Lützen & Markranstädt.* *RUPP.* Sed in neutro horum locorum reperire potuimus. Fl. exeunte aestate et autumno.

C L A S S I S V.

Plantae flore perfecto monopetalο
composito mixto.

919. MATRICARIA (*suaveolens*) receptaculis conicis, radiis deflexis, squamis calycinis margine aequalibus. *Linn. sp. pl. 1256. Gmel. Sib. 2. p. 200.*

Matricaria leucanthemos annua suaveolens, chamaemeli folio, ovariis albicantibus. *Vaill. aet. paris. 1720. p. 287. no. 22.*

Inter segetes passim annua.

920. MATRICARIA (*inodora*) receptaculis hemisphaericis, radiis patentibus, feminis

B bus

CLASSIS V. PLANTAE

bus coronato - marginatis, squamis calycinis margine obsoletis. *Linn. fl. Suec.* 765.

Chrysanthemum inodorum foliis pinnatis multifidis,
caule ramoso diffuso. *Linn. sp. pl.* 1253.

Chamaemelum inodorum annum humilius, foliis
obscure virentibus. *Morif. hist.* 3. p. 36.

Chamaemelum inodorum s. cotula non foetida.
Bauh. hist. 3. p. 120.

In agris post messem, solo praesertim arenoso *bey Schoenfeld, Lindenthal, Leutsch*, annua.

921. ASTER (Tripolium) foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris, ramis inaequatis, floribus corymbosis. *Linn. sp. pl.* 1226.
Gmel. Sib. 2. p. 187. t. 80. f. 2.

Aster maritimus Tripolium dictus, *Raj. hist.* 270.

Tripolium majus caeruleum. *Bauh. hist.* 267.

Tripolium. *Dod. pempt.* 379.

Ad Salinas *bey Ketschau* frequens. Fl. exeunte aestate, perennis.

922 ARNICA (montana) foliis ovatis integris:
caulinis geminis oppositis. *Linn. sp. pl.* 1245. *Gmel. Sib.* 2. p. 153.

Doronicum quintum germanicum. *Clus. hist.* 2. p. 18.

Alisma. *Matth. comm.* 934.

Icon. Oed. fl. dan. t. 63.

Wohlverleib.

In der Warte ad Taucha. Fl. Iul. perennis.

923. CHAMAEMELVM (arvense) receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus coronato-

MONOPETALAE COMP. MIXT. 19

ronato - marginatis. *Linn. sp. pl. 1261. n. 8.*
fl. suec. 768. sub nom. ANTHEMIDIS.

Chamaemelum inodorum. *Baub. pin. 135. Rupp.*
jen. 3. p. 139.

In agris post messem, ubique, biennis.

924. COREOPSIS (*Bidens*) foliis lanceolatis
serratis oppositis amplexicaulibus, floribus
cernuis. *Linn. sp. pl. 1281. it. Westgoth.*
p. 272.

Eupatorium aquaticum chrysanthemum. *Tab. ic. u7.*
Chrysanthemum aquaticum bidens, folio non divi-
so, flore radiato. *Morif. hist. 3. p. 17. f. 6. t. 5.*
f. 25.

Ad fossas, stagna, in paludosis, viis inundatis ubique,
Bidente cernua frequentior, cuius varietas esse ut plu-
rimum creditur.

925. CENTAVREA (*paniculata*) calycibus ci-
liatis, squamis planis, foliis bipinnatifidis:
rameis pinnatifidis linearibus, caule pani-
culato: *Linn. sp. pl. 1289.*

Centaurea calycibus ciliatis oblongis, foliis scabris:
caulinis pinnatis, rameis simplicissimis linearibus.
Gmel. Sib. 2. p. 98. t. 43.

Cyanus pinnulis foliorum pinnatis linearibus. *Hall.*
hist. n. 187.

Stoebe maior, caulinis non splendentibus. *Baub.*
pin. 3. p. 31.

Ad margines viarum, agrorumque ad Gobliz, Me-
ckern. Fl. aestate, annua.

20 CLASSIS VII. VIII. PLANTAE

C L A S S I S VII.

Plantae flore perfecto tripetalo,
HEXANTHERAE.

TRISTYLA.

926. TRIGLOCHIN (*maritimum*) capsulis sexlocularibus ovatis. *Linn. sp. pl. 483. act. stockh. 1742. t. 6. f. 4. 5. Gmel. Sib. 1. p. 72.*

Gramen marinum spicatum. *Lob. ic. 16.*

Gramen spicatum alterum. *Baub. pin. 6. theatr. 82.*

Icon Oed. dan. t. 306.

Ad Salinas Ketschavienses in rivulis pratisque salcis copiose.

C L A S S I S VIII.

Plantae flore perfecto tetrapetalo regulari.

TETRANTHERAE.

TETRASTYLA.

927. POTAMOGETON (*perfoliatum*) foliis cordatis amplexicaulibus. *Linn. sp. pl. 182. Hall. hist. 845.*

Potamogeton perfoliatum. *Raj. angl. 3. p. 149.*

Potamogeton foliis latis splendentibus. *Baub. pin. 95.*

Icon Oed. fl. dan. t. 196.

In stagnis.

928. POTAMOGETON (*heterophyllum*) foliis submersis linearibus sessilibus, natantibus lanceolatis petiolatis.

In stagno ad *Lindenthal*.

Caulis teres, ramosissimus, internodiis brevibus. *Folia* linearia basi angustata, acuta, tenera, subdiaphana; quae vero superficie aquae innatant, lanceolata, pariter acuta, nervosa, crassiora, petiolis brevibus insident. *Stipulae* solitariae, intrafoliaceae, foliis angustiores. Florentem nunquam reperi; inter plantas Buxbaumianas autem, quas possidet Ill. DD. SPRINGS-FELD Ser. Marggravio Brandenb. Onold. et Culmb. a consil. aul. urbisque ut et territorii Leucopetrensis medicus celeberrimus, specimen huius plantae vidi, spica densa pauciflora pedunculo paullo longiore fulta instructum. Cum Pot. natante confundi nequit, quo longe minus et tenerius est; accedit ad Potamogeton gramineum latiusculum, foliis et ramificationibus dense stipatis Raj. syn. 3. p. 149. t. 4. f. 3. prout cuius varietate forte haberi posset.

HEXANTHERAE.

MONOSTYLA E.

929. MYAGRVM (*paniculatum*) siliculis globosis punctato-rugosis. Linn. sp. pl. 894.

Myagro similis capsulis rotundis. Baub. pin. 109. prodr. 52. t. 52.

Pseudo-myagri species altera. Cam. epit. 902. f. 2.

Icon Oed. dan. t. 204.

In agris passim rarius. Fl. Majo annum.

22 CLASSIS VIII. PLANTAE

930. COCHLEARIA (*Coronopus*) caule depresso, foliis pinnatifidis, capsulis verrucosis.
Linn. syst. 2. p. 435. sp. pl. 904.

Ambrosia campestris repens. *Baub. pin. 138.*

Pseudo ambrosia. *Cam. epit. 596.*

Cornu cervi alterum. *Dod. pempt. uo.*

Icon *Gesn. oper. t. 119. Oed. dan. t. 202.*

Coronopus *Ruell. stirp. 373. Baub. hist. 2. p. 919.*

Blackw. herb. t. 120. Hall. hist. n. 502.

In viis vor dem Ranstädter Thore, auf der Vogelwiese an der Ziegelscheune.

OCTANTHERAE.

MONOSTYLA.

931. CHAMAENERION (*palustre*) foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Linn. suec. 330. sp. pl. 495. Gmel. Sib. 3. p. 165. sub EPILOBIO.*

Epilobium foliis glabris ellipticis integerrimis. *Hall. hist. n. 998.*

Epilobium foliis linearibus. *Linn. lapp. 149.*

Lysimachia siliquosa glabra minor. *Baub. pin. 245.*

Lysimachia siliquosa minor. *Tab. ic. 856.*

In pratis paludosis ad Abtnauendorf cum Triglochide palustri, ad piscinam inter Deliz et Meisdorf.

TETRASTYLA.

932. ELATINE (*Hydropiper*) foliis oppositis.
Linn. sp. pl. 527.

Hydropiper. *Buxb. cent. 2. p. 36. t. 37. f. 3.*

Alsinastrum serpyllifolium, flore albo tetrapetalo.

Vaill. Paris. t. 2. f. 1.

Icon Oed. dan. t. 146.

Ad piscinam Lindenaviensem.

POLYANTHERAE.

MONOSTYLA.E.

933. PAPAVER (*Argemone*) capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro. *Linn. sp. pl. 725.*

Argemone capitulo longiore. Baub. pin. 102. Lob. ic. 276.

Argemone capitulo tenuiore longiore hirsuto.

Moris. hist. 2. p. 278. f. 3. t. 14. f. 10.

In agris cultis frequens, annum.

Varietatem P. dubii esse cl. Cranzius vult; separat Perill. Hallerus.

934. PAPAVER (*dubium*) capsulis oblongis glabris, caule multifloro fetis appressis, foliis pinnatifidis incisis. *Linn. sp. pl. 726.*

Papaver erraticum capite longissimo glabro. Tourn. inst. 238. Rupp. jen. 3. p. 71.

Argemone capitulis longis glabris. Moris. hist. 2. p. 279. f. 3. t. 14. f. 11.

In agris praesertim minus fertilibus frequens, annum.

CLASSIS IX. PLANTAE
C L A S S I S I X.

Plantae flore perfecto tetrapetalō irregulari.

HEXANTHERA.

MONOSTYLA.

935. FVMARIA (*capnoides*) siliquis linearibus
tetragonis, caulis diffusis acutangulis.
Linn. sp. pl. 984.

Fumaria lutea. *Baub. pin. 143.*

Fumaria lutea montana. *Dalech. hist. 1294. Tab. ic.*

Fumaria tingitana. *Pluk. alm. 262. t. 90. f. 2.*

Pseudo fumaria flore luteo. *Riv. pent. tab. 74.*

In muris horti Casp. Bosiani, aliisque, frequens, annua. Fl. aestate.

DECANTHERAE.

VNILOCVLARES.

936. TRIFOLIVM (*hybridum*) capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente. *Linn. fl. Suec. 664. descr. sp. pl. 1079.*

Trifolium caulis subrectis, spicis depresso-siliquis dispermis. *Hall. hist. n. 368.*

Trifolium pratense corymbiferum &c. *Mich. gen. 28. t. 2. f. 2.*

Trifolium orientale altissimum, caule fistuloso, flore albo. *Vaill. paris. 195. t. 22. f. 5.*

Trifolium flore albo. *Riv. tetr. tab. II.*

Weißer Wiesenklee.

In pratis *hinter dem Brandvorwerke* aliisque vrbi vicinis frequens.

Planta pabularis praestans, Trifolio pratensi haud inferior, quae pari ratione coli meretur. Parcius tamen semina maturat. Colore capitulorum albo roseoque prata decorat.

937. TRIFOLIVM (*procumbens*) spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, caulis procumbentibus. *Linn. sp. pl. 1088. it. gotl. 257.*

Trifolium lupulinum alterum minus. *Raj. angl. 3. p. 330. t. 14. f. 3.*

In pratis, solo steriliiori inundato, *am Oberholze, in der Bürgeraue, und auf den Wiesen bey Leutsch.* Fl. Iul.

Differt ab agrario n. 316. capitulis minoribus paucifloris, vexillis angustioribus, aridis pallidioribus, minus manifeste striatis, nec plicatis, circa fructum magis convolutis. Variat caulis pluribus procumbentibus, et caule unico erecto.

938. SPARTIVM (*Scoparium*) foliis ternatis solitariisque pubescentibus, ramis inermibus angulatis. *Linn. sp. pl. 996.*

Spartium foliis inferioribus ternatis hirsutis superioribus simplicibus. *Hall. hist. n. 354.*

Genista. *Dod. pempt. 761. Riv. pent. t. 65. Blackw. herb. t. 144.*

Genista angulosa et scoparia. *Baub. pin. 395. Hafengeil.*

In nemorosis ad officinam lateritiam *Meisdorfi*; in pineto ad *Lindenthal* copiose.

26 CLASSIS IX. PLANTAE

Planta graveolens, amariuscula, adstringens, ad coria praeparanda pariter ut cortex querius apta. *Gleditsch.* Decoctum summitatum cum semine sinapis sumtum, alvum et urinam movet, in hydrope praestans, ut et lixivium plantae igne aperto combustae. Semina tosta Coffeae quodammodo substitui possunt. Cortex maceratus fila crastla ad telas viliores apta dat.

939. Vicia (*tetrasperma*) pedunculis subbifloris, leguminibus laevibus seminibus globosis quaternis. *Linn. sp. pl. 1039. sub E R V O.*

Vicia foliis linearibus, siliquis gemellis glabris. *Hall. hist. n. 423.*

Vicia segetum, singularibus siliquis glabris. *Baub. pin. 345.*

Vicia minor segetum, cum siliquis paucis glabris. *Morif. hist. 2. p. 64. f. 2. t. 4. f. 16.*

Cracca minor siliquis gemellis. *Riv. pent. t. 53.*

Icon *Oed. dan. t. 95.*

Vogelwicke.

In agris passim frequens.

940. OROBVS (*tuberosus*) foliis pinnatis lanceolatis stipulis semifagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. sp. pl. 1028.*

Orobus caule simplici, foliis senis ellipticis, radice tuberosa. *Hall. hist. 417.*

Orobus radice tuberosa. *Riv. tetr. t. 59.*

Lathyrus angustifolius radice tuberosa. *Loef. pruss. 138. t. 37.*

Astragaloides. *Baub. hist. 2. p. 334.*

Astragalus sylvaticus. *Thal. herc. 7. f. 1.*

In der Tigliz bey Düben. Fl. Maj. perennis.

Tubera dulcia, sapore ad Glycyrrhizam accedunt, quibus et vescuntur et ad pectoris affectus medicamenti loco utuntur Scotti. Raj.

343. LOTVS (*corniculatus*) capitulis depresso-
caulibus decumbentibus, leguminibus cy-
lindraceis patentibus. *Linn. sp. pl. 1092.*

Var. - - (tenuifolius) foliolis stipulisque linearibus.
Lotus pentaphyllos frutescens, tenuissimis glabris
foliis. *Baub. pin. 332. prodr. 144. n. 22. descr.*

Ad Salinas Ketschavienses in salmis.

Radices nodulis tuberosis interstinctae. Origo hu-
ius varietatis solo salso tribuenda esse videtur; in solo
enim minus salso foliolis latioribus invenitur. Salia
tamen in aquis thermarum carolinarum contenta fo-
liorum formam vix mutant, ubi in ipsis fontibus so-
terii calidis crescit; florum tantummodo color magis
aureus esse solet.

941. MEDICAGO (*minima*) pedunculis mul-
tifloris, leguminibus cochleatis: spinulis
hamatis, stipulis integris. *Ger. gallopr. 518.*
n. 13.

Medicago polymorpha minima. *Linn. sp. pl. 1099.*
var. μ.

Medica echinata minima. *Baub. hist. 2. p. 386.*

Cochleata echinata minima. *Riv. tetr. t. 88.*

Trifolium echinatum fructu minore. *Baub. pin. 330.*

Icon Oed. fl. dan. t. 211.

Schneckenklee.

In arenosis agris versurisque am Biniz, ad Deidiz.
Fl. aestate, annua.

Planta pubescens parva, prostrata. Foliola cuneiformia, emarginata, ferrulata cum acumine. Stipulae lanceolatae vix crenulatae. Pedunculi foliis paulo longiores bi - five quadriflori.

C L A S S I S X.

Plantae flore perfecto pentapetalo regulari.

PENTANTHERAE.

PENTASTYLAE.

942. LINVM (*Radiola*) foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *Linn. fl. suec. 272. sp. pl. 402.*

Linum tetrapetalon, caule ramosissimo dichotomo.
Hall. bist. n. 840.

Chamaelinum vulgare. *Vaill. paris. 33. t. 4. f. 6.*
Radiola. *Dill. gen. p. 127. t. 7. eph. nat. cur. cent. 5. app. t. 9.*

Radiola vulgaris serpyllifolia. *Raj. angl. 3. p. 345. t. 15. f. 3.*

Linocarpon serpylli folio multicaule et multiflorum. *Mich. gen. 23. t. 21.*

Millegrana minima. *Lob. ic. 1. 422.*

Polygonum minimum. *Baub. pin. 282.*

Icon Oed. dan. t. 178.

In agris arenosis subhumidis *bey den Schænfeldischen Wiesen*. Fl. Aug. annum.

DECANTHERAE.

MONOSTYLA.

943. LEDVM (*palustre*). *Linn. fl. suec. 352. sp. pl. 561.*

Ledum

PENTAPETALAE REGVL. 29

Ledum Silesiacum. *Clus. hist.* 1. p. 83. *Tab. ic.* 1069.
Cistus Ledon foliis rosmarini ferrugineis. *Baub.*
pin. 467.

Rosmarinum sylvestre. *Cam. epit.* 546. *Baub. hist.* 2.
p. 23.

Wilder Rosmarin, Post, Kienpost.

In nemorosis ad Meckern olim habitavit, nuper de-
structum; *in der Dübenschen Heide*, unde quotan-
nis copiose advehitur.

Odor gravis, caput tentans. Cerevisiae incoctum
temulentiam promovet & cephalalgias caussatur. Ap-
portatur quotannis copiose et ad abigendas tineas
vestibus apponitur. Apes allicit; ad corium Russi-
cum (*Fusfen*) praeparandum una cum aliis simplici-
bus eo utuntur.

TRISTYLAE.

381. ALSINE (*rubra*) foliis linearibus: stipu-
lis membranaceis vaginantibus. *Linn. sp.*
606. sub ARENARIA.

β. - - (*maritima*) foliis subcarnosis longitudine
internodiorum. *Linn. hort. Cliff.* 173.

Spergula marina nostras. *Raj. hist.* 1034.

Alsine spergulae facie media. *Baub. pin.* 251.

Ad Salinas *bey Ketschau*, annua fl. aestate.

Stamina huic quinque, septem ad decem.

944. ALSINE (*trinervia*) foliis ovatis acutis
petiolatis nervosis. *Linn. sp. pl.* 605. *sub*
ARENARIA.

Alsine plantaginis folio. *Baub. hist.* 3. p. 363.

Alsine foliis ovato-lanceolatis trinerviis. *Hall.*
hist. n. 878.

CLASSIS X. PLANTAE

In nemoribus humidis umbrosis, *im Rosenthal, dem zschöcherischen Holze, Biniz, pineto ad Lindenthal*; in pratis humidis ad *Abtnauendorf*, annua, fl. aestate.

945. ALSINE (*viscosa*) caule paniculato foliisque pubescentibus, petalis capsulisque calyce pubescente brevioribus.

Icon *Oed. dan. t. 389.*

In colle ad templum *S. Theclae*, primo vere.

Caulis uncialis, erectus, pilosus. *Folia* linearia, pilosa, subtus striata. *Panicula* pauciflora, dichotoma, cum pedunculis solitariis e dichotomia. *Pedunculi* capillares, pilosi. *Calycis* foliola lanceolato-linearia, perangusta, acuminata, pilosa; horum tria membranula angustissima marginata. *Petala* lanceolata obtusa (rarissime emarginata) calyce breviora. *Antherae* subdidymae, rubellae, supra germen conniventes sub anthesi. *Pistillum* altitudine staminum; *styli* tres villosi. *Capsula* oblongo-turbinata, trivalvis: valvulis truncatis. *Pili* pellucidi capitati. Similis *A. tenuifoliae* L. sed tota villoso-viscosa.

946. ALSINE (*nemorum*) foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramosis. *Linn.*
fl. suec. 2. n. 391. sp. pl. 603. sub ARE-
NARIA.

Alsine montana latifolia, flore laciniato. Baub. pin.
250.

In nemorosis succulentis, im zschöcherischen Holze,
in pineto ad Lindenthal, annua.

Cerastrio aquatrico 377. ad finis, sed distinctissima est, cum humilis maneat, nunquam scandat, folia caulina plurima petiolata gerat, et constanter tres stylos nan-

ciscatur.

PENTAPETALAE REGVL. 31

ciscatur. Ill. SCHMIDEL de *Iungermannia* p. 5. In Cerastio aquatico plerumque stylos 5, nonnunquam 6 observavimus.

947. ALSINE (*marginata*) foliis verticillatis seminibus marginatis. *Linn. sp. pl. 630.*
sub SPERGVLA. *Gleditsch. Abhandl. 2. p. 296.*

Arenaria teretifolia verna flore albo semine limbo foliaceo cincto. *Rupp. jen. 3. p. 113.*

Alsine spergulae facie minima, seminibus marginatis. *Tourn. inst. p. 244.*

In agris arenosis passim v. g. *nach Schœnfeld hin*,
cum vulgari Spergula.

948. CERASTIVM (*viscosum*) erectum villoso-viscosum. *Linn. sp. pl. 627.*

Myosotis hirsuta altera viscosa. *Vaill. paris. 142. t. 30. f. 1.*

Ad vias versus *Merseburg*, *Delitsch*, annua.

949. LYCHNIS (*noctiflora*) tristyla, calycibus decangularibus: dentibus tubum aequantibus, caule dichotomo. *Linn. sp. pl. 599.*
sub SILENE.

Viscago foliis ovato-lanceolatis hirsutis, caule brachiato, calycibus venosis. *Hall. hist. n. 9n.*

Lychnis noctiflora. *Baub. pin. 205.*

Ocymoides non speciosum. *Baub. hist. 3. p. 344. fig.*

Ocymoides noctiflorum. *Cam. hort. 109. t. 34.*

In nemoribus caeduis umbrosis *ad Gonnelwiz*, annua.

CLASSIS X. PLANTAE
POLYANTHERAE.

TRISTYLAE.

950. HYPERICVM (*quadrangulum*) floribus trigynis caule tetragono herbaceo. *Linn.*
sp. pl. 1104.

Hypericum caule quadrangulari, foliis ovatis perforatis punctatis. *Hall. Hist. n. 1038.*

Hypericum vulgare minus, caule quadrangulo, foliis non perforatis. *Baub. pin. 279.*

Androfaemum. *Dod. pemt. 78. Cam. epit. 677.*

In humidis nemorosis ad Zweynauendorf; ad Deliz, Abtnauendorf, Burghausen in pratis, frequens. Fl. Iul. perennis.

951. HYPERICVM (*hirsutum*) floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. *Linn. sp. pl. 1105.*

Hypericum villosum erectum caule rotundo. *Tourn. inf. 255.*

Androfaemum alterum hirsutum. *Col. ecphr. i. p. 74.*

In nemorosis humentibus ad Zweynauendorf, im Rosenthal, Kanitsch, perennis.

POLYSTYLAE.

952. RANVNCVLVS (*polyanthemos*) calycibus patulis pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Linn. sp. pl. 779.*

Ranunculus caule ramoso multifloro, foliis septilobis, lobis tridentatis, acutis. *Hall. hist. 1171.*

Ranunculus polyanthemos simplex. *Lob. ic. 666.*

Ranun-

Ranunculus sylvestris. Tab. ic. 42.

In pratis ad Kautsch, Zschocher, Lindenau, solo steriliiori, perennis. Fl. aestate.

953. RUBUS (*saxatilis*) foliis ternatis, flagellis nudis reptantibus herbaceis. Linn. sp. pl. 708.

Rubus caule herbaceo foliis ternatis glabris, acinis baccarum distinctis paucissimis. Hall. hist. n. m.
Rubus alpinus humilis. Gesn. hort. 277. Baub. hist. 2. p. 61.

Rubus saxatilis sive petraeus. Clus. hist. p. 117. ic. 118.

Chamaerubus saxatilis. Baub. pin. no.

Icon Oed. Dan. t. 134.

Im Oberholze, inter Ericam et Vaccinia.

CLASSIS XI.

Plantae flore perfecto pentapetalo irregulari.

PENTANTHERA.

MONOSTYLA.

954. VIOLA (*hirta*) acaulis, foliis cordatis piloso-hispidis. Linn. sp. pl. 1324.

Viola martia hirsuta inodora. Moris. hist. 2. p. 475.
f. 5. t. 35. f. 4.

Viola trachelii folio. Raj. hist. 105t.

Wilde Violaten. Brunnfels. Kräuterbuch. I. p. 94.
f. bon.

In pratis hinter dem Apelischen Garten, dem Brandvorwerke, et alibi, frequens. Fl. Aprili.

A *Viola odorata* discernitur defectu stolonum, foliis minus cordatis, odore debilissimo et plerumque fere

34 CLASSIS XI. XII. PLANTAE

nullo; a canina nectariis brevibus, et tempore floren-
di multo praecociori, floret enim ante Violam odo-
ratam.

DECANTHERA.

MONOSTYLA.

955. GERANIVM (*molle*) pedunculis bifloris
foliisque floralibus alternis, petalis bifidis,
calycibus muticis, caule erectiusculo.
Linn. syst. 2. p. 455. n. 48. sp. pl. 955.

Geranium soliis mollissimis hirsutis reniformibus
semiquinquefidis: lobis semitripartitis obtusis.
Hall. hist. n. 939.

Geranium columbinum villosum, petalis bifidis.
Vaill. Paris. p. 79. t. 15. f. 3.

Pes columbinus. *Dod. pent. p. 61.*

In pomariis pratis passim; in ruderatis ad pagos
v. g. *bey Lindenthal*, annua.

C L A S S I S XII.

Plantae flore pentapetalo umbellato.

956. BUPLEVRVM (*rotundifolium*) involucris
universalibus nullis, foliis perfoliatis.
Linn. sp. pl. 340.

Bupleurum caule brachiato ramosissimo, foliis ova-
to-lanceolatis amplexicaulibus. *Hall. hist. n. 767.*

Perfoliata, *Dod. pent. 104. Cam. epit. 888. Lob. ic.*
396. Riv. pent. t. 45. Tab. ic. 759. II. Moris.
umb. t. 8. Blackwell. T. 95.

Perfoliata vulgatissima arvensis, *Baub. pin. 277.*

Durch-

Durchwachs.

Inter segetes *bey Abtnauendorf und nach Eulenburg hin.*

498. LASERPITIVM (*prutenicum*) foliolis pinnatifidis connatis: laciniis suboppositis nervis petiolisque hispidis. *Crantz. fasc. 3. p. 182. Grimm. Iseñ. 290.*

Laserpitium minus. Riv. T. 23. Hall. Gætt. p. 177.

In dem *Biniz et in prato hinter demselben, im Oberholze,* in pratis inter *Oeltschau et Kemliz copiosissime.*

505. SIVM (*angustifolium*) foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucro universali pinnatifido. *Huds. Angl. 103. Linn. sp. pl. 1672.*

Sium sive apium palustre, foliis oblongis. Baub. pin. 154.

Sium minus. Riv. pent. T. 79. Rupp. Ien. 3. p. 285.

In pratis ad *Abtnauendorf, Schænfeld, hinter dem Biniz,* solo uliginoso; praesertim in fossis ibidem.

CLASSIS XIII.

Plantæ flore perfecto hexapetalο.

HEXANTHERAE.

MONOSTYLAE.

524. b. ORNITHOGALVM (*minimum*) scapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramosis. *Linn. sp. pl. 440.*

36 CLASSIS XIII. PLANTAE

Phalangium radice bulbosa, stipulis maximis hirsutis, floribus umbellatis pedunculis multifloris.
Hall. hist. n. 1214.

Ornithogalum pannonicum minus, *Baub. pin. 71.*
Clus. hist. I. p. 190.

Hypopyxis. *Renealm. sp. p. 92.*

In Rosenthale. Fl. Aprili, perennis.

Parum differt ab O. luteo, et a quibusdam Botanicas cum illo coniungitur.

526. PHALANGIVM (*liliago*) foliis planis, corollis patentibus, pistillo declinato.
Linn. sp. pl. 445. sub ANTERICO.

Phalangium radicibus teretibus foliis radicalibus carinatis ensiformibus, pedunculis unifloris. *Hall. hist. n. 1207.*

Phalangium non ramosum, *Dod. pempt. 106. Lob. ic. 48.*

Phalangium parvo flore non ramosum. *Baub. pin. 29. theatr. p. 555. Moris. hist. 2. p. 333. f. 4. t. 1. f. 10.*

Liliago. *Cord. hist. 190.*

Var - - - scapo ramoso.

In nemorosis im Biniz abunde, neque alia species ibidem occurrit.

Variat scapo simplici, et scapo ramoso, quae varietas apud autores non reperitur; differt autem a Phalangio parvo flore, ramoso C. B. s. Antherico ramoso Linnaei, quod vicissim scapo simplici variat, foliis latioribus floribusque multo maioribus, ut alias notas taceam. Varietas scapo ramoso plantae nostrae loco praedicto copiosior est altera scapo simplici.

PERFECTAE HEXAPETAL. 37

530. ALLIVM (*oleraceum*) caule teretifolio
bulbifero, foliis scabris semiteretibus sub-
tus sulcatis, staminibus simplicibus. *Linn.*
sp. 429. fl. Suec. 280.

Allium caule simplici, foliis fistulosis, spatha bicor-
ni, umbella bulbifera. *Hall. hist. n. 1223.*

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis te-
retibus. *Hall. opusc. p. 387. n. 26. t. 1.*

Allium montanum bicornē, flore exalbido. *Baub.*
pin. 75.

Allium bicine proliferum, flore intus albescente
cum stria purpurascente. *Baub. hist. 2. p. 560.*
sylvestre bicine flore viridi. *ib. p. 561.*

In pratis ad occidentem urbis *an der alten Plei-
ße*, inter virgulta; in horti *Apeliani* ambulacris fre-
quens.

Folia e terra prodeuntia ter seu quater sinistrorum
spiraliter incurva, apice recto, anguli in quolibet
novem, glandulis concatenatis scabri sunt.

957. ALLIVM (*carinatum*) caule planifolio
bulbifero, staminibus subulatis. *Linn. sp.*
pl. 426.

Allium bulbo sobolifero, foliis succulentis, spatha
bicorni, umbella bulbifera. *Hall. hist. n. 107.*

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis ca-
rinatis. *Hall. opusc. 391. n. 27. t. 2.*

Ampeloprason proliferum. *Lob. ic. u6.*

Allium sylvestre bicine purpureum proliferum.
Baub. hist. 2. p. 561.

In colle ad *Markkleeberg* inter virgulta ad viam
cavam, in horto *b. Casp. Bosii* sub fruticibus.

38 CLASSIS XIII. PLANTAE

958. ALLIVM (*scorodoprasum*) caule planifolio
bulbifero, foliis crenulatis: vaginis anci-
pitibus, staminibus tricuspidatis. *Linn. sp.*
pl. p. 425. fl. suec. 278.

Allium foliis ciliatis, umbella bulbifera, staminibus
alterne bifidis. *Hall. hist. 1222.*

Porrum planifolium, staminibus alterne trifidis, um-
bella bulbifera. *Hall. Rupp. Ien. 3. p. 154. t. 2.*

Im Rosenthal, Kanitsch, in pratis an der alten Pleisse,
auch in der Scheibe.

POLYANTHERA.

TETRASTYLA.

959. RESEDA (*luteola*) foliis lanceolatis inte-
gris basi utrinque unidentatis, calycibus
quadrifidis. *Linn. syst. nat. 2. p. 329.*

Reseda foliis ellipticis obtuse lanceolatis undulatis,
calycibus quadrifidis. *Hall. hist. n. 1058.*

Luteola herba falicis folio. *Baub. pin. 100.*

Antirrhinum. *Trag. stirp. p. 362.*

Pseudostruthium. *Cam. epit. 356.*

Lutum herba. *Dod. pempt. 80.*

Catanance. *Tab. ic. 110.*

In ruderatis auf den Stadtwellen und um die Stadt;
seritur etiam nonnumquam in usus tinctorios.

Tingit colore praestanti citrino, praesertim sericum.
Luteola Galloprovincialis praefertur, cui nostras nihil
cedit.

Folia supra basin dentes duos alternos molles ha-
bent.

PERFECTAE HEXAPETAL. 39

POLYSTYLA.

960. HEPATICA (*nobilis*) Linn. *hort. cliff.* 223.
mat. med. 277. *Blackw. herb. t.* 207.

Anemone foliis trilobis integerrimis. *Linn. sp. pl.*
758. *Hall. hist. n.* 156.

Trifolium hepaticum, flore simplici. *Baub. pin.* 330.
Ranunculus tridentatus vernus flore simplici caeruleo. *Tourn. inst.* 286.

Edel Leberkraut, Güldenklee.

Im Oberholze nach Oelschau zu, perennis. *Flor.*
April.

CLASSIS XV.

Plantae flore perfecto apetalos.

MONANTHERA.

MONOSTYLA.

961. SALICORNIA (*herbacea*) patula, articulis
apice compressis emarginato bifidis. *Linn.*
sp. pl. 5.

Salicornia. *Dod. pempt.* 82. *Linn. hort. Cliff.* 490.
Roy. Lugdb. 205.

Ad Salinas bey Ketschau et Deidiz. Fl. Aug. annua.

TRIANTHERA.

MONOSTYLA.

962. POLYCNEVM (*arvense*). *Linn. sp.*
pl. 50. Hall. hist. n. 1570.

Camphoratae congener. *Baub. pin.* 486.

Chenopodium annuum humifusum, folio breviore capillaceo. *Tourz. inst. 506.*

Chenopodium foliis subulatis prismaticis, floribus solitariis sessilibus axillaribus. *Guett. f. obs. 1. p. 14.*

Anthylis altera Italorum. *Lobel. ic. 404.*

In apricis, aridis, am Biniz, fl. aestate. *Dn. KNOLL.*
An der Straße über dem Ketschauer Berge nach Ketschau hin. *RUPP.*

PENTANTHERAE.

DISTYLAE.

963. **ATRIPLEX** (*hastata*) caule herbaceo, valvulis femineis magnis deltoidibus sinuatis. *Linn. sp. pl. 1494.*

Atriplex foliis triangularibus; basi producta, valvulis triangularibus subasperis. *Hall. hist. n. 1617.*

Atriplex sylvestris annua, folio deltoide sinuato & mucronato hastae cuspidi simili. *Moris. hist. p. 607. f. 5. t. 32. f. 14.*

In nemorosis ad Gonnewiz et alibi.

Rami patentes: infimi procumbentes: folia viridia.

964. **CHENOPODIVM** (*murale*) foliis ovatis nitidis acutis dentatis, racemis ramosis nudis. *Linn. sp. pl. 318.*

Chenopodium pes anserinus. *I. Tab. ic. p. 427.*

Chenopodium latifolium minus ramosum, petiolis longissimis ex alis foliorum confertim nascentibus. *Buxb. Hal. 69. t. 1.*

Chenopodium atriplicis sativae folio et facie, spicis multis surrectis velut racemosis in foliorum alis. *Rupp. jen. 3. p. 338.*

In ruderatis auf dem Walle und um die Dærfer.

Folia confertius dentata quam in Chenopodio rubro, racemi compositi fere paniculati subnudi, foliis non longiores. Planta Buxbaumii a Chenopodio urbico Linn. sp. pl. 318. n. 2. omnino differt, quod circa Hallam non occurrit; ipse eam cum Atriplice vulgari sinuata spicata Plot. coniungit (Cent. I. p. 47.) a Chenopodio urbico L. pariter aliena.

HEXANTHERAE.

TRISTYLAE.

965. RVMEX (*obtusifolius*) floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato - oblongis obtusis crenulatis.
Linn. sp. pl. 478.

Latham foliis ovatis circa petiolum emarginatis, floribus dense paniculatis, dentatis, verrucosis.
Hall. bift. n. 1897.

Latham. Cam. epit. 228.

Latham vulgare folio obtuso. Baub. bift. 2. p. 984.

Latham folio minus acuto. Baub. pin. iii. Lob. ic. 284.

Hippolathum sylvestre. Tab. ic. 436.

Im Rosenthale in ambulacris, Aug. Sept. perennis.

966. RVMEX (*maritimus*) floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. Linn. sp. pl. 478.

Latham aquaticum, luteolae folio. Tourn. inst. 504.

Blitum angustifolium verticillatum. Barr. ic. 1181.

Anthoxanthum. Baub. bift. 2. p. 987.

42 CLASSIS XV. PLANTAE

Lapathum folio acuto, flore aureo. *C. B. Rupp.*

Ien. 3. p. 58.

Ad stagna bey *Lindenthal, Burghausen &c.*

967. IVNCVS (*filiformis*) culmo nudo filiformi nutante panicula laterali pauciflora.

Linn. sp. pl. 465. Gmel. Sib. 1. p. 71. n. 35.

Iuncus caule nudo, foliis mollibus teretibus, panicula laterali pauciflora. Hall. hist. n. 1313.

Iuncus parvus, calamo supra paniculam longius producto. Raj. Angl. 3. p. 432. Pluk. alm. p. 200. t. 49. f. 8.

Iuncus laevis panicula sparsa, minor. Bauh. pin. 12. theatr. 183. Scheuchz. agr. 347. t. 7. f. ii.

In paludibus turfaceis ad Schœnfeld, Mockau.

OCTANTHERAE.

TRISTYLAE.

968. FAGOPYRVM (*dumetorum*) caule volumili, foliis sagittatis, valvulis seminalibus alatis. Hall. hist. n. 1562, sub POLYGONO.

*Polygonum (*dumetorum*) foliis cordatis caule volubili laevi, floribus carinato - alatis. Linn. sp. pl. 522.*

Fagopyrum scandens altissimum dumetorum, seminibus tribus alis pellucidis. Rupp. Ien. 3. p. 99. (Dill. spec. 60.)

In sepibus passim, frequens im Streitholze.

Genus Fagopyri a plerisque botanicis sub Polygoni genere comprehenditur; neque aliam ob caussam nomen retinuimus, quam quod haec species a maxime affini Polygono convolvulo L., in Flora Lipsiensi sub Fagopyri nomine recensita, non avellenda fuit.

PERFECTAE APETALAE. 43

DECANTHERA.

DISTYLA.

969. SCLERANTHVS (*perennis*) calycibus
fructus clausis. *Linn. sp. pl. 580.*

Knawel incanum, flore maiore, perenne. *Raj. Engl.*
3. p. 160. t. 5. f. 1.

Alchimilla gramineo folio maiori flore. *Vaill. Parif.*
4. t. 1. f. 5.

Polygonum minus polycarpon. *Tab. 1215.*

In arenosis *am Biniz* et alibi passim.

GRAMINA

ET

GRAMINIBVS ADFINES PLANTAE.

TRIANTHERAE.

DISTYLA.

970. PANICVM (*verticillatum*) spica tereti
glomerata, involucellis unifloris bifetis
retrorsum scabris. *Linn. sp. pl. 82. n. 3.*

Panicum spica unica paniculata, setis paucioribus.
Hall. hist. n. 1543.

Gramen paniceum spica aspera. *Baub. pin. 8. theatr.*
139. Scheuchz. gram. 47. Moris. hist. 3. p. 189. f.
8. t. 4. f. 11. bon.

Gramen geniculatum tertium. *Tab. hist. 516.*

Klebgraß,

In areis hortorum cultis copiosissime, annum.

Culmæ

Culmi diffusi, ramosi. Vaginae foliorum oris pilosae. Spica junior viridis, adulta purpurascens, composita e glomerulis confertissimis, (inferioribus saepe a se invicem remotis) flosculorum oblongorum obtusorum, pedicellis brevissimis insidentium, quorum cūvis ad basin adiacent setae duae, flosculo plerumque longiores, spinulis rigidis deorsum directis, microscopio tantum visilibus, armatae, unde fit, quod racemuli et saepe integrae spicae maturae vestibus transuentium adhaerere solent. Semina laevia, per lentem spectata, subtilissimis rugis transversalibus notata apparent.

971. PANICVM (*viride*) spica tereti glomerata, involucellis unifloris bisetis inermibus.
Linn. sp. pl. 84. n. 5.

Panicum sylvestre, spica simplici et molliori. *Tourn. inst. 515.*

Gramen paniceum s. panicum sylvestre, spica simplici. *Baub. pin. 8. theat. 138. Scheuchz. gram. 46. Moris. hist. 3. p. 189. f. 8. t. 4. f. 10.*

In muris argillaceis frequens, annum.

Praecedenti simillimum, differt flosculis copiosioribus, setis longioribus, confertioribus, mollioribus, digitis sursum ductis non resistentibus, magis tortis, saepe purpurascens. Datur etiam varietas setis longitudine tantum spicularum, aut vix longioribus. Semina laevia, per lentem transverse subtilissime rugosa.

972. PANICVM (*glaucum*) spica tereti involucellis unifloris fasciculato-setosis, seminibus undulato-rugosis. *Linn. sp. pl. 83. Schreb. gram. 2. p. 17. t. 25.*

*Panicum spica simplici, aristis aggregatis flosculo
subiectis. Gron. Virg. 12.*

*Panicum spica unica, flosculis sessilibus solitariis, se-
tis numerosis. Hall. hist. n. 1542. non syn.*

Panici effigie gramen simplici spica. Lob. ic. 13.

In agris post messem ubique, annum.

*Culmi recti. Folia basi barbata. Vaginae oris lae-
vibus. Spica simplex, flosculis subrotundo - ovatis,
obtusis, hinc planis inde convexis, quorum quivis pe-
dicello brevissimo insidet, basique obvallatur setis nu-
merosis (8 - 12.) fasciculatis, apice rutilantibus, mol-
libus, basi coalitis, lateri plano flosculi applicatis. Se-
mina latere convexo transverse rugosa, praecedentium
seminibus triplo fere maiora. Spica magnitudine ad-
modum variat, plerumque vix uncialis, nonnunquam
quinque unciis longior occurrit.*

973. PANICVM (*sanguinale*) spicis digitatis
basi interiore nodosis, flosculis geminis
muticis, vaginis foliorum punctatis. *Linn.*
sp. pl. 84. Schreber. gram. 1. p. 119. t. 16.

Digitaria foliis subhirsutis, caule debili, spicis verti-
cillatis, scapo ancipiti. *Hall. hist. n. 1526.*

Sanguinella, Gleichen. obs. t. 8.

Ischaemum, gramen sanguinarium. 1. Tab. hist. 534.

Gramen dactylon folio latiore. Baub. pin. 8. theat.

114. Moris. hist. 3. p. 184. f. 8. t. 3. f. 2.

Gramen dactylon maius repens, foliis hirsutissimis.

Buxb. cent. 5. p. 34. t. 65.

*Graminis genus, dens caninus tertius, sive gramen
primum vel galli crus. Baub. hist. 2. p. 444.*

Icon Oed. fl. Dan. 388.

Wilder Hirse, Hirsegras, Blutgras.

In cultis frequens, in agris arenosis passim, aestate; annuum.

Gluma calycina tertia vix ulla, quam ob causam Perill. Hallerus a Panicis separavit.

974. ANDROPOGON (*ischaemum*) spicis digitatis plurimis, flosculis sessilibus: aristato muticoque, pedicellis lanatis. *Linn. sp. pl. 1483.*

Gramen dactylon spicis villosis. *Baub. pin. 8. theat. nō. Scheuchz. agr. 94.*

Gramen dactylon spicatum, aristis geniculatis. *Barrel. ic. 753. f. 2.*

Andropogon spicis villosis septenis, locustis bifloris: floribus alternis, sessilibus. *Hall. hist. n. 1414.*

Ad stagnum *bey Altranstädt, bey Deidiz, auctumno, perenne.*

975. AGROSTIS (*arundinacea*) panicula oblonga, petalo exteriore basi villoso: aristata torta calyce longiore. *Linn. fl. suec. 63. sp. pl. 91.*

Arundo locustis unifloris, glumis ex imo dorso aristatis. *Hall. hist. n. 1522.*

Arundo culmo enodi, panicula contracta. *Linn. Lapp. 44. Gmel. Sib. 1. p. 126.*

Gramen avenaceum panicula acerosa, semine papposo. *Dill. app. 48. Raj. syn. 3. p. 406.*

Gramen avenaceum montanum, panicula angusta e dilutissime fusco albicante et papposa. *Scheuchz. agr. 507.*

In nemoribus, *im Biniz copiose Julio, perennis.*

Culmi adeo tenaces sunt, ut ex iis maturis orbes straminei et stragula fieri possint, qualia Tatari praeparant iisque domunculas operiunt; et ut apud nos fistulae hauriendo fumo tabaci inservientes iisdem purgari soleant. Folia nimis dura et tenacia sunt, quam ut pecoribus placere possint. Spica nonnunquam ustilagine tacta invenitur. *Gleditsch.*

976. AGROSTIS (*canina*) calycibus coloratis, petalorum arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. *Linn. sp. pl. 92. fl. suec. 65.*

Avena monantha, panicula diffusa, multiflora adscendente, gluma calycina exasperata. *Hall. hist. n. 1479.*

Gramen caninum supinum paniculatum folio varians. *Baub. pin. 1. theat. 12.*

Gramen paniculatum supinum, ad infima culmorum genicula foliorum capillarium fasciculis donatum. *Scheuchz. agr. 141.*

In agris arenosis et ad eorum margines *zwischen Schænfeld und den Kohlgäerten*, et alibi.

Similis Agr. capillari sed ut plurimum prostrata, culmis saepe basi repentibus. Flores quidam, nonnunquam plurimi, mutici, quam ob rem caute distingueda ab Agr. capillari.

977. AGROSTIS (*vinealis*) calycibus coloratis, petalorum arista dorsali longitudine fere calycis, culmis adscendentibus.

Avena monantha, panicula sparsa, arista paullo florrem superante. *Hall. hist. n. 1481.*

Gramen caninum vineale. *Scheuchz. agr. 143.*

In siccioribus ad Schœnfeld, templum S. Theclæ.

Difserit a praecedente s. Agr. canina, spiculis du-
plo maioribus. Aristae ut plurimum calyce non lon-
giores sunt, datur tamen varietas aristis ad lineae lon-
gitudinem exsertis, in pineto ad Linaenthal, et alibi.
Occurrit etiam flosculis plerisque muticis. Variat fo-
liorum latitudine, culmi altitudine, paniculae forma;
sola spicularum magnitudo constans reperitur. Pro-
xime accedit ad Agr. capillarem, quacum non con-
fundenda est.

978. AGROSTIS (*capillaris*) panicula capillari
patente, calycibus subulatis aequalibus hi-
spidiusculis coloratis, flosculis muticis.
Linn. sp. pl. 93.

Poa monantha, caule erecto, panicula diffusa, caly-
cibus exasperatis. *Hall. hist. n. 1475.*

Gramen montanum panicula spadicea delicatiore.
*Baub. pin. 3. prodr. 12. theat. 36. Scheuchz.
agr. 129.*

Gramen miliaceum minus, panicula rubente. *Mont.
prodr. 52.*

Icon *Oed. Dan. t. 163.*

In pratis, versuris ubique, Iun. perennis.

Variat magnitudine pro soli natalis diversitate; in
siccis semipedalis, in pinguiori solo bipedalis et altior
occurrit.

Varietatem spiculis quibusdam viviparis inveni in
pineto ad Lindenthal.

979. AIRA (*caerulea*) foliis planis, panicula
contracta floribus pedunculatis muticis
convoluto - subulatis. *Linn. fl. Suec. 67.
sp. pl. 95. Iacq. Vind. 207.*

Arundo locustis bifloris, floribus conicis, petiolis subvillosois. *Hall. hist. n. 1518.*

Gramen arundinaceum enode minus. *Baub. hist. 2. p. 481. sylvaticum.* *Baub. pin. 7. theat. 97.*
Scheuchz. agr. 209.

Icon Oed. fl. Dan. 239.

Var. *Gramen arundinaceum enode maius montanum.* *Baub. pin. 7. theat. 96.*

Gramen arundinaceum enode. *Baub. hist. 2. p. 481.*

Gramen paniculatum auctumnale, panicula ampliore e viridi nigricante. *Scheuchz. agr. 207. t. 4. f. 11.*

In pratis subhumidis ubique. *Var.* in acclivibus nemorosis, *im Biniz*, auctumno, perennis.

Flosculi saepius terni.

980. *AIRA (aquatica) foliis planis, panicula patente, floribus muticis laevibus calyce longioribus.* *Linn. sp. pl. 95.*

Poa locustis bifloris glabris, gluma florali maiore plicata ferrata. *Hall. hist. n. 1471.*

Gramen miliaceum aquaticum. *Raj. Scheuchz. agr. 176. Vaill. Paris. 89. t. 17. f. 7.*

Icon Oed. Dan. t. 381.

Var. - - spiculis sexfloris. *Linn. syst. 2. p. 91. amoen. acad. 7. fund. agrost. §. VI.*

Ad salinas bey Ketschau in pratis fossisque salfis; varietas *vor dem Petersthore auf dem Rossmarkte* in siccis, et ad vias inundatas in prato *hinter dem Winklerischen Garten.*

Spiculae quaedam in apicibus ramulorum caeruleae saepius occurunt.

981. AIRA (*flexuosa*) foliis setaceis, culmis subnudis, pedunculis flexuosis. *Linn. sp. pl. 96.*

Avena diantha paniculis flexuosis, floribus basi villosis, locustis ovatis. *Hall. hist. n. 1486.*

Gramen nemorosum paniculis albis capillaceo folio. *Baub. pin. 7. prodr. 14. Moris. hist. 3. p. 200. f. 8. t. 7. f. 9.*

Gramen alpinum nemorosum paniculatum, foliis angustissimis, locustis splendentibus aristatis. *Scheuchz. agr. 218. t. 6. f. 1.*

Icon *Oed. fl. Dan. t. 157.*

In memoribus: *im Universitætsholze, im Holze an der Ziegelscheune bey Meisdorf &c., perennis.*

982. AIRA (*canescens*) foliis setaceis, summo spathaceo paniculam inferne obvolvente. *Linn. sp. pl. 97.*

Gramen foliolis iunceis oblongis radice alba. *Baub. pin. 5. theat. p. 72. 73. Moris. hist. 3. p. 200. f. 8. t. 3. f. 10. Scheuchz. agr. 242.*

Avena diantha, foliis setaceis, panicula stricta, aristis clavatis. *Hall. hist. n. 1483.*

Bocksbart.

In agris arenosis *um den Biniz* copiose, *nach Schoenfeld* bin passim. *Flor. Iul. annua.*

Tenella ovibus gratus cibus est, adultam respuunt.

983. AIRA (*caryophyllea*) foliis setaceis, panicula divaricata. *Hall. hist. n. 1482.*

Caryophyllus arvensis glaber minimus. *Baub. prodr. 105.*

Gramen

Gramen paniculatum locustis purpureo - argenteis annuum. *Raj. Engl.* 3. p. 407. *Scheuchz. it. alp.* 2. p. 143. t. 18. f. 2. *Moris. hist.* 3. p. 200. f. 8. t. 5. f. 11.

Gramen paniculatum minimum molle. R. *Scheuchz.* agr. 215.

Gramen phalaroides sparsa panicula minimum angustifolium. *Barr. rar.* 1218. ic. 44. f. 1.

Icon Oed. fl. Dan. 382.

In agris arenosis versus *Schænfeld*, hinter dem Biniz et ad *Templum S. Theclae* copiose, annua.

984. AIRA (*mollis*) glumis bifloris nudiusculis, flosculo hermaphrodito mutico, masculo aristata geniculata. *Linn. sp. pl.* 1485. sub *HOLCO*. *Schreb. gram.* 1. p. 149. t. 20. f. 2.

Gramen paniculatum molle, radice graminis canini repente. *Moris. hist.* 3. p. 202.

Gramen caninum paniculatum molle. *Raj. hist.* 1285. *Scheuchz. agr.* 235.

Gramen caninum longius radicatum. *Bauh. pin.* 1. latiore panicula. *Lob. adv.* 2. p. 467.

In nemorosis im Biniz, Oberholze, ad Trachenau frequens; in pratis ad Abtnauendorf.

Differt a gramine pratensi paniculato molli C. B. sufficienter radicibus repentibus more tritici repentis, culmis altioribus, foliis viridibus, calycibus glabris, aristis rectis, post anthesin geniculatis, extra calycem prominulis.

985. TRITICVM (*caninum*) radice perenni, spica subnutante, spiculis erectis: aristis longissimis.

Triticum radice perenni, spiculis solitariis longissime aristatis. *Gmel. Sibir.* 1. p. 122. t. 27.

Elymus caninus. *Linn. sp. pl.* 124.

Gramen caninum non repens elatius, spica aristata.
Morif. bist. 3. p. 177. f. 8. t. 1. f. 2.

Gramen aristis longioribus. *Scheuchz. agr.* p. 10.

In umbrosis im Rosenthale, hinter Apels Garten, im Universitatsholze &c.

Spiculas nunquam geminas vidi, semper aliquantulum distant, spicamque raram efficiunt.

986. ARVENDO (*epigeios*) calycibus unifloris, panicula erecta, foliis subtus glabris. *Linn. sp. pl.* p. 121.

Gramen arundinaceum paniculatum montanum, panicula spadiceo viridi, semine papposo. *Scheuchz. agr.* p. 124.

In versuris inter Gohliz et Lindenthal, am Biniz.

Corollae aristatae. Folia lata.

987. AVENA (*orientalis*) panicula coarctata secunda, spiculis bifloris horizontalibus parallelis, seminibus laevibus.

Türkischer Hafer, Ungarischer Hafer.

Seritur in agris passim, novissime introducta; fl. aestate, annua.

988. AVENA (*strigosa*) panicula oblonga contracta secunda flosculis geminis apice biaristatis, dorso arista geniculata.

Inter avenam sativam frequens occurrit, neglecta agricolisque ignota. Fl. aestate, annua.

Statura Avenae orientalis, sed paniculae rami pa-
lo laxiores, spiculae graciliores. *Calyx* longitudine
flosculorum. *Flosculi* intra calycem pedicellati, lae-
ves, *gluma* exteriore terminata aristis duabus, brevi-
bus, tenuissimis, rubris, apice albo. E medio dorso
arista flosculis duplo longior, geniculata, basi valida,
fusca. In scriptis Botanicorum non occurrit. Simi-
lis a Tournefortio in Creta lecta est, sed flosculis basi
villosis. Non confundenda est cum Avena Loeflin-
giana.

989. AVENA (*fatua*) paniculata, calycibus tri-
floris, flosculis basi pilosis aristis totis lae-
vibus. *Linn. sp. pl. 118. Schreber. gram. 1.*
p. 109. t. 15.

Avena triantha, locustis patulis, folliculis villosis.
Hall. hist. n. 1495.

Avena sylvestris pilosa, aristis recurvis. *Moris. hist.*
3. p. 209. f. 8. t. 7. f. 5.

Gramen avenaceum, locustis lanugine flavescenti-
bus. *Scheuchz. agr. p. 239. Barrel. obs. 1229. ic.*
75. f. 2.

Wildhafer.

In agris passim.

990. AVENA (*pratensis*) subspicata, calycibus
quinquefloris. *Linn. syst. nat. 2. p. 99.*
Gorter. Ingr. p. 25.

Avena petiolis unifloris brevibus, locustis teretibus
quinquefloris basi pubescentibus. *Hall. hist. n. 1499.*

Gramen avenaceum erectum, foliis angustioribus
glabris. *Moris. hist. 3. p. 217. f. 8. t. 7. f. 21.*

Gramen avenaceum spica simplici, aristis recurvis.
Raj. Angl. 3. p. 405. t. 21. f. 1.

Gramen avenaceum, locustis splendidibus et bicornibus. *Vaill. Paris. p. 89. t. 18. f. 1.*

Gramen avenaceum alpinum glabrum angustifolium, locustis aristatis in spicam dispositis. *Scheuchz. agr. p. 228. t. 4. f. 21.*

In prato acclivi *am Biniz* et alibi.

991. AVENA (*flavescens*) panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *Linn. sp. pl. 118. Gmel. fl. Sibir. I. p. 129. Schreber. gram. I. p. 76. t. 9.*

Avena triantha, locustis teretibus, calycina gluma altera minima, petiolo villoso. *Hall. hist. n. 1497.*

Gramen avenaceum pratense elatius panicula flavescente, locustis parvis. *Raj. syn. 3. p. 407. Scheuchz. agr. p. 223. t. 4. f. 18. Moris. hist. 3. p. 215. f. 8. t. 7. f. 42.*

In versuris agrorum *am Brandvorwerke*, inter *Mekern* et *Lindenthal*, in pratis subhumidis, v. g. *auf der Vogelwiese*.

Spiculae plerumque biflorae. *Calyx* parvus inaequalis. *Flosculi* compressi glumis non carinatis. *Arista* paullo infra apicem a dorso exit, capillaris, tenuissima vix geniculata. *Flosculi* maturi flavescunt saepeque aureum nitorem induunt.

992. POA (*cristata*) panicula spicata, calycibus subpilosis subquadrifloris pedunculo longioribus, petalis aristatis. *Linn. syst. nat. 2. p. 94. sp. pl. 94. sub AIRA. Gmel. Sib. I. p. 93. n. 24.*

Festuca locustis bifloris mucronatis confertis imbricatis paniculatis in spicam congestis. *Hall. hist. n. 1444.*

Gramen spica cristata subhirsutum. *Bauh. pin. 2.*
prodr. 8. theat. 48. Moris. hist. 3. p. 194. f. 8. t.
4. f. 7. Scheuchz. agr. 167.

Vbique in siccis elatioribus, v. g. *bey Pfaffendorf,*
am Thonberge &c. Fl. vere.

993. POA (*palustris*) panicula diffusa, spiculis
 subtrifloris pubescentibus, foliis subtus
 scabris. *Linn. sp. pl. 98.*

Poa panicula stricta, locustis bifloris, calycibus aristatis,
 folliculis villosis. *Hall. hist. n. 1467.*

Gramen paniculatum aquaticum angustifolium pa-
 nicula speciosa locustis parvis. *Scheuchz. agr. 184.*

In udis *auf den Schœnfeldischen Wiesen.* Fl. aestate.

Non confundenda est cum PHALARIDE oryzoides.
 LINN. f. Homalocencho HALL. toto coelo diversa,
 quae crescit ad stagna fossasque *im Apelischen Garten,*
 Chemnitio eo adducta per D. D. HEDWIG, Botanicum
 acutissimum.

994. POA (*nemoralis*) panicula attenuata, spi-
 culis subbifloris mucronatis scabris, cul-
 mo incurvo. *Linn. sp. pl. 102. Gmel. Sib.*
1. p. 97. n. 26.

Poa culmo debili, panicula nutante locustis bifloris:
 folliculis subvillosis. *Hall. hist. n. 1469.*

Gramen paniculatum angustifolium alpinum, locu-
 stis rarioribus et angustioribus non aristatis.
Scheuchz. agr. 164. t. II.

In omnibus nemoribus, v. g. *im Rosenthaler, in den*
Hælzern bey Gonnevitz, Meckern, im Biniz, frequens.

995. BROMVS (*tectorum*) panicula nutante,
spiculis linearibus. *Linn. fl. Suec.* 2. n. 98.
Sp. pl. p. 114.

Festuca avenacea sterilis, pedicellis brevioribus et
spicis erectis. *Moris. hist.* 3. p. 212. f. 8. t. 7. f. 13.

Festuca avenacea sterilis, spicis erectis. *Raj. Angl.* 3.
p. 413. *Pluk. alm.* 174. t. 299. f. 2.

In sterilibus *auf den Stadtwällen* et in agris muris-
que limosis circa urbem frequens.

996. BROMVS (*giganteus*) panicula nutante,
spiculis lanceolatis: aristis longis flexuo-
sis. *Schreb. gram.* 1. p. 88. t. 11.

Bromus panicula nutante spiculis quadrifloris aristis
brevioribus. *Linn. Sp. pl. 114.*

Gramen avenaceum glabrum, panicula e spicis ra-
ris strigosis composita, aristis tenuissimis. *Raj.*
syn. 3. p. 415.

Gramen latifolium, panicula sparsa tenuissime arista-
ta. *Scheuchz. agr.* p. 264.

Gramen sylvaticum glabrum, panicula recurva.
Vaill. Parif. 93. t. 18. f. 13.

In nemorosis umbrosissimis *im Rosenthaler, Kabi-*
nitsch, Universitætsholze, frequens.

634. FESTVCA (*ovina*) panicula secunda co-
arctata, aristata, culmo tetragono nudius-
culo, foliis setaceis. *Linn. Sp. pl. 108.*

Var. *Gramen cristatum*, radiculis nigricantibus.
Loef. Pruss. no. t. 24.

Gramen foliolis janceis brevibus minus. *Baub.*
pin. 5. theat. 73. *Scheuchz. agr.* 282.

In siccioribus v. g. *um das Oberholz*, frequens. Varietas *am Biniz auf der Anhæhe*. Fl. Maj. Iun. perennis.

997. FESTVCA (*duriuscula*) panicula secunda oblonga, spiculis sexfloris oblongis laevibus foliis setaceis. *Linn. sp. pl. 108.*

Gramen pratense, panicula duriore laxa unam partem spectante. *Raj. syn. 3. p. 413. t. 19. f. 1.*
Scheuchz. agr. p. 285.

In pratis siccioribus passim. Fl. Iul. perennis.

998. FESTVCA (*rubra*) panicula secunda scabra, spiculis sexfloris aristatis, flosculo ultimo mutico. *Linn. sp. pl. 109.*

In siccioribus passim. Fl. Iul. perennis.

999. FESTVCA (*pratensis*) foliis hirsutis latiusculis spiculis paniculatis quinquefloris aristatis glabris. *Hall. hist. n. 1435.*

Gramen pratense paniculatum elatius, panicula laxa heteromalla. *Scheuchz. agr. p. 289.*

In pratis fertilibus, subhumidis, ubique.

1000. FESTVCA (*arundinacea*) panicula spicata stricta, spiculis oblongis erectis paucifloris, aristatis, calycibus angustatis. *Gmel. Sibir. 1. p. III.*

Gramen arundinaceum, loculis viridi-spadiceis lo liaceis brevius aristatis. *Scheuchz. agr. p. 266. t. 5. f. 18.*

In prato acclivi *hinter dem Biniz*, loco humido.

1001. FESTVCA (*decumbens*) panicula erecta,
spiculis subovatis muticis, calyce flosculis
maiore, culmo decumbente. *Linn.* it.
Scan. 226. *sp. pl.* 110. *fl. Suec.* 93.

Festuca locustis teretibus muticis octifloris, floscu-
lis alternis imperfectis. *Hall. hist.* n. 1434.

Gramen montanum avenaceum, locustis muticis
tumentibus non pilosis. *Scheuchz. agr.* p. 170. t.
3. f. 16.

Gramen triticeum palustre humilius, spica mutica
breviore. *Morif. hist.* 3. p. 177. f. 8. t. 1. f. 6.

Icon Oed. Dan. tab. 162.

In pratis siccioribus apricis ad *Abtnauendorf*; in
colle *am Biniz*; in nemorosis solo inundato, ut *im Bi-*
niz, Universitetholze frequentissime; in pineto *bey*
Lindenthal; *zwischen den Alleen in Apelsgarten*.

1002. FESTVCA (*myuros*) panicula spicata
nutante, calycibus minutissimis muticis,
floribus scabris longius aristatis. *Linn. sp.*
pl. 109.

Festuca foliis setaceis, panicula erecta, locustis gla-
bris, longius aristatis. *Hall. hist.* n. 1443.

Gramen festuceum myurum elatius, spica hetero-
malla gracili. *Barr. ic. 99. Scheuchz. agr.* p. 293.

In agris inter *Schænfeld* et die *Kohlgærtten*, et in li-
mitibus agrorum, *um den Biniz*, etiam in arenifodina.

Varietas spiculis pubescentibus, quam synonymon
in speciebus plantarum citatum indicat, hic non oc-
currit.

1003. FESTVCA (*elatior*) panicula secunda
erecta, spiculis lanceolatis subaristatis te-
retibus.

retibus. *Linn. sp. pl. III. Schreb. gram. I.
p. 35. t. 2.*

*Festuca panicula spicata stricta, spiculis oblongis
erectis multifloris submuticis. Gmel. Sibir. I.
p. 109.*

*Gramen loliaceum spica divisa pratense maius. Mo-
ris. hist. 3. p. 184. f. 8. t. 2. f. 15.*

*Gramen paniculatum elatius, spicis longis muticis
squamosis. Raj. Angl. 3. p. 411. Vaill. Paris. 92.*

*Gramen loliaceum, panicula multiplici et spicata.
Scheuchz. agr. p. 200.*

In pratis fertilioribus locisque graminosis ubique.

Statura variat, nam et digitii et cubiti longitudine
occurrit.

1004. FESTVCA (*speciosa*) panicula diffusa
spiculis teretibus subulatis muticis aristati-
isque.

*Bromus (inermis) panicula diffusa, spiculis teretibus
subulatis muticis aristatisque. Leyss. Halens. 90.
Schreb. gram. I. p. 97. t. 13.*

*Festuca locustis teretibus multifloris, glumis semi-
membranaceis breviter aristatis. Hall. hist. n. 1433.*

In margine editiore stagni ad Altranstædt.

Radix repens.

1005. SCIRPVVS (*setaceus*) culmo nudo seta-
ceo, spicis lateralibus subsolitariis sessili-
bus. *Linn. it. Scan. 227. c. d. fl. Suec. 45.
sp. pl. 73.*

*Scirpus omnium minimus, capitulo breviore. Tourn.
inst. 528. Scheuchz. agr. 358.*

Iuncus mutilis s. chamaeschoenos. *Baub.* *pin.* 12.

prodr. 22.

Iuncellus omnium minimus. *Moris. hist.* 3. *p.* 232. *f.* 8. *t.* 10. *f.* 23.

Gramen junceum minimum capite squamoso. *Baub.* *pin.* 6. *prodr.* 13.

Mariscus setaceus, capitulis lateralibus paucissimis. *Hall. hist.* n. 1345.

Icon *Oed. Dan.* *t.* 3u.

In locis humentibus agrorum ad *Schænfeld*, et circa stagnum ad *Lindenthal*.

1006. SCIRPVVS (*capitatus*) culmo tereti nudo setiformi, spica subglobosa terminali. *Linn.* *sp. pl.* 70.

Scirpus caule aphylo, spica imbricata subrotunda, glumis obtusis. *Hall. enum.* 249. *n.* 6.

Iuncus clavatus minor capitulis rotundioribus. *Moris. hist.* 3. *p.* 233. *t.* 10. *f.* 34.

Scirpus equiseti capitulis crassioribus et habitioribus pumilus et multicaulis. *Rupp. Ien.* 3. *p.* 319.

In limo humido ad margines stagnorum, *bey Lindenbal, Leutsch etc.* et in iisdem stagnis ipsis, quando exsiccantur.

1007. SCIRPVVS (*maritimus*) culmo triquetro panicula conglobata foliosa, spicularum squamis trifidis : intermedia subulata. *Linn. fl. Suec.* 47. *sp. pl.* 74. *Gmelin. fl. Sibir.* 1. *p.* 79.

Scirpus caule triquetro, panicula foliosa ramosa, loculis ovatis nutantibus, glumis dentatis aristatis. *Hall. hist.* n. 1339.

Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Baub. pin.*
14. theat. 215.

Gramen cyperoides vulgatus aquaticum. *Baub.*
bifl. 2. p. 495.

Cyperus panicula sparsa e spicis teretibus crassioribus composita. *Scheuchz. agr. p. 400. t. 9. f. 9.*

In fossis pratisque falsis ad *Ketschau*. Fl. aestate,
 perennis.

Variat spiculis omnibus subsessilibus, aut quibusdam pedunculatis; prior varietas in siccioribus locis,
 altera in fossis aut solo semper humido nascitur.

1008. SCHÖENVS (albus) culmo subtricetro folioso, floribus fasciculatis, foliis se-
taceis. *Linn. fl. Suec. 41. sp. pl. 65.*

Cyperus palustris hirsutus minor, paniculis albis.
Morif. bifl. 3. f. 8. p. 239. t. 9. f. 39. Oed. Dan.
t. 320.

Gramen luzulae accedens glabrum, in palustribus proveniens paniculatum. *Pluk. alm. 178. t. 34.*
f. n.

Gramen cyperoides palustre leucanthemum. *Raj.*
bifl. 1295. Scheuchz. agr. 503. t. u. f. u.

In paludibus circa Lipsiam reperit **BVRSERVS.**
 vid. *Aet. Vpsal. tom. 1. 1724. p. 499.* conf. *Linn. amoen.*
I. p. 174. n. 28.

CLASSIS XVI.

Plantae flore perfecto relativo monophyto.

APETALAE.

1009. CHARA (*vulgaris*) caulis laevis,
frondibus interne dentatis. *Linn. sp. pl.*
1624.

Chara caule levi fragili. *Hall. hist. n. 1681.*

Chara vulgaris foetida. *Vaill. Paris. 1719. p. 22. t. 3.*
f. 1.

Equisetum foetidum sub aqua repens. *Baub. pin.*
16. prodr. 25. theat. 251.

In fossis auf den Wiesen bey Schœnfeld und Abtnauendorf, in scrobibus limosis paludosis nach Gonnevitz, in stagno ad Altranstædt.

661. CAREX (*sylvatica*) spicis pendulis: ma-
scula erecta, femineis filiformibus pedun-
culo brevioribus, capsulis acutis distanti-
bus. *Huds. Engl. 353.*

Carex spicis femineis pendulis raris praelongis, ca-
psulis rostratis bifidis. *Hall. hist. n. 1395.*

Carex capillaris. *Leyf. Hal. 841.*

Icon *Oed. Dan. t. 404.*

In nemorosis umbrosis im Rosenthal, Kanitsch etc.

669. CAREX (*pendula*) spicis pendulis: ma-
scula erecta, femineis cylindraceis pedun-
culo longioribus, capsulis acuminatis.
Huds. Engl. 352.

Carex spicis femineis pendulis longissimis, capsulis
ovatis mucronatis. *Hall. hist. n. 1396.*

Gramen cyperoides, spica pendula longiore. *Moris.*

hist. 3. p. 242, f. 8. t. 12. f. 4.

Loco indicato.

674. CAREX (*disticha*) spica composita subdisticha, spiculis ovatis imbricatis androgynis, foliolo longiori instructis, culmo triangulare. *Huds. Angl. 347.*

Gramini cyperoidi ex monte Ballon simile, spica totali e plurimis spicis composita. *R. Pluk. phyt. t. 34. f. 7.*

Loco indicato. Gramen palustre, omnino diversum a Carice arenaria in siccis habitante.

675. CAREX (*brizoides*) spica composita disticha nuda: spiculis androgynis contiguis teretibus, curvatis, culmo superne nudo. *Linn. amoen. 4. p. 293. sp. pl. 1381.*

Carex spicis distichis teretibus repandis. *Hall. hist. n. 1358.*

Gramen fibrata radice angustifolia, caule exquisite triangulari etc. *Michel. gen. p. 70. t. 33. f. 17.*

In umbrosis nemoribus v. g. *im Rosenthale, Schamburgischen Holze, ad Kautsch.*

Non confundenda cum sequente, qua altior est, foliis latioribus, spicis extrorsum curvatis divergentibus, albidis; serius etiam floret.

1010. CAREX (*praecox*) spica composita disticha nudiuscula: spiculis contiguis androgynis teretibus rectis, culmo superne nudo.

Carex angustifolia, caule triquetro, spicis pluribus elegantibus, parum inter se distantibus. *Seguier.*

Veron. t. p. 124. t. 1. f. 3. *suppl.* 84.

In graminosis siccoribus passim in horto *Apeliano*, am *Biniz*, ad *Kautsch* etc. Fl. Martio, Aprili, reliquis speciebus praecocius.

Culmi humiles, ut plurimum vix pedales. Spicae compactiores quam in praecedente, glumis fuscis evidenter carinatis. Folia angusta.

Confunditur a *SEGVIERIO* cum *C. leporina* L. quam diversam esse, optime perill. de *HALLER* monet *bist.* n. 1361.

1011. CAREX (*loliacea*) spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis: capsulis ovatis teretiusculis muticis divaricatis. *Linn. sp. pl.* 1382. *fl. Suec.* 840.

Carex nemorosa, fibrosa radice, caule triangulari, spica divulsa s. interrupta, capitulis solitariis prae-terquam ultimo. *Mich. gen.* 69. t. 33. f. 10.

In udis ad officinam lateritiam *Meisdorfensem*.

1012. CAREX (*remota*) spiculis ovatis subsessilibus remotis androgynis, foliis caulinis culmum aequantibus. *Linn. sp. pl.* 1383. *amoen.* 4. p. 293.

Carex spicis androgynis, infimis in ala folii prae-longi sessilibus, supremis nudis. *Hall. bist.* n. 1357.

Gramen cyperoides angustifolium, spicis parvis sessilibus in foliorum alis. *Raj. bist.* 1295. *Pluk. alm.* 178. t. 4. f. 3. *Moris. bist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 17. *Scheuchz. agr.* 483.

Carex angustifolia, caule triquetro, capitulis pulchellis strigosioribus compactis inter se distantibus et in foliorum alis sessilibus. *Mich. gen.* 70. t. 33. f. 18.

Icon *Oed. Dan.* t. 370.

In nemoribus umbrosis humidis, ad Gonnewiz,
Gautsch.

1013. CAREX (*humilis*) spica mascula oblonga,
femineis senioribus remotis subpeduncu-
latis paucifloris, culmo foliis breviore.
Leyf. Hal. 845.

Carex spica mare unica, femineis adpressis, calyci-
nis glumis maximis, caule senescente prostrato.
Hall. hist. n. 1370.

Cyperoides montanum humile angustifolium, cul-
mo veluti folioso spicis obsesso. *Scheuchz. agr.*
407. t. 10. f. 1. *Mich. gen.* 63. t. 32. f. 8.

In acclivibus im Biniz. Fl. Aprili, Majo.

1014. CAREX (*montana*) spicis femineis sessili-
bus, subsolitariis ovatis masculæ approxi-
matis, culmo nudo, capsulis pubescenti-
bus. *Linn. sp. pl.* 1385. fl. Suec. 845.

Carex foliis caryophylleis, spicis sessilibus approxi-
matis paucifloris, capsulis ovatis subhirsutis. *Hall.*
hist. n. 1472.

Cyperoides montanum, foliis angustis parvis, spica
spadicea divisa. *Scheuchz. agr.* 419. t. 10. f. 8. 9.

In acclivibus am Biniz, ad templum S. Thecla.
Fl. Majo.

1015. CAREX (*tomentosa*) spicis femineis sub-
pedunculatis erectis, capsulis subglobosis
tomentosis. *Linn. mant.* 123. descr.

Cyperoides angustifolium montanum, folliculis se-
minum villosis. *Scheuchz. agr.* 423.

66 CLASSIS XVI. PLANTAE

Gramen spicatum angustifolium montanum. Baub.
pin. 4. prodr. 20. theat. 47.
In nemorosis im Biniz. Majo.

1016. CAREX (*palleescens*) spicis pendulis: ma-
scula erecta, femineis ovatis imbricatis,
capsulis confertis obtusis. Linn. sp. pl.
1386. fl. Suec. 852. Gmel. Sib. I. p. 139.

Cyperoides polystachyon flavicans, spicis breviori-
bus prope summitem caulis. Moris. hist. 3. p.
243. f. 8. t. 12. f. 16. Pluk. alm. 178. t. 34. f. 5.
Scheuchz. agr. 431. Mich. gen. 61. t. 32. f. 13.

In umbrosis passim; ad Gautsch, Meusdorf, in pra-
tis ibidem, ad Abtnauendorf in sepibus.

Folia huic pubescentia.

1017. CAREX (*panicea*) spicis pedunculatis
erectis remotis: femineis linearibus, ca-
psulis obtusiusculis inflatis. Linn. sp. pl.
1387. Gmel. Sib. I. p. 136.

Carex spica mascula una pluribusve, femineis pe-
tiolatis erectis, capsulis rarissimis maximis ovato - tri-
quetris bidentatis. Hall. hist. n. 1405.

Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicis e ra-
rioribus et tumidioribus vesicis compositis. Mich.
gen. 61. t. 32. f. 11. Pluk. alm. 178. t. 91. f. 7. Raj.
syn. 3. p. 418.

Icon Oed. Dan. t. 261.

In pratis humidis, palustribus fere ubique, v. g. auf
den Schœnfeldischen Wiesen. Fl. Maj. Jun. perennis.

1018. CAREX (*hirta*) spicis remotis; masculis
pluribus, femineis subpedunculatis ere-
ctis, capsulis hirtis. Linn. sp. pl. 1389.

Carex

Carex caule foliis capsulisque hirtis. *Hall. hist.* n. 1403.

Gramen spicatum, foliis et spicis hirsutis mollibus.

Baub. pin. 4. *tbeat.* 48.

Cyperoides polystachion lanuginosum. *Moris. hist.*

3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 10. *Pluk. alm.* 178. t. 34.

f. 6. *Scheuchz. agr.* 478.

Icon *Oed. Dan.* t. 379.

In udis versus *Gonnewitz*.

1019. CAREX (*distans*) spicis remotissimis sub-
sessilibus bractea vaginante, capsulis an-
gulatis mucronatis. *Linn. sp. pl.* 1387.
Gmel. Sib. I. p. 136.

Carex spicis brevissime petiolatis diffitis. *Hall. hist.*
n. 1382.

Cyperoides spicis parvis longe distantibus. T.
Scheuchz. agr. 431.

Gramen cyperoides gracile alterum, glomeratis to-
rulis spatio distantibus. *Lob. ill.* 61. *Moris. hist.* 3.
p. 243. f. 8. t. 12. f. 18.

In prato hinter dem *Biniz* cum Nardo.

1020. MORVS (*alba*) foliis oblique cordatis
laevibus. *Linn. sp. pl.* 1398.

Morus fructu albo. *Baub. pin.* 459.

Weißer Maulbeerbaum.

Passim circa urbem occurrit, plantata. Arbor.

68 CLASSIS XVII. PLANTAE
CLASSIS XVII.

Plantæ flore relativō diphyto.

APETALAE.

1021. SALIX (*pentandra*) foliis ferratis glabris,
flosculis pentandris. *Linn. sp. pl. 1442.*
Gmel. Sib. 1. p. 154. t. 34. f. 1.

Salix foliis glabris ovato-lanceolatis, petiolis glandulosis, floribus hexandris. *Hall. hist. n. 1639.*

Salix spontanea, folio amygdalino, fragilis, non auriculata. *Bauh. hist. 1. p. 214.*

Salix folio laureo s. lato glabro odorato. *Raj. hist. 1420. Syn. 3. p. 449.*

Ad oras *Plissæ* passim.

Pappus seminis gossypii loco quodammodo adhiberi potest ad culcitrás, ellychnia, ipsasque telas; populneo tamen longe inferior.

1022. SALIX (*triandra*) foliis ferratis glabris,
floribus triandris. *Linn. sp. pl. 1442. Gmel.*
Sib. 1. p. 155. t. 34. f. 3. Gorter. Ingr. 156.

Salix stipulis dentatis, foliis glabris elliptico-lanceolatis, serratis, julis gracilibus triandris. *Hall. hist. n. 1437.*

In humidis ad *Plissam* passim.

1023. SALIX (*fragilis*) foliis ferratis glabris ova-to-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Linn. sp. pl. 1443. fl. Lapp. 349. t. 8. f. b.*

Salix folio longo latoque splendente, fragilis. *Raj. Syn. 3. p. 448. Linn. it. Scan. p. 200.*

Passim culta occurrit.

1024. SALIX (*purpurea*) foliis ferratis glabris lanceolatis: inferioribus suboppositis. *Linn.*

sp. pl. 1444. it. Scan. 252.

Salix folio longo subluteo non auriculata, vimini-
bus rubris. *Raj. Syn. 3. p. 450.*

In pratis circa urbem passim occurrit cum præce-
dente, culta.

1025. SALIX (*aurita*) foliis integerrimis utrin-
que villosis appendiculatis. *Linn. sp. pl.*

1446. fl. Lapp. 368. t. 8. f. y.

Salix folio rotundo minore. *Dill. Giss. app. 37. Raj.*
Syn. 3. p. 450.

Ad fossas pratenses circa urbem inque pratis humidis.

1026. POPVLVS (*alba*) foliis subrotundis den-
tato angulatis subtus tomentosis. *Linn. sp.*
pl. 1463. Gmel. Sib. 1. p. 151. Hall. hist. n. 1634.

Populus alba. *Cam. epit. 61.* majoribus foliis. *Baub.*
pin. 429.

Weisse Pappel.

Ad pagos passim occurrit, culta.

Seponimus *Populum orientalem* ramis coarctatis ere-
ctis, *P. nigræ* similem, a quibusdam ob celerius incre-
mentum formamque venustam junceam coli cœptam;
variasque *Salicum* five species five varietates, circa
Lipsiam obvias, de quarum synonymis certis nondum
nobis constat. *Salicem 699, five Helicem Linn. sp.*
1444. n. u. spontaneam non deprehendimus, sed cul-
tam tantummodo ad fossas in horto Apeliano; quæ
flosculis monandris facile distinguitur.

70 CLASSIS XVIII. PLANTAE
CLASSIS XVIII.

Plantæ flore nudo.

FILICES.

719. POLYPODIVUM (*Thelypteris*) frondibus pinnatis: pinnis pinnatifidis integerrimis.
Linn. sp. pl. 1528. sub Acrosticho.

Filix fontis admirabilis ad mare vulgarem non ramosam accedens. *Baub. hist. 3. p. 731. c. f. aliena.*
Raj. hist. 145.

Filix tenuissime et profunde dentata. *Baub. l. c. aliena descr. cum figura hujus speciei.*

Filix petræa femina 3. *Tab. hist. 1182.*

Filix non ramosa minor sylvatica repens. *Moris. hist. 3. p. 580. f. 14. t. 4. f. 17.*

Thelypteris palustris non ramosa. *Rupp. Ien. 3. p. 342. Schmidel. ic. p. 45. t. 11. 13.*

In pratis humidis ad Schoenfeld.

027. POLYPODIVUM (*molle*) frondibus subbipinnatis: pinnulis lanceolatis obtusiusculis apice crenulatis.

Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis ovatis obtusis dentatis, dentibus imis bifidis. *Hall. hist. n. 1703.*

Filix mollis seu glabra, vulgari non ramosæ accedens. *Baub. hist. 3. p. 730. Vaill. Paris. p. 53. t. 9. f. 3. (Moris. hist. 3. f. 14. p. 579. t. 3. f. 82.?)*

Filix non ramosa alpina etc. *Seguier. Veron. 3. p. 53. t. 1. f. 1.*

In nemoribus passim ad arborum radices.

Pinnæ alternæ, pinnulis plurimis lanceolatis basi hinc dilatatis, pinhatifidis, laciniis basi hinc dilatatis, obtusis, apice una alterave crenula notatis; ultimis acutis, integrerrimis. Glomeruli pollinis in inferiore parte pinnularum in duplicem seriem digesti, ubi sinus laciniarum desinunt, oriuntur, squamula tecū.

1028. POLYPODIVM (*cristatum*) frondibus subbipinnatis: foliolis ovato - oblongis: pinnis obtusiusculis apice acute ferratis: ferraturis acuminatis. *Linn. sp. pl. 1551.*

Polypodium pinnulis pinnatis: lobulis semipinnatis dentatis aristatis. Hall. hist. n. 1705.

Filix mas ramosa, pinnulis dentatis. Pluk. phyt. t. 180. f. 2.

Ad arborum radices in alneto inter *Schoenfeld* et *Abtnauendorf*.

Frondium pinnæ infimæ utplurimum steriles. Glomeruli seminales in seriem duplicem digesti. Pinnæ inferiores fere oppositæ. Pinnulæ oblongæ, latæ, inferiorum pinnarum infimæ fere petiolatæ, quasi cordatae. Laciniæ pinnularum falcatae: mucronibus introrargentibus et fæpe conniventibus.

M V S C I.

777. PHASCVM (*subulatum*) caulescens, foliis lanceolato - linearibus patulis. *Schreb. Phasc. p. 8.*

*Phascum acaule, anthera sessili, foliis subulato - se-
taceis patulis. Linn. sp. pl. 1570. Oed. Dan. t.
249. f. 1.*

*Sphagnum acaulon trichodes. Dill. musc. 251. t. 32.
f. 10, Hall. hist. n. 1727.*

72 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Muscus trichodes minor acaulis, capillaceis foliis.

Vaill. Par. 128. t. 29. f. 4.

In agris arenosis, ad Gonnevitz, pratis pinguibus Schoenfeldicis, im Oberholze ad latera fossarum atque orbitarum; ad Meusdorf an der Ziegelscheune, vere et autumno.

1029. PHASCVM (*piliferum*) caulescens, foliis oblongis apice piliferis erectis. Schreb.

Phasc. p. 8. t. 1. f. 6. 7.

In muris limosis, gregatim nascens, pulvillis convexis.

780. PHASCVM (*cuspidatum*) caulescens, foliis ovatis cuspidatis patulis: summis erectis conniventibus. Schreb. Phasc. p. 8. t. 1. f. 1. 2.

Phascum (*acaulon*) acaule, anthera sessili, foliis ovatis acutis conniventibus. Linn. sp. pl. 1570. Oed. Dan. 249. f. 1.

Sphagnum acaulon bulbiforme majus. Dill. musc. 251. t. 32. f. 11.

Sphagnum acaulon, foliis ovato-lanceolatis pilo aristatis. Hall. hist. n. 1726. potius ad praecedentem speciem pertinere videtur.

Muscus trichodes acaulos minor latifolius, Pet. gaz. 156. t. 95. f. 14. Vaill. Par. p. 128. t. 27. f. 2.

In agris, hortorum areis, pratis, solo pinguiori; in muris argillaceis, ubique fere, frequens, vere et autumno.

779. PHASCVM (*muticum*) acaule, foliis ovatis muticis concavis conniventibus. Schreb.

Phasc. p. 8. t. 1. f. 11. 12.

Spha-

Sphagnum acaule bulbiforme minus. *Dill. musc. p.*

252. t. 32. f. 12.

In muris argillaceis rarius.

Perill. a Linne' ut varietatem ad præcedentem speciem refert, cui tamen forma et crescendi modo aliisque attributis nimis dissimile est.

1030. PHASCVM (*serratum*) acaule, foliis ova-to-lanceolatis planis ferratis erectis. *Schreb.*

Phasc. p. 9. t. 2.

In pratis pinguibus inundatis ad *Plissam*, vere.

Minimus fere omnium muscorum. Folia subinde apice laciniata. Semina majora quam in Polytricho maximo.

733. POLYTRICHVM (*commune*) capsulis parallele-pipedis, foliis ferrulatis acutis.

Polytrichum caule simplici, anthera parallelepipa-da. *Linn. sp. pl. 1573.*

Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis ferratis. *Dill. musc. 420. t. 54. f. 1.*

Muscus capillaceus major, pediculo et capitulo crassioribus. *Tourn. inst. 550. Plum. fil. t. B. f. 6. 6.*

Barr. ic. 251. f. 3. Mich. gen. 108. t. 59. f. 1.

Muscus juniperifolius, capitulo quadrangulo. *Vaill. Par. 131. t. 23. f. 8.*

734. Var. Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevioribus et rigidioribus. *Dill. musc. 424. t. 54. f. 2.*

Muscus erectus, juniperi folio glauco rigido, calyptra longissima. *Vaill. Par. 131. t. 23. f. 6.*

Muscus capillaceus major etc. *Buxb. cent. 1. p. 42. t. 62. f. 1.*

74 CLASSIS XVIII. PLANTAE

In pratis ad Schoenfeld et Abtnauendorf, locis humidis, at varietas locis siccioribus.

1031. POLYTRICHVM (*piliferum*) capsula parallelepipedo, foliis integerrimis piliferis, caule simplici.

Polytrichum quadrangulare minus juniperi foliis pilosis. *Dill. musc. 426. t. 54. f. 3.*

Muscus capillaceus stellatus prolifer. *Tourn. inst. 551. Vaill. Par. t. 23. f. 7.*

In editioribus siccioribus ad Abtnauendorf, templo S. Thecla, am Biniz.

Difserit caule breviori, simplici, foliis non ferrulatis pilo longo erectiusculo cano terminatis.

735. POLYTRICHVM (*nanum*) capsulis subrotundis, caule simplici. *Huds. Angl. 400.*

Polytrichum nanum, capsulis subrotundis galeritis, aloes folio non serrato. *Dill. musc. 428. t. 55. f. 6.*

Mnium (*polytrichoides*) calyptra villosa. *Linn. sp. pl. 1576.*

Muscus coronatus rigidus minor et humilior, capitulis villosis brevioribus. *Moris. bist. 3. p. 630. f. 15. t. 7. t. 2. f. 7.*

Muscus capillaceus minor, calyptra tomentosa. *Tourn. inst. 552. Vaill. Paris. 131. t. 26. f. 15.*

Ad latera verticalia scrobiculorum arenosorum am Biniz, am Gickerlingsberge.

736. POLYTRICHVM (*striatum*) caule ramoso, capsulis subsessilibus sparsis, calyptis sursum pilosis. *Huds. Angl. 401.*

Bryum (*striatum*) antheris sessilibus sparsis, calyptis striatis sursumque pilosis. *Linn. sp. pl. 1579.*

Poly-

Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus manus. *Dill. musc. 430. t. 55. f. 8.*

1037. *Var.* **Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus minus.** *Dill. l. c. p. 431. f. 9.*

Ad arbores, lapides, muros, passim.

1032. **BRYVM (fontanum) capsulis subrotundis obliquis, caule simplici geniculis inflexo.** *Huds. Angl. 404.*

Bryum palustre, scapis teretibus stellatis, capsulis magnis subrotundis. *Dill. musc. 340. t. 44. f. 2.*

Mnium fontanum. *Linn. sp. pl. 1574.*

Mnium caulibus teretibus erectis ex vertice multifidis. *Hall. hist. n. 1851.*

Muscus capillaceus tenuissimus, pediculo longissimo purpurascente, capitulo rotundiore. *Vaill. Paris. t. 24. f. 10.*

Icon Oed. Dan. t. 298.

In palustribus pratis versus *Schoenfeld.*

1033. **BRYVM (extinctorium) capsula erecta oblonga minori, calyptris laxis æqualibus.** *Linn. sp. pl. 1581.*

Bryum caule brevissimo, calyptora cylindrica, longe aristata. *Hall. hist. n. 1829.*

Bryum calyptora extinctorii figura minus. *Dill. musc. 349. t. 45. f. 8.*

Muscus capillaceus minimus, calyptora longa conoidea nitida. *Vaill. Paris. 137. t. 26. f. 1.*

In muris argillaceis *nach den Kohlgärten hin*, et in pagis vicinis; in ipsa terra aridiore *am Gickerlingsberge.*

76 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Calyptra cylindraceo-campanulata, pellucida, albid'a, margine crenulata, vasculum occultante, ab omnibus aliis abunde differt.

744. BRYVM (*subulatum*) capsulis erectis subulatis, surculis acaulibus. *Linn. sp. pl. 1581.*

Bryum caule brevissimo, foliis lanceolatis, capsulis longissimis, operculo prælongo. *Hall. hist. n. 1827.*

Bryum capsulis longis subulatis. *Dill. musc. 350. t. 45. f. 10.*

Muscus capillaris, corniculis longissimis incurvis. *Vaill. Paris. 133. t. 25. f. 8.*

In aggeribus passim; v. g. ad sinistram viæ nach Gohliz.

742. BRYM (*murale*) capsulis erectis, foliis piliferis rectiusculis, surculis simplicibus cespitosis. *Linn. sp. pl. 1581.*

Bryum caulinis brevissimis, foliis ovato-lanceolatis patulis pilo terminatis, capsulis aristatis. *Hall. hist. n. 1825.*

Bryum tegulare humile pilosum et incanum. *Dill. musc. 355. t. 45. f. 14.*

747. Var. Bryum caulinulo brevissimo, foliis ovato-lanceolatis patulis, capsulis aristatis. *Hall. hist. n. 1826.*

Bryum humile pilis carens viride ei pellucidum. *Dill. musc. 356. t. 45. f. 15.*

In tegulis, muris, lapidibus, ambulacris hortorum etc.

Planta altera 747, quam perill. *a Linné* priori 746, ut varietatem subjicit, ab aliis, v. g. perill. *de Haller*, ut et ab *Illustr. Boehmero* factum est, pro distincta specie habetur.

739. BRYVM (*glaucum*) caulis erectis tere-
tibus, foliis imbricatis fragilibus, capsulis
inclinatis aristatis. *Hall. hist. n. 1785. sub*
HYPNO.

Bryum antheris erectiusculis, operculo arcuato, fo-
liis erectis imbricatis, surculis ramosis. Linn. sp.
pl. 1582.

Bryum albidum et glaucum fragile majus, foliis ere-
citis, setis brevioribus. Dill. musc. 362. t. 46. f. 20.

Im Biniz, aliis muscis immersus, nec pulvilos con-
vexos formans. Rarissime floret.

1034. BRYVM (*hypnoides*) vasculis erectis, cau-
le erectiusculo, ramis lateralibus brevibus
fertilibus. *Linn. sp. pl. 1584.*

Bryum hypnoides hirsutie canescens vulgare. Dill.
musc. 368. t. 47. f. 27.

Ad templum S. Theclæ in colle.

Folia recurva, lutescentia, pilo cano terminata, sicca
appressa, nec tortilia, vascula ovata, brevia, operculo
longiori. His notis, ut et statuā minori, tum ramifi-
catione diversa, differt a bryo rurali, quocum primo
intuitu facile confundi posset.

1035. BRYVM (*aestivum*) vasculis erectis subro-
tundis axillaribus, foliis subulatis distanti-
bus. *Huds. Angl. 411. Linn. sp. pl. 1585.*

78 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Bryum caulinis subnudis ramosis, foliis subulatis brevibus, capsulis ovatis. *Hall. hist. n. 1811.*

Bryum palustre aestivum, conservæ facie. *Dill. musc. 375. t. 47. f. 36.*

In humidis limosis *in der Lehmgrube vor dem Petersthore.*

1036. BRYVM (*heteromallum*) vasculis erectis, foliis setaceis secundis. *Linn. sp. pl. 1583.*

Bryum foliis capillaribus heteromallis, capsulis ovatis, operculis aristatis. *Hall. hist. n. 1807.*

Bryum heteromallum. *Dill. musc. 375. t. 47. f. 37.*
Im Oberholze ad aggeres.

748. BRYVM (*cirratum*) foliis capillaceis congestis tortilibus, capsulis ovato-cylindraceis brevissime ciliatis. *Hall. hist. n. 1786.*
sub HYPNO.

Mnium foliis arefactione revolutis. *Linn. sp. pl. 1576.*
Bryum cirratum et stellatum, tenuioribus foliis. *Dill. musc. 379. t. 48. f. 42.*

Muscus coronatus minimus capillaceis foliis, capitulis oblongis. *Morif. hist. 3. p. 631. f. 15. t. 7. l. 2. f. 19.*

In tectis stramineis pagorum vicinorum inter alia Brya.

1037. BRYVM (*unguiculatum*) capsulis urceolatis operculo longo obliquo, foliis lanceolatis tortilibus, caulinis erectis.

Bryum unguiculatum et barbatum, surculis in summitate crassioribus. *Dill. musc. 383. t. 48. f. 47.*

Muscus capillaris, capitulis erectis lageniformibus.
Buxb. cent. 2. p. 6. t. 2. f. 9.

Var.

Var. Bryum unguiculatum et barbatum tenuius et stellatum. *Dill. l. c. p. 385. f. 48.*

In hortorum areis, ad vias v. g. nach Gonnwiz hin,
in der Lehmgrube bey Gonnwiz etc. vulgare.

Cauliculi vix semipollicares, dense vestiti foliis linear-i-lanceolatis carinatis brevissime mucronatis post exsiccationem contortis, apice setas rubras superne dilutiores proferentes, ad quarum originem saepius rami excrescunt longitudine fere setarum. Capsulae ovali oblongae, ab initio virescentes, demum obscure rubrae, operculo obliquo crassiusculo, quo decidente pecten contortus in conspectum prodit.

1038. BRYVM (*crispum*) capsulis obliquis, foliis subulatis basi dilatatis undulatis demum tortilibus, caulinis erectis.

Ad fossas *am Biniz.*

Cauliculi humiles (vix tertiam pollicis partem æquantes,) foliis e basi lata fere subrotunda undulata subulatis, acutis, post exsiccationem crispati laxius vestiti. Setæ longiusculæ, virides basi rubentes. Capsula obliqua, altero latere coarctata; operculum conicum, acuminatum, capsula paullo minus, rubellum. Rarius floret.

738. BRYVM (*purpureum*) capsulis inclinatis striatis, operculo conico, foliis linear-i-lanceolatis carinatis, caule subdiviso.

Mnium (*purpureum*) caule dichotomo, axillis pendunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Linn. sp. pl. 1575.*

Bryum foliis lanceolatis subulatis, capsulis erectis, operculis conicis. *Hall. hist. n. 1816.*

80 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Bryum tenue stellatum, setis purpureis. *Dill. musc.*

386. t. 49. f. 51.

Var. Bryum polytrichoides palustre, setis longioribus rubris sericeis. *Dill. musc. 387. t. 49. f. 52.*

In tectis, muris, agris arenosis, ad vias etc. varietas in fossa humida ad *Lindenau.*

Confertim nascitur, facileque cognoscitur setis copiosis longis ruberrimis, foliis tenuibus lète viridibus, post exsiccationem parum crispis, capsulis per siccitatem striatis, operculis brevibus acutis.

1039. BRYVM (*pallidum*) capsulis urceolatis erectis pectine spirali, foliis capillaceis, surculis acaulibus.

Bryum caule sessili, foliis capillaribus, capsulis ova-to - cylindraceis, operculo conico. *Hall. hist. n. 1805.*

Bryum acaulon heteromallum, setis longis pallidis.

Dill. musc. 389. t. 49. f. 57.

Ad latera fossarum aggerumque, arenosa, *im Oberholze*, cum Phasco subulato.

Caulis brevissimus. Folia capillacea, acuminata, sèpius secunda, numquam se contorquentia, pallide viridia. Setæ sesquiunciales, pallidius virides. Capsulæ siccæ striatæ, uti bryi purpurei, operculo conico longo.

1040. BRYVM (*stellatum*) acaule, foliis involutis, operculis cuspidatis, pectine spirali.

Accedit ad Bryum acaulon, foliis teneris confertis, capsulis conicis. *Dill. musc. 389. t. 49. f. 56.*

In muris e limo construclis.

Surculi altitudine unius alteriusve lineæ geometricæ.

Folia pauca, 7 - 8 circiter in stellulæ formam congesta, patentia, oblongo - triangularia, margine utrinque invo-

involuta, acuminata, basi plana, subvaginantia. Seta uncialis, obscure purpurea. Capsula oblonga, operculi cuspis ea fere longior, parum ad latus flexa. Calyptra angusta, testacea.

1041. BRYVM (*simplex*) capsulis oblongis nutantibus, foliis subulatis, surculo simplicissimo medio pedunculifero. *Huds. Engl.*
413. n. 31. Linn. Sp. pl. 1587.

Bryum caulinis cernuis, foliis capillaribus heteromallis, capsulis curvulis cylindricis, operculis conicis. *Hall. hist. n. 1808.*

Bryum trichoides, capsulis rubris cernuis. *Dill. musc.*
390. t. 50. n. 59.

Am Bieniz.

Cauliculus apice pedunculifer; ad latus pedunculi saepius oritur ramulus pedunculo longior. Folia saepius secunda, post exsiccationem caulinis appressa.

1042. BRYVM (*aureum*) foliis capillaceis, capsulis pyriformibus pendulis. *Hall. hist. n. 1813.* operculo brevissimo rotundato.

Mnium antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, floribus femineis setiferis. *Linn. Sp. pl. 1576.* *Huds. Engl. 412. n. 28. sub BRYO.*

Ad rivulum in pratis *hinter dem Bieniz*; ad latera stagni *bey Burghausen*, frequens, paullo rarius florens.

1043. BRYVM (*nutans*) foliis lanceolatis subulatis, capsulis urceolatis cernuis, operculo conico.

Bryum trichodes late virens, capitulis cernuis oblongis. *Dill. musc. 391. t. 50. f. 61.*

82 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Muscus terrestris capillaris, foliis rarioribus et acutioribus, capitulis deorsum pendentibus velut apiculatis oblongis. *Rupp. Jen. 3. p. 401.*

Ad latera fossarum arenosa *im Oberholze.*

A priori 1042. satis differt foliis brevioribus basi latioribus minus late viridibus, seta non ut in isto arcuatim deorsum flexa, pendulis, sed capsulis ut plurimum tantum cernuis aut oblique deorsum spectantibus, senescentibus erectis, non pyriformibus sed e basi angusta sensim ampliatis, antrorum gracilescientibus; operculi denique ejusque contentorum structura.

749. BRYVM (*argenteum*) capsulis pendulis, surculis cylindraceis imbricatis levibus.

Linn. Sp. pl. 1586.

Bryum caulinis teretibus, capsulis ovatis acuminate pendulis. *Hall. hist. n. 1821.*

Bryum pendulum julaceum argenteum et sericeum.

Dill. musc. 394. t. 50. f. 62.

Var. Bryum pendulum, surculis teretibus viridibus.

Dill. musc. 394. t. 50. f. 63.

In muris, tegulis, asseribus, var. in terra pinguiori ad aggeres, in areis hortorum, ollis hortulanorum frequens.

1044. BRYVM (*capillare*) capsulis pendulis oblongis, foliis ovatis setiferis carinatis.

Linn. Sp. pl. 1586.

Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus. *Dill. musc. 398. t. 50. f. 67.*

Muscus capillaceus major, capitulis crassioribus cylindraceis nutantibus. *Vaill. Paris. 134. t. 24. f. 6.*

Ad vias cavas, latera fossarum, scrobium, ad ligna putrida passim v. g. ad viam publicam *vor dem Peters-thore*; in horto *Apeliano*.

1045. BRYVM (*crudum*) capsulis oblongis pendulis, foliis acutis pellucidis ovatis: summis longioribus lanceolatis.

Mnium crudum. Linn. Sp. pl. 1576.

Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis magnis nutantibus. Dill. musc. 402. t. 51. f. 71.

In pratis *Schœnfeldicis* ad radices alnorum.

1046. BRYVM (*hornum*) capsulis oblongis nutantibus, pedunculis curvatis, foliis ovatis margine scabris. Huds. Angl. 415. (Linn. Sp. pl. 1576. sub MNIO.)

Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis magnis nutantibus. Dill. musc. 402. t. 51. f. 71.

Muscus capillaceus major stellatus. T. Vaill. Par. t. 24. f. 5. Mich. gen. 108. t. 9. f. 2.

In pratis *Schœnfeldicis* ad radices alnorum. Flor. Mart. Apr.

1047. BRYVM (*bimum*) capsulis pendulis pyriformibus obtusis, foliis lanceolatis alternis, caule rubiginosa. Hall. hist. n. 1847. sub MNIO.

Bryum lanceolatum bimum, setis et capsulis longis pendulis. Dill. musc. 405. t. 51. f. 73.

In paludosis pratorum *Schœnfeldicorum*.

Folia parum decurrentia, ovato-lanceolata, acuminata, distantia: ramea minora.

84 CLASSIS XVIII. PLANTAE

753. BRYVM (*ligulatum*) capsulis nutantibus,
pedunculis aggregatis, foliis oblongis un-
dulatis ferrulatis. *Linn. Sp. pl. 1578. n. 14.*
var. δ. (MNIVM undulatum.)

Bryum dendroides polycephalon, phyllitidis folio
undulato pellucido, capsulis ovatis pendulis.
Dill. musc. 410. t. 52. f. 76.

Muscus polygoni folio. *Tourn. inst. 555. t. 326. f. E.*
Mich. gen. 108. t. 59. f. 5.

In dem Rosenthal, pratis Schäufeldicis, in dem
Oberholze, Linkelerholze, solo humido, paludoso,
copiose.

Folia decurrentia ligulata, obtusa cum acumine mi-
nuto.

1048. BRYVM (*roseum*) capsulis nutantibus,
pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-con-
gestis lanceolatis acutis. *Linn. Sp. pl. 1578.*
n. 14. var. γ. (MNIVM proliferum.)

Bryum stellare roseum majus, capsulis ovatis pen-
dulis. *Dill. musc. 411. t. 52. f. 77.*

Muscus stellaris roseus. *Buxb. cent. 2. p. 2. t. 1. f. 3.*
Cum sequentibus.

Folia ad apicem caulum in formam rosæ congesta
et patentia, decurrentia, ovato-lanceolata, integerri-
ma, (per lentem visa minutissime crenulata) acu-
minata.

1049. BRYVM (*cuspidatum*) capsulis nutanti-
bus, pedunculis aggregatis, foliis ovatis
acutis ferratis. *Linn. Sp. pl. 1577. n. 14. var.*
β. (MNIVM cuspidatum.)

Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. *Dill. musc. 413. t. 53. f. 79.*

Muscus polytrichoides polycephalus, chamæsyces folio. *Vaill. Par. 136. t. 26. f. 18.*

In pratis im Rosenthale, bey Schœnfeld und Abt-nauendorf, præsertim in fossis, ubi muscis impletæ sunt.

Folia decurrentia, nunc latiora ad subrotundam, nunc angustiora ad lanceolatam formam magis inclinata, mucrone brevi terminata.

755. BRYVM (*punctatum*) capsulis cernuis, pedunculis aggregatis, foliis obovatis integrerrimis obtusis punctatis. *Linn. Sp. pl. 1577. n. 14. var. α. sub MNIO.*

Bryum pendulum, serpilli folio rotundiore pellucido, capsulis ovatis. *Dill. musc. 416. t. 53. f. 81.*

Cum præcedente et ad Gonnewiz, ad radices salicium, ut et am Gickerlingsberge in graminosis.

Folia sessilia, integerrima, quorum maxima sunt quæ caulem terminant. Operculum aristatum.

1050. HYPNVUM (*bryoides*) fronde simplicissima pinnata lanceolata apice pedunculifera. *Linn. Sp. pl. 1588.*

Hypnum foliis planis pinnatis parvum septem, setis ex summitate. *Hall. hist. n. 1776.*

Hypnum taxiforme exiguum versus summitem capsuliferum. *Dill. musc. 262. t. 34. f. 1.*

Muscus polytrichoides, exiguis capsulis in summis surculis s. foliis, subrotundis, erectis. *Vaill. Par. 136. t. 24. f. 13.*

Muscus terrestris minimus, foliis pennatim dispositis. *Buxb. cent. 1. p. 44. t. 64. f. 3.*

86 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Icon Oed. Dan. t. 473. f. 1.

In umbrosis humidis, solo argilloso, præsertim in fossis, ad aggeres, *im Apelischen Garten an der Linden-Allee, im Rosenthal, bey Gohliz, Lindenau, Gonnewitz, ad laterarium Meisdorficam, im Oberholze.* Flor. hyeme, primo vere.

1051. HYPNVM (*taxifolium*) fronde simpliciflora pinnata lanceolata basi pedunculifera.
Linn. Sp. pl. 1587.

Hypnum foliis planis pinnatis parium duodecim, setis radicalibus. *Hall. hist. n. 1775.*

Hypnum taxiforme minus, basi capsulifera. *Dill. musc. 263. t. 34 f. 2.*

Muscus pennatus, capitulis adianti. *Vaill. Par. 136. t. 24. f. 11.*

In viis minus tritis humidis, *im Rosenthal.* Rarissime floret, Octobri.

Frondibus planis foliisque distichis, i. e. in duas series oppositas simplices digestis, cum priori convenit, sed longe majus est, foliisque majoribus numerosioribus et saturatius viridibus differt. Frondes quandoque ramosæ, rarius apice semel vel bis proliferæ observantur.

772. HYPNVM (*denticulatum*) fronde pinnata simplici: pinnis duplicatis, basi pedunculifera. *Linn. Sp. pl. 1588.*

Hypnum denticulatum pinnatum, pinnulis duplicatis recurvis. *Dill. musc. 266. t. 34 f. 5.*

In pratis Schœnfeldicis, ad radices alnorum.

Folia bifaria, serie simplici, s. dupliqui, rarius triplici sibi incumbentia, falcata. Opercula exæde conica.

1052. HYPNVM (*sylvaticum*) fronde pinnata ramosa decumbente, foliolis acutis, medio pedunculifera. *Huds. Engl.* 419. n. 4.

Hypnum denticulatum pennatum, pinnulis simplicibus rectioribus. *Dill. musc.* 267. t. 34. f. 6. *Hall. hist.* n. 1773.

In aggeribus humidis umbrosis, *im Oberholze*, ad laterarium *Meisdorficam*.

Folia rectiora. Operculum in mucronem acuminate productum. Surculi subinde indivisi, supra basin setiferi.

778. HYPNVM (*complanatum*) fronde ramosa: foliis distichis imbricatis acinaciformibus acuminatis.

Hypnum (complanatum) fronde pinnata ramosa: foliolis imbricatis acutis complicatis compressis. *Linn. Sp. pl.* 1588.

Hypnum caule disticho, foliis ovatis planis, capsulis ovatis aristatis. *Hall. hist.* n. 1771.

Hypnum pennatum compressum et splendens, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 268. t. 34. f. 7.

Muscus trichomanoides filicifolius splendens. *Vaill. bot.* 159. t. 23. f. 4.

Muscus terrestris repens - - *Moris. hist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. l. 2. f. 5.

Ad arborum truncos, *im Rosenthale* et alibi.

Frondes explanatae, de arborum truncis recta extantes, inferiori pagina quodammodo concavæ, undique cinctæ foliis in duplice seriem oppositam digestis, in ramis primariis latioribus, in minoribus angustioribus; extremitates ramulorum lateralium in fila tenuia abeunt, foliis minimis capillaribus obsita, licet

88 CLASSIS XVIII. PLANTAE

oculo nudo calva videantur; hæc fila tam a DILLENIo, quam a VAILLANTIO in iconibus omittuntur, in sola icone MORISONIANA adfunt; sed perperam additis capsulis, quod nimirum pro fetis habuit pictor.

Non confundendum est cum alio musco, cui, nisi curiosius examinatum, non adeo dissimile est; nimis rum *Fontinali pennata* LINN. a DILLENIO t. 32. f. 7. VAILLANTIO t. 27. f. 4. et HALLERO enum. t. 3. f. 2. hist. t. 45. f. 2. expressa, ad Hypna potius referenda, circa Lipsiam nondum reperta.

1053. HYPNUM (*trichomanoides*) fronde ramosa: foliis distichis imbricatis acinaciformibus obtusis.

Hypnum pennatum trichomanoides splendens ramosum. Dill. musc. 269. t. 34. f. 8.

Ad arborum radices in nemoribus umbrosis *bey Gonnelwiz, im Rosenthal etc.*

Statura minor et habitus strictior quam præcedentis speciei; ramuli breviores, in quibus extremitates calvæ prioris rarius observantur, foliis minimis ovatis adspersæ, apice iterum foliosæ; folia acinaciformia, quam in præcedente breviora, fine elliptico, obtuso, non tamen apice rotundato, sed angulo terminato; setæ ut plurimum ad exortum ramulorum enascuntur, non tamen semper. Opercula magis acuminata. Præcedenti maxime adfnis est, cui ut varietas a pluribus auctoribus jungitur.

1054. HYPNUM (*prælongum*) surculis subspinatis decumbentibus: ramulis remotis, foliis ovatis, capsulis cernuis. Linn. Sp. pl.

1591.

Hypnum

Hypnum repens, triangularibus parvis foliis prælongum. *Dill. musc. 278. t. 35. f. 15.*

An Muscus filicinus minor C. Bauhini? *Vaill. Par. 140. t. 23. f. 9.*

Muscus terrestris minor foliis crispis. *Buxb. cent. 4. p. 37. t. 63. f. 3.*

Ad arbores emortuas, radices arborum, et in ipsa terra argillosa humida, in horto *Apeliano, im Rosenthal*, ad *Gonnewitz, Raschewitz etc.*

1055. HYPNVM (abietinum) surculis pinnatis teretiusculis remotis inæqualibus. *Linn. sp. pl. 1591.*

Hypnum ramis duris teretibus, foliis appressis ova-to-lanceolatis pilo aristatis. *Hall. hist. n. 1762.*

Hypnum lutescens, alis subulatis tenacibus. *Dill. musc. 280. t. 35. f. 17.*

Muscus pennatus minor, caulis ramosis in summitate velut spicatus. *Vaill. Par. t. 29. f. 12.*

Muscus terrestris, surculis filamentosis tenacibus abietinis semel tantum divisis. *Moris. hist. 3. p. 626. f. 15. t. 5. l. 4. f. 22.*

In aggeribus aridioribus, auf dem Gickerlingsberge, ad viam nach Gohliz und Lindenthal. Numquam apud nos floret.

Ramuli recti, aut in arcum modice flexi; eorum nonnulli saepius apice intumescunt in gemmulas ovatas, a foliis ovatis muticis, imbricatis constructas, quas apud auctorum neminem reperio. - - Figura *VAILLANTII* optima est, neque folia nimis cuspidata, quidquid in contrarium moneat *DILLENIUS*.

90 CLASSIS XVIII. PLANTÆ

1056. HYPNVM (*aduncum*) surculis erectiusculis subramosis, foliis secundis recurvatis subulatis. *Linn. sp. pl. 1592.*

Hypnum caule erecto, foliis falcatis pilo aristatis, operculis conicis. *Hall. hist. n. 1736.*

Hypnum palustre erectum, summitatibus aduncis. *Dill. musc. 292. t. 37. f. 26.*

In pratis uidis *Schœnfeldicis* copiose.

1057. HYPNVM (*triquetrum*) ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Linn. sp. pl. 1589.*

Hypnum vulgare triangulum maximum et pallidum. *Dill. musc. 293. t. 38. f. 28.*

In nemoribus ad arborum radices, *im Rosenthale, bey Gonnewiz etc.* rarissime floret.

Hac specie, præ aliis, radices, vitra, vasa murrhina etc. peregre transmittenda involvi, sedilia sarciri, et tegularum interstitia hiantia obturari solent.

1057. HYPNVM (*rutabulum*) ramis vagis erectiusculis, foliis ovatis acutis mucronatis patulis, operculis conicis.

Hypnum ramis vagis subrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis. *Linn. sp. pl. 1590.*

Hypnum dentatum vulgatissimum, operculis obtusis. *Dill. musc. 295. t. 38. f. 29.*

Muscus terrestris vulgaris minor, adianti aurei capitulis. *Moris. hist. 3. p. 625. n. 3. p. 626. f. 15. t. 6. l. 1. f. 35. p. 629. t. 6. l. 4. f. 18.*

Icones *Vail. Paris. t. 27. f. 8. t. 23. f. 2.*

In nemoribus humidis ad arborum radices, *im Rosenthale, ad Gonnewiz etc.*

Folia amplexicaulia, laxa, parum vel nihil striata, convexo-concava, omnium tenuissime denticulata, ita, ut denticuli non nisi lenticulis vitreis convexioribus videri possint; in acumen modicum desinentia. Operculum breve, conicum, acutum absque mucrone.

1058. HYPNVUM (*striatum*) ramis vagis recurvis, foliis ovatis lineatis acutis undique patentibus, operculis mucronatis.

Hypnum vulgare dentatum, operculis cuspidatis.

Dill. musc. 297. t. 38. f. 30.

In nemorosis udis passim, im Rosenthale etc.

Folia conferta, magis amplexicaulia, quam præcedentis, iisque laxiora, latiora et fere triangularia, apice acuta, saepe etiam obtusa, non in acumen elongatum exeuntia, lineata, si lente adspicias, tenuissime ferrulata.

1059. HYPNVUM (*piliferum*) ramis vagis rectis, foliis ovatis, concavis, obtusis, apice piliferis, operculis cuspidatis.

In nemorosis umbrosis udis ad Gonnevitz. Numquam florens inveni.

Hypno *ratabulo* persimile est, sed folia magis appressa ovata, pleraque ita concava, ut cochleariformia dici possint, per siccitatem basi striata, integerrima, apice rotundato in pilum tenuissimum rectum elongatum desinunt. Setæ (in specimine aliunde ad me misso) unciales, rubræ; capsulæ ut in Hypno ratabulo, sed minores; operculo conico, cuspide longa terminato, longitudine fere capsulæ. - - Præcedentibus duobus dissimilius est, præsertim oculo armato examinatum, quam ut cum eorum alterutro confundi possit.

92 CLASSIS XVIII. PLANTAE

1060. HYPNUM (*fluitans*) foliis lanceolatis,
alternis remotis. Linn. fl. Suec. 2. n. 1034.

Hypnum caule fluitante prælongo, foliis raris lan-
ceolatis adscendentibus. Hall. hist. n. 1761?

Hypnum erectum aut fluitans, foliis oblongis angu-
stis peracutis. Dill. musc. 299. t. 38. f. 33.

Muscus fluitans, foliis et flagellis longis tenuibus-
que. Vaill. Paris. 139. t. 33. f. 6.

In aquis stagnantibus: im Teiche vor Meckern; in
der Lehmgrube am Gonnewizer Wege; ad radices al-
norum in pratis Schænfeldicis. Rarissime floret.

1061. HYPNUM (*stellatum*) surculis erectis,
foliis ovatis longe mucronatis erecto-pa-
tulis coloratis. . . .

Hypnum coma lutescente, extremitatibus stellatis.
Dill. musc. 302. t. 39. f. 35.

Muscus palustris, foliis et flagellis rigidiusculis, fe-
minibus in foliorum alis. Vaill. Paris. 141. t. 28.
f. 10.

In paludofis pratorum Schænfeldicorum.

Pars inferior caulum sæpius nigricat aut fulva est,
extremitates lutescunt. Folia amplexicaulia, basi di-
latata, non striata, inferiori parte erecta, deinde undi-
que patentia, apicem versus attenuantur et in mucro-
nem longum pertenuem desinunt. Semina in folio-
rum alis a VAILLANTIO observata meræ sunt gem-
mulæ. Fructificatio vera ignoratur.

1062. HYPNUM (*nitens*) surculis erectis, ra-
mulis brevissimis, foliis lanceolatis appres-
sis striatis, perichætiis longissimis, capsulis
obliquis.

Hypnum

Hypnum (trichodes) ramis rectiusculis, pinnulis approximatis apice pedunculiferis. *Neck. Gallobelg.*

483. n. 35.

Hypnum palustre erectum trichodes, ramulis crebris luteo - et rufo - virentibus glabris. *Dill. Giss.*
220. *musc. 303. t. 39. f. 37.*

In paludosis pratorum *Schænfeldicorum*. Numquam florentem inveni.

Surculi palmates, tomento fusco denso obducti, ex quo passim folia rara emicant. Rami primarii pauci, altitudine surculorum, similiter tomentosi, saepe nulli. Ramuli ultimi perbreves. Folia luto immersa fusca, in summitatibus surculorum longa, concava, flava aut dilute lutea, nitentia, striata, acuminata. Perichaetia ex ipso caule oriunda, prælonga, ramulos referentia, ita ut ex ramulis potius quam e caule setæ egredi videantur; ejus folia interiora, quæ totam perichaetii longitudinem efficiunt, foliis plantæ similia, sed magis striata, minus acuminata sunt. Setæ longæ erectæ rubræ. Capsulæ inclinatæ, oblongæ, incurvæ, rubellæ, operculo conico acuto. — Male *trichodes* dicitur, nec folia vere capillacea sunt, quamvis obiter intuentia talia videantur.

1063. **HYPNVM (squarrosum)** foliis ovato-lanceolatis apice subulatis undique reflexis. *Linn. sp. pl. 1593.*

Hypnum repens triangularibus reflexis foliis majus et minus. *Dill. musc. 303. 304. t. 39. f. 38. 39.*

Muscus erectus, foliis reflexis. *Vaill. Paris. 139. t. 27. f. 5. minus bona.*

Majus, in nemoribus udis, ad *Gautsch, Zæpen* frequens; minus, in prato am *Rosenthal*, et alibi; im

94 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Stadtgraben beym Petersthore. Eidem usui inservit ac
Hypnum triquetrum.

761. HYPNVM (*viticulosum*) surculis repenti-
bus, ramis vagis teretibus erectis, foliis
patulis acuminatis. *Linn. sp. pl. 1592.*

Hypnum foliis lanceolatis crispis, capsulis erectis,
operculis conicis. *Hall. hist. n. 1739.*

Hypnum subhirsutum, viticulis gracilibus erectis,
capsulis teretibus. *Dill. musc. 307. t. 39. f. 43.*

Ad arborum truncos *im Rosenthale*, in nemoribus
ad Gonnewitz, Raschowitz. Rarissime floret.

Surculi recti vel modice flexi. Folia sicca parum
contorta, secunda, præsertim in summitatibus ramo-
rum, quæ per siccitatem crassescunt. Sæpius gem-
mulæ minimæ, e foliorum alis copiose erumpentes, ra-
mos clavatos crisposque reddunt.

1064. HYPNVM (*riparium*) surculis teretibus
ramosis, foliis acutis patulis distantibus.
Linn. sp. pl. 1595.

Hypnum aquaticum, flagellis teretibus et pinnatis.
Dill. musc. 380. t. 40. f. 44.

In fossis pratorum *Schænsfeldicorum*; ad *Plissam*
passim.

1065. HYPNVM (*purum*) ramis teretibus, fo-
liis ovatis, setis prælongis, capsulis incli-
natis aristatis. *Hall. hist. n. 1743.*

Hypnum surculis pinnato - sparsis, subulatis, foliis
ovatis obtusis conniventibus. *Linn. sp. pl. 1594.*

Hypnum cypressiforme vulgare, foliis obtusis. *Dill.*
musc. 309. t. 40. f. 45.

Muscus squamosus cupressiformis. T. Vaill. Parif.

138. t. 28. f. 3.

In pratis, pascuis, vor dem Ranstädter-Thore, im Apelischen Garten, in nemoribus, passim, ut im Oberholze.

Rami versus apices surculorum gradatim decrescentes, apice attenuati, recurvati. Folia ovata, in brevissimum mucronem exeuntia, concava: majora fere cochleariformia. Setæ longæ rectæ. Eadem species, sed obesior, et foliis latioribus, occurrit im Bieniz.

1066. HYPNVM (*illecebrum*) surculis ramisque vagis teretibus erectiusculis obtusis.

Linn. sp. pl. 1594.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis concavis, ramis teretibus. Hall. hist. n. 1744.

Hypnum cupressiforme rotundius vel illecebrense æmulum. Dill. musc. 3n. t. 40. f. 46.

Muscus terrestris, surculis kali geniculati aut illecebrense æmulis, foliolis subrotundis squamatim incumbentibus. Raj. Vaill. Par. 137. t. 25. f. 7.

In aggeribus, im Apelischen Garten, ad viam publicam versus Gobliz, ubi rarissime floret; in pratis et nemoribus, im Rosenthale, ad Raschowitz, numquam florens.

Rami teretes, aut minus quam praecedentis attenuati, magis inordinate crescentes; folia cochleariformia, obtusa, mucrone minutissimo non nisi per lentieulam apparente. Setæ breves, uncia non longiores, ut plurimum curvæ.

96 CLASSIS XVIII. PLANTAE

1067. HYPNVM (*compressum*) ramis apice at
tenuatis, foliis ovato-lanceolatis, setis
elongatis, capsulis inclinatis operculo co-
nico.

Hypnum ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis,
setis prælongis, capsula crassa, operculo conico.
Hall. hist. n. 1742.

Hypnum surculis plano-pinnatis, ramulis simplici-
bus proliferisque, pedunculis bipollicaribus.
Neck. Gallop. 477. n. 23.

Hypnum cupressiforme tenuius et compressius.
Dill. musc. 312. t. 40. f. 47.

Muscus erectus, foliis angustis, caulis appressis.
Vaill. Par. 139. n. 1. t. 29. f. 10.

Muscus terrestris erectus, foliis angustioribus. *Buxb.*
cent. 4. p. 37. t. 64. f. 1. 3.

In nemorosis, *im Bieniz*, copiose; floret in declivi-
bus, humosis, sæpius humectatis.

Rami longe tenuiores, folia longiora auctioraque
quam in præcedentibus. Ab *Hypno puro*, cui ita simi-
lis est, ut cum eo facile confundi posset, præeunte per-
ill. *de HALLER* separavi.

1068. HYPNVM (*alopecurum*) surculis erectis,
ramis fasciculatis terminalibus subdivisis,
capsulis inclinatis. *Linn. sp. pl. 1594.*

Hypnum caule nudo confertim ramoso, ramis et
capsulis inclinatis aristatis. *Hall. hist. n. 1748.*

Hypnum dendroides obscurius, setis et capsulis
brevioribus subnutantibus. *Dill. musc. 315. t. 41.*
f. 49.

Muscus squamosus alopecuroides, flagellis recurvis.

Vaill. Par. 123. t. 23. f. 5.

In nemorosis umbrosis ad *Gonnewiz*, *Gautsch* etc. frequens, ubi terram argillaceam nudam operit, sed numquam floret.

Surculi basi nudi, arbusculas referentes, fragillimi, exsiccati ut plurimum nigrescentes. Rami recurvati.

1069. HYPNVM (*myosuroides*) surculis ramosissimis : ramis subulatis incurvatis utrinque attenuatis teretibus. *Linn. sp. pl. 1569.*

Hypnum myosuroides crassius, capsulis erectis. *Dill. musc. 316. t. 41. f. 50.*

Muscus denticulatus minor sericeus nostras, capitulis adianti. *Vaill. Par. 137. t. 28. f. 4.*

In truncis arborum im *Oberholze*.

1070. HYPNVM (*polyanthos*) surculis ramosissimis : ramis rectis teretibus multifloris, capsulis erectis.

Hypnum sericeum ramosius et tenuius, capsulis acuminatis. *Dill. musc. 327. t. 42. f. 62.*

Ad truncos arborum, in primis salicium, annosos frequens.

Cauliculi teretes, repentes, extremitatibus liberi. Ramuli perbreves (vix semunciales) dense congesti, erecti, versus extremitates cauliculorum proportionate decrescentes, undique imbricati foliis parvis, erectis, lanceolatis, modice concavis, non striatis, splendentibus, longe acuminatis, apices ramulorum pilis terminantibus ad alterutrum latus subinde flexis. Setae numerosae erectae dilute rubrae e cauliculis ramisque frequentes erumpunt, capsulas et effuetas et nondum ad-

98 CLASSIS XVIII. PLANTAE

ultas proferentes; illæ plerumque setis humilioribus insident, saepiusque vix e ramulorum cæspitulo emergunt. Perichaetium arctum, gracile. Calyptre albidæ. Capsulæ erectæ, maturæ urceolatæ, rufescentes; operculum conicum. Synonymon Dillenianum indubium est, quamvis icon primo adspectu recedere videatur, cum plantulæ ramos, semper implexos densumque cespitem constituentes, extricatos distinctosque, et capsulas nonnullas justo paullo magis inclinatas sistit. — Ad duætum hujus synonymi est *Hypnum* foliis perangustis filo terminatis, capsulis inclinatis breviter aristatis. *Hall. hist. n. 1755.*

770. HYPNVM (*sciuroides*) surculis erectis ramosis incurvatis. *Linn. sp. pl. 1596.*

Hypnum caulis teretibus ramosis, foliis adpressis pilo aristatis, operculis conicis. *Hall. hist. n. 1749.*

Hypnum arboreum sciuroides. *Dill. musc. 319. t. 41. f. 54.*

In arborum truncis *im Rosenthale* et alibi passim frequens, rarissime florens.

Rami saepius recti; foliis siccis appressis in alterutrum latus flexis. E foliorum alis subinde gemmulae nascuntur, unde rami clavati crispique fiunt.

1071 HYPNVM (*lutescens*) surculis vagis procumbentibus, foliis ovatis-lanceolatis subulatis striatis, capsulis obliquis. *Huds. Engl. 421.*

Hypnum sericeum surculis longioribus et rectioribus, capsulis incurvis. *Dill. musc. 325. t. 42. f. 60.*

Hypnum

**Hypnum caulis teretibus, foliis pilo terminatis,
capsulis obliquis aristatis.** *Hall. hist. n. 1753.*

In pratis, nemoribus ad terram.

**Hypno sericeo simillimum, differt surculis longioribus,
ramis remotioribus, capsulis cernuis.**

760. HYPNVM (*serpens*) surculis repentibus, ramis filiformibus: foliis obliteratis (*Linn. sp. pl. 1596.*) capsulis cylindriaceis inclinatis, mucrone brevissimo recto.

Hypnum caulis prostratis, foliis minimis pilo terminatis, capsulis cylindricis erectis mucronatis.
Hall. hist. n. 1756.

**Hypnum trichodes serpens, setis et capsulis longis
erectis.** *Dill. musc. 329. t. 42. f. 64. excluso syn.
Vaillantii.*

Habitat ad sepes, arborum radices corticesque cet.

Ramuli breves. Folia vix visibia, lanceolata, in acumen capillare tenuissimum desinentia. Capsulæ inclinatæ aut cernuæ, basi graciles, inde cylindracea, curvulae, longæ. Operculum conicum, mucrone tenuissimo brevissimo recto.

1072. HYPNVM (*intricatum*) surculis repentibus, ramis brevibus: foliis laxis lanceolatis acuminatis, capsulis obliquis cernuis mucrone obliquo.

Muscus terrestris omnium minimus, capitulis masculis oblongis erectis. *Vaill. Paris. 138. t. 28.
f. 2. 6. 7. 8.*

Muscus terrestris minor, caulinis repentibus tenuissimis. *Buxb. cent. 4. p. 36. t. 63. f. 2.*

100 CLASSIS XVIII. PLANTAE

In corticibus arborum ad truncos, radices, in horto
Apeliano, im Rosenthale, et alibi.

Cauliculi longi, intricati. Ramuli breves, foliis si-
milibus ac præcedens, sed oculo nudo bene visilibus,
laxis, post exsiccationem adhuc magis existantibus, la-
tioribus, in pilum breviorem desinentibus cincti. Setæ
breviores, dilute rubræ. Capsulæ inclinatæ aut ad la-
tus flexæ, breviores, virescentes, (denique obscure ru-
bræ) oblique urceolatæ, basi ventricosæ, collo sub an-
nulo contractiore, annulo tumido eleganter rubro;
operculo conico pariter rubro, terminato cuspidate ejus-
dem longitudinis, obliqua, ut plurimum sursum spe-
ctante. — Cum Hypno serpente ob folia majora figu-
ramque capsularum diversam conjungi nequit, neque
cum Hypno velutino ex eadem causa et ob folia sem-
per a surculis dehiscentia.

1073. HYPNVM (*attenuatum*) surculis rāmo-
sissimis, ramis incurvatis apice gracilescen-
tibus, foliis secundis ovatis carinatis obtu-
sis, capsulis erectis cuspidatis.

Hypnum repens trichodes arboreum majus, cauli-
culis ramosis. *Dill. musc. 331. t. 42. f. 66?*

Ad radices arborum non infrequens, ad *Gonnewiz*,
Raschwiz.

Surculi frequentes inferne pallentes et quasi emortui,
extremitatibus dilute virides, non tamen splendentes;
rami conferti, sæpe fasciculati, utrinque attenuati, api-
ce in filum tenue fere calvum desinentes, curvi. Fo-
lia amplexicaulia, a caule existentia, ad alterum latus
magis flexa, ovata, apice lanceolato, obtuso, canalicu-
lata, post exsiccationem perfecte heteromalla; in fine
ramulorum minuta. Setæ ad divaricationes caulum
ramorum-

ramorumque, solitariæ aut confertæ, unciales et supra, rectæ, purpureæ; perichætio albido brevi, cuius squamæ ovatæ inferiores, obtusæ, superiores in acumen prælongum desinunt. Capsulæ cylindraceo-urceolatæ, longiusculæ, pallide rubræ, operculi cuspidé brevi, obliqua. — Figura Dillenii ad similitudinem quorundam hujus speciei speciminum quodammodo accedit, sed figura foliorum, quam et icon, et descriptio exhibent, aliena est.

1074. HYPNVM (*palustre*) surculis repentibus, ramis confertis erectis, foliis ovatis secundis, capsulis erectiusculis. *Huds. Engl.*
429. n. 37. Linn. sp. pl. 1593.

Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalon repens. Dill. 293. t. 37. f. 27.

Ad sublicas putridas *an der Pleisse.*

Specimina nostra cum figuris Dillenianis exakte convenient, nisi quod teneriora, surculi longiores, ramuli que breviores sint. Hi in inferiore parte surculi subinde ramulosi, ut in fig. B., versus ejus extremitatem simpliciores, ut fig. A. exhibet, esse, saepiusque sub ipso apice non erigi, sed ligno arrepere et pinnatim utrinque a caule divergere solent. Capsulæ pleræque erectæ, cylindraceæ, rectiusculæ sunt; non tamen desunt obliquæ inclinatae.

1075. HYPNVM (*curtipendulum*) surculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis, perichætiis longissimis, capsulis pendulis.
Linn. sp. pl. 1594.

102 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Hypnum ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis
pilo aristatis, capsulis ovatis pendulis: operculis
aristatis. *Hall. hist. n. 1740.*

Hypnum dentatum curtipedulum, viticulis rigidis.
Dill. musc. 333. t. 43. f. 69.

Ad arborum truncos *im Oberholze.* D. KNOLLE.

Ramuli steriles alii apice subulati, calvescentes, alii
apice crassiores stellati. Folia sicca ad alterum latus
inclinata. Setæ breves. Capsulæ post emissionem
pulveris contenti iterum erectæ.

1076. MNIVM (*pellucidum*) caule simplici, fo-
liis ovatis. *Linn. sp. pl. 1574. n. 1. Schmi-
del. ic. 1. p. 13. t. 3. opt.*

Mnium caule simplicissimo, foliis ovato-lanceola-
tis, seta fungifera foliosa. *Hall. hist. n. 1853. ex-
clusis synonymis Michelii et Buxbaumii, quæ bis-
citantur, ad hanc et ad sequentem speciem.*

Mnium serpylli foliis tenuibus pellucidis. *Dill. musc.
232. t. 31. f. 2.*

Icon *Oed. Dan. t. 300.*

In ligno putrido passim; *im Apelischen Garten.* D.
KNOLLE.

1077. MNIVM (*palustre*) caule dichotomo, fo-
liis lanceolatis. *Linn. sp. pl. 1574.*

Mnium caulibus rubiginosis bipartitis, foliis lanceo-
latis mollibus, capsulis cylindricis acuminatis.
Hall. hist. n. 1855.

Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis. *Dill.
musc. 233, t. 31. f. 3.*

Muscus palustris, flagellis erectis luteolis raro divisis, capitulis oblongis adianti. *Moris. hist. 3. p. 629. t. 6. f. 9.*

Muscus palustris erectus flavescens capillaceo folio. *Vaill. Par. 135. t. 24. f. 1.*

In pratis *bey Schœnfeld, Abtnauendorf etc.* copiose.

1078. JVNGERMANNIA (*scalaris*) foliis integerrimis ovatis distichis, extremo caule serifero. *Hall. hist. n. 1858.*

Jungermannia scalaris. Schmidel. de Jungerm. p. 20. f. XVII.

Mnium trichomanis facie, foliis integris. *Dill. musc. 236. t. 31. f. 5.*

Mnium foliis distichis integerrimis. *Linn. sp. pl. 1578.*
Ad aggeres, et fossas *im Oberholze.*

Calyx ut plurimum terminalis, quandoque e medio frondis oritur.

1079. JVNGERMANNIA (*lanceolata*) frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis adscendentibus apice floriferis, foliis integerimis. *Linn. sp. pl. 1597.*

Jungermannia foliis pinnatis ovatis confertis, ex apice florifera. Hall. hist. n. 1871.

Lichenastrum trichomanis facie minus ab extremitate florens. Dill. musc. 486. t. 70. f. 10. f. A. B.

Var. — — surculis foliis ac floribus minoribus, foliolis circa thecas tenuioribus crebrioribus. Dill. l. c.

In subhumidis umbrosis *im Oberholze*; varietas in agris arenosis humidis, versus *Schœnfeld*, copiosa.

104 CLASSIS XVIII. PLANTAE

1080. JVNGERMANNIA (*varia*) surculis adscendentibus, foliis distichis bilobis subrotundis integerrimis, lobulis inæquilibus.

Jungermannia surculis erectiusculis bifariam imbri-catis, foliolis bipartitis. *Linn. sp. pl. 1601.*

Lichenastrum foliis variis. *Dill. musc. 505. t. 73. f. 36. variet. A. B.*

Ad aggeres im Oberholze.

Plantulæ nostræ, quæ ad figuræ Dillenianas citatas proprius, non tamen ad amissim, accedit, surculi, quantum videre potui, simplices, rarius versus apicem ramosi, basi decumbunt ultra medium erecti; folia disticha inferne minuta, versus extremitatem gradatim majora, a caulinculo exstantia, laxa, subinde remota, biloba: lobis integerrimis, subrotundis: quorum alter inferiora specans duplo fere major, phlebotomium figura imitatur, undique tamen rotundatus, antice aliquot crenis lente admodum convexa tantum observandis notatus: minor magis ovatus in angulum exit acutulum. Cal. terminalis, brevis, quadrangularis, sulcis quatuor profundis longitudinalibus divisus, quadridentatus, acutulus. Totius plantulæ longitudo vix dimidium pollicem excedit.

1081. JVNGERMANNIA (*bidentata*) surculis procumbentibus ramosis, apicibus floriferis, foliis ovatis bicuspidatis, stipulis lanceolatis quadridentatis.

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. sp. pl. 1598.*

Lichenastrum pinnulis acutioribus et concavis bifidis majus. *Dill. musc. 487. t. 70. f. n.* et *L. pinnulis obtusioribus bifidis minus.* *p. 488. f. 12.*

Jungermannia foliis imbricatis bicuspидatis globuligeris. *Hall. hist. n. 1863.* et *Jungermannia foliis bifidis in ramo florifero majoribus.* *Hall. hist. n. 1877.*

Muscus lichenoides, foliis pennatis bifidis. *Moris. hist. 3. p. 627. f. 15. t. 6. l. 2. f. 47.*

Hepaticoides polytrichi facie, foliis bifidis majus. *Vaill. Par. 99. t. 19. f. 8.*

In umbrosis et ad aggeres, *im Rosenthale, Oberholze* frequens. Numquam florentem inveni.

Pinnulas secundarias s. auriculas, quæ forte melius stipulæ dicuntur, in hac specie nec DILLENIUS, nec alius quispiam auctorum observavit. Sunt autem solitariæ, oppositifoliæ i. e. in inferiore parte caulinis, e regione foliorum, collocatæ, deorsum spectantes, bifidæ, immo quandoque bipartitæ: laciniis in forficis morem divergentibus, lanceolatis, externe dente acuto auctis, acutis, parvis. Folia majuscula, apice rotunde resecto, acutissime bidentata. Ramuli florentes adscendententes, apice floriferi.

1082. JVNGERMANNIA (*bicuspidata*) furculis procumbentibus, foliis distichis quadratis bidentatis, stipulis nullis.

Jungermannia bicuspidata. *Schmidel. Diss. f. XVI.*

Jungermannia foliis bifidis e medio caule crebro florifera. *Hall. hist. n. 1878.* et *Jungermannia foliis distichis bicuspidalis, summis ramis globuliferis.* *Hall. hist. n. 1865. cum synonymis repetitis.*

106 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis medio floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. sp. pl. 1598.*

Lichenastrum pinnulis acutissime bifidis, minimum. *Dill. musc. 488. t. 70. f. 13.*

In umbrosis in horto *Apeliano*, *im Oberholze* et alibi in humidis, præsertim ad orbitas, ubi aqua per hyemem stagnat; rarius floret.

Cauliculi medio floriferi; calyces prælongi, cylindracei plicati. Foliorum dentes sinu acuto separati.

1083. JVNGERMANNIA (*reptans*) surculis decompositis, medio floriferis, foliis quadratis antice incisis, stipulis quadrifidis.

Jungermannia frondibus subtus bipinnatis apice reptantibus, foliolis quadridentatis. *Linn. sp. pl. 1599.*

Jungermannia minima ramosa polyanthos, foliis imbricatis trifidis. *Hall. bist. n. 1879.*

Lichenastrum multifidum exiguum ad basin florens, per siccitatem imbricatum. *Dill. musc. 494. t. 71. f. 24.*

In aggeribus umbrosis udis *im Oberholze*, etiam in apricis ad *Lindenau*. Flor. vere, non raro.

Surculi passim radicati, eleganter bipinnati, læte virides. Folia laxa, ad medium fere trifida aut quadrifida, acuta, adscendentia denticulis deflexis extrorsum spectantibus. Stipulae foliis minores, denticulis pariter acutis, adscendentibus. Calyces in medio surculorum, excepti calyculo e squamis ovatis, triplici vel quadruplici serie imbricatis; ipsi triquetri, trisulcati, ore tri- seu quadridentato.

1084. JVNGERMANNIA (*barbata*) surculis elongatis medio floriferis, foliis antice crenatis, caulinulo subtus villoso.

Jungermannia barbata. *Schmidel. diss. p. 20.*

Jungermannia foliis latiusculis obtusis undulatis et velut angulosis. *Mich. gen. 7. t. 5. f. 10?*

In umbrosis, *im Rosenthale, Oberholze.*

Surculi recti, subtus villo radicati. Folia disticha, obliqua, quadrata, antice crenis tribus quatuorve incisa, acutis, ut plurimum undulato - plicata plicis tot quot crenæ. Calyces ovati. Hujus ut et aliarum minus vel nondum cognitarum specierum Jungermanniæ historiam absolutissimam, ab excellentissimo inventore, Cel. SCHMIDELIO, sperare licet.

1085. JVNGERMANNIA (*pusilla*) surculis brevissimis apice floriferis, foliis imbricatis antice crenatis, caulinulo subtus villoso.

Jungermannia pusilla. *Linn. sp. pl. 1602. fl. Suec.*

1050. *Schmidel. diss. p. 13.*

Lichenastrum exiguum, capitulis nigris lucidis et cotylis parvis nascentibus. *Dill. musc. 513. t. 74. f. 46.*

Ad aggeres, fossas, solo arenoso, fere ubique: *zwischen der Stadt, den Koblgäerten und Schänsfeld, bey Lindenau, am Bieniz, im Oberholze etc.*

Cauliculi brevissimi, unam alteramve lineam longi, ramis pariter brevissimis, basi et subtus radiculis cereberrimis adfixi. Folia imbricata, in surculis florentibus densius congesta, in reliquis paullo laxiora, apice rosu-

108 CLASSIS XVIII. PLANTAE

rosulas formantia, obliqua, antice crenata, denticulis duobus ad quinque, acutis, plerumque concava, longitudinaliter undulata, subinde tamen planiora; foliis antecedentis admodum similia. Flores terminales (aut, caulinulo simul ex apice prolifero, medii) solitarii, rarius bini ternive. Calyx cinctus foliis quatuor laxis, compressus, angulatus, plicis quatuor seu quinque totidemque crenis. Receptaculi cruciati laciniæ ovatae. Frondes aliæ supra caulinulum polliniferæ.

Ab hac nostra diversa esse videtur Jungermannia foliis palmatis digitatis e basi florifera. *Hall. hist. n. 1387.* cum perill. Auctor ad tribum frondibus simplicibus refert, eique calyces clavatos hirsutos tribuit.

1086. JVNGERMANNIA (*tamariscifolia*) surculis decompositis apice floriferis, foliis subrotundis subtus auriculatis, stipulis ovatis emarginatis.

Jungermannia foliis imbricatis serie dupli, superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo majoribus. *Linn. sp. pl. 1600.*

Jungermannia foliis imbricatis rotundis, superne alternis convexis, inferne quadrifariis. *Hall. hist. n. 1873.*

Lichenastrum imbricatum, *tamarisci narbonensis* facie. *Dill. musc. 499. t. 72. f. 31.*

Hepaticoides quæ muscus *trichomanoides* terestrис minor floridus. *Vaill. Paris. 100. t. 23. f. 10.*

Muscoides squamosum nigro-purpureum, surculis angustioribus, foliis circinatis minoribus. *Mich. gen. 10. t. 6. f. 5.*

In truncis arborum frequens.

Surculi passim radicati. Folia fere orbicularia, nunc imbricata, nunc remotiora, viridia, rubiginosa, fusca, grisea.

grisea. Auriculæ foliis appressæ, oblongæ, obtusæ, minutæ. Stipulæ iis plus quam duplo maiores. Calyx acute tetragonus angulis crenulatis, superne contractior.

1087. JVNGERMANNIA (*trichophylla*) surculis teretibus, foliis capillaceis æqualibus.
Linn. sp. pl. 1601.

Lichenastrum trichodes minimum in extremitate florens. Dill. musc. 505. t. 73. f. 37. minus bona.

Im Oberholze passim inter alios muscos.

Surculi decumbentes, parum ramosi. Folia capillo quovis tenuiora, tamen, microscopio admodum augeante spectata, plana, nonnumquam bifida, isthmis intercepta, bina, trina et plura in fasciculos collecta, (rarius solitaria) per intervalla alternatim caulinis adfixos. Calyx teres, apice in lacinias plures subulatas introrsum conniventes divisus. Crux linearis.

1088. JVNGERMANNIA (*multifida*) acaulis, fronde bipinnatifida. *Linn. sp. pl. 1602.*
Weiss Gotting. 109.

Lichenastrum ambrosiæ divisura. Dill. musc. 511. t. 74. f. 43.

Ad orbitas humidas, in umbrosis, *im Oberholze*, numquam cum flore lecta.

784. JVNGERNANNIA (*furcata*) acaulis, fronde linearis ramosa, extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Linn. sp. pl. 1602.*

Jungermannia foliis linearibus dichotomis inferne floriferis. *Hall. bist. n. 1885.*

110 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Lichenastrum tenuifolium furcatum. *Dill. musc. 512.*
t. 74. f. 45.

Ad arborum truncos, *im Oberholze.* Rarissime et
non nisi in humidis floret.

Frondes pilis raris ciliatæ. Calyces ovati, ex infe-
riore frondium pagina oriuntur.

785. JVNGERMANNIA (*epiphylla*) fronde
foliacea obtuse lobata ex medio florifera.
Hall. hist. n. 1883.

Lichenastrum capitulis rotundis e foliorum medio
enacentibus. *Dill. musc. 508. t. 74. f. 41.*

Icon *Schmiedel. diff. f. 1.*

Ad rivulum *hinter dem Bieniz;* rarius florens.

1089. ANTHOCEROS (*lævis*) fronde plana
crenata. *Schmiedel. Ic. pl. 1. p. 71. t. 19.*

Anthoceros frondibus indivisis sinuatis laevibus.
Linn. sp. pl. 1606. Hall. hist. n. 1893.

Anthoceros major. *Mich. gen. n. t. 7. f. 1.*

Anthoceros foliis majoribus minus laciniatis. *Dill.*
musc. 476. t. 68. f. 2.

Lichen hepaticus, pediculis gramineis. *Buxb. cent.*
1. p. 40. t. 61. f. 1.

Icon *Oed. fl. Dan. t. 396.*

In agris arenosis humidis ubique circa urbem; in
prato *Schænfeldico*, frequens. Floret vere, tum Au-
gusto, Septembri, Octobri.

1090. ANTHOCEROS (*punctatus*) fronde
crispa sinuato-laciniata.

Anthoceros frondibus indivisis sinuatis punctatis.

Linn. sp. pl. 1606.

Anthoceros minor etc. Mich. gen. u. t. 7. f. 2.

Anthoceros foliis minoribus magis laciniatis. Dill. musc. 476. t. 68. f. 1.

Cum præcedente, et ad latera fossarum *im Oberbolze.*

1091. **RICCIA** (*glauca*) *frondibus glabris canaliculatis bilobis obtusis.* *Linn. sp. pl. 1605.*

Riccia fronde sulco divisa, lobis bifurcatis, lobulis lanceolatis obtusis. *Hall. hist. n. 1897.*

Riccia minima pinguis, foliis latiusculis ample sulcatis e glauco virescentibus. *Mich. gen. 107. t. 54. f. 4.*

Hepatica palustris bifurca, lobis brevioribus carinatis. *Vaill. Paris. 98. t. 19. f. 1.*

Lichen minimus, foliis venosis bifariam vel trifariam se dividendo progredientibus. *Moris. hist. 3. p. 623. n. 5. Dill. hist. musc. 533. t. 78. f. 10.*

Lichen terrestris minor, foliis rutæ. *Buxb. cent. 2. p. 10. t. 5. f. 5.*

In agris fere ubique, in primis *nach Gomewiz, Burghausen, Schænfeld hin*, cum Anthocerote utroque; *auf dem Gickerlingsberge inter muscos.*

853. **MARCHANTIA** (*conica*) *calyce communni quinqueloculari subovato.* *Linn. sp. pl. 1604.*

Marchantia verrucis asperis, capitulis conicis. *Hall. hist. n. 1889.*

112 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Lichen vulgaris major pileatus et verrucosus. *Dill.*
musc. 516. t. 75. f. 1.

Hepatica reticulata et verrucosa. *Vaill. Paris. 97.*
t. 33. f. 8. f. fl. fem.

Ad ripas paullo elatiores rivuli prata *Schænfeldica*
irrigantis observatus a sagacissimo plantarum scrutatore
D. D. HEDWIGIO, nunc Practico Chemnitensi.

IV. F V N G I.

1092. ELVELA (*purpurea*) subglobosa sessilis
solitaria glabra. *Linn. sp. pl. 1626. sub*
TREMELLA.

Sphæria convexa miniata hirsuta. *Hall. hist. n. 2189.*

Lichenoides tuberculosum amœne purpureum. *Dill.*
musc. 127. t. 18. f. 6.

In ramis demortuis Oxyacanthæ, *im Apelischen Gar-*
ten, rarius.

Fungis, monente **DILLENIO**, proprius quam Li-
chenibus accedit, et a perill. **HALLERO** ad fungos re-
fertur. Ob notabilem quam cum speciebus quibus-
dam Elvelæ *Gled.* habere videtur adfinitatem, huic ge-
neri adsociare non dubitavimus.

1093. ELVELA (*Ceratospermum*) scutellata ova-
ta subcutanea.

Ceratospermum nigrum minimum discoides, e di-
versarum arborum ramorum emortuorum cor-
ticibus et præcipue corylo erumpens. *Mich.*
gen. 125. t. 56. f. 1. Hall. hist. n. 2212.

In corticibus ramorum populi tremulæ ad *Breiten-*
feld.

Patellæ ovatæ planiusculæ læves, margine parum elevato, fusco-nigricantes, disco semifinero; libro insidentes ex epidermide rupta efflorescentes. Nostra specimina iconi Michelianæ simillimæ sunt.

1094. LYCOPERDON (*pedunculatum*) stipite longo, capitulo globoso glabro: ore cylindraceo integerrimo. *Linn. sp. pl. 1654.*

Lycoperdon petiolo gracili, capite sphærico lævi papillato perforato. *Hall. hist. n. 2170.*

Lycoperdon parisense minimum pediculo donatum. *Tourn. inst. 563. t. 331. f. E. F.*

In muris argillaceis, *vor dem Schænfeldischen Schlage.*

Hujus speciei seminâ, microscopio plurimum augeante lustrata, caudata deprehenduntur, ut vulgaris.

1095. LYCOPERDON (*multifidum*) volva multifida patente evanida: radiis ovato-lanceolatis.

Geaster *Mich. gen. t. 100. f. 2. 3. quoad figuram.*

Fungus pulverulentus --- inferne stellatus. *Raj. Angl. 3. p. 27. cum volvam teneriore dicat; t. 1. f. 1. major nostris speciminibus.*

Icon *Tourn. inst. t. 331. f. G. H. Oed. Dan. t. 360.*

In muris argillaceis *Schænfeldicis* inter muscos, autumno et hyeme.

Volva simul cum capitulo perit; communiter instruitur radiis 7 - 10, nonnumquam incisis, ut in *f. 5. Michelii.* Moleculæ pollinis pariter caudatæ sunt. Distinguendum est ab altera specie majore, volva crassiore, duriore, perenni, in pauciores latioresque lacinias divisa: *Mich. l. c. f. 4. 5.*

114 CLASSIS XVIII. PLANTAE

1096. LYCOPERDON (*Brassicæ*) subterraneum rugosum congestum. *Hall. hist. n. 2178.*

Tremella sphærica sessilis gregaria nigra. *Gleditsch. Abb. 2. p. 346.*

Icon *Gleichen. Reich. d. Pfl. t. 6.*

In foliis Brassicæ accumulatis aut defossis, putridis. Ad Elvelas *GLED.* potius referenda esse videtur.

1097. CLAVARIA (*digitata*) ramosa lignea nigra. *Linn. sp. pl. 1652.*

Sphæria nigerrima aspera petiolata conica. *Hall. hist. n. 2193.*

Lichenagaricus nigricans cupressiformis ramosus et non ramosus, lignis aridis adnascens. *Mich. gen. 104. t. 55. f. 2. it. t. 54. f. 4.*

Ad asperes putrescentes, *im Zwinger*, copiose inventit Clar. KNOLLE, Septembri.

1098. CLAVARIA (*hypoxylon*) ramoso - cornuta compressa. *Linn. sp. pl. 1052.*

Fungus ramosus niger compressus parvus: apicibus albidis. *Raj. syn. 3. p. 15.*

In lignis putridis passim; in horto Illustr. LUDWIGI, auch *im Zwinger* invenit IDEM.

V. PLANTAE DVBLIAE.

1099. LENTICVLA (*polyrrhiza*) foliis sessilibus, radicibus confertis. *Linn. sp. pl. 1377.*

Hydrophace polyrrhiza, foliis ovatis planis. *Hall. hist. n. 1899.*

Lenti-

Lenticularia major polyrrhiza inferne atropurpurea.

Mich. gen. 16. t. II. f. 1.

Lenticula palustris major. *Raj. Angl. 3. p. 129. t. 4.*
f. 2.

Icon Ræf. inf. 3. t. 73. 74. f. 12. t. 94.

In aquis stagnantibus passim.

CRVSTACEAE ET FILAMEN- TOSAE HALL.

1100. LICHEN (*jubatus*) filamentosus pendulus, axillis compressis. *Linn. Sp. pl. 1622.*
n. 74.

Lichen barbatus pendulus, filamentis nigris prolixis. *Hall. hist. n. 1968.*

Vsnea jubata nigricans. *Dill. musc. 64. t. 12. f. 1.*
Im Oberholze ad arborum truncos.

1101. LICHEN (*chalybeiformis*) filamentosus, ramosus, divaricatus, decumbens, implicato flexuosus. *Linn. Sp. pl. 1623. n. 77.*

Lichen fruticosus diffusus, caulis vagis flexuosis rigidis teretibus. *Hall. hist. n. 1969.*

Vsnea rigida horsum vrosum extensa. *Dill. musc. 66. t. 13. f. 10.*

Lichen capillaceus, setæ equinæ instar rigidus, e fusco virens. *Buxb. Hall. 190.*

Ad quercuum truncos *im Bieniz*; in sepimentis ligneis semiputridis, *bey Parneck*.

Maxime affinis praecedenti, sed minus pendulus, brevior, ramis magis intricatis: primariis crassioribus.

116 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Vterque intus cavus est, quo a sequenti ad finibusque differunt, et ad Coralloidem proprius accedunt.

1102. LICHEN (*hirtus*) filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis.
Linn. sp. pl. 1623. n. 78.

Lichen barbatus caulinis teretibus, ramis simplicibus parallelis. *Hall. hist. n. 1973.*

Usnea vulgatissima tenuior et brevior sine orbiculis. *Dill. musc. 67. t. 13. f. 12.*

Muscus ramosus. *Tab. ic. 807.*

In arboribus, dumetis, sepibus ubique frequens.

1103. LICHEN (*floridus*) filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. *Linn. sp. pl. 1624. n. 81.*

Lichen barbatus ramis teretibus, surculis parallelis simplicibus, scutellis radiatis. *Hall. hist. n. 1972.*

Usnea vulgatissima tenuior et brevior cum orbiculis. *Dill. musc. 69. t. 13. f. 13.*

Ad arbores *im Bieniz*, repertus a Clar. HEDWIGIO et KNOLLO.

1104. LICHEN (*barbatus*) filamentosus pendulus subarticulatus, ramis patentibus. *Linn. sp. pl. 1622. n. 73.*

Lichen barbatus, trunco articulo lavi. *Hall. hist. n. 1970.*

Usnea barbata, loris tenuibus fibrosis. *Dill. musc. 63. t. 12. f. 6.*

Im Oberholze. Cl. KNOLLE.

1105. LICHEN (*rängiferinus sylvaticus*) fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus : quibusdam capitatis. *Linn.*
Sp. pl. 1620. n. 66. var. β.

Lichen caule fruticoso folioso, ramis subnutantibus minute multifidis fungiferis. *Hall. hist. n. 1956.*

Coralloides fruticuli specie candicans, corniculis rufescentibus. *Dill. musc. no. t. 16. f. 30.*

Im Oberbolze, ad terram, in stipitibus arborum detruncatis putridis.

1106. LICHEN (*furcatus*) fruticulosus tubulosus ramosus, ramis erectis furcatis. *Huds.*
Angl. 458.

Lichen caule fruticoso subfolioso, ramis adscendentibus repetito-bifurcatis punctiferis. *Hall. hist. n. 1954.*

Coralloides corniculis brevioribus et crebrioribus.
Dill. musc. 104. t. 16. f. 27.

Coralloides cornua cervi referens, corniculis brevissimis. *Barr. obf. 1307. ic. 1277. f. 2.*

Musco-fungus montanus corniculatus. *Moris. hist. 3. p. 632. f. 15. t. 7. l. 2. f. 1. Vaill. Paris. 42. n. 3. t. 26. f. 7.*

In sterilibus fabulosis in und am Bieniz, confertim provenit.

1107. LICHEN (*subulatus*) fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis.
Linn. Sp. pl. 1621. n. 68.

Lichen caule fruticoso erecto, ramis adscendentibus dichotomis. *Hall. hist. n. 1955.*

118 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Coralloides corniculis longioribus et rarioribus.

Dill. musc. 102. t. 16. f. 26.

Coralloides cornua cervi referens, corniculis longioribus. *Tourn. inst. 565. Vaill. Par. 42.*

Muscus corniculatus. *Tab. ic. 809. Bauh. hist. 3. p. 707.*

In sylvaticis, apricisque sterilibus, **im Bieniz, Oberholze**, aliis muscis immixtus.

1108. LICHEN (*uncialis*) fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis acutis. *Linn. sp. pl. 1621. n. 67.*

Lichen fruticosus lævis perforatus spinosus, ramulis punctiferis. *Hall. hist. n. 1959.*

Coralloides perforatum minus molle et tenue. *Dill. musc. 99. t. 16. f. 22.*

Im Oberholze passim.

Caules aliquoties dichotomi cum ramulo brevissimo ad dichotomiam, et foramine axillari: summitatibus ramorum in dentes seu ramulos tres patulis desinentibus, intra quos pariter foramen est.

1109. LICHEN (*pyxidatus*) scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Linn. sp. pl. 619. n. 60.*

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. *Dill. musc. 79. t. 14. f. 6.*

Var. 1. Simplex, tuberculis nullis. *Dill. A. B.*

Lichen scypho infundibuliformi simplici. *Hall. hist. n. 1912.*

- Lichen pyxidatus major. *Tourn. inst. 549. t. 325. f.*
D. Vaill. Paris. 115. t. 21. f. 8. Mich. gen. 82. t.
41. f. 1. K.
2. Idem senescens.
- Fungus terrestris pyxidatus. *Magnol. hort. Monsp.*
p. 83. c. f.
- Icon. *Vaill. Paris. t. 21. f. 7.*
3. Simplex tuberculis sessilibus. *Dill. C. a. b.*
- Lichen pyxidatus major, acetabulo fimbriato et tu-
 berculo. *Vaill. Paris. t. 21. f. 11.*
4. Simplex, tuberculis stipitatis. *Dill. C. c. c.*
- Lichen pyxidatus — receptaculis florum copio-
 sioribus et rufescentibus. *Mich. gen. 28. t. 41. f.*
2. ibid. f. 1. L.
5. E disco prolifer, scyphulis solitariis aggregatis-
 que, tuberculis nullis. *Dill. D. E. F. G.*
- Lichen infundibuluis glabris proliferis. *Hall. hist. n.*
1923.
- Lichen pyxidatus prolifer. *Vaill. Paris. 115. t. 21.*
f. 5.
6. E disco prolifer, scyphulis solitariis aggregatis-
 que tuberculatis. *Dill. H.*
7. E margine prolifer, tuberculis nullis. *Dill. I.*
- Lichen pyxidatus verticillatus prolifer. *Vaill. Par.*
115. t. 21. f. 9.
- Lichen pyxidatus, acetabulorum oris proliferis, re-
 ceptaculis florum rufescentibus. *Mich. gen. 82. t.*
41. f. 7. 8. nam in iconibus receptacula florum seu
tubacula desunt.
8. E margine prolifer tuberculatus. *Dill. K. L. M.*

120 CLASSIS XVIII. PLANTAE

*Im Bieniz, Oberholze, im Apelischen Garten, et alibi
passim; varietates nonnullæ in muris argillaceis pa-
gorum.*

III. LICHEN (*cocciferus*) scyphifer sim-
plex integerrimus, stipite cylindraceo,
tuberculis coccineis. *Linn. sp. pl. 1618.*
n. 58.

*Lichen scyphifer, infundibulorum fungis coccineis.
Hall. hist. n. 1918.*

*Coralloides scyphiforme, tuberculis coccineis. Dill.
musc. 82. t. 14. fig. 7.*

*Var. 1. Simplex, tuberculis sessilibus aut stipitatis.
Dill. A. F. H. I.*

*Lichen pyxidatus, acetabulorum oris coccineis et
tumentibus. T. Vaill. Par. 15. t. 21. f. 4. Mich.
gen. 82. t. 41. f. 3.*

*Muscus pyxidatus, labellis saturate croceis. Bocc.
muf. 2. p. 142. t. 104.*

2. Simplex, tuberculis totum discum replentibus.

*Lichen squamosus, acetabulis dense aggestis. Vaill.
Par. t. 21. f. 10.*

3. E margine prolifer, tuberculatus. Dill. K. L.

Lichen tubulatus etc. Mich. gen. p. 83. t. 42. f. IX.

4. E centro prolifer. Dill. M.

*In sterilibus fabulosis, ad arborum stipites putre-
scentes etc. am Bieniz, im Oberholze; im Apelischen
Garten an der Lindenallée.*

IV. LICHEN (*fimbriatus*) scyphifer simplex
denticulatus, stipite cylindraceo. *Linn. sp.
pl. 1619. n. 61.*

Var.

Var. 1. Simplex.

Lichen scyphiger, infundibulis ferratis. *Hall. hist.*
n. 1915 - 16.

Coralloides scyphiforme gracile, marginibus ferratis.
Dill. musc. 84. t. 14. f. 8. A. B.

Lichen pyxidatus minor. *T. Vaill. Paris. 15. t. 21.*
f. 6. (an Mich. gen. p. 83. t. 41. f. 4? 5?)

2. Margine prolifer. *Dill. C.*

Lichen infundibulis ferratis proliferis. *Hall. hist.*
n. 1924. 1925.

In terra humida, ad arborum radices, *im Rosenthale,*
Bieniz, Linkelschen Holze, im Apelischen Garten.

III2. LICHEN (*gracilis*) scyphifer ramosus den-
ticulatus filiformis. *Linn. sp. pl. 1619. n. 62.*

Lichen infundibulis proliferis et corniculatis erectis.
Hall. hist. n. 1946.

Coralloides scyphiforme ferratum elatius, caulis
gracilibus glabris. *Dill. musc. 88. t. 14. f. 13.*

Im Oberholze.

III3. LICHEN (*cornutus*) scyphifer simplex cla-
vatus, scyphis obscuris integris. *Linn. sp.*
pl. 1620. n. 64.

Lichen cornubus acutis farinosis subramosis. *Hall.*
hist. 1903.

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *Dill.*
musc. 90. t. 25. f. 14.

In stipitibus putredine consumtis, *im Apelischen*
Garten, Rosenthale, Bieniz, Oberholze.

III4. LICHEN (*radiatus*) scyphifer subramosus, cylindraceus, elongatus, scyphis inæqualiter dentatis radiatisque.

Coralloides scyphiforme cornutum. *Dill. musc.* 92 *t. 15. f. 16.*

Lichen pyxidatus et corniculatus etc. *Mich. gen. 81 ord. 7. t. 41. f. 3. 4.*

In nemorosis; *im Apelischen Garten.*

Stipes prælongus, ut plurimum e latere ramum simplicem subulatum emittens, desinens in scyphulum minus amplum, margine tenuissime denticulatum, dentatum dentibus elongatis plerumque inæqualibus, radiatum, radiis longis, aut proliferum. Tubercula rufofusca, apud nos rariora minoraque, in speciminiibus quibusdam, e Grœnlandia delatis, permagna, ut totos scyphulos impleant, eadem ratione ac in Coralloide 15 Dillenii. — Ad altiores species scyphiferas pertinet, sed cum prolifer fit, basi decumbere solet.

III5. LICHEN (*foliaceus*) foliis adscendentibus multifido-laciñati subtus niveis scyphiferis: scyphulis conicis brevissimis. *Huds. Angl. 457. n. 62.*

Coralloides scyphiforme, foliis alcicorniformibus cartilagineis. *Dill. musc.* 87. *t. 14. f. 12. A.*

Lichen pyxidatus endiviae crispæ folio prolifer (superne flavescens inferne albidus) acetabulorum oris crispis. *T. Mich. gen. 82. t. 42. f. 1. 2.*

Muscus digitatus. *Barr. ic. 1278. f. 4. sine scyphis.*

Muscofungus terrestris minor crispus, foliis superne e flavo virentibus subtus albicantibus. *Moris. bist. 3. p. 632. f. 15. t. 7. l. 2. f. 3. f. scyphis.*

In elatioribus sterilibus *im Bieniz, im Oberholze; im Rosenthal.* Cl. KNOLLE.

VAILLANTII icon, sub nomine Tournefortiano t. 21. f. 3. exhibita, nostris speciminibus parum similis est.

III6. LICHEN (*horizontalis*) coriaceus repens planus subtus avenius, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. mantiff. 132. n. 88.*
(Huds. Angl. 453. n. 48.)

Lichen fronde rotunde lobata, peltis planissimis.
Hall. hist. n. 1991.

Lichen pulmonarius maximus superne e cinereo rufescens etc. *Mich. gen. 85. t. 44. f. 1. 6.*

In nemoribus, *im Bieniz etc.*

863. LICHEN (*caperatus*) foliaceus repens pallide viridis rugosus margine undulatus. *Linn. sp. pl. 1614. syst. nat. 711. n. 41.*

Lichen fronde rotunde lobata rugosa inferne atra et aspera. *Hall. hist. n. 2005.*

Lichen pulmonarius -- major inferne nigricans superne e sulphureo cinereus -- *Mich. gen. 89. t. 48. f. 1.*

Lichenoides caperatum rosacee expansum. *Dill. musc. 193. t. 25. f. 97.*

Ad arbores quascumque; non nisi rarissime scutella profert, qua *in dem Bieniz* aliquando inveni. Color sulphureus parum virescens; scutella spadicea.

862. LICHEN (*fraxineus*) foliaceus rectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacuniferus

24 CLASSIS XVIII. PLANTAE

fus glaber, scutellis subpedunculatis. *Linn.*
syst. nat. 711. n. 37.

Lichen utrinque lacunofus, fronde latissima scutellis uberrimis. *Hall. hist. n. 1995.*

Lichen pulmonarius -- in amplas lacinias divisus.
Tourn. inst. 549. t. 325. f. A. B. Mich. gen. 74.
t. 36. f. 1.

Muscofungus quernus latifolius cinereus etc. *Morif.*
hist. 3. p. 634. f. 15. t. 7. l. 3. f. 14. l. 5. f. 3. 4.

Lichenoides longifolium rugosum rigidum. *Dill.*
musc. 165. t. 22. f. 59.

In salicibus frequens.

III7. **LICHEN** (*calicaris*) foliaceus erectus linearis ramosus lacunofus convexus mucronatus. *Linn. syst. nat. 711. n. 36.*

Lichen utrinque lacunatus farinosus et scutellifer.
Hall. hist. n. 1983.

Lichen cinereus latifolius ramosus. *Vaill. Paris. 115.*
t. 20. f. 6.

Lichenoides coralliforme rostratum et canaliculatum. *Dill. musc. 170. t. 23. f. 62. A. B.*

Muscus alter quernus latifolius coralloides αὐλαῖος. *Col. ecphr. 1. p. 334. f. 335. bon.*

Muscofungus arboreus capitulis rostratis. *Morif.*
hist. 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 5.

Arborum truncis adhæret, *im Bieniz*, inventus a
DD. HEDWIGO.

Ad præparationem pulveris cyprii præstantioris præ aliis Lichenis speciebus aptus est. Præparationis modum, olim apud Monspelienses usitatum, docet I. BAVHINVS *Hist. I. Part. II. p. 88.*

118. LICHEN (*farinaceus*) foliaceus compres-
sus erectus ramosus : verrucis marginali-
bus farinosis. *Linn. Syst. nat. III. n. 35.*

Lichen lacunosus complanatus, ramis acutissimis,
orbiculis farinosis marginalibus frequentissimis.
Hall. hist. n. 1981.

Lichen cinereus angustior, scutis in margine seg-
mentorum. *Vaill. Par. 15. t. 20. f. 13. 14. 15.*

Lichenoides segmentis argutioribus ad margines
cinereis et pulverulentis. *Dill. musc. 172. t. 23.*
f. 63.

Ad salices, aliasque arbores, copiose.

Scutella in hoc Lichene DILLENIUS numquam
vidit, quam ob rem, et propter maximam hujus
cum præcedente similitudinem, utrumque non nisi
sexu differre suspicatur. Mihi in quercubus *in Bien-*
niz aliquoties obvenerunt specimina Lichenis, ad fa-
rinacei varietatem E DILL. referenda, aliaque inter
hanc et variet. D intermedia, et verrucas farinosas in
margine, et scutella versus extremitates proferentia,
concava, margine fere ochroleuca, collo brevi insi-
denta, sicut scutella Lichenis calicaris, et Lichenoidis
55 B. G. apud DILLENIUM; a cuius varietatibus
exemplaria nostra consistentia rigidiore, utraqne pa-
gina concolore, et glomerulis farinaceis mere margi-
nalibus satis differunt, ut habitum taceam, et superfi-
ciem microscopio examinatam, quæ omnino Lichenis
farinacei est.

119. LICHEN (*aculeatus*) foliaceus diffusus,
compressus ramosissimus; ramulis furcatis
spinulosis.

126 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Lichen fruticosus durus castaneus, surculis spinosis.

Hall. hist. n. 1965.

Coralloides fruticuli specie fuscum spinosum. Dill.
musc. 112. t. 17. f. 31.

Lichen coralloides aculeatus nigricans. Buxb. cent.
2. p. 10. t. 5. f. 3. 4.

Lichen terrestris angustior ramosissimus fuscus.
Vaill. Par. 115. t. 26. f. 8.

Inter Lichenes fruticulosos passim, ut *am Bieniz auf der Anbaehe*.

Color fuscus. Cauliculi compressi, e ramulis et ad
margines spinulas tenuissimas innocuas proferentes.

868. LICHEN (*ciliaris*) foliaceus erectiuscu-
lus: laciniis linearibus ciliatis, (viridibus
acutis) scutellis pedunculatis crenatis. Linn.
syst. nat. 710. n. 28.

Lichen corniculatus planus, ramulis capillaribus,
scutellis petiolatis. Hall. hist. n. 1980.

Lichenoides hispidum majus et rigidius, scutellis ni-
gris. Dill. musc. 150. t. 20. f. 45.

Muscofungus arboreus cinereus scutellatus, margi-
nibus pilosis. Moris. hist. 3. p. 634. f. 15. t. 7. l. 4.
f. 6.

Muscus alter πλανυπυκνοδασύφυλλος. Col. ecphr.
1. p. 334. f. 335.

Muscus arboreus pyxioides pilosus. Læs. Pruss. 171.
t. 50.

In arboribus ubique. Siccatus cinerascit.

1120. LICHEN (*hispidus*) foliaceus laciniatus
albus : laciniis adscendentibus obtusis
pilosis,

pilosis, scutellis sessilibus. *Scop. carn.* I.
p. 110.

Lichen fronde semipinnata canaliculata cinerea.
Hall. hist. n. 2019.

Lichenoides hispidum minus et tenerius, scutellis
nigris. *Dill. musc. 152. t. 20. f. 46.*

Lichen cinereus arboreus, marginibus pilosis, minor.
Vaill. Paris. 15. t. 20. f. 5.

Lichen pulmonarius exiguus etc. *Mich. gen. 93. t.*
50. o. 27. 28.

In truncis arborum variarum frequentissime.

Præcedente longe minor, siccus pariter ac humidus
albus est. Scutella margine vix crenata.

1121. LICHEN (*crispus*) gelatinosus, foliis im-
bricatis lobatis truncatis crenatis atro vi-
ridibus, scutellis crenulatis. *Linn. syst. nat.*
710. *Huds. Engl. 447. n. 26.*

Lichenoides gelatinosum atrovirens *crispum* et ru-
gosum. *Dill. 139. t. 19. f. 23.*

In muris argillaceis pagorum v. g. *Burghausen; im*
Apelischen Garten an den Linden auf der Erde.

Scutella recentia atro - viridia, limbo crenato con-
colore, sicca e rufo fusca, margine atro; magna, con-
fertim provenientia. Crediderim figuram 26. C. DIL-
LENII ad hanc speciem potius pertinere.

865. LICHEN (*stellaris*) imbricatus : foliolis
oblongis laciniatis angustis cinereis, scu-
tellis pullis. *Linn. syst. nat. 710. n. 27.*

Var. orbicularis, foliolis angustioribus, minus laxis,
etiam ad margines radicatis.

128 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Icon Mich. gen. t. 51. o. XXIX. f. 1. a Dill. musc. t.
20. f. 47. repetita, procul dubio hoc spectat, quam-
vis foliolis justo multoties latioribus sit, siquidem
icon t. 43. f. 2. ad L. stellarem vulgarem pertinet.
Auf alten Schindeldächern; auf Steinen.

1122. LICHEN (*granosus*) imbricatus: foliolis
oblongis lobatis, incisis, cinereis, lævibus,
scutellis nigris margine crenulato.

Lichen pulmonarius saxatilis etc. Mich. gen. 94. t.
51. f. 3. 5.

In tectis ligneis putridis, salicibus.

Orbiculatus, cinereus, continuus, rugosus, segmen-
tis in ambitu imbricatis, oblongis, varie flexuosis, divisis,
sinuatis crenatisque. Scutella in disco plurima, con-
ferta, saepiusque granulis minimis, punctatis, scutello-
rum rudimentis, distincta, margine crenato s. granoso,
disco fusconigricante, ab initio pellicula cinerea tecto,
qua abscedente omnino nigricant. Sequenti quo-
dammodo similis, sed colore, aliisque attributis satis
diversus est.

1123. LICHEN (*pulverulentus*) imbricatus; fo-
liolis lobatis crenatis obtusis viridibus,
polline conspersis, scutellis nigris margine
crenatis.

Lichen fronde semipinnata rotunde lobata cinerea,
scutellis nigris. Hall. hist. n. 2016.

Lichen (*orbicularis*) imbricatus foliolis oblongis ob-
tuse multifidis, scutellis subfuscis. Neck. gallob. 509.

Lichenoides glaucum orbiculare, segmentis latiuscu-
lis, scutellis nigris. Dill. musc. 176. t. 24. f. 71.

Lichen pulmonarius crassus etc. Mich. gen. 91. t. 43.
f. 1. 3.

In salicibus, aliisque arboribus, vulgaris.

Recens eleganter et saturate viridis, polline albido, præsertim in ambitu, perspersus; siccus primum cinereus, successu temporis luridus, subtus incanus, radiculis nigricantibus arcte adfixus. Laciniæ latiores quam præcedentis, profundius crenatæ, obtusiores. Scutella in medio copiose congesta, granulisque innumeris permixta sunt, juniora cancerorum calculis similia, nigra, sed farina cinerea obducta, margine crasso, folio concolorre, æquali; adultiora sæpius angulata aut compressa, nigra, margine tenuiore crenato crispato; utrorumque margo sæpius in foliola excrescit. Plantæ scutellis destitutæ e dorso rugarum pulverem viridi flavescentem proferunt. -- *Lichenoides viride, segmentis angustis distortis, scutellis pullis* Dill. l. c. p. 178. f. 72. vix nisi extate et magnitudine differt.

1124. LICHEN (*physodes*) imbricatus multifidus: laciniis obtusis subinflatis. *Linn. syst. nat. 710. n. 26.*

Lichen fronde profunde laciniata cava, cornibus pulverulentis. *Hall. hist. n. 2018.*

Lichenoides ceratophyllum obtusius et minus ramosum. *Dill. musc. 154. t. 20. f. 49.*

Lichen pulmonarius - desuper cinereus subtus anthocinus: segmentis teretibus tubulosis -- *Mich. gen. 92. t. 50. f. 1 - 2.*

In corticibus arborum frequens, rarissime florens.

1125. LICHEN (*centrifugus*) imbricatus, foliolis obsolete multifidis lævibus flavescentibus centrifugis, scutellis rufo-fuscis. *Linn. syst. nat. 720. n. 18.*

330 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Lichen fronde semipinnata rotunde lobata crasse villosa, scutellis peramplis. *Hall. hist. n. 2015.*

Lichenoides imbricatum viridans, scutellis badiis. *Dill. musc. 180. t. 24. f. 75. excluso syn. Buxbaumii.*

In lapidibus, præsertim terminalibus, aliisque majoris molis, zwischen dem Berge und Schænfeld, et alibi; frequenter florens.

Nec cum *L. caperato*, cui quodammodo similis, neque cum proxime sequente confundendus est.

In arborum ramis ad *Breitenfeld* cinereum observavi varietatem, forma et scutellorum colore vulgari simillimam.

1126. LICHEN (*muralis*) imbricatus flavo - virescens, scutellis concoloris demum lutescentibus: margine pallido.

Lichen (*pallecens*) crustaceus albicans scutellis pallidis. *Linn. sp. pl. 1610. (non syn.) nomen L. tartarei huic melius conveniret.*

Lichen pulmonarius saxatilis glauco - virescens, angustioribus segmentis, receptaculis florum griseis. *Mich. gen. 94. t. 51. f. 4. Segu. Veron. 1. p. 63. n. 22. 3. p. 49. n. 22. descr.*

Lichen fronde laciniata appressa cervina concolore. *Hall. hist. n. 2024. præter syn. Dill.*

In lapidibus, præsertim cotaceis, asperibus, trabibusque putridis etc. ubique.

Medius est inter imbricatos et crustaceos, illis ramen propior; orbiculatus flavo virescens, ambitu in laciniis numerosas, imbricatas, angustas, apice dilatas, crenatas, obtusas, divisus; medio proferens scutella ab initio parva orbiculata, concava, pariter virescentia, margine pallidiore cincta, postea a mortua pressione angulosa, planiora, in foliola sœpe ex crescētia, demum,

mum, margine oblitterato, plana aut convexa, tubercula mentientia, subinde confluentia. Planta emortua siccata ad colorem ochroleucum inclinat, scutella lutescunt, fuscescunt. Est etiam varietas e meris fere scutellis constans absque crusta, aliaque magis foliacea, iconi *Mich. gen. t. 43. f. 4.* quodammodo similis. — Saxis lignisve arctissime adnascitur, et vix nisi frustillatim abradi se patitur; in quo, ut et colore et consistentia friabiliore, et colore inferioris paginæ cinereo, quantum videre possum, a L. centrifugo differt.

Quomodo planta adeo vulgaris oculatissimi DILLENTI oculis se subtrahere potuerit, non perspicio. Sub Lichenoidis crustosi orbicularis incani nomine longe aliam plantam eum intellexisse mihi persuasissimum est; nec in tota ejus descriptione ullam video notam characteristicam nostræ plantæ convenientem; contrario illam, cum orbiculatum nascitur, scutella proferre diserte negat. Michelii nomen et figuram hujus loci esse descriptio Seguieriana confirmat.

1127. LICHEN (*pullus*) imbricatus, foliolis lobatis olivaceis, scutellis integerrimis.

Lichen fronde semipinnata rotunde lobata olivacea, scutellis levibus. *Hall. hist. n. 2013.*

Lichenoides olivaceum scutellis levibus. *Dill. musc. 182. t. 24. f. 77.*

Lichen pulmonarius saxatilis subtus nigricans, desuper olivæ conditæ colore, receptaculis florum concoloribus. *Mich. gen. 89. t. 51. o. 19.*

In lapidibus passim.

1128. LICHEN (*olivaceus*) imbricatus, foliolis lobatis nitidis olivaceis, scutellis crenatis.

Linn. sp. pl. 1610. n. 21.

132 CLASSIS XVIII. PLANTAE

Lichen fronde semipinnata rotunde lobata olivacea
pulla, scutellis crenatis. *Hall. hist. n. 2014.*

Lichen crustæ modo arboribus adnascens olivaceus.
Vaill. Paris. n. 20. t. 20. f. 8.

Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus verru-
cosis. *Dill. musc. 184. t. 24. f. 78.*

In lapidibus, ad arborum truncos.

Adeo ad finis est præcedenti, ut DILLENIUS dubi-
tet, utrum specie differant, an pro varietatibus tantum
habendæ sint. Diversos tamen judicat Perill. HAL-
LERVS. Figuram VAILLANTI reprehendit DILLE-
NIUS; sed nostris speciminibus egregie convenit.

1129. LICHEN (*subfuscus*) crustaceus albicans,
scutellis nigris: junioribus urceolatis ca-
vis. *Linn. syst. nat. 710. n. 16. sp. pl. 1609.*

Lichen crusta tenacē verrucosa cinerea, scutellis ru-
fis marginatis. *Hall. hist. n. 2049.*

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis sub-
fuscis, *Dill. musc. 134. t. 18. f. 16.*

In arborum cortice, tegulis, cippis etc.

Crusta tenuis, nonnumquam granosa. Scutella nunc
pallidius nunc saturatius fusca, margine ab initio lœvi,
tandem (in primis ubi lœtius crescit) crenulato, albido.

1130. LICHEN (*ater*) crustaceus albicans, scu-
tellis rugosis nigris. *Huds. Engl. 445. n. 19.*

Lichen crusta glauca verrucosa tenace. *Hall. hist. n.
2056.*

Lichen (*nigricans*) crustaceus albicans, scutellis atris:
margine cinereo lœvi. *Neck. Gallob. 504. n. 11.*

Lichen-

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis nigricantibus majoribus et minoribus. *Dill. musc.*

133. t. 18. f. 15. t. 55. f. 8.

In arborum cortice.

1131. LICHEN (*candelarius*) crustaceus flavus, scutellis luteis. *Linn. sp. pl. 1608. n. 13.*

Lichen fronde laciniata rotunde lobata flava concoleore. *Hall. hist. n. 2023.*

Lichenoides crustosum, orbiculis et scutellis flavis.

Dill. musc. 136. t. 18. f. 18.

Ad cortices arborum, in lignis putrescentibus, cippis etc.

Frequenter absque notabili crusta occurrit; scutella subinde margine farinaceo cincta sunt.

1132. LICHEN (*pallidus*) crustaceus cinereus, scutellis pallide carneis margine albo.

Ad cortices arborum.

Crusta cinerea, granulosa, inseparabilis, saepius vix notabilis. Scutella plana, colore lacteo ad carneum tendente, tenera, margine exili lacteo circumdata, remota. Anne potius varietas Lichenis 1137?

1133. LICHEN (*scruposus*) crustaceus cinereus granulosus, scutellis immersis atris; margine crenulato.

Lichen verrucosus albus tenax, scutellis nigris e substantia excavatis. *Hall. enum. 82. t. 2. f. 6. hist. n. 2051. t. 47. f. 6.*

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis nigricantibus etc. *Dill. musc. 133. t. 18. f. 15. var. B.*

Lichen crustaceus saxatilis farinaceus verrucosus cinereus, receptaculis florum exiguis concavis et

134 CLASSIS XVIII. PLANTAE

nigricantibus in substantia plantæ veluti infixis.

Mich. gen. 97. n. 22.

In muris argillaceis vor dem Schænfeldischen Schlage.

134. LICHEN (*capitatus*) crustaceus viridis,
foliis furfuraceis, stipite filiformi, capitulo
globoso. *Linn. sp. pl. 1655. sub MVCORE.*

*Lichen crustaceus luteo virescens, tuberculis conco-
loribus stipitatis sphæricis. Scop. Carniol. 1. p. 76.*

*Coralloides fungiforme arboreum etc. e crusta te-
nuissima rugosa luteo - virente nascentis. Dill.
musc. 78. t. 14. f. 3. var. B.*

In rimis corticis quercuum annosarum, im Rosenthale.

135. LICHEN (*sabuletorum*) leprosus virescens,
tuberculis substipitatis planiusculis atris.

*Lichenoides terrestre leprosum, crista cinereo - vi-
rescente, tuberculis nigerrimis. Dill. Giss. 205.*

Ad aggeres fabulosos, in muris argillaceis.

A DILLENIO cum L. sanguinario confunditur;
sequenti autem magis ad fine est. Tubercula stipitibus
brevissimis insident et nisi attente examinentur, sessilia
esse videntur.

136. LICHEN (*ericetorum*) leprosus candidus,
tuberculis carneis. *Linn. sp. pl. 1608.*

*Var. tuberculis stipitatis. Linn. syst. nat. 709. (Dill.
musc. 76. t. 14. f. 1.)*

*Lichen - crista granulosa ex albo subcinerea, rece-
ptaculis florum rotundis carneis pediculo insi-
dentibus. Mich. gen. 100. t. 59. f. 35.*

In pascuis sterilibus siccis limoso fabulosis, ad *Abt-
mauendorf, am Oberholze*, cum *Erica vulgari*. Altera
varie-

varietas, tuberculis fere sessilibus, majoribus, planioribus, in humidis aut palustribus proveniens, circa Lipsiam nondum lecta est.

1136. LICHEN (*orbiculatus*) crustaceus albicans, tuberculis albis farinaceis.

Lichenoides candidum et farinaceum, scutellis fere planis. *Dill. musc. 131. t. 18. f. n.*

Var. 1. Crusta orbiculata, disco plumbeo rugoso granosoque, ambitu pallidiore margine extimo cinereo, tuberculis nullis. *Dill. fig. C.*

Var. 2. Crusta orbiculata, disco albo cinerascente, tuberculis scutellisve subrotundis, tuberculatis, ambitu obscuriore: margine extimo cinereo.

Lichen crustaceus arboribus adnascens farinaceus albus (f. subcinereus) superficie in acetabulis pulverulentis velut efflorescente. *Mich. gen. 99. t. 53. f. 1. 2.*

Var. 3. Idem, scutellis tuberculisque in pollinem album fatiscentibus. *Dill. fig. A. B.*

1. 2. Lichen (*fagineus*) leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. *Linn. sp. pl. 1608. n. 10.*

Var. 4. Idem, orbiculis post pollinis casum calvis, cavis. *Dill. fig. D.*

In arboribus variis; quercu, tilia, hippocastano etc. frequens.

Crusta perfectius quam in reliquorum plurimis orbiculata, (nisi ob arborum cortices rimosos aliasve causas, alia forma succedat) crassiuscula. Pro varietate arborum, quibus innascitur, aliquantulum differt, in primis qui ad fagos proveniens sepius ambitu minus discolor est, receptaculis minoribus magis ad tu-

136 CLASSIS XVIII. PLANTAE

berculorum quam scutellorum formam accedentibus; non tamen specie diversus. — In hoc Lichene, tiliæ adhærente, sæpius cellulas confertas sphaericas cavas, nunc clausas, nunc foramine modico hiantes, vidi, a larvis ignoti generis, in iisdem mutationem formæ subeuntibus fabrefactas.

137. LICHEN (*angulosus*) crustaceus albidus, scutellis confertis albidis in tubercula demum abeuntibus.

Lichenoidis candidi et farinacei etc. varietas, candida quidem sed non farinacea, crusta tenuiore, scutellis minoribus ad incarnatum colorem tendentibus. *Dill. musc. 131.*

Lichen geographicus. *Linn. it. scan. 48?*

Lichen (*carpineus*) leprosus cinereus, tuberculis albidis rugosis? *Linn. sp. pl. 1608. n. n.*

In lapidibus, ad variarum arborum, quercus, tiliæ etc. cortices, frequens.

Crusta tenuissima, alba. Scutella admodum conferta, e mutua pressione sæpius angulata, polline tenuissimo candido undique conspersa, colore disci (per microscopium visi) levissime ad cinereum aut carneum inclinante, margine (in junioribus) subinde crenulato, in adultioribus sensim evanescente, ut, disco elevato, in tubercula abeant. — Adultioris color in cinereum transire solet. Margo niger, si adest, ad Lichenem sanguinarium potius pertinere videtur.

138. LICHEN (*fusco - ater*) leprosus fuscus, tuberculis atris. *Linn. sp. pl. 1607. n. 5.*

Ad lapides, muros, v. g. arcis Pleissenburg.

1139. LICHEN (*fulvus*) leprosus luteo-viridis,
scutellis fulvis. *Zoega.*

Lichen crustaceus --- verrucosus sulphureus, re-
ceptaculis florum fuscis. *Mich. gen. 96. n. 4?*

In salicis annosorum truncis frequens.

Crusta annosa per senium cinerascens. Tubercula
ab initio margine elevatiore pallidiore circumdata, qui-
demum obliteratur.

1140. LICHEN (*sanguinarius*) leprosus cine-
reo-virescens, tuberculis atris. *Linn. sp.*
pl. 1607. n. 4.

Lichenoides leprosum, crista cinereo-virescente,
tuberculis nigerrimis. *Dill. musc. 126. t. 18. f. 3.*

Lichen crustae farinacea virescente, scutellis atris.
Hall. hist. n. 2065.

Arboribus frequenter adnascitur.

Tubercula ab initio vera sunt scutella, margine sub-
tumido nigro, carne fusco-nigra; deinde vero ex-
crescent in tubercula majora convexa margine obso-
leto, carne intrinsecus nucleum ferrugineum, rarius
pulchre sanguineum, continente. Crusta plerumque
linea nigra circumscribitur. Ex observatione Clar.
ZOEGAE.

1141. LICHEN (*rugosus*) leprosus albicans, li-
neolis simplicibus punctisque nigris con-
fertis. *Linn. sp. pl. 1607. n. 3.*

Lichenoides punctatum et rugosum nigrum. *Dill.*
musc. 125. t. 18. f. 2.

*Im Rosenthal, Bieniz, ad arborum, praesertim ve-
getiorum, cortices.*

138 CLASSIS XVIII. PLANTAE

1142. LICHEN (*scriptus*) leprosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus.
Linn. sp. pl. 1606. n. 1.

Lichen bivalvis de rimis efflorescens, ater characteristicus. *Hall. hist. n. 2079.*

Lichenoides crusta tenuissima, peregrinis velut literis inscripta. *Dill. musc. 125. t. 18. f. 1. t. 55. f. 9.*

Corticibus quercum aliarumque arborum adnascitur, *im Rosenthale etc.*

1143. LICHEN (*geographicus*) leprosus flavescentia, lineolis nigris mappam referens.
Linn. sp. pl. 1607. n. 2.

Lichen crusta inseparabili flava, scutellis nigris confluentibus. *Hall. hist. n. 2063.*

Lichenoides nigro flavum, tabulae geographicæ instar pictum. *Dill. musc. 126. t. 18. f. 5.*

Lichen crustaceus tenuissimus flavo et nigro colore eleganter variegatus. *Buxb. Hal. 187.*

In lapidibus passim: *bey Schœnfeld nach dem Berge bin.*

1144. LICHEN (*antiquitatis*) pulverulentus ater. *Linn. sp. pl. 1638. n. 6. sub BYSSO.*

Lichen crustaceus faxatilis omnium minimus niger.
Hall. hist. n. 2081.

Reaum. act. Paris. 1729. p. 596. t. 602.

Ad lapides aliquamdiu aeri expositis, in ipso marmore candidissimo. Anne ad Lich. 1138. pertinet?

1145. LICHEN (*flavus*) pulverulentus flavus.

Byssus (*candalaris*) pulverulenta flava lignis adnascens. *Dill. musc. 3. t. 1. f. 4. Linn. sp. pl. 1639.*

Lichen crusta tenuissima flava. *Hall. hist. n. 2096.*

Ad cortices arborum, in asperibus putrescentibus etc. Anne idem cum Lichene 1131?

1146. LICHEN (*croceus*) pulverulentus croceus.

Ad quercus annosas im Rosenthal.

1147. LICHEN (*incanus*) pulverulentus albus, glebulis rotundatis.

Byssus (*incana*) pulverulenta incana, farinæ instar strata. *Dill. musc. 3. t. 1. f. 3. Linn. sp. pl. 1639.*

Ad latera fossarum, nach dem Bienitz bin, etiam circa das Oberholz, et alibi. Anne ad 866. referendus?

1148. LICHEN (*lacteus*) pulverulento-crustaceus albissimus. *Linn. sp. pl. 1639. n. 12. sub BYSSO.*

Byssus candidissima, calcis instar muscos vestiens. *Dill. musc. 2. t. 1. f. 2.*

In muscis, corticibus arborum.

Particulæ farinaceæ, passim in crustulas degenerantes, difformes.

1149. LICHEN (*viridis*) pulverulentus viridis.

Ad quercus corticem; forte prima stamina Lichenis alicuius.

140 CLASSIS XVIII. PLANTAE

1150. LICHEN (*roseus*) pulverulentus conglomeratus roseus.

Cortici tiliarum annosarum adnascitur, in horto *Apeliano* frequens.

Glebulæ parvæ, rotundæ aut irregulares, pulcherimæ, figura et colore floris cobalti, (qualis quarzo inspersus in fodinis subinde occurrit) pulverulentæ: moleculis ejusdem formæ ac pulveris sæpe e lichenibus efflorescentis.

Lichenes hos pulverulentos, a DILLENTIO aliisque ad Byssi genus relatos, præeuntibus MICHELIO, et nuper Perill. à HALLER, genti suæ restituo; siquidem moleculæ earum textura sua cum reliquis Lichenibus ita conveniunt, ut scutellorum absentia ad separationem minime sufficere videatur; præsertim, cum et eorum aliqui in veros Lichenes demum adolescant, et Lichenum leprosorum ultimi pariter hisce fructificationis organis destituantur. Cavendum esse ne ejusmodi plantulæ pro Byssis veris habeantur, etiam monuit Ill. GLEDITSCHIUS Meth. fung. p. 75.

1151. TREMELLA (*crispa*) terrestris tenera crispa. Dill. musc. 52. t. 10. f. 12.

Ad radices arborum juxta viam cavam versus Gonnelviz.

1152. TREMELLA (*verrucosa*) tuberculosa solidia rugosa, Linn. sp. pl. 1625.

Tremella lobata et rugosa. Hall. hist. n. 2127.

Tremella fluviatilis gelatinosa et uterculosa. Dill. musc. 55. t. 10. f. 16.

Linkia palustris gelatinosa etc. *Mich. gen. 126. t. 67. f. 2.*

In stagno ad *Lindenthal*, plantis aquaticis sub aqua innascens, figura, ut proxime sequentis, varia, etiam granorum magnitudine semenis sinapios.

869. TREMELLA (*Noftoch*) plicata undulata.

Linn. sp. pl. 1625.

Tremella terrestris sinuosa pinguis et fugax. *Dill. musc. 52. t. 10. f. 14.*

Lichen gelatinosus plicatus undulatus: laciniis crispis granulosis. *Hall. biſt. n. 2041.*

An den Alléen um die Stadt herum.

1153. TREMELLA (*botryoides*) pulverulenta viridis. *Linn. sp. pl. 1639. n. 10. sub BYSSO.*

Byffus botryoides saturate virens. *Dill. musc. 3. t. 1. f. 5.*

Lichen crustaceus verrucosus viridis. *Hall. biſt. n. 2089.*

In terra humida agrorum, hortorum cet.

1154. VLVA (*compressa*) tubulosa simplex ramosaque compressa. *Linn. sp. pl. 1632.*

Tremella marina tenuissima et compressa. *Dill. musc. 47. t. 9. f. 8.*

In und an den Gradirhäusern zu Ketschau, aquis salinis innatans.

Filo crassiorem hic numquam inveni.

1155. VLVA (*granulata*) sphærica aggregata. *Linn. fl. Suec. 2. n. 1160. sp. pl. 1633.*

Tremella palustris, vesiculis sphæricis fungiformibus. *Dill. musc. 55. t. 10. f. 17.*

142 CLASSIS XVIII. PLANTAE

In inundatis argillofis: inter *Gautsch* et *Lauer*, in argilla cærulea tenacissima; ad stagna *bey Leutsch*, *Alttranstädt*, *Ketschau*, *Lindenthal*, in argilla alba; frequens.

Plantulæ, ut plurimum aggregatæ, sæpe etiam solitariæ, ab initio minutissimæ, farinam viridem mentientes, cuius moleculæ sphæricæ microscopio tantum distinguendæ sunt, incremento celeri adolescentes in globulos virides, magnitudine seminis viciæ albæ turgidos, sessiles ut videtur, proprie tamen pedunculo insidentes, in limo latitante, aut apice saltim emergente. Ex his globulis, acicula pertusis, aqua effluit gelatinosa, granula innumera minutissima microscopio exhibens, e globulis integris sponte tandem exhalans, et tunicam globuli collapsam sub forma patellæ in limo relinquens, unde brevi nova exsurgit plantula. Ex ejusmodi globulo majore, qui vesperi aqua evaporata subsederat, altero die mane globulum magnitudine capitis aciculæ majoris enatum vidi. — Crusta subviridis amorpha mucilaginosa, quam DILLENIUS huic speciei tribuit, fictitia, et nihil aliud est, quam vel congeries globulorum nondum adultorum, vel reliquæ ruptorum aut senio consumtorum; ubi enim solitaria nascitur, evidenter apparet, e limo, non e crusta quadam, lichenum pyxidatorum more, eam oriri. Reperiuntur etiam plantulæ, quarum figura non sphærica, sed cylindracea, turbinata et vario modo irregularis est.

156. CONFerva (*bullosa*) filamentis æqualibus ramosis, bullas æreas includens. Linn.
sp. pl. 1634.

Conferva pilis tenerimis, vellere gossypiaceo. Hall.
bifl. n. 2120.

Confer-

Conferva palustris bombycina. *Dill. musc. 18. t. 3. f. u.*

Alga bombycina. *Baub. pin. 363.*

Wiesenpelz, Wiesenwatte.

In fossis ubique, viget etiam extra aquas in hume-
tatis; nonnumquam post inundationes integra prata
obducit.

Stupam præbet teneram levemque, inservit etiam
vestibus farciendis. **DILL.**

**1157. CONFERVA (abbreviata) palustris, fila-
mentis brevioribus et crassioribus.** *Dill.
musc. 17. t. 3. f. 20.*

Conferva filamentosa, filamentis crassioribus et bre-
vioribus. *Buxb. Halens. p. 79. 78.*

In fossis pratensis ad *Abtnauendorf*.

**1158. CONFERVA (capillaris) filis geniculatis
simplicibus: articulis alternatim compres-
sis.** *Linn. sp. pl. 1636.*

Conferva filis longis geniculatis simplicibus. *Dill.
musc. 25. t. 5. f. 2. var. B.*

Conferva fluitans, filamentis geniculatis. *Pluk. alm.
113. t. 84. f. 9. Moris. hist. 3. p. 644. f. 15. t. 4. l. 3. f. 3.*

Ad margines *Plisse*, locis umbrosis.

Nostra exæste filiformis, hyalina, isthmis viridibus
intercepta.

**1159. CONFERVA (amphibia) filamentis æqua-
libus ramosis exsiccatione in aculeos co-
untibus.** *Linn. sp. pl. 1634.*

Conferva amphibia fibrillosa et spongiosa. *Dill.
musc. 22. t. 4. f. 17.*

In fossis humentibus ad *Ketschau obnweit der Gra-
dirhäuser*.

144 CLAS. XVIII. PLANT. FLOR. NVD.

1160. BYSSVS (*floccosa*) evanida floccosa nivea.

Dill. musc. 5. t. 1. f. 9. Leyf. Hal. 1045. 1046.

Byssus longissima tenerima nivea. Hall. hist. n. 2108.

Byssus major, cellis vinariis innascens latissima etc.

Mich. gen. 211. t. 90. f. 1.

Byssus fructificationibus sparsis, filamentis productioribus crassis, basi latissima etc. Gled. fung. 22. n. a.

In cellis ad dolia, trabes etc.

1161. BYSSVS (*coriacea*) perennis densissima albicans.

Byssus — tenuissima ac densissima, filtrum et panum laneum textura sua æmulans. Mich. gen. 211. t. 90. f. 6. Dill. musc. 7. t. 1. f. 13. e Michelio desumpta; buc videtur referre debere, quamvis sulphureum dicat; color enim in hisce plantulis aliquantulum variabilis videtur.

Quercum annosarum cortici rimoso saepius adcrescere solet.

Albidus ad ochroleucum inclinans, aut ochroleucus, corio subtiliori tenuique similis, cortici firmiter agglutinatus, e fibris constat capillaribus subtilissimis densissime intertextis, microscopii multum augmentis beneficio tantum discernendis. An varietas praecedentis ab aere libero mutata?

ADDENDA.

AD CLASS. I.

1162. CAMPANVLA (*Speculum veneris*) caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis sub-crenatis, calycibus solitariis corolla longioribus, capsulis prismaticis. *Linn. sp. pl.* 238.

Campanula caule procumbente, fructibus prismaticis, floribus rotatis longissime petiolatis solitariis. *Hall. hist. n. 703.*

Campanula arvensis erecta. *Baub. pin.* 215.

Campanula arvensis minima. *Dod. pempt.* 168.

Inter segetes passim rarius.

AD CLASS. V.

1063. CHAMAEMELVM (*tinctorium*) foliis bipinnatis ferratis subtus tomentosis, caule corymboso. *Linn. sp. pl. n. 1261. sub nomine ANTHEMIDIS.*

Chamæmelum foliis pinnatis hirsutis, pinnulis simplicibus lanceolatis. *Hall. hist. n. 105.*

Chamæmelum chrysanthemum quorumdam. *Baub. hist. 3. p. 122.*

Buphthalmum tanaceti minoris folio. *Baub. pin.* 134.

Buphthalmum vulgare. *Cluf. hist. 1. p. 332. Mattib. comm. 652. Tab. ic. 2. p. 70. Blakw. herb. t. 439.*

Chrysanthemum foliis tanaceti. *Loef. Pruss. 47. t. 9 Ochsenauge, Rindsauge, Goldblume.*

Ad viam cavam prope *Lindenau*, qua itur versus
Plagwiz. Cl. KNOLLE. Flor. Iul. August. perennis.

Folia lanam colore flavo pulchro tingunt.

AD CLASS. VIII.

1164. CHAMAENERION (EPILOBIVM)
(*parviflorum*) foliis oppositis lanceolatis
ferratis sessilibus cauleque villosis.

Epilobium foliis longis dentatis villosis, flore parvo. Hall. enum. helv. 410. Schmidel. op. Gesn. 2. fasc. 2. p. 28. n. 72. t. 19. f. 72.

Chamænerion villosum maius parvo flore. Tourn. inst. 305.

Lysimachia siliquosa II. Tab. ic. 855.

Lysimachia siliquosa hirsuta parvo flore major. Baub. pin. 245. prodr. 160. Moris. hist. 2. p. 270. f. 3. t. 11. f. 4.

Lysimachia siliquosa hirsuta flore minore. Baub. hist. 2. p. 906.

Icon Oed. Dan. t. 347.

In humidis ad *Schoenfeld*, *Abtnauendorf*, perennis.

Plerumque pro varietate *Epilobii hirsuti* habetur.

Folia in inferiore parte caulis opposita, in superiore alterna, nullo modo decurrentia, sed sessilia, aut potius petiolo brevissimo vix notabili, insidentia, basi rotundata, integerrima, obiter serrata: denticulis minoribus remotioribusque quam *Epilobii hirsuti*, utrinque villosa, mollissima, minus acuta. Flores parvi. Germen villis undique exstantibus hirsutum, tandem calvum. — Varietatem foliis ternis ibidem aliquoties legi.

n65. CHAMAENERION (EPILOBIUM)
(roseum) foliis oppositis alternisque ova-
to-lanceolatis petiolatis ferratis glabris.

Epilobium minus flore albo. *Schmiedel. l. c. p. 20.*
t. 20. f. 73.

Cum præcedente.

Planta obscura, ab Excellentissimo SCHMIDELIO
 primum rite definita. Caulis teres glaber, summita-
 tibus villo candido obductis. Folia inferiora oppo-
 sita, reliqua pleraque ut plurimum alterna, petiolata,
 ovato-lanceolata, glabra, (sed in junioribus hirsuties
 tenera alba nervos obsidet) inæqualiter ferrata, acuta.
 A concursu petiolorum, ubi oppositi sunt, linea te-
 nera deorsum ad proximum internodium extenditur,
 unde caulis ibidem anceps; alternorum bases dupli-
 cia linea simili decurrunt. Flores parvi. Petala dilutissi-
 me rosea aut albicantia, venis saturationibus. Stigma
 clavatum, indivisum. Germen pilis albis densis ob-
 ductum.

n66. CHAMAENERION (EPILOBIUM)
(obscurum) foliis oppositis alternisque lan-
ceolatis glabris ferratis basi decurrentibus.

Cum præcedente.

Caulis teres glaber, ramosissimus, summitates pilis
 rarissimis obsitæ. Folia parva, lanceolata, omnino
 glabra, ferrata denticulis parvis inæqualibus, apice
 glandulosis, acuta, ad notabilem a basi distantiam de-
 currentia, tandem in lineam utrinque per caulem ad
 proximum geniculum descendenter definentia; unde
 caulis tetragonus. Summa tamen folia sessilia, qua-
 lia etiam in *Epilobio hirsuto* observo. Flores alterni, pe-

dicellati, parvi. Petala parva, purpurascens. Germen tenellum villis albis densis vestitum, ægre distinguendis, quo magis adolescit, eo magis calvescit, tandem in siliquam longissimam acute angulatam abit, in qua pilos raros albos adpresso vix distinguas. — A reliquis Epilobii speciebus diversum esse videtur. Lysimachiæ siliqueosæ II. Tab. icon hanc plantam egregie exprimit, quam ab *Epilobio parvifloro* huc revocarem, nisi Excell. SCHMIDELII auctoritas obstaret.

AD CLASS. XV.

1167. HORDEVM (*secalinum*) flosculis laterilibus masculis aristatis, involucris setaceis scabris.

Hordeum murinum β . *Linn. sp. pl.* 126.

Hordeum spicis distichis, folliculo brevi, glumis calycinis aristatis. *Hall. hist. n. 1538.*

Gramen spicatum secalinum minus. *Tourn. inst. 518.* *Scheuchz. gr. 17. n. 3.* *Vaill. Paris. 83. t. 17. f. 6. nitida.*

In siccis versus *Ketschau.*

Folia mollia, pilosa. Spica minor et tenerior, quam Hordei murini. Involucra pariter minora, nullibi ciliata. Glumæ in nostris pilosæ, in aliis specimibus quondam Halæ a me lectis, glabræ.

CONSPECTVS
PLANTARVM
FLORAE LIPSICAE
ORDINE LINNEANO.

CLASSIS I.			
MONANDRIA.	17	agrestis	91
<i>Mono^γynia.</i>	18	arvensis	94
SALICORNIA	19	hederæfolia	92
1 herbacea *	20	verna *	905
<i>Digynia.</i>	21	trifollos	93
CALLITRICHE	247	PINGVICULA	
2 verna *	22	vulgaris	83
3 . . .	248	VTRICVLARIA	
3 auctumnalis	249	23 vulgaris *	902
CLASSIS II.	248	VERBENA	
DIANDRIA.	249	24 officinalis	133
<i>Mono^γynia.</i>	250	LYCOPVS	
LIGVSTRVM	250	25 europæus	82
4 vulgare	2	SALVIA	
CIRCAEA	250	26 pratensis	81
5 lutetiana	250	<i>Digynia.</i>	
VERONICA	250	ANTHOXANTHVM	
6 maritima	95	27 odoratum	597
7 spicata	96	CLASSIS III.	
8 longifolia *	903	TRIANDRIA.	
9 officinalis	89	<i>Monogynia.</i>	
10 serpyllifolia	90	VALERIANA	
11 Beccabunga	85	28 dioica	98
12 Anagallis aquatica	84	29 officinalis	97
13 scutellata	85	30 Locusta olitoria	99
14 Teucrium	87	POLYCNEVM	
15 montana *	904	31 arvense *	962
16 Chainædrys	88	GLADIOLVS	
		32 communis	100
		K 3	IRIS

CONSPECTVS

IRIS		AGROSTIS		
33	Pseundo-Acorus	3	59	spica venti
34	Sibirica †	4. 5	60	arundinacea *
SCHOENVS			61	canina *
35	Mariscus ○	654	62	vinealis *
36	albus *	1008	63	stolonifera
CYPERVS			64	capillaris *
37	flavescens	649	65	alba
38	fuscus	648	AIRA	
			66	cærulea *
SCIRPVVS			67	aquatica †
39	palustris	653	68	ceipitosa
40	capitatus *	1006	69	flexuosa *
41	acicularis	650	70	canescens *
42	lacustris	652	71	caryophyllea *
43	setaceus *	1005		MELICA
44	maritimus *	1007	72	nutans
45	sylvaticus	651	73	ciliata ○
ERIOPHORVM			POA	
46	polystachion	655	74	aquatica
NARDVS			75	trivialis
47	stricta	598	76	angustifolia
	Digynia.		77	pratensis
PHALARIS			78	palustris *
48	arundinacea	600	79	annua
PANICVM			80	compressa
49	verticillatum †	605	81	nemoralis *
		970	82	cristata *
50	viride *	971	BRIZA	
51	glaucum *	972	83	media
52	crus galli ☿	606	DACTYLIS	
β	β . . . β	607	84	glomerata
53	sanguinale *	973	CYNOSVRVS	
PHLEVM			85	cristatus
54	pratense	601	86	cæruleus
55	nodosum	602	FESTVCA	
ALOPECVRVS			77	ovina †
56	pratenſis	604	88	duriſcula *
57	geniculatus	603	89	rubra *
MILIVM			90	pratenſis
58	effusum	609		999
				91

PLANTARVM.

91	myuros *	1002	CLASSIS IV.	
92	decumbens *	1001	TETRANDRIA.	
93	elatior *	1003	<i>Monogynia.</i>	
94	arundinacea *	1000		
95	speciosa *	1004	DIPSACVS	
96	fluitans	643	119	fullonum 153
			120	pilosus 157
	BROMVS			
97	secalinus	640	SCABIOSA	
98	mollis	640	121 succisa 159	
99	sterilis	641	122 arvensis 160	
100	tectorum *	995	123 columbaria 161	
101	giganteus *	996	124 ochroleuca 162	
102	pinnatus	639	SHERARDIA	
	STIPA		125 arvensis 14	
103	capillata	644	ASPERVLA	
	AVENA		126 arvensis 15	
104	elatior	627	127 cynanchica * 889	
105	fatua *	989	GALLIVM	
106	pratensis *	990	128 palustre 9	
107	pubescens	628	129 uliginosum * 887	
108	flavescens *	991	130 asperum * 888	
	ARVNDO		131 verum 8	
109	phragmites	624	132 sylvaticum + 13	
110	epigeios *	986	133 Mollugo 11	
111	Calamagrostis	625	134 glaucum + 12	
	LOLIVM		135 boreale 10	
112	perenne	645	136 rotundifolium * 886	
113	temulentum	646	137 Aparine 6	
	HORDEVM		PLANTAGO	
114	murinum	622	138 major 18	
115	secalinum *	1167	139 media * 890	
	TRITICVM		140 lanceolata 19	
116	repens	621	141 maritima * 891	
117	caninum *	985	CENTVNCLVS	
	Trigynia.		142 minimus * 892	
	HOLOSTEVM		SANGVISORBA	
118	umbellatum	379	143 officinalis 16	
	CORNVS			
			144 sanguinea 257	
			145 mas * 258	
	K 4		TRAPA	

CONSPECTVS

TRAPA		SYMPHYTVM	
145 <i>natais</i>	255	165 <i>officinale</i>	28
ALCHEMILLA		BORAGO	
146 <i>vulgaris</i>	552	166 <i>officinalis</i>	21
APHANES		LYCOPSIS	
147 <i>arvensis</i>	551	167 <i>arvensis</i>	24
<i>Digynia.</i>		ECHIVM	
CVSCVTA		168 <i>vulgare</i>	151
148 <i>europaea</i>	20	PRIMVLA	
<i>Tetragynia.</i>		169 <i>officinalis</i>	39
POTAMOGETON		170 <i>elatior</i>	38
149 <i>natans</i>	261	β - - - <i>acaulis</i>	38
150 <i>perfoliatum</i> *	927	MENYANTHES	
151 <i>crispum</i>	262	171 <i>trifoliata</i>	40
152 <i>setaceum</i>	260	HOTTONIA	
153 <i>matrinum</i>	263	172 <i>palustris</i>	37
154 <i>gramineum</i>	264	LVSIMACHIA	
155 <i>beterophyllum</i> *	928	173 <i>vulgaris</i>	34
SAGINA		174 <i>thyrsiflora</i> ○	35
156 <i>procumbens</i> *	384	175 <i>Numalaria</i>	36
β β	385	ANAGALLIS	
CLASSIS V.			
PENTANDRIA,		176 <i>arvensis</i>	33
<i>Monogynia.</i>		177 <i>cerulea</i> *	893
MYOSOTIS		CONVOLVVLVS	
157 <i>Scorpioides arvensis</i>	32	178 <i>arvensis</i>	49
158 - - <i>palustris</i>	31	179 <i>sepium</i>	50
159 <i>Lappula</i>	27	CAMPANVLA	
LITHOSPERMVUM		180 <i>rotundifolia</i> * 897	
160 <i>arvense</i>	3	181 <i>patula</i> * 894	
ANCHVSA		182 <i>Rapunculus</i> 48	
161 <i>officinalis</i>	22	183 <i>persicifolia</i> 47	
CYNOGLOSSVM		184 <i>rapunculoides</i> * 896	
162 <i>officinale</i>	25	185 <i>Trachelium</i> 45	
<i>virens</i>	26	186 <i>glomerata</i> 46	
PVLMONARIA		187 <i>Cervicaria</i> * 895	
163 <i>angustifolia</i>	30	188 <i>Speculum veneris</i> *	
164 <i>officinalis</i>	29		1162
		PHYTEVMA	
		189 <i>spicatum</i>	155
		190 <i>orbicularę</i>	156
		SAMQ-	

PLANTARVM.

SAMOLVS		214	hybridum	560
191 Valerandi *	898	215	glaucum	563
VERBASCVM		216	Vulvaria	558
192 Thapsus	152	217	polyspermum	564
193 nigrum	153	VLMVS		
DATVRA		218	campestris	570
194 Stramonium	42	GENTIANA		
HYOSCYAMVS		219	Pneumonanthe	55
195 niger	154	220	Centaurium	57
SOLANVM		ERYNGIVM		
196 nigrum	53	221	campestre	354
197 Dulcamara	54	SANICVLA		
RHAMNVS		222	europea	495
198 catharticus	694	BVPLEVRVM		
199 Frangula	51	223	rotundifolium *	956
EVONYMV		TORDYLIVM		
200 europaeus	353	224	Antheriscus	497
RIBES		DAVCVS		
201 rubrum (a)	356	225	Carota	496
202 nigrum	355	CONIVM		
203 uva crispa	357	226	maculatum	500
HEDERA		SELINVVM		
204 Helix	352	227	sylvestre	477
THESIVM		228	palustre	478
205 Linophyllum	553	229	Carvifolia	473
VINCA		ATHAMANTA		
206 minor	41	230	Cervaria	476
<i>Digynia.</i>		231	Oreoselinum	475
ASCLEPIAS		PEVCEDANVM		
207 Vincetoxicum	56	232	officinale	479
HERNIARIA		233	Silaus	480
208 glabra	569	LASERPITIVM		
CHENOPODIVM		234	prutenicum †	498
209 bonus Henricus	557	HERACLEVM		
210 rubrum	561	235	Sphondylium	474
211 murale *	964	ANGELICA		
212 album	562	236	Iylvestris	472
213 viride	559	SIVM		
(a) Hæc et sequentes vix veræ indigenæ sunt.		237	latifolium	504
		K 5		238

CONSPECTVS

238	angustifolium	505	261	viscosa *	(Stam. 3.	
239	Falcaria	506	4.)		945	
OENANTHE				<i>Tetragynia.</i>		
240	fistulosa.	494		PARNASSIA		
PHELLANDRIVM			262	palustris	351	
241	aquaticum	507		<i>Pentagynia.</i>		
CICVTA				STATICE		
242	virosa	502	263	Armeria	358	
AETHVSA				LINVM		
243	Cynapium	501	264	catharticum	362	
SCANDIX			265	Radiola *	942	
244	peeten Veneris	487		DROSERA		
245	Anthriscus	493	266	rotundifolia	359	
CHAEROPHYLLVM			267	longifolia	360	
246	sylvestre	491		<i>Polygynia.</i>		
247	bulbosum	489		MYOSVRVS		
248	temulentum	488	268	minimus	420	
249	hirsutum	o				
PIMPINELLA				CLASSIS VI.		
250	saxifraga major	484		HEXANDRIA.		
251	... minor	483		<i>Monogynia.</i>		
β	... hircina	485		LEVCOIVM		
SESELI			269	vernun	528	
252	saxifragum	486		ALLIVM		
PASTINACA			270	Scorodoprasum *	958	
253	latifolia sylvestris	469	271	carinatum *	957	
CARVM			272	oleraceum †	530	
254	Carvi	482	273	angulosum	535	
APIVM			274	urfinum	536	
255	graveolens	509		LILIVM		
AEGOPODIVM			275	Martagon	527	
256	Podagraria	471		ORNITHOGALVM		
	<i>Trigynia.</i>		276	luteum	524	
VIBVRNVM			277	minimum †	524. b	
257	Opulus	58	278	umbellatum	525	
SAMBVCVS				ANTHERICVM		
258	Ebulus	60		279	Liliago †	526
259	nigra	59		ASPARAGVS		
ALSINE			280	officinalis	538	
260	media	378				
				CON-		

PLANTARVM.

CONVALLARIA

281	majalis	62
282	Polygonatum	61
283	multiflora	61.b
284	bifolia	256

Polygynia.

ALISMA	
Plantago aquatica	252

ACORVS

285	Calamus	571
-----	---------	-----

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

Monogynia.

TRIENTALIS	
europaea	64

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

Monogynia.

EPILOBIVM	
angustifolium	297
hirsutum *	298
parviflorum *	1164
montanum	299
roseum *	1165
palustre *	931
obscurum *	1166

VACCINIVM

319	Myrtillus	68
320	Vitis idaea	67

ERICA

321	vulgaris	65
-----	----------	----

DAPHNE

322	Mezereum	66
-----	----------	----

Trigynia.

323	Bistorta	592
-----	----------	-----

RVMEX

298	crispus	574
299	maritimus *	956
300	glomeratus	576
301	acutus	575
302	obtusifolius *	965
303	aquaticus	574
304	Acetosa	572
305	Acetosella	573

324	amphibium	566
-----	-----------	-----

SCHEVCHZERIA

306	palustris	587
-----	-----------	-----

325	Hydropiper	568
-----	------------	-----

TRIGLOCHIN

307	palustre	251
308	maritimum *	926

326	Pericaria	567
-----	-----------	-----

COLCHICVM

309	auctumnale	63
-----	------------	----

327	aviculare	589
-----	-----------	-----

328	Convolvulus	591
-----	-------------	-----

329	dumetorum *	968
-----	-------------	-----

Tetra-

CONSPECTVS

	<i>Tetragynia.</i>		<i>SAPONARIA</i>	
PARIS			348 officinalis	369
330 quadrifolia	302		349 Vaccaria	370
ADOXA			DIANTHVS	
331 Moschatellina	69		350 carthusianorum	366
ELATINE			351 Armeria	368
322 Hydropiper *	932		352 deltoides	367
333 Alsinastrum	301		353 superbus	365
			<i>Trigynia.</i>	
	CLASSIS VIII.		CVCVBALVS	
	ENNEANDRIA.		354 baccifer	389
	<i>Hexagynia.</i>		355 Behen	394
BVTOMVS			SILENE	
334 umbellatus	254		356 nutans	395
	CLASSIS X.		357 noctiflora *	949
	DECANDRIA.		STELLARIA	
	<i>Monogynia.</i>		358 nemorum *	946
MONOTROPA			359 holostea	376
335 Hypopitys	300		360 graminea	375
PYROLA			361 uliginosa	374
336 rotundifolia	465		ARENARIA	
337 minor	465. 3		362 trinervia *	944
338 secunda	466		363 serpillifolia	383
339 umbellata	467		364 rubra campestris	381
340 uniflora	468		. . maritima †	
LEDVM			<i>Pentagynia.</i>	
341 palustre *	943		SEDVM	
	<i>Digynia.</i>		365 Telephium	409
CHRYSOPLENIVM			366 rupestre	413
342 alternifolium	588		367 acre	410
SAXIFRAGA			368 sexangulare	411
343 granulata	572		OXALIS	
344 tridactylites	573		369 Acetosella *	70
SCLERANTHVS			370 corniculata	71
345 annuus	595		AGROSTEMMA	
346 perennis *	969		371 Githago	396
GYPSOPHILA			LYCHNIS	
347 muralis	371		372 Flos eculi	391
			373 Viscaria	390
			374 dioica	392
			CERA-	

PLANTARVM.

CERASTIVM

375	vulgatum	387
376	viscofum *	948
377	semidecandrum	388
378	arvense	386
379	aquaticum	377

SPERGVLA

380	arvensis	380
381	pentandra *	947
382	nodosa	382

CLASSIS XII.

DODECANDRIA.

Monogynia.

PORTVLACA

383	oleracea
-----	----------

LYTHRVM

384	salicaria
385	hyssopifolia

Digynia.

AGRIMONIA

386	Eupatoria
	<i>Trigynia.</i>

RESEDA

387	Luteola *
-----	-----------

EVPHORBIA

388	Peplus	78
389	exigua acuta	79
390	dulcis	80
391	helioscopia	77
392	Esula *	901
393	cyparissias	76
394	palustris	75
395	platyphyllos *	900

Dodecagynia.

SEMPERVIVVM

396	tectorum	412
-----	----------	-----

CLASSIS XIII.

I COSANDRIA.

Monogynia.

PRVNVS

397	Padus	399
398	avium	400
399	spinosa	401

Digynia.

CRATAEGVS

400	Oxyacantha	404
	<i>Trigynia.</i>	

SORBVS

401	aucuparia	405
	<i>Pentagynia.</i>	

MESPILVS

402	germanica	416
-----	-----------	-----

PYRVS

403	communis	417
404	Malus	418
405	Cydonia	419

SPIRAEA

406	Filipendula	542
407	Vlmaria	421

Polygynia.

ROSA

408	canina	450
409	spinosissima	451

RVBVS

410	idaeus	447
411	cæsius	449

412	fruticosus	448
413	saxatilis *	953

FRAGARIA

414	vesca	423
415	sterilis	424

POTENTILLA

416	Anserina	423
417	supina	431
		418

CONSPECTVS

418	recta	○	427	439	Pulsatilla	543
419	argentea		430	440	nemorosa	548
420	verna		429	441	ranunculoides	547
421	alba		428	CLEMATIS		
422	reptans		429	442	Flammula (*)	309
TORMENTILLA			THALICTRVM			
423	erecta		306	443	angustifolium	308
GEVM				444	flavum	307
424	urbanum		433	RANUNCVLVS		
425	rivale		432	445	Flammula	444
COMARVM				446	Lingua	445
426	palustre		425	447	Ficaria	446
CLASSIS XIII.				448	auricomus	442
POLYANDRIA.				449	sceleratus	441
Monogynia.				450	bulbosus	438
CHELIDONIVM				451	repens	439
427	majus		305	452	polyanthemos*	952
PAPAVER				453	acris	437
428	Argemone	*	933	454	lanuginosus	440
429	Rhœas		303	455	arvensis	443
430	dubium	*	934	456	aquatalis divertifo-	
NYMPHAEA				lius	434	
431	lutea		544	457	· : ♂ fænicula-	
432	alba		545		ceus	435
TILIA				458	· : ♀ peucedani-	
433	europæa		397		folius	436
CISTVS				TROLLIVS		
434	Helianthemum		398	459	europæus	549
Digynia.				CALTHA		
DELPHINIVM				460	palustris	623
435	Consolida		541	CLASSIS XIV.		
Pentagynia.				DIDYNAMIA.		
NIGELLA				Gymnospermia.		
436	sativa		414	AIVGA		
437	arvensis		415	461	pyramidalis	103
Polygynia.				462	reptans	102
ANEMONE				(*) Descriptio et synonyma ad C.		
438	Hepatica	*	960		rectam pertinent.	

TEV-

PLANTARVM.

TEVCRIVM		THYMVS		
463	Chamæpitys	104	491 Serpillum	
464	Scorodonia *	906	492 Acinos	
465	Scordium	101	SCVTELLARIA	
NEPETA		493 galericulata		
466	Cataria	123	494 hastifolia	
BETONICA		PRVNELLA		
467	officinalis	120	495 vulgaris	
MENTHA		496 . . β grandiflora		
468	filvestris	881	<i>Angiospermia.</i>	
469	aquatica	128	RHINANTHVS	
470	arvensis	129	496 Crista galli α semi-	
471	Pulegium *	909	na	
GLECHOMA		139		
472	hederacea	131	β . . : . . γ mas	
LAMIVM		138		
473	purpureum	107	EVPHRASIA	
474	album	106	497 officinalis	
475	amplexicaule	105	498 Odontites	
GALEOPSIS		148		
476	Ladanum	108	142	
477	Tetrahit rubrum	109	MELAMPYRVM	
478	. . luteum	110	499 cristatum *	
479	Galeobdolon	114	500 arvense	
STACHYS		140		
480	sylvatica	112	501 nemorosum	
481	palustris	113	502 pratense *	
482	germanica	111	503 sylvaticum *	
483	annua	121	LATHRAEA	
484	arvensis *	907	504 squamaria	
BALLOTA		134		
485	nigra	122	PEDICVLARIS	
MARRVBIVM		505 palustris		
486	vulgare	127	506 sylvatica	
LEONVRVS		136		
487	Cardiaca	115	ANTIRRHINVM	
488	Marrubiastrum *	908	507 Cymbalaria *	
CLINOPODIVM		913		
489	vulgare	130	508 Elatine	
ORIGANVM		147		
490	vulgare	132	509 spurium	
		146		
		510 Linaria		
		143		
		511 minus		
		144		
		512 Orontium		
		145		
SCROPHVLARIA				
		513 nodosa		
		149		
		514 aquatica		
		150		
		LIMO-		

CONSPECTVS

LIMOSELLA					
513 aquatica	135		535	Barbarea	279
			536	Alliaria	281
			537	cheiranthoides	284
CLASSIS XV.			ARABIS		
TETRADYNANIA.			538	thaliana	286
<i>Siliculosa.</i>			TVRRITIS		
MYAGRVM			539	glabra	283
516 sativum &	265		540	hirsuta	285
517 paniculatum *	929		SINAPIS		
DRABA.			541	arvensis	272
518 verna	295		RAPHANVS		
LEPIDIVM			542	Raphanistrum	267
519 ruderale	293		CLASSIS XVI.		
THLASPI			MONADELPHIA.		
520 arvense	289		<i>Decandria.</i>		
521 campestre	290		GERANIVM		
522 Bursa pastoris	291		543	cicutarium	461
COCHLEARIA			544	palustre	458
523 Armoracia a)	294		545	pratense	459
524 Coronopus *	930		546	robertianum	462
IBERIS			547	dissectum	463
525 nudicaulis	292		548	rotundifolium	464
ALYSSVM			549	molle *	955
526 incanum	296		550	sanguineum	460
<i>Siliquosa.</i>			<i>Polyandria.</i>		
CARDAMINE			MALVA		
527 impatiens	288		551	rotundifolia	72
528 pratenis	287		552	sylvestris	73
SISYMBRIVM			553	Alcea	74
529 Nasturtium	277		LAVATERA		
530 sylvestre	878		554	thuringiaca *	899
531 amphibium & palu- lustre	275		CLASSIS XVII.		
β . . . β aquaticum	276		DIADELPHIA.		
			<i>Hexandria.</i>		
232 Sophia	380		FVMARIA		
533 Irio o	274		555	bulbosa & cava	312
ERYSIMVM			556	. . . β solidia	313
534 officinale	273				
a) vix vera civis.					557

PLANTARVM.

557	<i>capnoides</i> *	935	581	<i>hybridum</i> *	936
558	<i>officinalis</i>	311	582	<i>repens</i>	320
	<i>Octandria.</i>		583	<i>alpestre</i>	318
			584	<i>pratense</i>	317
POLYGALA			585	<i>arvense</i>	321
559	<i>vulgaris</i>	253	586	<i>montanum</i>	319
	<i>Decandria.</i>		587	<i>fragiferum</i> $\alpha.$ $\beta.$	315
SPARTIVM			588	<i>agrarium</i>	316
560	<i>scoparium</i> *	938	589	<i>procumbens</i> *	937
GENISTA					
561	<i>tinctoria</i>	323	LOTVS		
562	<i>germanica</i>	324	590	<i>filiqusus</i>	342
ONONIS			591	<i>corniculatus</i> †	343
563	<i>spinosa</i>	227	MEDICAGO		
ANTHYLLIS			592	<i>falcata</i>	349
564	<i>Vulneraria</i>	322	593	<i>lupulina</i>	348
OROBVS			594	<i>polymorpha</i> mini-	
565	<i>vernus</i>	340		<i>ma</i> *	941
566	<i>tuberosus</i> *	940			
567	<i>niger</i>	341			
LATHYRVS					
568	<i>tuberosus</i>	339	CLASSIS XVIII.		
569	<i>pratensis</i>	337	POLYADELPHIA.		
570	<i>latifolius</i>	338	Polyandria.		
VICIA			HYPERICVM		
571	<i>Cracca</i>	333	595	<i>perforatum</i>	406
572	<i>sativa</i>	330	596	<i>humifusum</i>	408
573	<i>lathyroides</i>	332	597	<i>quadrangulum</i> *	950
574	<i>sepium</i>	331	598	<i>montanum</i>	407
ERVVM			599	<i>hirsutum</i> *	951
575	<i>hirsutum</i>	334	CLASSIS XIX.		
576	<i>tetraspernum</i> *	939	SYNGENESIA.		
CORONILLA			Polygamia <i>aqualis</i> .		
577	<i>varia</i>	346	TRAGOPOGON		
ORNITHOPVS			600	<i>pratense</i>	205
578	<i>perpusillus</i>	347	SCORZONERA		
ASTRAGALVS			601	<i>laciniata</i>	882
579	<i>glycyphylloides</i>	350	PICRIS		
TRIFOLIVM			602	<i>hieracioides</i>	207
580	<i>Melilotus officinalis</i>	314	L		SON.

CONSPECTVS

SONCHVS		CARDVVS	
603 arvensis	214	629 lanceolatus	194
604 oleraceus lœvis	216	630 nutans	191
605 . . asper	215	631 polyacanthos *	915
LACTVCA		632 crispus	192
* 605 sativa	220	633 palustris	198
606 Scariola	221	634 tuberosus †	197
607 saligna *	918	635 acaulis	196
CHONDRILLA		CNICVS	
608 juncea	206	636 oleraceus	200
LEONTODON		ONOPORDON	
609 Taraxacum	218	637 Acanthium	186
610 auctumnale	222	CARLINA	
611 hispidum	217	638 vulgaris	189
612 hirtum	219	BIDENS	
HIERACIVM		639 tripartita	187
613 Pilosella	211	640 minima *	914
614 dubium *	916	641 cernua	188
615 cymosum	210	EVPATORIVM	
616 murorum	212	642 cannabinum	185
617 paludosum *	917	<i>Polygamia superflua.</i>	
618 sabaudum	208	TANACETVM	
619 umbellatum	209	643 vulgare	163
CREPIS		ARTEMISIA	
620 tectorum	213	644 campestris	166
621 biennis *	918	645 Absinthium	165
HYOSERIS		646 vulgaris	164
622 minima	204	GNAPHALIVM	
HYPOCHOERIS		647 dioicum	174
623 radiata	225	648 arenarium	175
LAPSANA		649 uliginosum	180
624 communis	203	650 sylvaticum	179
CICHORIVM		CONYZA	
625 Intybus	223	651 squarrosa	181
* 625 Endivia	224	ERIGERON	
ARCTIVM		652 canadense	184
626 Lappa *	201	653 acre	183
β . , , β	202	TVSSILAGO	
SERRATVLA		654 Farfara	167
627 tinctoria	199		655
628 arvensis	195		

PLANTARVM.

655	hybrida	169	Polygamia frustranea.
656	Petasites o	168	CENTAVREA
SENECIO			
657	vulgaris	170	682 Cyanus' 245
658	viscosus	171	683 paniculata * 925
659	Iacobaea	172	684 scabiosa 883
660	paludosus	173	685 Iacea 246
ASTER			686 Calcitrapa o 244
661	Tripolium *	921	COREOPSIS
SOLIDAGO			687 Bidens * 924
662	Virga aurea	236	Polygamia necessaria.
INVLA			CALENDVLA
663	Helenium	232	688 arvensis 227
664	dysenterica	235	FILAGO
665	pulicaria	182	689 germanica 176
666	salicina	233	690 montana 178
667	hirta	234	691 arvensis 177
CINERARIA			Monogamia.
668	palustris	237. 238	IASIONE
ARNICA			692 montana 44
669	montana *	922	VIOLA
BELLIS			693 persicifolia 456
670	perennis	226	694 hirta * 954
CHRYSANTHEMVM			695 odorata 454
671	Leucanthemum	229	696 canina 455
672	corymbosum	230	697 tricolor 452
673	inodorum *	920	698 bicolor 453
MATRICARIA			IMPATIENS
674	Parthenium	228	699 Noli tangere 310
675	suaveolens *	919	CLASSIS XX.
676	Chamomilla	231	GYNANDRIA.
ANTHEMIS			Diandria.
677	arvensis *	923	ORCHIS
678	Cotula	239	700 bifolia 520
679	tinctoria *	1163	701 Morio 512
ACHILLEA			702 mascula 511
680	Ptarmica	241	L. 2
681	Millefolium	240	703

CONSPECTVS

703	militaris	510	722	disticha †	674			
704	latifolia	515	723	leporina	667			
705	maculata	515. 1	724	vulpina	666			
706	conopsea	514	725	brizoides †	675			
SATYRIVM								
707	viride	513	727	muricata	672			
OPHRYS								
708	Nidus avis	522	729	remota *	1012			
709	spiralis	516	730	elongata . .	676			
710	ovata	521	731	paniculata	671			
SERAPIAS								
711	latifolia	518	732	flava	668			
712	longifolia	519	733	digitata	670			
713	grandiflora	517	734	humilis *	1013			
<i>Polyandria.</i>								
ARVM								
714	maculatum	596	735	montana * . .	1014			
CLASSIS XXI.								
MONOECIA.								
<i>Monandria.</i>								
CHARA								
715	vulgaris *	1009	736	tomentosa *	1015			
<i>Diandria.</i>								
LEMNA								
716	trisulca	854	747	alba	682			
717	minor	855	748	Alnus glutinosa	681			
718	polyrrhiza *	1099	BETVLA					
<i>Triandria.</i>								
TYPHA								
719	latifolia	678	749	urens	680			
720	angustifolia	678. 2	750	dioica	679			
SPARGANIVM								
* 720	erectum	677	Pentandria.					
CAREX								
721	pulicaris	673	XANTHIVM					
AMARANTHVS								
Blitum								
Polyan-								

PLANTARVM.

	<i>Polyandria.</i>		<i>Tetrandria.</i>
CERATOPHYLLVM		VISCVM	
753 demersum	688	774 album	681
MYRIOPHYLLVM			
754 spicatum	593		
755 verticillatum	594	Pentandria.	
SAGITTARIA		HVMVLVS	
756 sagittæfolia	660	775 Lupulus	703
POTERIVM			
757 Sanguisorba	17	Octandria.	
QVERCVS		POPVLVS	
758 Robur	690	776 tremula	707
FAGVS		777 nigra	706
759 sylvatica	693	778 alba *	1026
CARPINVS			
760 Betulus	689	Enneandria.	
CORYLVS		MERCVRIALIS	
761 Avellana	691	779 petennis	709
		780 annua	708
		HYDROCHARIS	
		781 Morus ranæ	695
	<i>Monadelphia.</i>		
PINVS		CLASSIS XXIII.	
762 sylvestris	687		
763 Abies (Picea veter.)	686	POLYGAMIA.	
BRYONIA			
764 alba	658	Monoecia.	
		ANDROPOGON	
		782 Ischænum *	974
		HOLCVS	
		783 lanatus	616
		784 mollis *	984
		VALANTIA	
		785 Cruciata	7
SALIX		PARIETARIA	
765 pentandra *	1021	786 officinalis	550
766 triandra *	1022	ATRIPLEX	
767 fragilis *	1023	787 laciniata	555
768 purpurea *	1024	788 hastata *	963
769 vitellina	701	789 patula	554
770 amygdalina	697	ACER	
771 Helix o	699	790 Pseudoplatanus	364
772 Caprea	700	791 campestre	363
773 aurita *	1025	M	
			<i>Dios-</i>

CONSPECTVS

<i>Dioecia.</i>		813 . . . capillaceum	
FRAXINVS			775
792 excelsior	710	PHASCVM	
		814 subulatum	777
CLASSIS XXIV.		815 piliferum *	1029
CRYPTOGAMIA.		816 cuspidatum	780
<i>Filices.</i>		817 muticum	779
EQUISETVM		818 ferratum *	1030
793 sylvaticum	728	POLYTRICHVM	
794 arvense	730	819 commune †	733
795 palustre	731	820 piliferum *	1031
796 fluviatile	727	821 nanum † MNIVM L.	
797 hiemale	729		735
OPHIOGLOSSVM		822 striatum † BRYVM L.	
798 vulgatum	726		736
OSMVNDA		β . . . minus † it.	
799 Lunaria	725		737
800 Spicant	724	FONTINALIS	
ACROSTICHVM		823 major	781
801 septentrionale	711	MNIVM	
PTERIS		824 androgynum	773
802 aquilina	723	825 pellucidum *	1076
ASPLENIVM		826 palustre *	1077
803 Trichomanes	716	BRYVM	
804 Ruta muraria	712	827 apocarpum	776
POLYPODIVM		828 pomiforme	740
805 vulgare	717	829 fontanum * MNIVM L.	
806 Thelypteris †	719		1032
807 Filix mas	718	830 pyriforme	743
808 molle *	1027	831 truncatulum	745
809 cristatum *	1028	832 extinctorium *	1033
810 fragile	721	833 subulatum †	744
*810 Dryopteris *	1170	834 rurale	741
<i>Musci.</i>		835 murale † 742. 747	
LYCOPODIVM		836 scoparium	756
811 clavatum	732	837 undulatum	746
SPHAGNVM		838 glaucum †	739
812 palustre	774	839 hypnoides *	1034
		840 astivum *	1035
			841

PLANTARVM.

841	<i>heteromallum</i> *	1036	873	<i>prælongum</i> *	1054	
842	<i>cirratum</i> †	748	874	<i>abietinum</i> *	1055	
843	<i>viridulum</i>	754	875	<i>filicinum</i>	771	
844	<i>unguiculatum</i> *	1037	876	<i>cupressiforme</i>	762	
845	<i>crispum</i> *	1038	877	<i>aduncum</i> *	1056	
846	<i>purpureum</i> †	738	878	<i>palustre</i> *	1074	
847	<i>pallidum</i> *	1039	879	<i>triquetrum</i> †	767	
848	<i>stellatum</i> *	1040	880	<i>rutabulum</i> *	1057	
849	<i>simplex</i> *	1041	881	<i>piliferum</i> *	1059	
850	<i>aureum</i> * MNIVM L.	1042	882	<i>striatum</i> *	1058	
			883	<i>fluitans</i> *	1060	
851	<i>nutans</i> *	1043	884	<i>cuspidatum</i>	768	
852	<i>argenteum</i> †	749	885	<i>stellatum</i> *	1061	
853	<i>pulvinatum</i>	751	886	<i>nitens</i> *	1062	
854	<i>cespitosum</i>	750	887	<i>squarrosum</i> *	1063	
855	<i>capillare</i> *	1044	888	<i>viticulosum</i> †	761	
856	<i>erectum</i> * MNIVM L.	1045	889	<i>riparium</i> *	1064	
			890	<i>purum</i> *	1065	
857	<i>hornum</i> * MNIVM L.	1046	891	<i>illecebrum</i> *	1066	
			892	<i>compressum</i> *	1067	
858	<i>bimum</i> *	1047	893	<i>dendroides</i>	769	
859	<i>hygrometricum</i>	MNIVM L.	752	894	<i>alopecurum</i> *	1068
			865	<i>myosuroides</i> *	1069	
860	<i>ligulatum</i>	753	896	<i>polyanthes</i> *	1070	
861	<i>roseum</i> *	1048	897	<i>sciuroides</i> †	770	
862	<i>euphidatum</i> *	1049	898	<i>sericeum</i>	759	
863	<i>punctatum</i> †	755	899	<i>velutinum</i>	757-758	
			900	<i>lutescens</i> *	1071	
			901	<i>serpens</i> †	760	
			902	<i>intricatum</i> *	1072	
			903	<i>attenuatum</i> *	1073	
			904	<i>palustre</i>	1074	
			905	<i>curtipendulum</i> *		
					1075	

HYPNVM

864	<i>bryoides</i> *	1050	901	<i>serpens</i> †	760
865	<i>taxifolium</i> *	1051	902	<i>intricatum</i> *	1072
866	<i>denticulatum</i>	772	903	<i>attenuatum</i> *	1073
867	<i>sylvaticum</i> *	1072	904	<i>palustre</i>	1074
868	<i>complanatum</i> †	778	905	<i>curtipendulum</i> *	
869	<i>trichomanoides</i> *				
		1053			

Algae.

870	<i>erisum</i> o	764	IVNGERMANNIA	
871	<i>parietinum</i>	765	906	<i>asplenioides</i>
872	<i>proliferum</i>	766		783

CONSPECTVS

907	<i>scalaris</i> *	1078	939	<i>cornutus</i> *	1113
908	<i>lanceolata</i> *	1079	940	<i>radiatus</i> *	1114
909	<i>bidentata</i> *	1081	941	<i>foliaceus</i> *	1115
910	<i>bicuspidata</i> *	1082	942	<i>caninus</i>	858
911	<i>barbata</i> *	1084	943	<i>horizontalis</i> *	1116
912	<i>pufilla</i> *	1085	944	<i>aphthosus</i>	860
913	<i>varia</i> *	1080	945	<i>caperatus</i> †	863
914	<i>reptans</i> *	1083	946	<i>fraxineus</i> †	862
915	<i>complanata</i>	782	947	<i>furfuraceus</i>	859
916	<i>tamariscifolia</i> *	1086	948	<i>calicaris</i> *	1117
917	<i>trichophylla</i> *	1087	949	<i>farinaceus</i> *	1118
918	<i>epiphylla</i> †	785	950	<i>prunastri</i>	856
919	<i>furcata</i> †	784	951	<i>aculeatus</i> *	1119
920	<i>multifida</i> *	1088	952	<i>ciliaris</i> †	868
			953	<i>bifidus</i> *	1120
			954	<i>pulmonarius</i>	857
921	<i>polymorpha</i>	852	955	<i>crispus</i> *	1121
922	<i>conica</i> †	853	956	<i>stellaris</i> †	865
			957	<i>granosus</i> *	1122
			958	<i>pulverulentus</i> *	1123
			959	<i>physodes</i> *	1124
			960	<i>centrifugus</i> *	1125
923	<i>glauca</i> *	1091	961	<i>saxatilis</i>	864
			*961	<i>muralis</i> *	1126
			962	<i>pullus</i> *	1127
926	<i>jubatus</i> *	1100	963	<i>olivaceus</i> *	1128
927	<i>chalybeiformis</i> *		964	<i>parietinus</i>	861
		1101	965	<i>subfuscus</i> *	1129
928	<i>hirtus</i> *	1102	966	<i>ater</i> *	1130
929	<i>floridus</i> *	1103	967	<i>candelarius</i> *	1131
930	<i>barbatus</i> *	1104	968	<i>pallidus</i> *	1132
931	<i>rangiferinus</i> <i>sylvaticus</i> *	1105	969	<i>scruposus</i> *	1133
932	<i>furcatus</i> *	1106	970	<i>capitatus</i> *	1134
933	<i>subulatus</i> *	1107	971	<i>sabuletorum</i> *	1135
934	<i>uncialis</i> *	1108	972	<i>ericetorum</i>	866
935	<i>pyxidatus</i> *	1109	973	<i>orbicularius</i> *	1136
936	<i>coccifer</i> *	1110	974	<i>angulosus</i> *	1137
937	<i>fimbriatus</i> *	1111	975	<i>fusco-ater</i> *	1138
938	<i>gracilis</i> *	1112	976	<i>fulvus</i> *	1139

PLANTARVM.

977	sanguinarius *	1140	F V N G I.
978	rugosus *	1141	CLAVARIA
979	scriptus *	1142	1005 pistillaris I 850
980	geographicus *	1143	1006 coralloides III 851
981	antiquitatis *	BYS-	1007 Hypoxylon * 1098
	SVS L.	1144	1008 digitata * 1097
982	flavus *	1145	ELVELA
983	croceus *	1146	1009 Morchella II 843
984	incanus *	1147	1010 Auricula III 842
985	laeteus *	1148	1011 fallopiana IV 841
986	viridis *	1149	1012 scutellata VIII (838
987	roseus *	1150	840)
TREMELLA			
988	crispa *	1151	1013 purpurea * <i>Tremella L.</i> 1092
989	verrucosa *	1152	1014 Ceratospermum * 1093
990	Nostoch †	869	PHALLVS
991	botryoides *	BYS-	1015 impudicus I 835
	SVS L.	1153	1016 esculentus IV 834. 836
VLVA			
992	compressa *	1154	BOLETVS
993	granulata *	1155	1017 bovinus I 818-822
CONFerva			
994	bullosa *	1156	1018 versicolor II 830
995	abbreviata *	1157	1019 squamosus III (824 829)
996	capillaris *	1158	1020 coriaceus * V
997	amphibia *	1159	1021 imbricatus VI 832
998	rivularis	879	1022 Auriscalpium VII 831
BYSSVS			
999	phosphorea 3: a. b	878	1023 cristatus VIII 827
1000	velutina	875	1024 intybaceus IX 828
1001	stellaris *		1025 sanguinaceus X 823
1002	cespitosa *		1026 echinatus * XI
1003	floccosa *	1160	1027 igaiarius XII 826
1004	coriacea *	1161	β . . . flabelliformis XII d. 825
AGARICVS			
			1028 muscarius I
			1029 ovinus aureus II b. 787
			1030 tuberosus albus III. 788
			β . . . fuscus III d.
			1031 atramentarius IV 790
			M 3 1032

CONSPECTVS PLANTARVM.

1032 crenulatus albus	V	789	STEMONITIS		
1033 fornicatus luteo albus			1065 clavata	I	837
	VI	791			
1034 p ^{re} altus *	VIII				
1035 laxus	IX	792			
1036 piperatus albus	X	793			
1037 deliciosus lateritius					
	XI	794			
1038 Cantharellus	XII	(795 833)			
1039 Kremlinga	XIII	796			
1040 diversicolor flavescens *					
	XIV f.				
1041 androsaceus	XV	797			
1042 salebrofus	XVI	798			
1043 porcatus	XVII	799			
1044 lacerus albus	XIX	801			
1045 acetabulosus *	XX				
1046 campestris	XXI	802			
1047 Georgii	XXI e. f.	803			
1048 Columbetta	XXII	804			
1049 tenuissimus	XXIII	805			
1050 simetarius	XXIV	806			
1051 galericulatus	XXV	807			
* . . . umbellatus	- g.				
1052 squamosus *	XXVI				
1053 lacteus	XXVII	808			
1054 carneus L.		812			
1055 croceus	XXVIII	809			
1056 campanulatus L.		810			
1057 clypeatus		811			
1058 violaceus		813			
1059 villosus *	XXIX				
				V	
1060 quercinus	XXX	(814 816)			
1061 pectunculus	XXXI	815			
1062 spathulatus HALL.	hist.				
	2338.	817			

PEZIZA

1063 laevis	I	846
1064 hirsuta	I a.	847

LYCOPERDON

1066 Bovista vulgaris	I	849
* . . . furfuracea	I e.	- i
* . . . stellata	I f.	849. 2
* . . . tessellata	- g.	- 3
* . . . verrucosa *	- h.	
* . . . aculeata	- i.	- 4
* . . . papillofa	- k.	- 5
* . . . pilosa *	- p.	
* . . . decorticata	- r.	
1067 pedunculatum *	III	1094
1068 epidendrum	IV	848
1069 multifidum *	V, a	1095
1070 Brassicæ *		1096

MVCOR

1071 cellularis *	I	
1072 clavatus *	II	
1073 simetarius *	II. a.	
1074 paniceus *	II. b.	873
1075 septicus	II. d.	872
1076 monstrosus *	II. c.	
1077 Mucedo	IV	874
1078 botryoides *	IV b.	
1079 globosus *	IV c.	
1080 Lycogala *	III c.	
1081 cespitosus *	BYSSVS	
	V	
1082 glaucus	VI	871
1083 crustaceus L. *		
1083 Erysiphe L. *		

PLAN-

PLANTAE CVLTAE

<i>Diandria.</i>			
SYRINGA		APIVM	
1 vulgaris		19 Petroselinum	508
<i>Triandria.</i>		I LINVM	
PHALARIS		20 vfitatissimum	361
2 canariensis	599	<i>Hexandria.</i>	
PANICVM		ALLIVM	
3 miliaceum	608	21 Porrum	531
AVENA		22 sativum	529
4 sativa	626	23 ascalonicum *	Cha-
5 orientalis *	987		lotte
6 strigosa *	988	24 Cepa	532
SECALE		25 fistulosum	533
7 cereale	618	26 Schoenoprasum	536
HORDEVM		<i>Heptandria.</i>	
8 vulgare	623	ESCVLVS	
9 distichum *		27 Hippocastanum	457
TRITICVM		<i>Octandria.</i>	
10 aestivum	619	POLYGONVM	
11 hibernum	620	28 Fagopyrum	590
<i>Tetrandria.</i>		<i>Polyandria.</i>	
CORNVS		PAPAVER	
12 mas	158	29 somniferum	304
<i>Pentandria.</i>		<i>Tetradynamia.</i>	
SOLANVM		MYAGRVM	
13 tuberosum	52	30 sativum *	265
BETA		BRASSICA	
14 vulgaris	565. 3. 4.	31 oleracea	269
15 Cicla	565. 1. 2.	32 Napus	270
SIVM		33 Rapa	271
16 Sisarum	503	RAPHANVS	
CORIANDRVM		34 sativus	268
*16 sativum	499	ISATIS	
SCANDIX		35 tinctoria	266
**16 Cerefolium	492	<i>Diadelphia.</i>	
ANETHVM		PHASEOLVS	
17 graveolens	470	36 vulgaris	344
18 Foeniculum	481	PISVM	
		37 sativum	336
		M 4	VICIA

PLANTAE CVLTAE.

VICIA			<i>Monoecia.</i>
38 sativa alba	328	CVCVMIS	
... nigra	329	47 sativus	656
39 Faba	335	CVCVRBITA	
ERVVM		48 lagenaria.	<i>Flaschen-</i>
40 Lens	326		<i>kürbis.</i> 657
ROBINIA		49 Pepo *	<i>Kärbis.</i>
41 Pseudo Acacia	345	IVGLANS	
HEDYSARVM		50 regia	692
42 Onobrychis	884		
<i>Syngenesia.</i>			
LACTVCA		SPINACHIA	
43 sativa	220	51 oleracea	705
CYNARA		CANNABIS	
44 Scolymus	199	52 sativa	704
HELIANTHVS		IVNIPERVS	
45 annuus	242		
46 tuberosus	243	53 Sabina.	702

O B S E R V A T I O.

Numeri columnæ posterioris Bœhmeriani sunt, aut si planta, * notata, in opere III. BOEHMERI non occurrit nostri. Huic in fungis praemittuntur numeri ex Illustr. GLEDITSCHII *methodo fungorum*, Berol. 1753, cuius ordinem in fungis sequitum sumus, (ut Dillenianum in muscis,) vbi præterea variæ species fungorum reperiuntur ab Ill. BOEHMERO omisæ.

Species signo † notatæ in spicilegio nostro repetitæ sunt; signum o indicat plantas, quæ circa Lipsiam non amplius inveniuntur.

NOMINA BOTANICA
PLANTARVM
SPICILEGI.

Numerus paginam indicat.

<i>Acanthus</i>	15	<i>Arnica</i>	18
<i>Agrostis</i>	46 seq.	<i>Arundo</i>	52
<i>Aira</i>	48 seq.	<i>Arundo</i>	46. 49
<i>Aira</i>	51	<i>Asperula</i>	3
<i>Alchimilla</i>	43	<i>Aster</i>	18
<i>Alisma</i>	18	<i>Astragaloides</i>	26
<i>Allium</i>	37 seq.	<i>Astragalus</i>	26
<i>Alstroemeria</i>	23	<i>Atriplex</i>	40
<i>Althea</i>	29 seq.	<i>Avena</i>	52 seq.
<i>Althea</i>	5	<i>Avena</i>	47. 50
<i>Alysson</i>	8	<i>Bidens</i>	14
<i>Ambrosia</i>	22	<i>Blitum</i>	41
<i>Ampeloprasum</i>	37	<i>Bromus</i>	56
<i>Anagallidastrum</i>	5	<i>Bromus</i>	59
<i>Anagallis</i>	5	<i>Bryum</i>	75 seq.
<i>Anagallis</i>	5. 8	<i>Bryum</i>	74
<i>Andropogon</i>	46	<i>Buphtalmum</i>	145
<i>Androshaemum</i>	32	<i>Bupleurum</i>	34
<i>Anemone</i>	39	<i>Byssus</i>	144
<i>Anthemis</i>	145	<i>Byssus</i>	139. 141
<i>Anthoceros</i>	110 seq.	<i>Campanula</i>	6. 7. 145
<i>Antennaria</i>	41	<i>Campborata</i>	39
<i>Antirrhinum</i>	34	<i>Cardiaca</i>	12
<i>Antirrhinum</i>	38	<i>Carduus</i>	15
<i>Arenaria</i>	31		
<i>Argemone</i>	23		
		M 5	Carex

NOMINA BOTANICA.

<i>Carex</i>	62 et antepenult.	<i>Elymus</i>	52
<i>Caryophyllus</i>	50	<i>Endivia</i>	17
<i>Catananche</i>	38	<i>Epilobium</i>	22
<i>Centaurea</i>	19	<i>Equisetum</i>	62
<i>Centunculus</i>	5	<i>Esula</i>	9
<i>Cerastium</i>	31	<i>Euphorbia</i>	8 seq.
<i>Ceratospermum</i>	112	<i>Eupatorium</i>	19
<i>Chamedrys</i>	11	<i>Fagopyrum</i>	42
<i>Chamelinum</i>	28	<i>Festuca</i>	54 seq.
<i>Chamæmelum</i>	18 sq. 145	<i>Filix</i> 70. 71 et pag. penult.	
<i>Chamænerion</i>	22 146 seq.	<i>Fumaria</i>	24
<i>Chamærubus</i>	33	<i>Fungus</i>	113. 114. 119
<i>Chara</i>	62	<i>Gallium</i>	1 seq.
<i>Chenopodium</i>	40	<i>Gallium</i>	4
<i>Chondrilla</i>	17	<i>Geaster</i>	113
<i>Chrysanthemum</i>	18 seq.	<i>Genista</i>	25
<i>Cistus</i>	129	<i>Geranium</i>	34
<i>Clavaria</i>	114	<i>Gramen</i>	20. 43. seq. 66
<i>Cochlearia</i>	22	<i>Hepatica</i>	39
<i>Cochlearia</i>	27	<i>Hepatica</i>	112. 114
<i>Conferva</i>	142 seq.	<i>Hepaticoides</i>	101. 108
<i>Coralloides</i>	117. 118. 120	<i>Hieracium</i>	16
	121. 122. 126. 134	<i>Hippolathum</i>	41
<i>Coreopsis</i>	19	<i>Hordeum</i>	148
<i>Cornu cervi</i>	22	<i>Hydrophace</i>	114
<i>Coronopus</i>	22	<i>Hydropiper</i>	23
<i>Cracca</i>	26	<i>Hypericum</i>	32
<i>Crepis</i>	16	<i>Hypnum</i>	85 seq.
<i>Cruciata</i>	2	<i>Hypopitys</i>	36
<i>Cunila</i>	12	<i>Iris</i>	1
<i>Cyanus</i>	19	<i>Ischaemum</i>	45
<i>Cymbalaria</i>	14	<i>Iuncellus</i>	60
<i>Cyperoides</i>	65. 66. 67	<i>Iuncus</i>	42
<i>Cyperus</i>	61	<i>Iuncus</i>	69
		<i>Iungermannia</i>	103 seq.
<i>Digitaria</i>	45	<i>Knawel</i>	43
<i>Doronicum</i>	18		
<i>Dryopteris</i>	p. penult.		
<i>Elatine</i>	22		
<i>Elvela</i>	112		

NOMINA BOTANICA.

<i>Lactuca</i>	27	<i>Muscoides</i>	108
<i>Lamium</i>	12	<i>Muscus</i>	72. sq. 103. 120.
<i>Lapathum</i>	41. 42		122. 124. 126
<i>Laserpitium</i>	35	<i>Myagrum</i>	21
<i>Lathyrus</i>	26	<i>Myosotis</i>	31
<i>Lavatera</i>	8	<i>Ocymoides</i>	31
<i>Ledum</i>	28 seq.	<i>Orchis</i>	p. antepenult.
<i>Lentibularia</i>	10	<i>Ornithogalum</i>	35 seq.
<i>Lenticula</i>	114 seq.	<i>Orobus</i>	26
<i>Lichen</i>	110. 111. 112	<i>Panicum</i>	43 seq.
<i>Lichen</i>	115 seq.	<i>Papaver</i>	23
<i>Lichenagaricus</i>	114	<i>Perfoliata</i>	34
<i>Lichenastrum</i>	103. seq. 110	<i>Pes columbinus</i>	34
<i>Lichenoides</i>	112. 123	<i>Phalangium</i>	36
<i>Liliago</i>	36	<i>Phascum</i>	71. 72
<i>Linkia</i>	141	<i>Pilosella</i>	16
<i>Linocarpon</i>	28	<i>Plantago</i>	4
<i>Linum</i>	28	<i>Poa</i>	54 seq.
<i>Lotus</i>	27	<i>Poa</i>	48. 49
<i>Luteola</i>	38	<i>Polyacantha Theophrasti</i>	15
<i>Lycchnis</i>	31	<i>Polycnemum</i>	39
<i>Lycoperdon</i>	113	<i>Polygonum</i>	28. 42. 43
<i>Lysimachia</i>	22	<i>Polypodium</i>	70 et p. penult.
		<i>Polytrichum</i>	73 seq.
<i>Malva</i>	8	<i>Populus</i>	69
<i>Marchantia</i>	111	<i>Porrum</i>	38
<i>Mariscus</i>	60	<i>Potamogeton</i>	20 seq.
<i>Marrubiastrum</i>	12	<i>Prenanthes</i>	p. antepenult.
<i>Matricaria</i>	17	<i>Primula</i>	5
<i>Medica</i>	27	<i>Pseudo-Ambrosia</i>	22
<i>Medicago</i>	27	— - <i>fumaria</i>	24
<i>Melampyrum</i>	13 seq.	— - <i>Myagrum</i>	21
<i>Mentha</i>	12 seq.	— - <i>Struthium</i>	38
<i>Millefolium</i>	10	<i>Pulegium</i>	13
<i>Mille grana</i>	28		
<i>Mnium</i>	102 seq.	<i>Radiola</i>	28
<i>Mnium</i>	74. 75. 78. 79. 81	<i>Ranunculus</i>	32 seq.
	83	<i>Ranunculus</i>	39
<i>Morus</i>	67	<i>Rapunculus</i>	6. 7.
<i>Musco fungus</i>	117. 122. 124	<i>Reseda</i>	38
	126	<i>Riccia</i>	111
		<i>Rosma-</i>	

NOMINA BOTANICA.

<i>Rosmarinum</i>	29	<i>Teuerium</i>	II
<i>Rubeola</i>	4	<i>Thelypteris</i>	70
<i>Rubia quadrifolia</i>	2. 3. 4	<i>Tithymalus</i>	9
<i>Rubus</i>	33	<i>Trachelium</i>	6
<i>Rumex</i>	41	<i>Tremella</i>	140 seq.
		<i>Tremella</i>	114
<i>Salicornia</i>	39	<i>Trifolium</i>	24. 25
<i>Salix</i>	68 seq.	<i>Trifolium</i>	27. 39
<i>Samolus</i>	8	<i>Triglochin</i>	18
<i>Sanguinella</i>	45	<i>Tripolium</i>	20
<i>Schoenus</i>	61	<i>Triticum</i>	51
<i>Scirpus</i>	59 seq.	<i>Trixago</i>	12
<i>Scleranthus</i>	43		
<i>Scorodonia</i>	11	<i>Verbesina</i>	14
<i>Sideritis</i>	12	<i>Veronica</i>	10 seq.
<i>Sium</i>	35	<i>Veronica</i>	8
<i>Sonchus</i>	pag. antepenult.	<i>Vicia</i>	26
<i>Spartium</i>	25	<i>Viola</i>	33
<i>Spergula</i>	29	<i>Viscago</i>	31
<i>Sphaeria</i>	112. 114	<i>Ulva</i>	141
<i>Sphagnum</i>	71. 72. 73	<i>Vicia</i>	116
<i>Stachys</i>	12	<i>Vericularia</i>	10
<i>Stoebe</i>	19		

NOMINA GERMANICA
P L A N T A R V M
S P I C I C I L E G I I .

B lutgras	P. 45	Leberkraut, edel -	39
Bocksbart	50	Maulbeerbaum, weisser	67
Durchwachs	35	Ochsenauge	145
Flaschenkürbis, vid. conspe- ctum n. 48		Pappel, weisse	69
Gauchbeil, blauer	5	Poley	13
Goldblume	145	Post	29
Güldenklee	39	Rosmarin, wilder	29
Hafer, wild - s. Wildhafer.		Schneckenklee	27
Hafer, türkischer	52	Schwertel, blauer	1
Hafer, ungarischer	52	Violaten, wilde	33
Hasegeil	25	Vogelwicke	26
Hirse, wilder	45	Wiesenklees, weisser	24
Hirsegras	45	Wiesenpelz	143
Kienpost	29	Wiesenwarze	143
Klebgras	43	Wildhafer	53
Klæ, s. Wiesenklees.		Wohlverleib	18

APPEN.

APPENDIX.

AD CLASS. IV.

1168. PRENANTHES (*muralis*) flosculis' quinis, foliis runcinatis. *Linn. sp. pl.* 1121.

Prenanthes foliis serratis pinnatis, pinna suprema triangulari trilobata. *Hall. hist. n. 18.*

Sonchus laevis laciniatus muralis parvis floribus. *Baub. pin. 124.*

Sonchus laevis vulgatior secundus. *Clus. hist. 2. p. 136.*

In nemorosis im Bieniz lecta a Cl. POHLIO, mens. Iulio. it. copiose im Linkelerholz.

AD CLASS. XIII.

1169. ORCHIS (*coriophora*) bulbis indiuisis, necarii labio trifido reflexo crenato: cornu brevi, petalis conniventibus. *Linn. sp. pl. 1332.*

Orchis radicibus subrotundis, galea connivente, labello trifido reflexo. *Hall. hist. n. 1284. t. 34.*

Orchis odore hirci minor. *Baub. pin. 82. Vail. Paris. 149. t. 31. f. 30 - 32.*

Orchis flore parvo viridi purpureo. *Riv. hex. t. 20.*

In nemorosis im Zschocherischen Holze, plantam rarissimam reperit Cl. POHLIVS, mense Iunio.

CLASS. XVI. p. 62. §. 669. ita corrigatur:

669. CAREX (*flacca*) spicis masculis pluribus erectis, femineis pendulis, capsulis ovatis obtusis bractea brevioribus.

Cyperoides spicis femineis pendulis turgidis obtusis atrorubentibus, maribus longis et gracilibus. *Hall. enum. 240. hist. 1408.*

Cyperoides palustre, spicis purpureo-spadiceis, tenuibus pediculis insidentibus. *Scheuchz. agr. 467.*

Gramen

APPENDIX.

Gramen Cyperoides angustifolium, spica nutante minus. Barr. ic. u3. f. u.

Ad fossas passim, v. c. loco ab ill. BOEHMERO indicato.

Culmus cubitalis, superne nudus, triqueter. Folia culmo breviora, glauca. Spicæ masculæ duæ, quarum inferior sessilis: squamis rotundatis spadiceis nervo pallido; femineæ duæ f. tres, unciales f. biunciales, basi laxiores, squamis acutis, fuscis, nervo pallidiore; capsulis ovatis compressis obtusissimis, demum nigricantibus; hæ spicæ insident pedunculis capillaribus, quorum infimus longior, subinde longissimus, ex ala folii spicam vix superantis egreditur. — In opere Illustr. BOEHMERICI deleantur synonyma. Difficilis species, caute distinguenda a Carice panicea similibusque.

AD CLASS. XVIII.

1170. POLYPODIVUM (*Dryopteris*) frondibus supradecompositis: foliolis ternis bipinnatis. Linn. sp. pl. 1555.

Polypodium pinnis pinnatis, coniugatis, pinnulis ovatis, obtusis, crenatis. Hall. hist. n. 1699.

Filix ramosa minor pinnulis dentatis. Baub. pin. 358. Baub. hist. 3. p. 733. Amman. Act. Petr. 10. p. 301. t. 22. f. 2.

Filix petræa. 4. Tab. hist. 182.

In petrarum rimis an den Brücken bey dem Kub-Turm copiose. Mens. Iulio. Cl. KNOLL.

EMENDANDA.

- p. 8. n. 899. lin. 3. unifloris legatur unifloris
- 24. n. 936. l. ult. weiser l. weissler
- 27. n. 343. l. 8. intersticta l. obsitæ
- 29. l. 14. aliis simplicibus eo l. aliis similibus psilotris oleo
- 30. 946. l. 3. sub Arenaria l. sub Stellaria.
- 37. n. 530. del. verba: ad occidentem urbis
- 44. l. 8. del. unde fit, et pro: quod l. quibus
- 51. n. 984. l. 16. extra l. ultra
- 54. n. 991. l. 16. a dorso l. e dorso
- 60. l. 1. cutilis l. inutilis
- 64. l. 6. præcocius l. præcocior
- 71. l. 2. del. verba: laciniis basi hinc dilatatis.
- 82. l. 6. del. ut in isto.
- - l. 7. del. pendulis.
- 83. n. 1047. l. 3. rubiginosa l. rubiginoso.
- 87. n. 778. l. 16. explanatæ l. complanatæ.
- 89. n. 1055. l. 18. a foliis l. e foliis.
- 92. n. 1060. l. 1. del., post: lanceolatis
- 93. l. 8. florentem l. florens.
- - l. 14. folia l. folia.
- 96. n. 1067. l. 2. similis l. simile
- 97. n. 1070. l. 1. polyanthos l. polyanthes
- 98. l. 7. cum l. quæ
- 104. n. 1080. l. 11. accedunt l. accedit
- - - l. 17. phlebotomium l. phlebotomum
- 108. l. 12. cum l. quam
- 112. l. 6. observatus l. observata.
- 116. l. 2. coralloidem l. coralloide.
- 123. n. 863. l. 12. qua l. quæ
- 125. n. 1118. l. 24. et p. 131. l. 8. consistentia l. substantia
- 131. l. 16. contrario l. e contrario.
- 132. l. 10. habendae l. habendi.
- 141. l. 4. innascens - - sinapis l. innascens. Figura ---
variata, et si apud DILLENIVM unica tantum forma
descripta inveniatur; hic plerumque occurrit sub forma
granorum, magnitudine seminis sinapis.
- 145. n. 1063. l. 3. n. 1261. l. p. 1263.

IN CONSPPECTV PLANTARVM.

- n. 224 Antheriscus l. anthriscus
n. 248 temulentum l. temulum
Cl. XV. tetradymania l. tetrodynamia.
n. 742 pendula l. flacca.
-
- C P Y 172