

- Digitalisierte Fassung im Format PDF -

Florae Berolinensis prodromus

Karl Ludwig Willdenow

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](#) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

CAROLI LUDOVICI WILDENOW

Societ. Natur. Curios. Halens. sodal.

FLORAE BEROLINENSIS
PRODROMUS

secundum

SYSTEMA LINNEANUM

A B

ILLUSTR. VIRO ac Eq. C. P. THUNBERGIO

emendatum conscriptus.

cum Tabulis VII. aeri incisis.

BEROLINI

IMPENSIS WILHELCMI VIEWEGII

KLOPSTOCK.

Schoen ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht
Auf die Fluren verstreut, schoener ein froh Gesicht,
Das den grossen Gedanken
Deiner Schoepfung noch einmal denkt.



PATRI PATRIAEC

FRIDERICO WILHELMO II.

Borussorum Regi, Marchioni Brandenburgico,

S. Rom. Imper. Archicamerario & Principi

Electori, Supremo Silesiae Duci,

Supremo Principi Arans-

onensi Neocomi

cet. cet.

DOMINO SUO

LONGE CLEMENTISSIMO

HASCE PRIMITIAS LABORUM

SUORUM

MOMI HAIPI COUPACHA

submisse offert

TANTI REGIS

devotissimus cultor

C. L. WILDENOW.

LECTURIS.

S.

Offero TIBI B. L. *Tentamen Florae Berolinensis*, quo plantas a me visas, & Amicis benigne communicatas recensui. Haud exceptes velim omnium *Florae nostrae* civium enumerationem; quum neque regio circum *Berolinum* ex toto investigata est, neque *Flora* harum regionum scripta existit. Minime me fugit, *Celeberrimos Viros* in describendis plantis *Berolinensisibus* desudasse, & libros hoc consilio scriptos existere; sed *Eorum libri*, exceptis novissimis, pro nostris temporibus, vix magni momenti sunt. Omnes indicabo nunc libros ad *Floram nostram* respicientes, ut eo magis supra dicta pateant.

Omnium antiquissimus mihi notus est:
Celeber. Joan. Sigism. Elsholt M. D. &
horti botanici olim Praefectus Berolini, qui
in libro Suo *) ordine alphabetico, plantas
spontaneas, ac hortenses, cum nominibus
BAUHINI aliorumque Auctorum, absque
tamen loco natali indicavit. Observationes
nullas neque medicas neque botanicas addidit,
nec etiam breviores descriptiones vel nova ab
aliis nondum descripta vegetabilia.

Alter equidem **Celeber. Vir Michel**
Matthias LUDOLFF M. D. Bot. ac Mat.
Med. Profess. ord. olim *Berolini* in usum au-
ditorum Suorum libellum **) secundum al-
pha-

*) *Joan. Sigism. Elsholtii Flora Marchica, sive Catalogus Plantarum, quae in hortis Electoralibus Marchiae Brandenburgicae, primariis Berolinensi, Aurangiburgico & Potstamensi excolluntur: partim sua sponte passim proveniunt.* Berol. 1663. 8vo. min.

**) *Michaelis Matthiae Ludolff Catalogus Plantarum Sc.*

phabethum conscripsit, quo plantas horti botanici, aequac vulgatissimas & officinales cum nominibus TOURNEFORTII, LINNEA-
NISQUE descriptionibus absque tamen locis natalibus indicavit. Adjecta est *Tabula Systematis TOURNEFORTIANI* cum generibus.

Prae aliis excellit multis scriptis *Celeberrimi pie colendi Praeceptoris Joan Gottlieb GLEDITSCHI* liber de *Fungis*, *** ubi omnes tunc notas fungorum species breviter, cum descriptionibus propriis concinnis, observationibus, locisque natalibus, speciatim indicatis, exposuit. Libellus sui generis praestantissimus, quod post secula adhuc tam utilis erit, quam suo tempore fuit.

Minus nostro scopo adaequatum videtur,
liber ****) *Pharmacopei olim aulici C. F. ARNSTORFF* qui in illo plantas officinales sua
sponte provenientes pro Tyronibus Pharma-
ceuticae artis recensuit, loca natalia, *nomi-*
naque LINNEANA brevissime indicavit.

Denique liber novissime ab *Amico con-*
junctissimo Frid. Wilhelmo Ant. LÜDERS
M. D. & Practico apud Havelbergenses fe-
*licissimo *****)* huc pertinet. In illo plantas
Marchiae Brandenburgiae Electoralis se-
cundum sistema Praeceptoris nostri b. m. J.
G. GLEDITSCHII enumeravit. Sed dolen-
dum est, nomina tantum, nec observatio-
nes,

****) *Comparatio Nominum Plantarum officinalium cum*
nominibus botanicis Linnei & Tournefortii. Berolini
1762. 8vo maj. (etiam cum Titulo vernaculo.)

*****) *Frid. Wilhelm Ant. Lüders M. D. & Pract. Hal-*
velberg. Nomenclator botanicus stirpium Marchiae Bran-
denburgiae, secundum sistema Gledischianum a sta-
minum situ digestus. Berolini 1786. 8vo maj.

nes, nec loca natalia eum indicasse. Opto
& mecum forsan omnes *Florae Marchicae*
cultores, eum integrum editurum libellum.

Haec sunt mihi nota scripta, quae ut jam
dixi, ad Floram nostram pertinent, & unde
facile L. B. animadvertes, *Floram agri Bero-*
linensis adhuc eo usque desideratam fuisse;
periculum itaque feci in edenda *Flora*. Te-
nuitatem virium ad hunc laborem minus ap-
tam satis sentio, sed *Amicis* suasus hancce
suscepi libellum. Indulgias itaque L E C T O R
A M I C E si opinioni hoc de opusculo T I B I
facta, haud respondeam. Mihi sufficiens erit,
si modo quid ad augmentum scientiae feci.

Systema quod elegi est *Systema LIN-*
NEANUM ab *Illustr. Equite & Professore*
C. P. THUNBERGIO emendatum, quo usus
est, quum *Floram Suam Japonicam* ederet.
Perinde semper erit quodnam *Systema* eligi-

mus, nam *Systema* est: *filum Ariadneum*,
cujus ope Labyrinthum facile exire possumus, quo demto semper *Chaos* erit. Quod
de *Systemate Naturae* nonnulli somniant,
semper pium manebit desiderium. Si vel
omnia terrae nostrae vegetabilia detecta es-
sent, tamen impossibile erit *Systema Na-
turae* investigare. *Alma enim Natura*, in
se spectata, non est *systematica*, non *Ge-
nera* habet, neque *catenam rerum* agnoscit.
Singula Creata nexu quasi retiformi, ut ita
dicam cohaerent, & Nos singula in lineam
rectam disponere solemus, qua methodo
haud uititur *Natura*. Non ignoro *Systema*
LINNEANUM emendatum adhuc imper-
fectum esse, sed ubi quaeso reperitur *Syste-
ma* omni numero absolutum? *Systema b.*
m. J. G. GLEDITSCHI, *Praeceptoris mei*,
LINNEANO praeserendum esse in quibus-

dam agnosco; sed etiam ut LINNEANUM
Systema sigillum humanitatis p[re]fert se. Lubenter istud secutus essem, nisi *Ordines* nimis prolixii, & frequentes ob minorem *Classium* numerum essent, & *Tyroni* legenti, cui bono praecipue hunc librum scripsi, facile fastidium crearet. Quodsi *Systema LINNEI* suis cum viginti quatuor Classibus elegisset, tres ultimae Classes, ejusdem difficultatis causam praebuissent. Ingenue quidem fateor, dari plantas constanter dichinas, quarum sexus nunquam mutatur, e. g. *Quercus*, *Corylus cet*, numerus vero earum tam magnus non est, ut propriam mereantur Classem, quum facilitiori modo, secundum staminum numerum aliis in Classibus comprehenduntur. Plura de quatuor ultimarum Classium inconstantia *Amicus venerabilis* noster, supra jam nominatus *Illust. C. P.*

THUNBERG in *Flora sua Japonica* adduxit.

In dispositione *Graminum Recentiores Botanicos* secutus sum, & nonnulla genera eo reduxi, ubi locum eorum proprium occupant. Sic *Melicae* genus sub *Airam* posui, ob rudimentum tertii floris rarissime duntaxat observatum; quum etiam nonnullae, & fere omnes *Airae* species, si loco nimis pingui crescunt, tale rudimentum, interdum etiam integrum florem producunt.

Umbelliferarum familiam exceptis nonnullis mutationibus necessariis, cum *Il-*
lust. LINNEO enumeravi. Novissimae mu-
tationes non tam constantes sunt, ut illas
sequi potuissem. Optandum foret, ut ob-
servationes certiores de genera eorum insti-
tuerentur. Reliquis in Classibus interdum

quaedam mutavi, ubi necessitas id requirebat, quin tamen difficilis redderetur, methodus electa.

Cryptogamiam praecipue quoad *Muscos*, secundum *Celeberrimi* ac *Amicissimi D. HEDWIGII* detecta disposui. *Filices* vero ad *LINNEI* sistema enumeravi. In *Algis & Fungis*, Recentiorum Botanico-rum dispositionem secutus sum. *Lichenum* genus in plura divisi, quum sane non omnes quos *LINNEUS* *Lichenes* dixit, hujus generis sint; dispositionem *Celeber. WIGGERSII* servavi, licet nonnulla mutaverim, quia *Ille* interdum ob formam externam *Lichenes* novo sub genere complectitur. E Fructu illorum genera disposui, quia optime, ut puto ex illo distinguitur. In fungis *GLEDITSCHIUM* & alios secutus sum, servatis vero nominibus *LINNEANIS*. Lubenter *Cele-*

ber. BATSGHIUM optimum fungorum scrutatorem elegisse, nisi saepius nomina, jam ab aliis fungis data, deficiente ratione mutasset, & *Synonima* tam pauca adduxisset.

Nomina ab *Illust. LINNEO* vegetabilibus tributa in tantum servavi, in quantum confusio non metuenda. e. g. *Spergulae pentandrae* nomen mutavi, & istam plantulam *Spergulam vernalem* nuncupavi, ob defectum quinque staminum. Ubi vero *LINNEO* plantae descriptae deficiebant, nomen antiquissimum assumsi. Novis vero plantis secundum regulas *Philosophiae botanicae* nomina dedi.

Semel necessarium duxi novum nomen pro fructificationis parte confidere, est istud: *Indusium*, quo nomine integumentum, quod totum florem, & postea fructum, tanquam

sacculo in *Filicibus* v. g. in *Equiseto*, *Poly-*
podio cet. includit, intelligo.

Synonima pauca tantum, & quidem ad
plantarum determinationem necessaria citavi.
Frequentiora in *Cryptogamia*, ob difficilium
hujus Classis studium invenies. Praecipue
libros anglicos indicavi, quos ex ditissima
Sua bibliotheca benigne mihi communicave-
rat *Celeber. Profess. J. R. FORSTER.*

In tabulis aeneis plantas partim novas,
partim haud satis determinatas pingi curavi.
Cetera opus docebit.

Denique omnibus Florae nostrae amicis,
qui observationes suas mecum communica-
runt, gratias maximas publice solvo. Inter
omnes SPRENGELIO *Rectori Scholae Span-*
daviae sagacissimo vegetabilium scrutatori, in-
signem numerum plantarum in regionibus
Spandaviensibus sponte nascentium, debo.

HERMES *Juvenum Nobilium Clementiss.*
REGINAE VIDUAE *Educator*, quem diu
tanquam amicum sincerrimum, conjunctis-
simumque veneror, mihi acutissimas obser-
vationes benigne communicavit. KOCH
fratrum Bohemiae olim Chirurgus, nunc
Practicus Gnadaviae nonnulla loca planta-
rum specialia mihi suppeditavit.

Tu Benigne Censor, si forsan uno alte-
rove me errasse invenies, memor sis rogo
verfliculi *Horatiani*.

Vive, Vale, si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti, si non his utere mecum.

CLASSIS I.
M O N A N D R I A
M O N O G Y N I A.



HIPPURIS Lin. gen. II.

*Calyx superus minimus. Corolla O. Stamen
stigmate insertum. Semen. I.*

**I. HIPPURIS vulgaris foliis octonis subulatis Lin.
suppl. p. 81.**

In aquis stagnantibus bey den Zeltern; prope
Charlottenburg, Spandau auf der Freiheit
passim. Majo.

Planta gynandra. Calyx vix absque lente vi-
sibilis.

CHARA Lin. gen. 1127.

♂ — ♀. ♂. *Calyx & Corolla. O. Anthera sphaeri-
ca. Fil. O.*

♀ *Calyx 3. 4 phyllus Cor. O. Stigm. 5 fidum
Capula polysperma.*

**2. CHARA vulgaris caulibus laevibus, foliis interne
dentatis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 90. Hedwig
Theoria pl. crypt. 125. tab. 32. 33.**

In fossis inter Strahlow & Rummelsburg inque
Grunewald copiose. Junio. Julio.

DIGYNIA.

CALLITRICE *Liu. gen. 13.*

♂—♀. *Calyx* O. *Petala* 2. *Capsula* bilocularis.

3. **CALLITRICE** *verna*; foliis apice integris.

Callitricha verna foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 10.

β. Foliis omnibus lanceolato-ovatis.

In fossis aquisque stagnantibus copiosissime. Varietas β. *in den Papenbergen in via inferiore* frequens & alibi rarius. Vere, interdum autumno.

4. **CALLITRICE** *autumnalis* foliis apice bifidis.

Callitricha autumnalis foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis *Lin. syst. ed. R. I.* p. 11.

β. Foliis superioribus ovalibus, inferioribus linearibus, omnibus apice bifidis.

Im *Grunewald* præcipue *in der Hundskæhle* rarius. β. rarissima. Julio. Augusto.

Foliorum apex tantum has species distinguit, quum figura valde variabilis est. Sexus vix etiam ad has distinguendas sufficit, ob flores sæpe monoicos.

CLASSIS II.

D I A N D R I A
M O N O G Y N I A.

a. Flores apetali.

LEMNA Lin. gen. 1130.

♂—♀. *Cal* 1. *phyllus*. *Cor*. O. *Capsula* 1 locularis polysperma.

5. LEMNA *trisulca*; foliis lanceolatis petiolatis
Lin. syst. ed. R. 4. p. 92.

In aquis quietis *im Thiergarten*, *Grunewald*,
prope *Spandau* & alibi frequens. Junio.

6. LEMNA *minor*; foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis *Lin. syst. ed. R. 4. p. 92.*

In aquis stagnantibus inter sequentem passim.
Julio.

7. LEMNA *gibba*; foliis sessilibus subtus hemisphaericis, radicibus solitariis *Lin. syst. ed. R. 4. p. 93.*

In fossis, lacubus, aquisque quietis, copiose.
Junio. Julio.

8. LEMNA *polyrhiza*; foliis sessilibus radicibus confertis *Lyn syst. ed R. 4. p. 93.*

Iisdem locis, & prope *Spandau* rarius. Julio.

CLASSIS II.

SALIX. Lin. gen. 1201.

♂—♀. ♂. Amentum imbricatum. Cal. squamæ 1
floræ Cor. O. Nectar glandula baseos.

♀. Ament. Cal. & Corolla maris Styl. 2 fidus
Capsula 2 valvis 1 locularis Semina papposa.
* Foliis glabris serratis.

9. SALIX triandra; foliis oblongo-lanceolatis, ser-
ratis glabris, floribus triandris.

Salix triandra foliis serratis glabris, floribus tri-
andris Lin syst. ed. R. 4. p. 223.

Im Thiergarten & prope Spandau an der Chaussee
rarius. Majo.

Fruticem femineum nondum vidi.

10. SALIX pentandra; foliis ovatis, acutis, serratis,
glabris, floribus pentandris.

Salix pentandra foliis serratis, glabris, floribus
pentandris. Lin. syst. ed. R 4. p. 223.

Salix laurea polyandra Gled. vid. Lüders Nomen-
clator. fl. march. p. 4.

Im Thiergarten & versus Falckenhagen passim.
Majo.

Nffic. Cortex Salicis laureæ.

11. SALIX vitellina foliis serratis, ovatis, glabris:
ferraturis cartilagineis, petiolis calloso puncta-
tis Lin syst. ed R. 4. p. 224.

Inter Pancko & Gesundbrunnen, im Thiergarten
alibique passim Aprili.

12 SALIX amygdalina foliis ferratis, glabris, lanceo-
latis, petiolatis, stipulis trapeziformibus. Lin.
syst. ed R. 4. p. 224.

Im *Thiergarten*, & alibi rarius. Aprili.

Marem nondum legi. Numme femina *Salicis triandræ*?

13. *SALIX fragilis* foliis serratis, glabris, ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Linn. syst. ed. R. 4. p. 125.*

Prope *Pancko*, *Schænhausen*, *Unterbaum* & alibi frequens. Aprili.

Offic. Cortex Salicis fragilis.

14. *SALIX Helix* foliis linear-lanceolatis serratis, glabris, amentis tamentosis: floribus monandris.

Salix Helix foliis serratis, glabris, lanceolato-linearibus: superioribus oppositis obliquis.

Linn. syst. ed. R. 4. p. 226.

Mas ad fossas versus *Pancko* & *Schænhausen* olim frequens, nunc rarius. *Fæmina* ad *Spandau an der Chaussee* passim. Aprili.

** *Foliis integerrimis villosis.*

15. *SALIX aurita* foliis integerrimis utrinque villosis, obovatis, appendiculatis. *Linn. syst. ed. R. 4. p. 230.*

Locis humidis im *Thiergarten*, *Jungfernheyde* & prope *Spandau* frequens. Aprili.

16. *SALIX arenaria* foliis integris, ovatis, acutis, superne subvillosis, subtus tomentosis. *Linn. syst. ed. R. 4. p. 231.*

In pratis humidis, arenosis, inter *Pancko*, & *Gesundbrunnen*; prope *Schænhausen*, *Spandau*, & alibi frequens. Aprili.

Autumno præcipue Augusto, Septembri iterum flores profert.

17. *SALIX incubacia* foliis integerrimis lanceolatis, subtus villosis nitidis, stipulis ovatis, acutis.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 231.

Ante portam Halensem passim. Aprili.

18. *SALIX rosmarinifolia* foliis integerrimis, lanceolato linearibus, strictis sessilibus subtus tomentosis *Lin. syst. ed. R. 4. p. 232.*

Ad latera fossarum *in der Jungfernheyde*, & prope *Spandau* passim. In turfosis *des Grunewaldes* frequens. Aprili.

* * * *Foliis subserratis villosis.*

19. *SALIX Caprea* foliis, ovatis, rugosis: subtus tomentosis, undatis, superne denticulatis *Lin. syst. ed. R. 4. p. 232.*

In nemorosis humidis copiose. Aprili.

20. *SALIX viminalis* foliis subintegerrimis, lanceolato linearibus, longissimis, acutis, subtus sericeis, ramis virgatis *Lin. syst. ed. R. 4. p. 233.*

Ad ripas fluminum & humidis locis infrequens. Plantata frequens *im Thiergarten* & prope *Spandau*. Aprili. Majo.

21. *SALIX alba* foliis lanceolatis, acuminatis, serratis, utrinque pubescentibus: ferraturis infinitis glandulosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 234.*

In viis publicis copiose. Aprili.

Offic. Cortex Salicis albæ. (Folia.)

DIANDRIA MONOGYNIA.

7

F R A X I N U S Lin. gen. 1273.

♂—♀. Calyx & Corolla O. Sem. 1. lanceolatum, alatum.

22. F R A X I N U S *excelsior* foliolis serratis, floribus apetalis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 356.

In via versus Schoenwald prope a ponte passim, & im Thiergarten frequens. Aprili.

Arber dioica. Nunquam flores hermaphroditos vidi.

Offic. Cortex Fraxini (*Lignum. Folia Semina* sub nomine *Lingua avis.*)

b. Flores petaloidei, rotati.

L I G U S T R U M Lin. gen. 18.

Cor. 4 fida. Bacca 4 sperma.

23. L I G U S T R U M *vulgare* foliis ovatis obtusis; panicula simpliciter trichotoma. Thunb. fl. jap. 17.

Ligustrum vulgare. Lin. syst. ed. R. 1. p. 18.

Im Thiergarten passim. Junio.

Offic. (Folia ♂ Flores Ligustri.)

S Y R I N G A Lin. gen. 22.

Corolla 4 fida. Capsula 2 locularis.

24. S Y R I N G A *vulgaris* foliis ovato cordatis, Lin. syst. ed. R. 1. p. 20.

β. Lilac flore albo Tournef. inst. 601.

In dumetis & sepibus frequens. Majo.

C I R C A E A Lin. gen. 25.

Cal. 2. phyllus superus. Cot. 2 petala Capsula bilocularis bivalvis disperma.

- 25. CIRCAEA** *Lutetiana* foliis cordato-ovatis, sub-serratis, pubescentibus.

Circaea lutetiana caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 23.*

Locis umbrosis im Thiergarten ad viam versus Charlottenburg passim. Julio. Augusto.

VERONICA *Lin. gen. 26.*

Corolla limbo quadripartito: lacinia infima angustiore. *Capsula* bilocularis, obcordata.

* *Spicatae.*

- 26. VERONICA** *maritima* spicis terminalibus, foliis oblongo-lanceolatis, inaequaliter serratis.

Veronica maritima spicis terminalibus, foliis ternatis, inaequaliter serratis. *Lin. syst. ed. R. p. 24.*

Prope Spandau auf dem Werder, & hinter dem Gewehrplan, ad ripas der Spree prope Strahlow passim. Julio. Augusto.

Variat foliis ternis, quaternis, & simpliciter oppositis. Foliis inaequaliter serratis, hanc Veronicae speciem a Veronica spuria distinguit Linneus. Interdum vero folia aequaliter serrata, & in V. spuria semper incisurae foliorum inaequales sunt. Differt itaque V. spuria a. nostra, foliis linear-lanceolatis, inaequaliter incisis, vel si mavis, foliis interrupte pinnatifidis.

- 27. VERONICA** *spicata* spicis terminalibus, foliis oppositis, crenatis, obtusis, caule adscendente simplicissimo. *Lin. syst. ed. R. I. p. 25.*

In ericetis der Jungfernheide, des Grunewalds, der Papenberge &c. frequens. Julio. Augusto.

Nonnunquam caulis vix digitalis, & folia pubescentia sunt.

28. VERONICA *officinalis* spicis lateralibus, foliis oppositis, caule procumbente *Lin. syst. ed. R. I. p. 26.*

Locis nemorosis frequens Junio. Julio.
Offic. Herba Veronicae.

* * *Corymbo-racemosae.*

29. VERONICA *serpillifolia* racemo terminali subspicato, foliis ovatis, glabris, crenatis *Lin. syst. ed. R. I. p. 29.*

In pratis humidis passim. v. g. prope Schoenberg, Reineckendorf &c. Majo.

30. VERONICA *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ovatis, planis, caule repente. *Lin. syst. ed. R. I. p. 30.*

In fossis inter portam Halensem & Lipsensem, in rivulis beym Gesurdbrunnen, & ad scaturigines in der Jungfernheide frequens. Junio. Julio.

Offic. Herba Beccabungae recens.

31. VERONICA *Anagallis* racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. I. p. 30.*

¶. racemo unico, foliis lanceolatis, crenatis.

In fossis, ante portam Halensem im Aufstall, in der Jungfernheide aliisque locis frequens.

¶. in turfosis inundatis in der Jungfernheide. Junio.

In varietate ¶. caulis vix digitalis, glaber, superne parum pilosus: folia linearis lanceolata ob-

folete crenata racemus unicus, quadri florus.
Corolla albida, apicibus rubicundis.

32. **V E R O N I C A** *scutellata* racemis lateralibus alternatis, pedicellis pendulis, foliis linearibus integrimis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 30.

In fossis ad Reineckendorf, Spandau, alibique frequens. *Hinterm Gesundbrunnen* copiose. Julio.

33. **V E R O N I C A** *Teucrium* racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis, dentatis, obtusifusculis, caulis procumbentibus *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 31.

In coemeteriis ad Pancko, Lüzow similibusve locis frequens. Junio,

Variat caule adscendente, & procumbente.

Offic. (Herba Veronicae Teucrui folio.)

34. **V E R O N I C A** *prostrata* racemis lateralibus, foliis oblongo-ovatis serratis, caulis prostratis *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 32.

In nemorosis frequens, praecipue *in der Juungfernheide & Thiergarten.* Majo. Junio.

Petala acuta.

35. **V E R O N I C A** *Chamaedrys* racemis lateralibus, foliis ovato-sessilibus rugosis dentatis, caule bifariam piloso. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 33.

Iisdem locis copiose. Majo. Junio.

Petala subrotunda.

* * * *Pedunculis unifloris.*

36. **V E R O N I C A** *agrestis* floribus solitariis; foliis cordatis, plerisque sessilibus, incisis, pedunculo brevioribus. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 34.

DIANDRIA MONOGYNIA.

ii

In agris, locisque cultis passim. Aprili.

37. **V E R O N I C A** *arvensis* floribus solitariis; foliis cordatis, petiolatis, incisis, pedunculo longioribus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 36.*

Iisdem locis rarius. Aprili.

38. **V E R O N I C A** *heredifolia* floribus solitariis; foliis cordatis planis, quinquelobis *Lin. syst. ed. R. 1. p. 36.*

In agris, arvis, hortis, locisque cultis copiose. Aprili. Interdum autumno.

39. **V E R O N I C A** *triphylllos* floribus solitariis; foliis digitato partitis, pedunculis calyce longioribus *Lin. syst. ed. R. 1. p. 37.*

In agris, versuris, inque hortis vulgaris. Aprili.

40. **V E R O N I C A** *verna* floribus solitariis; foliis digitato partitis, pedunculis calyce brevioribus *Lin. syst. ed. R. 1. p. 37.*

In collibus siccis, agris, & arvis arenosis. e. g. prope *Charlottenburg*, *Spandau*, & ante *portam oranienburgicam* haud infrequens. Aprili.

41. **V E R O N I C A** *acinifolia* floribus pedunculatis solitariis, foliis ovatis glabris crenatis, caule erecto subpilofo *Lin. syst. ed. R. 1. p. 38.*

In agris prope *Spandau* ante *portam Charlottenburgicam* ibidem passim. Aprili, Majo.

c. *Flores, nectario calcarato.*

O R C H I S. *Lin. gen. 1094.*

* *Bulbis indivisis.*

- 42.** *ORCHIS bifolia* bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus *Lin. syst. ed. R. 4. p. 5.*

In nemoribus umbrosis humidis; *in den Papenbergen* passim. In pratis humidis apricis ad *Rummelsburg* infrequens. Majo. Junio.

Offic. (Radix Satyrii.)

- 43.** *ORCHIS Morio* bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 8.*

In pratis versus *Stegliz* passim. Majo. Junio.

- 44.** *ORCHIS militaris* bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido punctis scabro: cornu obtuso, petalis confluentibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 10.*

Prope *Spandau* in pratis inter agros *bei der Nachthütung* hinc, inde. Majo.

Offic. Radix Salep.

** *Bulbis palmatis.*

- 45.** *ORCHIS latifolia* bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico, labio trilobo lateribus reflexis, bracteis flore longioribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 12.*

ꝝ. *Orchis palmata pratensis maculata Bauh. pin. 85.*

ꝝ. *Orchis palmata palustris altera & tertia Bauh. pin. 86.*

ꝝ. *Orchis palmata palustris latifolia Bauh. pin. 86.*

ꝝ. *Orchis palmata maculata Bauh. pin. 86.*

In omnibus fere pratis vulgaris. Majo.

46. *ORCHIS maculata* bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore; labio piano; petalis dorsalibus patulis. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 13.

Inter praecedente passim. Majo.

Offic. (Radix Palmatae.)

47. *ORCHIS conopsea* bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longiore: labio trifido; petalis duobus patentissimis. *Lin. syst. ed. R.*

4. p. 14.

Prope Spandau in pratis *hinter der Nachthütung* passim. Majo. Junio.

SATYRIUM Lin. gen. 1095.

Nectarium scrotiforme, s. inflato didymum pone florem.

48. *SATYRIUM repens* bulbis fibrosis, foliis ova-
tis, radicalibus, floribus secundis. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 20.

s. Orchis radice repente, foliis maculis nigris,
& albis adspersis *Menz pug. t. 3. f. 4. 5.*

In sylvaticis prope Tegel passim. Augusto.

OPHRY S Lin. gen. 1096.

Nectarium subtus carinatum.

* *Bulbis ramosis.*

49. *OPHRY S. Nidus avis* bulbis fibroso-fascicula-
tis caule vaginato aphylllo, nectarii labio bi-
fido. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 21.*

In nemorosis umbrosis, ad radices Alnorum & Coryli parasitica, *in den Papenbergen* passim.
Majo. Junio.

50. OPHRYS *spiralis* bulbis aggregatis oblongis, caule subfolioso, floribus spirali-secundis, nectarii labio indiviso crenulato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 22.*

In pratis ad *Rummelsburg* rarius Augusto. Julio.

51. OPHRYS *ovata* bulbis fibrosis, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 22.*

β . Ophrys trifolia *Bauh. pin. 87.*

Locis paludosis *im Thiergarten, Jungfernheide* & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. (*Herba Bifolii.*)

** *Bulbis rotundis.*

52. OPHRYS *paludosa* bulbo subrotundo, scapo subnudo pentagono, foliis apice scabris, nectarii labio integro. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 24.*

Locis turfosis *im Grunewald* passim. Julio. Augusto.

Variat, foliis nigro variegatis.

SERAPIAS *Lin. gen. 1097.*

Nectarium ovatum gibbum, labio ovato.

53. SERAPIAS *latifolia* bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 28.*

Im Thiergarten ad venatorem aulicum locis humidis frequens. *In den Papenbergen* copiose. Junio.

54. SERAPIAS *Lonchophyllum* bulbis fibrosis, foliis ovato-lanceolatis, bracteis longitudine capsulae, floribus erectis: nectarii labio obtuso petalis breviore. *Lin. suppl. pl. 405.*

Serapis grandiflora bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis, nectarii labio obtuso petalis breviore. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 30. a.*

In pratis versus *Hasenheide* frequens, & prope *Spaudau* passim. Junio.

55. SERAPIAS *rubra* bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis nectarii labio acuto. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 32.*

In den Papenbergen passim, ad *Tegel* novo in plantario frequeus. Julio.

PINGUICULA *Lin. gen. 33.*

Calyx 2 labiatus quinquefidus. *Corolla* ringens calcarata. *Capsula* unilocularis.

56. PINGUICULA *vulgaris* nectario cylindrico longitudine petali. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 50.*

In pascuis hinter der Fasanerie ad viam versus *Grunewald* passim. Majo. Junio.

UTRICULARIA *Lin. gen. 34.*

Cal. 2 phyllus aequalis. *Cor.* ringens calcarata, *Capsula* unilocularis.

57. UTRICULARIA *vulgaris* nectario conico, scapo paucifloro *Lin syst ed R. 1. p. 51.*

Inter *Fridriehsfelde* & *Strahlow*, im *Grunewald* & *Jungfernheide* frequens in fossis. Julio.

58. UTRICULARIA *minor* nectario carinato. *Lin. syst. ed R. 1. p. 55.*

Prope venatorem Philipp in der Jungfernheide locis humidis turfosis frequens, ibidem prope pontem destructum passim. Junio.

d. Flores monopetali sublabiati.

GRATIOLA Lin. gen. 30.

Calyx 7 phyllus: 2 exterioribus patulis. *Cor.* irregularis resupinata. *Stam.* 2 sterilia. *Cap-* *sula* bilocularis.

59. GRATIOLA officinalis foliis lanceolatis serratis, floribus pedunculatis. Lin. syst. ed R. I. p. 47. In pratis humidis frequens. v. g. ante portam Halensem im Aufstall. vorm Unterbaum, prope Spandau &c. Julio.

Offic. Herba Gratiolae. (*Gratia Dei.*)

VERBENA Lin. gen. 35.

Calycis dens unicus truncatus. *Cor.* infundibuli-formis subaequalis curva. *Stamina* saepius 4. *Sem.* 4. nuda.

60. VERBENA officinalis tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido laciniatis, caule solitario. Lin. syst. ed R. p. 55.

Ad pagos, locis ruderatis frequens. Julio. Augusto.

Offic. Herba Verbena.

LYCORUS Lin. gen. 36.

Corolla 4 fida: lacinia unica emarginata. *Sta-* *mina* distantia. *Semina* 4. retusa.

DIANDRIA MONOGYNIA. 17

61. *Lycopus europaeus* foliis sinuato-ferratis.

Lin. syst. ed. R. I. p. 6.

Ad *Schoenbergs*, *Rummelsburg*, *Charlottenburg*,
Spandau & alibi in pratis humidis inque fossis
frequens. Julio.

SALVIA Lin. gen. 42.

Corolla ringens inaequalis. *Filamenta* transverse
pedicello affixa.

62. *Salvia pratensis* foliis cordato-oblongis cre-
natis: summis amplexicaulibus, verticillis
subnudis, corollis galea glutinosis. *Lin. syst.*
ed. R. I. p. 65.

$\beta.$ *Horminum pratense*, foliis profunde incisis.

Bauh. pin. 238.

$\gamma.$ Flore albo.

Ad viam versus *Britz*, *an den Rollbergen*, *in der*
Spandauerheide ad littora *der Havel* & alibi
copiose. Varict. $\beta.$ & $\gamma.$ rarius. Junio.

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM Lin. gen. 46.

Cal. Gluma 2. *valvis*, 1 *flora*. *Cor. Gluma* 2. *val-*
vis acuminata. *Sem. 1.*

63. *Anthoxanthum odoratum* spica oblongo-
ovata, flosculis subpedunculatis arista longio-
ribus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 74.*

In pascuis, pratis, locis nemorofis, & alibi co-
piose. Aprili. Majo.

CLASSIS III.

TRIANDRIA
MONOGYNIA.a. *Flores superi.*

VALERIANA Lin. gen. 48.

Cal. O. Cor. 1. petal. basi hinc gibba. **Semen** 1.
 * *Legitimae semine papposo.*

64. **VALERIANA dioica** floribus triandris dioicis,
 foliis radicalibus subintegris & pinnatifidis,
 caulinis pinnatis: pinnis integerrimis.

Valeriana dioica floribus triandris dioicis, foliis
 pinnatis, integerrimis Lin. syst. ed. R. 1. p. 85.
 In pratis humidis im Thiergarten, Jungfernheide
 & alibi copiose. Majo.

Flores apud nos semper dioici, rarissime herma-
 phrodit. *Celebr. Scopoli* semper hanc plan-
 tam, floribus hermaphroditis, uno altero ve
 sexu castrato vidit.

65. **VALERIANA officinalis** floribus triandris foliis
 uniformibus pinnatis: pinnis dentatis.

Valeriana officinalis floribus triandris, foliis om-
 nibus pinnatis Lin. syst. ed. R. p. 86.

In nemorosis humidis, e. g. ante portam Ha-
 lensen im Aufstall, prope Spandau & alibi
 passim. Junio.

Offic. Radix Valerianae minoris.

** *Locusta*, *caule dichotomo, semine nudo.*

66. *VALERIANA olitoria* floribus triandris, caule dichotomo, foliis oblongis integerrimis, fructu simplici.

Valeriana Locusta olitoria floribus triandris, fructu simplici. *Lin. syst. ed. R. I. p. 89. a.*
a. Foliis superioribus, ad basin versus obsolete dentatis.

In agris, arvis, locisque cultis frequens. Varietas a. rarius. Majo.

67. *VALERIANA dentata* floribus triandris, caule dichotomo, foliis serratis oblongis, semine tridentato.

Valeriana Locusta dentata caule dichotomo, foliis oblongis subserratis, semine corona tridentata.

*Lin. syst. ed. R. I. p. 89. **

In agris ad *Spandau* frequens. Majo.

Valerianas caule dichotomo, semine pappo destituto, sub nomine *Locusta* amplectitur *Linneus*; etsi omnes ab *Ilo* indicatae varietates, specie differunt. Hac de re, nomen hoc delivi, et eo ad genus subdividendum utor. *Perrill Haller*, *Pollich* & alii sub nomine *Valerianellae* genere separarunt, lubenter eos, haud nego secutus essem, nisi natura ipsa, maximam ob affinitatem, aliis cum speciebus, hoc vetaret.

IRIS. Lin. gen. 65.

Corolla 6. partita: petalis alternis reflexis.

Stigmata 3. partita, petaliformia.

68. *IRIS Pseudacorus* corollis imberibus, petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 107.

In paludibus, fossisque uliginosis. v. g. *im Thiergarten*, *Fungfernheyde* & alibi frequens. Majo.

Offic. (*Radix Iridis nostratae. f. Acori palustris.*)

69. *IRIS sibirica* corollis imberibus, germinibus trigonis, caule tereti, foliis linearibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 108.

Locis paludosis *in den Papenbergen* passim, & prope *Rummelsburg* rarius. Majo.

b. Flores inferi.

POLYCNEUM Lin. gen. 59.

Calyx persistens, 5 phyllus; foliolis 2 alternis minoribus. *Corolla* nulla. *Semen* 1. membra na tenuissima vestitum.

70. *POLYCNEUM arvense* caule diffuso, foliis triangularibus.

Polycnemum arvense. Lin. syst. ed. R. I. p. 96.

In agris editioribus inter *den Rollbergen*, & *Hassenheide* frequens. Ante portam Halensem & versus *Pancko* rarissime. Augusto.

c. Gramina, spicis dense imbricatis.

SCIRPUS Lin. gen. 73.

Gal. 1. valvis: *glumis* paleaceis undique imbricatis. *Cor.* O. *Sem.* 1. imberbe triquetrum, setis circumdateum.

* *Spica unica.*

71. *Scirpus palustris* culmo tereti nudo, spica subovata terminali. *Lin. syst. ed R. I.* p. 150.

In fossis, locisque inundatis ante portam Halensem, im Thiergarten, vorm Unterbanm, & alibi frequens. Majo. Junio.

72. *Scirpus Boeothryon* culmo tereti striato nudo basi vaginato, vagina truncata, spica terminali pauciflora bivalvi; valvulis ovatis spica brevioribus margine scariosis: exteriori breviori *Lin. suppl. pl.* p. 103.

Ab amico accepi, sed locus natalis me fugit.
Forte ante portam Halensem im Aufstall, vel im Grunewald. Junio.

73. *Scirpus acicularis* culmo tereti nudo setiformi, spica ovata bivalvi, seminibus nudis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 132.

Ad paludes in der Jungfernheide bei den Rehbergen frequens. Julio. Augusto.

74. *Scirpus caricis* culmo nudo subtriquetro, spica disticha involucro monophyllo. *Retzii prodrom. fl. scand.* n. 56.

Schoenus compressus culmo subtriquetro folioso, spica disticha, spiculis multifloris, involucro monophyllo. *Huds. angl. ed. 2.* p. 15. n. 4.
Lin. syst. ed. R. I. p. 121.

- . In der Jungfernheide, in pratis hinter Staaken, prope Spandau vor Haaks Meyerei, & alibi passim. Junio.

*** *Culmo tereti polystachyo.*

75. *SCIRPUS lacustris* culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus.
Lin. syst. ed. R. I. p. 132.

- a. *Scirpus palustris altissimus.* Scheuchz. agrost. 354.
b. *Scirpus palustris humilior.* Scheuchz. agrost. 356.

Ad ripas inundatas *der Spree & Havel* frequens v. g. prope *Rummelsburg, Strahlow, Tegel, Spandau &c.* b. *in der Jungfernheide* locis paludosis passim. Julio. Augusto.

76. *SCIRPUS setaceus* culmo nudo setaceo, spica terminali sessili. *Lin. syst. ed. R. I. p. 134.*

In humidiusculis ad *Schoeneberg, hinter Falkenhagen*, in via versus *Bredow* passim. Julio. Augusto.

*** *Culmo triquetro, panicula foliacea.*

77. *SCIRPUS sylvaticus* culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 139.*

In den Papenbergen, & im Grunewald frequens. Majo. Juuio.

TYPHA *Lin. gen. 1131.*

♂—♀. ♂. Ament. cylindricum. Cal. 3 phyllus setaceus. Corolla nulla.

♀. Ament. Cal. & Cor. maris. Semen 1. Pappus inversus capillaris.

78. *TYPHA latifolia* foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 94.

In paludibus ad *Tegel*, *Briselang*, & in der *Jungfernheide* alibi frequens. Julio.

79. *TYPHA angustifolia* foliis semicylindricis, spica mascula femineaque remotis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 94.

In der *Jungfernheide*, *Grunewald*, in parco ad *Doebriz* & alibi frequens. Julio.

ERIOPHORUM. *Lin. gen. 74.*

Cal. 1. valvis: glumis paleaceis undique imbricatis. *Cor.* O. *Sem.* 1. lana longissima cinctum.

80. *ERIOPHORUM vaginatum* culmis vaginatis teretibus, spica scariosa. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 142.

a. *Juncus alpinus* capitulo tomentoso majori. *Scheuchz. agrost. app. tab. 7. f. 2.*

b. *Juncus alpinus* capitulo lanuginoso, seu *Schoenagurus*. *Scheuchz. agrost. app. t. 7. f. 1.*

In humidiusculis turfosis in der *Jungfernheide*, im *Grunewald*, *Spandauerheide*, prope den *Teufelssee*, inter *Schoeneberg* & *Fasanerie* abunde. Aprili. Majo.

81. *ERIOPHORUM polystachyon* culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 143.

b. *Linagrostis panicula minori*. *Vaill. paris.* tab. 16. fig. 2.

71. *Linagrostis pappo rario*. *Scheuchz. agrost.*
p. 308.

In uliginosis turfosis *in der Jungfernheide, Grunewald*, & alibi copiose. Aprili, Majo.

SCHOENUS Lin. gen. 71.

Cal. 1. valvis: glumis paleaceis congestis. *Cor. O.*
Semen 1. subrotundum,

82. *SCHOENUS albus* culmo subtriquetro folioso,
floribus fasciculatis, foliis setaceis. *Lin. syst.*
ed. R. I. p. 122.

In turfosis *des Grunewalds* frequens. Julio.

Calyx universalis unico brevi sit folio. *Glumae*
florales fere tres, aristatae, intra eas *semen*
piriforme. *Setae circum semen decem*, se-
mine longiores, tertius flosculus serius matu-
ratur. *Haller. helo 1341.*

CYPERUS Lin. gen. 72.

Cal. 1. valvis: glumis paleaceis distiche imbrica-
tis. *Cor. O.* *Semen* 1. nudum,

83. *CYPERUS flavescens* culmo triquetro nudo,
umbella triphylla, pedunculis simplicibus
inaequalibus, spicis confertis lanceolatis. *Lin.*
syst. ed. R. I. p. 127.

Locis uliginosis, paludosis frequens. Julio.
Augusto.

84. *CYPERUS fuscus* culmo triquetro nudo, um-
bella trifida, pedunculis simplicibus inaequa-
libus, spicis confertis linearibus. *Lin. syst.*
ed. R. I. p. 127.

Iisdem locis, eodemque tempore. *In der Jungfernheide & prope Reineckendorf rarius.*

Praecedenti simillimus, differt umbellis minoribus magis compressis, spicis linearibus, foliis scabriusculis, culmo minori.

CAREX. Lin. gen. 1137.

♂—♀. ♂. *Ament.* imbricatum. *Cal.* 1 phyll.
Cor. O.

♀. *Ament.* *Cal.* & *Cor.* ut in flore mascula. *Nect.* inflatum 2. dentatum. *Stigmata* 2. 3. *Sem.* triquetrum intra nectarium.

* *Spicis androgynis.*

85. *CAREX disticha* spica composita subdisticha, spiculis ovatis subimbricatis androgynis, folio longiori instructis, culmo triquetro. *Huds.* angl. ed. 2. p. 403. ed. 1. p. 347. *Schreb.* *spicil. fl. lipſ. 63.*

Carex spicata spica composita, spiculis ex subrotundo ovatis, numerosis, confertis, in summo scapo cohaerentibus, sessilibus, androgynis nudis. *Pollich. pal. tom. 2. p. 562. n. 875.*

Carex arenaria Leers herborn. 195. t. 14. f. 2.

Versus Spandau in pratis paludosis prope den Stern & alibi passim. Majo.

Stigma bifidum.

Difserit a Carice arenaria: spicis remotioribus spiculis sudistichis magis obtusis, bractea spica longiori & foliis angustioribus. Non confundenda cum Carice spicata. *Huds. angl. ed.*

*Withering. brittan. 2. p. 566. & Relhan. cantab.
n. 686.*

86. *CAREX arenaria* spicis compositis, spiculis androgynis ovato-acutis: inferioribus remotioribus, folio longo instructis, culmo triquetro. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 100.*

In campis arenosis, locisque gramineis *im Thiergarten* & alibi copiose. Majo.

Stigma bifidum.

Radix recens vulnerata, odorem Therebinthinae venetae similem spargit.

Offic. Radix Graminis majoris, seu Caricis arenariae.

87. *CAREX leporina* spica composita, spiculis ova-tis sessilibus approximatis alternis, androgynis nudis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 101.*

Locis humidis *im Thiergarten* & alibi frequens. Majo.

Stigma bifidum.

88. *CAREX praecox* spica composita disticha nudiuscula, spiculis contiguis androgynis teretibus rectis, culmo superne nudo. *Schreb. spicil. 63. n. 1010.*

Prope Spandau locis editioribus ante portam Berolinensem & in der Jungfernheide passim. Martio, Aprili.

Stigma bifidum.

88. *CAREX vulpina* spica supradecomposita inferne laxiore: spiculis androgynis ovato-

TRIANDRIA MONOGYNIA. 27

glomeratis superne masculis. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 102.

Locis humidis & ad ripas fluviorum prope Rum-
melsburg, Spandau, Schoeneberg & alibi pa-
sim. Majo. Junio.

Stigma bifidum.

90. CAREX *paniculata* racemo composito, spiculis
androgyinis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 105.*

Carex *spica paniculata*. *Hall. helv. n. 1368.*

Im Elsbruch versus Falkenhagen passim. Majo.
Junio.

Stigma bifidum.

91. CAREX *elongata* spiculis oblongis sessilibus,
remotis androgyinis, capsulis ovato-acutis.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 104.

Carex spicis ovatis, imis remotis, supremis con-
gestis. *Hall, helv. n. 1359.*

Ibidem passim. Majo. Junio.

Spiculae oblongae 8. 9. 10 florae. Squamae ob-
longae, obtusae, albido flavescentes, nervo
viridi elevato, capsulis minores. Capsulae
oblongae, obsolete trigonae, subconvexae,
acumine longe producto.

Stigma bifidum.

92. CAREX *caneicensis* spiculis subrotundis sessilibus
obtusis androgyinis, capsulis ovatis obtusiuscu-
lis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 104.*

Prope Spandau passim. Majo. Junio.

Spiculae subrotundae, inferne remotae, superne

flavescentes, seta terminatae, nervo viridi,
longitudine capsularum.

Capsulae oblongae convexae, acumine brevi.
Stigma bifidum.

93. CAREX *remota* spicis ovatis subfessilibus, re-
motis, androgynis, bracteis culmum aequan-
tibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 103.

Carex axillaris spiculis ovatis fessilibus remo-
tis androgynis, bracteis culmum aequantibus,
Lin. spec. pl. 1382.

Prope Tegel & in den Papenbergen ad viam infe-
riorem passim. Majo. Junio.

Stigma bifidum.

94. CAREX *muricata* spiculis sub-ovatis fessilibus,
remotis androgynis, superne masculis, inferne
femineis, capsulis acutis bicuspidatis.

Carex muricata spiculis subovatis fessilibus, re-
motis, androgynis, capsulis acutis divergen-
tibus spinosis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 102.

Locis humidis *in der Jungfernheide* praecipue
in der Charlottenburger Allee frequens. Ma-
jo. Junio.

Radix fibrosa. Culmi florentes minutissimi, fructu
maturo vix digitales. Folia glabra, culmo lon-
giora. Spicae 3. aut. 4. superne masculae.
Squamae capsulis minores.

Capsulae compressae, acumine longo bifido.
Stigma bifidum.

95. CAREX *Leersii* spicis subovatis fessilibus remo-
tis androgynis, inferne masculis, superne

femineis, capsulis aoutis simpliciter mucronatis.

Carex muricata. Leers herborn. 709. t. 14. f. 8.

Pollich. pal. tom. 2. n. 877. Relhan. cantab.
682.

Carex spicis ternis echinatis, glumis lanceolatis, capsulis mucrone simplici. Hall. helv.
n. 1366.

Ehrhart hanoev. Magaz. 1780. 84. Stück. p.
1330.

Prope Spandau rarius. Majo. Junio.
Stigma bifidum.

Difserit a praecedenti: culmo majori, spiculis inferne masculis, & capsulis simpliciter mucronatis.

* * *Spicis sexu distinctis: femineis sessilibus.*

96. CAREX flava spicis confertis subfessilibus, subrotundis: mascula linearis, capsulis acutis recurvis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 106. Leers herb.
714. t. 15. f. 6. (*figura non optima, capsulae nimis obesaæ.*)

In pratis prope Spandau hinterm Gewehrplan, ad lacum magnum inter Staaken, & Doebriz, etiamque in pratis prope Ruhleben frequens= Aprili. Majo.

Stigma trifidum.

Squamae obtusæ fuscae, capsulis minores.

Capsulae ventricosae striatae, acumine longo apice bifido.

97. CAREX *digitata* spicis linearibus erectis: mascula breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. Lin. syst. ed. R. 4. p. 106.

Stigma trifidum.

Im Charlotteuburger Schlossgarten, & in den Papenbergen passim. Majo. Aprili.

98. CAREX *montana* spicis feminineis subsolitariis sessilibus, ovatis, masculis approximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. Lin. syst. ed. R. 4. p. 107.

In der Jungfernheide & Hasenheide passim. Aprili.

Stigma trifidum.

Spica mascula terminalis erecta oblonga; squamis fuscis, obtusis, nervo luteo. Spicae feminineae ovatae sessiles approximatae, plerumque binae rarius unica. Squamae oblongae obtusae, fuscae, interdum filo brevissimo terminatae, margine diaphano, membranaceo. Capsulae subtrigonae, pilis albidis brevissimis obsitae.

99. CAREX *ericetorum?* spica mascula terminali obverse-ovata, obtusa, feminineis sessilibus ovatis, capsulis pubescentibus. Pollich. pal. 2. n. 886.

In den Papenbergen rarius. Aprili. Majo.

Stigma trifidum.

Descriptio Celebr. Pollichii satis bene cum nostra specie conuenit: sed strobilus & calyx

et icon illius minime respondent. In nostra specie, caulis digitalis & ultra. Spica mascula terminalis oblongo-ovata; squamis obtusis fuscis nervo luteo. Spicae femineae solitariae vel geminatae, masculae approximatae. Squamae subrotundo-oblongae, acutae. Capsulae pubescentes.

100. *CAREX pilulifera* spicis confertis, mascula oblonga, femineis subrotundis sessilibus, culmo nudo.

Carex pilulifera spicis terminalibus confertis subrotundis: mascula oblonga. Lin. syst. ed. R. 4. p. 109. Relhan cantab. n. 689.

In der Spandauerheide frequens, Majo.

Stigma trifidum.

Radix fibrosa. Culmus pedalis, anceps, hinc planus, inde convexus, obsolete triquetrus striatus, glaber, nudus. Folia ad radicem fasciculata, linear-lanceolata, lata, glabra, nervosa, longitudine dimidi culmi. Spicae confertae, terminales, & conglobatae; Mascula unica oblonga; squamis oblongo-lanceolatis rufis, nervo luteo, margine membranaceo albo diaphano; Femineae 3. 4. sessiles, spicae masculae approximatae, oblongo subrotundae, infima bractea spica longiori instruete. Capsulae ventricosae obsolete trigonae, hirtae mucronatae; mucrone brevissime hispida. Squamae longitudine capsularum

oblongae, flavescentes, seta terminatae, nervo viridi. vid. TAB. I fig. 1.

Carex pilulifera Leyss. fl. halens. ed. 2. n. 951.
est longe alia species.

101. CAREX *filiformis* spica mascula oblonga feminis sessilibus inferiore folio proprio breviore.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 108. Leers herborn. 718.
t. 16. f. 5.

Cyperoides sylvaticum tenuifolium, spicis parvis tenuibus spadiceo-viridibus. Scheuchz. *agrost.*
425. t. 10. f. 11.

In der Jungfernheide passim, *in den Papenbergen*
& ad *Spandau* copiose. Aprili. Majo.

Spica mascula: squamis flavescentibus linearie-lanceolatis apice truncatis. Spicae feminae oblongae geminatae: squamis fuscis oblongis nervo viridi, apice seta instratis. Capsulae hirtae.

Stigma trifidum.

102. CAREX *aspera* spica mascula solitaria longe pedunculata, linearie; feminis remotis subternatis, oblongis, capsulis squamis majoribus, culmo retrorsum hispido.

In pratis prope Spandau hinter den Schülerbergen magnos formans cespites. Majo.

Culmus sesquipedalis, triquetus, striatus, nudus: angulis retrorsum hispidis. Folia linearie-lanceolata caespitosa. Spica mascula terminalis solitaria, longe pedunculata, subnutans, linearis: squamis albo-flavescentibus

oblongo lanceolatis, nervis pluribus fuscis. Spicae femineae binae, vel tres cylindricae dense imbricatae, sessiles, erectae, infima maxima $\frac{3}{4}$ unicalis bractea longa instructa, tercia si adeat minutissima prope masculana, circiter floribus 4 aut 5. Squamae oblongo-lanceolatae fuscae nervo margineque albido, capsulis minores. Capsulae glabrae subrotundae, acumine brevi. vid. TAB. I. fig. 2.

Stigma trifidum.

103. *Carex splendida* spicis remotis, mascula subsolitaria linearis; femineis geminatis ovatis, capsulis bifidis, lana splendida testis, bracteis longissimis.

In der Spandauerheide versus den Papenbergen in palude copiosissime. Majo.

Culmus sesquipedalis & ultra, triquetus, glaber striatus. Spica mascula unica, interdum duplex linearis lanceolata, si altera adeat minutissima magis oblonga. Squamae masculae spicae, oblongo lanceolatae, flavescentes, nervis tribus fuscis. Spicae femineae duae sessiles remotae bracteatae. Bractea primae spicae triplo ista longior; infimae omnibus multo longior. Capsulae oblongae obsolete triquetrae, apice bifidae, lana ferruginea splendida testae. Squamae capsulis minores, ovatae, acutae, atrofuscæ, nervo albido. vid. TAB. I. fig. 3.

*** *Spicis sexu distinctis, femineis pedunculatis.*

104. *CAREX elegans* spicis pendulis, mascula erecta linearis; femineis geminatis pendulis, capsulis distichis acuminatis, squama minoribus.

Cyperoides spica pendula, breviore, squamis e spadiceo vel fusco rutilante viridibus. *Scheuchz.* agrost. 443. t. 10. f. 13?

Gramen cyperoides spica pendula breviore minus.

C. Bauh. theatr. 85?

B. Spica feminea unica.

Locis turfosis humidis *im Grunewald & Jungfernheide* frequens. Aprili. Majo.

Culmus pedalis vel sesquipedalis, obsolete trigonus, striatus, glaber. Spica mascula solitaria linearis erecta: squamis oblongis fuscis acutis, margine membranaceis dense imbricatis. Spicae femineae binae planae pendulae remotae, oblongae. Capsulæ oblongæ obsolete-triquetrae, distichæ, glaberrimæ, obtusæ, mucronatae. Squamae concavæ, oblongæ, acutæ, rufæ, capsulis majores. Bractea unica ad infimam spicam subulata, spicis femineis longior. vid. TAB. I. fig. 4.

Stigma trifidum.

105. *CAREX Pseudo Cyperus* spicis pendulis, mascula erecta linearis, femineis geminatis cylindricis pendulis, capsulis sulcatis, mucronatis.

Carex Pseudo Cyperus spicis pendulis, pedunculis geminatis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 112.

β. Spicis femineis ternis, quaternisve.

γ. Spica feminea unica.

In fossis locisque paludosis *im Thiergarten*, prope *Tegel*, *Ruhleben*, & *ad Doebriz* frequens.

April. Majo.

Spica mascula terminalis erecta; squamis lanceolatis acuminatis, pallidis. Spicae femineae solitariae 2. 3. vel etiam 4. cylindricae. Capsulae oblongae, glabrae, sulcis exaratae, mucronatae, bifidae. Squamae longitudine capsularum setaceae, margine hispidae, virides.

Stigma trifidum.

106. CAREX *pallerens* spicis pendulis; mascula erecta, femineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 110. *Leers herborn.* 721. t. 15. f. 4.

In pratis prope *Spandau hintern Gewehrplan*, & *in den Papenbergen*. Majo.

Stigma trifidum.

Spica mascula erecta linearis: squamis stramineis ovatis pilo terminatis. Spicae saepissime geminatae subnutantes; prima bractea subulato setacea spica longiori instructa; altera bractea linear-lanceolata spicis omnibus longiori donata. Squamae capsulis minores ovato-oblongae stramineae, nervo viridi, acuminatae. Capsulae trigonae glabrae obtusae.

107. CAREX *caespitosa*? spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 112.

Prope Spandau in pratis hinter den Schülerbergen. Majo.

Culmus fere pedalis obsolete triquierter, nudus, & glaber. Folia linear-lanceolata, nervosa, glabra triuncialia, ad radicem posita.

Spica mascula unica terminalis, linearis: squamis stramineis, oblongis, concavis obtusis dense imbricatis. Spicae femineae pedunculatae erectae, cylindricae; infima bractea femineis longiori instructa subulata. Capsulae ventricosae triquetrae spadiceae, mucrone brevissimo: squamis longitudine capsularum, viridibus nervo luteo, ovatis, acutis. vid.

TAB. II. fig. 5.

Stigma trifidum & bifidum.

108. CAREX *panicea* spicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capsulis obtusifusculis inflatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 111.

Leers herborn. 722. t. 15. f. 5.

Locis uidis im Thiergarten, Jungfernheide, prope Spandau in pratis hinterm Gewehrplan & alibi copiose. Majo.

Spica mascula oblonga, unica, terminalis: squamis oblongis obtusis pallide fuscis striis duabus spadiceis. Spicae femineae plerumque geminatae, interdum solitariae. Capsulae

squamis oblongis acutis spadiceis nervo & margine albido, capsulis minores.

Stigma trifidum.

109. CAREX *mutabilis* spica mascula nutante, cylindrica, longissima: femineis cylindricis, capsulis squamis longioribus, culmo acute triquetro.

- α. Spica mascula cylindrica nūtante; femineis geminatis pedunculatis nutantibus.
- β. Spica terminali mascula inferne feminea; femineis quinatis cylindricis subfessilibus minutis.

In pratis & fossis prope *Spandau hinter den Schüllerbergen* rarius. Majo.

Culmus bipedalis & ultra, acute triqueter, striatus: angulis retrorsum scabris. Folia linearis subulata nervosa, costa medio instrueta, margine retrorsum hispida, longissima. Spicae valde variabiles. Squamae spicae masculae concavae, lanceolatae, stramineae striis fuscis. Capsulae oblongae, gibbae, glabrae, trigonae, mucrone brevissimo. Squamae capsulis minores, oblongo-lanceolatae spadiceae, nervo viridi. Bracteae longissimae.

Stigma trifidum.

In varietate α spica mascula terminalis, quadriuncialis, cylindrica, nutans, rarissime uno alterove flore femineo. Spicae femineae geminatae pedunculatae nutantes, quadriuncia-

floribus alternis, superne densioribus: floribus imbricatis. TAB. II. fig. 6.

In varietate 3. spica terminalis androgyna cylindrica, 4 uncialis, nutans; floribus inferne femineis, bracteis longissimis instructis; superne masculis dense imbricatis. Spicae femineae quator vel quinque, remotae, subsessiles, cylindricae. Tria superiora 6 linearia sessilia ovata. Bina inferiora uncialia brevissime pedunculata cylindrica. Bracteae culmo multo majores. vid. TAB. III. fig. 7.

110. CAREX *distans* spicis remotissimis subsessilibus bractea vaginali, capsulis angulatis mucronatis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 112.

Stigma trifidum.

Ad Doebriz & in den Papenbergen infrequens.

Majo. Junio.

**** Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.

111. CAREX *acuta* spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 113.

a. Carex *acuta* spicis masculis pluribus, obtusis, squamis obtusiusculis, caule acutangulo. Curtis Flor. Lond. Relhan cantab. 698. Carex *acuta nigra*. Leers herborn. t. 16. f. 1.

3. Carex *riparia* spicis masculis pluribus triquetris nigricantibus, acutis, squamis aristato-acuminatis, capsulis subinflatibus, bicornibus. Curtis Flor. Lond. Relhan cantab. 697. Carex *acuta rufa*. Leers herborn. t. 16. f. 2.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald, & alibi copiose. ♂. in pratis humidis. ♀. in fossis aquisque stagnantibus. Majo. Junio.

Stigma bifidum.

112. CAREX *glauca* spicis maribus una, pluribus, feminis pendulis, capsulis ovato-triquetris, confertis. *Pollich. pal. 2.* p. 594. n. 894. *Leysser halens. ed. 2.* p. 237. n. 960.

Carex glauca culmo subtriquetro; spicis pendulis, pedunculatis, fuscis; capsulis obtusis. *Scop. carn. ed. 1.* p. 214. n. 8. *ed. 2. tom. 2.* p. 223. n. 1157.

Carex limosa ♀. *pallida.* *Retz prod. fl. Scand.* 180. n. 1045. *Oeder dan.* 444.

In pratis humidis ad Spandau & in der Jungfernheide passim. Majo. Junio.

Spica mascula saepissime geminata, cylindrica: squamis oblongis, obtusis, fuscis, nervo viridi. Spicæ femineæ duae pedunculatae. Capsulae oblongae, glabrae, trigonae, virides: squamis ovato-acutis fuscis nervo viridi.

Stigma trifidum.

113. CAREX *vesicaria* spicis masculis pluribus, feminineis pedunculatis, capsulis striatis glabris inflatis, rostro bifido.

Carex vesicaria spicis masculis pluribus, feminineis pedunculatis, capsulis inflatis, acuminatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 114.

Locis paludosis. v. g. *im Thiergarten, Grunewald,*
in der Jungfernheide, prope Rummelsburg,
Spandau & alibi frequens. Majo. Junio.

Stigma trifidum.

Capsulae masculae binae, linear-lanceolatae:
 squamis oblongo-lanceolatis stramineis, nervo
 pallido. Spicae femineae tres remotae peduncu-
 latae oblongae. Capsulae oblongae inflatae
 striatae acuminatae, acumine bifido: squamis
 oblongis fuscis, nervo viridi, seta terminatis.

114. CAREX *sylvatica* spieis pedunculatis, mascula
 erecta, femineis filiformibus laxis pedunculo
 brevioribus, capsulis ovatis aristatis furcatis.
Huds. angl. ed. 2. tom. 2. p. 411. n. 28. Rel-
han. cantab. 695.

Carex vesicaria β. culmo longissimo, spicis tenui-
 bus remotis. *Linn. syst. ed. R. 4. p. 114.*

Carex capillaris. *Leers herborn. 720. t. 15. f. 2.*

Carex patula. *Scop. carn. ed. 2. n. 1160. t. 59.*
 minime hic pertinet, descriptio & figura ad
 nostram haud quadrant.

Prope Tegel, & *in den Papenbergen* rarius.
 Majo. Junio.

Stigma trifidum.

Culmus triquierter striatus inferne glaber, superne
 scaber. Spica mascula subsolitaria, oblonga:
 squamis oblongis acutis, membranaceis dia-
 phanis, nervo viridi. Spicae femineae ple-
 rumque quatuor lineares longissime peduncu-
 latae. Capsulae triquetrae glabrae ventrico-

sae; apice longe produ^{to} bifido: squamis membranaceis oblongis seta terminatis, nervo viridi, longitudine capsularum.

115. CAREX *hirta* spicis remotis: masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 115.

In campis arenosis, ad vias, prope Schoeneberg, Charlottenburg, Wedding, & alibi copiose. Majo. Junio.

Stigma trifidum.

Squamae spicarum muscularum pilosae, fuscae, oblongae, nervo viridi. Capsulae subrotundae, ventricosae, striatae, hirtae, acumine longe produ^{to}, bifido. Squamae oblongae glabrae virides, margine fusco, apice setaceae.

Radix repens & ei Caricis arenariae similis, sed recens inodora.

SPARGANIUM. *Lin. gen. 1132.*

♂. Amentum subrotundum. *Cal. 3 phyllus.*
Cor. O.

♀. Ament. *Cal. & Cor. maris Stigma 2 fidum.*
Capsula coriacea 1—2 sperma.

116. SPARGANIUM *erectum* foliis erectis, linearilanceolatis, nervo elevato.

Sparganium erectum foliis erectis triquetris. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 95.

Sparganium ramosum. *Bauh. pin. 15.*

In paludibus, fossis, similibusve locis frequens.

Variet. s. in fossis inter portam *Halensem* & *Lipsensem* rarius. Junio. Julio.

117. SPARGANIUM *natans* foliis decumbentibus, linearibus obtusis.

Sparganium natans foliis decumbentibus planis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 95.

In der *Jungfernheide*, fossis innatans. Julio. Augusto.

Caulis nuncquam ramosus. Amenta feminea 2, rarius 3; masculum 1. rarius 2.

d. *Gramina spicis gracilibus; floribus sparsis.*

NARDUS. *Lin. gen. 75.*

Cal. O. Cor. 2 valvis. Sem. 1. corolla adnatum.

118. NARDUS *stricta* spica setacea, recta secunda,

Lin. syst. ed. R. 1. p. 144.

In arenosis sterilibus ad *Schoeneberg*, im *Thiergarten*, *Jungfernheide*, alibique copiose, Junio. Julio.

DIGYNIA.

a. *Gramina floribus unifloris vagis.*

PHALARIS. *Lin. gen. 80.*

Cal. 2 valvis carinatus, longitudine aequalis corollam includens.

119. PHALARIS *canariensis* panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. *Lin. syst. ed. R. 1.*

Passim culta occurrit, in ruderatis interdum ac si spontanea. Julio. Augusto.

Offic. Semen canariense.

120. *PHALARIS arundinacea* panicula oblonga ventricosa ampla. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 150.

ꝝ. *Phalaris picta*.

In pratis inundatis prope *der Charite* & in fossis ad *Spandau* copiose. ꝝ. in hortis culta. Junio.

PANICUM. *Lin. gen. 82.*

Cal. 3 valvis, valvula tertia minima. *Cor.* 2 valvis.

121. *PANICUM verticillatum* spica verticillata, racemis quaternis, involucellis unifloris bifloris, culmis diffusis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 153.

In cultis, sepibus atque dumetis rarius. Julio. Augusto.

122. *PANICUM glaucum* spica tereti involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus transversim rugosis, culmo erecto.

Panicum glaucum spica tereti involucellis bifloris fasciculato pilosis, seminibus undulato-rugosis.

Lin. syst. ed. R. I. p. 153.

In agris, arvis, locisque cultis copiose. Julio. Augusto.

123. *PANICUM viride* spica tereti involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus ad longum salcatis, culmo decumbente.

Panicum viride spica tereti involucellis bifloris
fasciculato-pilosis seminibus nervosis. *Lin. syst.*
ed. R. I. p. 154.

Locis cultis, in agris arenoso-limosis passim.
Julio. Augusto.

124. *PANICUM Crus galli* spicis alternis conju-
gatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis
hispidis, rachi quadrangulari. *Lin. syst. ed.*
R. I. p. 155.

¶. *Gramen paniceum*, spica divisa, aristis longis
armata. *Bauh. pin. 8.*

In hortis, cultis, ruderatis humidis copiose. ¶.
passim. Julio. Augusto.

125. *PANICUM sanguinale* spicis digitatis basi in-
teriori nodosis, flosculis geminis muticis, va-
ginis foliorum punctatis. *Lin. syst. ed. R. I.*
p. 157.

Digitaria sanguinalis. *Scop. carn. ed. 2. n. 72.*

In agris & campis arenofis copiosissime. Au-
gusto.

Tertia valvula calycis saepius adest, licet minu-
tissima.

126. *PANICUM miliaceum* panicula laxa flaccida,
foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis
nervosis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 160.*

In agris frequens cultum. Julio. Augusto.

PHLEUM. *Lin. gen. 83.*

*Cal. 2. valvis, linearis, truncatus; apice bicuspis-
dato. Cor. inclusa mutica.*

127. *Phleum pratense* spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 162.

In pratis humidis ad *Reineckendorf*, *Rummelsburg*, *Tegel*, *Spandau*, im *Thiergarten* & alibi copiose. Julio. Augusto.

128. *Phleum nodosum* spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 163.

In der Hasenheide & *Thiergarten* frequens. Julio. Augusto.

Alopecurus. *Lin. gen. 84.*

Cal. 2 valvis. *Cor. 1* valvis.

129. *Alopecurus pratensis* culmo spicato erecto, glumis villosis corollis muticis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 165.

In pratis & pascuis abunde. Majo. Junio.

130. *Alopecurus geniculatus* culmo spicato infarcto, corollis muticis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 165.

Im Thiergarten & *Jungfernheide* copiose. Julio. Augusto.

Agrostis. *Lin. gen. 86.*

Cal. 2 valvis: valvulis acutis. *Cor. 2* valvis paulo calyce minor. *Stigmata* longitudinaliter hispida.

* *Aristatae.*

131. *Agrostis spica venti* petalo exteriore arista recta stricta longissima, panicula patula. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 166.

Inter segetes ubique copiose; aestate.

132. AGROSTIS *canina* calycibus elongatis, petalorum arista dorsali recurva, culmis prostratis scabriusculis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 173.
In pratis pascuisque siccis passim. Julio.

133. AGROSTIS *rubra* paniculae parte florente patentissima, petalo exteriore glabro: arista terminali tortili recurva. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 173.
Ad pagos in viis arenosis & agrorum versuris frequens. aestate.

** MUTICAE.

134. AGROSTIS *stolonifera* panicula ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus aequalibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 173.
In viis arenosis inter Pancko & Gesundbrunnen, im Thiergarten alibique frequens. Junio.
Julio.

135. AGROSTIS *capillaris* panicula capillari patente, calycibus subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 174. *Leers herborn.* 54. t. 4. f. 3.
s. Calycibus duplo majoribus, corollis in foliola subulata excrementibus, viviparis. *Leers herborn.* p. 20. n. 54.
Locis nemorosis im Thiergarten & alibi passim.
Variet. s. ad fossas hinternm Gewehrplan prope Spandau. aestate.

136. *AGROSTIS alba* panicula laxa, calycibus muticis aequalibus, culmo repente. *Lin. syst. ed. R. I. p. 175.*

In Thiergarten, prope *Spandau & Tegel* infrequens. Aestate.

MILIUM. Lin. gen. 85.

Cal. 2 valvis uniflorus: valvulis subaequalibus.

Cor. brevissima. Stigmata penicilli-formia.

137. *MILIUM effusum* floribus paniculatis dispersis muticis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 168.*

Milium paniculis raris, petiolis longissimis. Hall. helv. n. 1525.

In pratis prope Briselang passim, ad Friedrichsfelde rarius. Julio.

STIPA. Lin. gen. 96.

Cal. 2 valvis uniflorus. Cor. 2 valvis valvula exteriore terminali, basi articulata.

138. *STIPA pennata* aristis lanatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 218.*

In collibus arenosis versus Spandau hinterm Stern & in plantariis versus Falkenhagen frequens. Majo.

b. Gramina floribus bifloris vagis.

HOLCUS. Lin. gen. 1252.

♀. *Cal. gluma 1 vel 2 flora. Cor. gluma aristata. Semen unicum.*

♂. *Cal. gluma 2 valvis, altera valvula infra api-*

139. *Holcus mollis* glumis bifloris nudiusculis: flosculo hermaphrodito mutico, masculo aristata geniculata. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 308.

Inter Spandau & Tegel, in der Juugfernheide locis apricis frequens, prope Rummelsburg rarius. Junio. Julio.

140. *Holcus lanatus* glumis bifloris, hermaphrodito mutico, masculo aristata recurva. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 308.

In pascuis, pratis, agrorum versuris, & nemoribus copiose. Junio. Julio.

141. *Holcus odoratus* glumis trifloris muticis acuminatis: hermaphrodito diandro. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 310.

In prato unico ad Henningsdorf passim. Julio.

Culmus pedalis teres sulcatus, geniculis & foliis tribus, superne nudus. Foia uncialia lanceolata nervosa glabra, vaginis inflatis, superne dimidiatis. Panicula mediocris: racemulis geminatis, alternis longe pedunculatis: glumis trifloris bivalvibus subrotundis acuminatis: medio flosculo hermaphrodito diandro, binis lateralibus masculis triandris.

Facile a congeneribus glumis splendide flavescens tibus distinguendus.

AIRA. *Lin. gen. 87.*

Cal. 2 valvis 2 florū interdum rudimento tertii floris. *Cor.* 2. valvis: altera valvula saepe

* *Muticae.*

142. *Aira caerulea* panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto-subulatis, foliis planis. *Lin. spec. plantar.* 2. p. 95. *Leers herborn.* 58. t. 4. f. 7. *Wiggers primit.* 7. n. 69.

Melica caerulea panicula coarctata, floribus cylindricis. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 183.

♂. *Gramen paniculatum autumnale*, panicula ampliore e viridi-nigricante. *Scheuchz. agrost.* 207.

In pratis humidis ad *Schoeneberg*, *Spandau* hinterm *Gewehrplan*, im *Thiergarten*, *Papenbergen* & alibi frequens. Augusto.

143. *Aira nutans* panicula indivisa nutante. *Wiggers primit.* 7. n. 68.

Melica nutans petalis imberibus, panicula nutante simplici. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 182.

In den *Papenbergen* locis umbrosis frequens. Majo. Junio.

Omnis Melicae species hic crescentes, ad hoc genus amandavi, quum rudimentum tertii floris rarissime adest, & aliis Airae speciebus interdum proprium. Melica vero ciliata ad Arundinis genus pertinet, hic nondum observata.

144. *Aira cristata* panicula spicata, calycibus pendulo longioribus, petalis subaristatis inaequalibus. *Lin. spec.* 94. *Huds. angl. ed.* 2. *tom. I.* p. 33.

CLASSIS III.

Poa cristata panicula spicata, calycibus subpilosis
subquadrifloris pedunculo longioribus, petal-
lis aristatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 193.*

In pratis siccioribus *im Thiergarten* inque colli-
bus apricis, versuris agrorum & alibi frequens.
Majo. Junio.

Culmus in pratis pedalis & sesquipedalis; locis
siccioribus digitalis & spithameus. *Glumae*
calycinae biflorae, rarius triflorae, rarissime
quadriflorae. *Antherae* violaceae.

Confer. *Leers herborn. 73. t. 5. fig. 6. (figura*
non optima.)

145. *AIRA aquatica* panicula patente, floribus mu-
ticis laevibus calyce longioribus, foliis planis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 177.

Ad ripas fluviorum *im Thiergarten* & alibi pas-
sim. Julio.

** *Aristatae.*

146. *AIRA caespitosa* foliis planis, panicula pa-
tente, petalis basi villosis aristatisque, arista
recta brevi. *Lin. syst. ed. R. I. p. 178.*

In pratis locisque humidis frequens. Aestate.

147. *AIRA canescens* foliis setaceis: summo spa-
thaceo paniculam inferne involvente. *Lin. syst.*
ed. R. I. p. 180.

Avena diantha, foliis setaceis, panicula stricta,
aristis clavatis. *Hall. helv. 1483. Avena ca-*
nescens. Wiggers primit. 9. n. 99.

In campis arenosis ubique copiose. Julio.

148. *Aira praecox* foliis setaceis: vaginis angulis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 180.

Avena pusilla panicula contracta, calycibus bifloris, aristis subulatis. *Wiggers primit. 9.* n. 100.

In der Jungfernheide in via versus *Spandau* pas- sim. Aprili.

149. *Aira coryophyllea* foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 180.

Avena coryophyllea panicula divaricata, calycibus bifloris aristis subulatis. *Wiggers primit. 10.* n. 101.

In der Hasenheide versus *den Rollbergen* fre- quens. Majo.

Non male has ultimas tres species, ad *Avenae* genus duxit *Celeb. Wiggers.*

c. *Gramina floribus multifloris vagis.*

Poa. Lin. gen. 89.

Cal. 2 valvis multiflorus. Spicula ovata, valvulis margine scariosis acutiusculis.

150. *Poa aquatica* panicula diffusa, spiculis sex-floris linearibus. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 184.
Ad ripas fluviorum frequens. e. g. *im Thiergar- ten &c. Junio. Julio.*

Variat spiculis 5 ad 10 floris.

Equisetum

151. *Poa trivialis* panicula subdiffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti.
Lin. syst. ed. R. I. p. 185.

In pratis, pascois, nemoribus, hortis, inque urbe ipsa frequens. Junio.

152. *Poa pratensis* panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Lin. syst. ed. R. I. p. 186.*

In pratis fertilibus passim. Julio.

Spiculae ovato-acutae quinqueflorae, glabrae, valvularum apice fuscae. *Leers herborn. 68. t. 6. f. 4.*

Poa pratensis Leysser fl. halens. 21. n. 91. est *Poa dubia* Leers herborn. 69. t. 6. f. 5.

153. *Poa dubia* panicula diffusa, spiculis ovatis obtusis subtrifloris basi pubescentibus, vaginis foliisque subtus scabris. *Leers herborn. 69. t. 6. f. 5.*

In pratis passim. Junio. Julio.

Spiculae ovato-obtusae 2. 3. vel 4. florae.

154. *Poa annua* panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso.
Lin. syst. ed. R. I. p. 187.

In cultis, hortis, viis, plateis urbis, ubique fere copiosissime. omni tempore.

155. *Poa nemoralis* panicula attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo.
Lin. syst. ed R. I. p. 191.

In nemoribus umbrosis ad Tegel, im Thiergarten

156. *Poa bulbosa* panicula secunda patentiuscula,
spiculis quadrisfloris. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 191.

8. *Germen arvense* panicula crispa. *Bauh. pin.*
3. (*vivipara.*)

In der Hasenheide, Jungfernheide, Thiergarten
aliisque locis passim. Majo.

157. *Poa compressa* panicula coarctata secunda,
culmo obliquo compresso. *Lin. syst. ed. R. I.*
p. 190.

In urbe ipsa versus portam Strahlowianam ad se-
pes rarius. Junio. Julio.

BRIZA. Lin. gen. 90.

Cal. 2. valvis multiflorus. Spicula disticha val-
vulis cordatis obtusis: interiore minuta.

158. *BRIZA media* spiculis ovatis calyce flosculis
(7.) breviore. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 194.

In pratis siccioribus, nemorosis frequens. e. g.
im Thiergarten, Papenbergen, ad Tegel, Rei-
neckendorf &c.

CYNOSURUS. Lin. gen. 93.

Receptaculum proprium unilaterale, foliaceum.

Cal. 2 valvis, multiflorus.

159. *CYNOSURUS cristatus* bracteis pinnatifidis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 198.

In pratis, pascuis locisque humidis satis fre-
quens. Junio.

DACTYLIS. Lin. gen. 92.

Cal. 2 valvis 2 vel 3 floribus; altera valvula ma-
jori carinata. Cor. 2 valvis altera valvula

160. *Dactylis glomerata* panicula secunda glo-
merata. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 197.

Bromus glomeratus spiculis quadrifloris, glo-
meratis asperis. *Scop. carn. ed. 2. 1.* p. 76. n. 111.

In nemorosis, locis cultis, ad vias, alibique co-
piose. Junio. Julio.

Festuca. *Lin. gen. 94.*

Cal. 2 valvis. Spicula oblonga teretiuscula glu-
mis acuminatis.

* *Panicula secunda.*

161. *Festuca ovina* panicula secunda coarctata
aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis
setaceis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 202.

Bromus ovinus culmo tenui erecto; foliis seta-
ceis; panicula coarctata erecta; racemis soli-
tariis; calyce flosculis breviore; petalo inte-
riore bifido; semine colorato; stylis in lanam
fatiscentibus. *Scopol. carn. ed. 2. 1.* p. 77.
n. 112.

Locis arenosis siccis *im Thiergarten, Jungfern-*
heide &c. copiosissime. Majo. Junio.

162. *Festuca rubra* panicula secunda scabra, spi-
culis sexfloris aristatis: flosculo ultimo muti-
co, culmo semi tereti. *Lin. syst. ed. R. 1.*
p. 203.

Iisdem locis eodemque tempore passim.

163. *Festuca duriuscula* panicula secunda oblon-
ga, spiculis sexfloris oblongis laevibus, foliis
setaceis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 204.

Ad *Fridrichsfelde, Rummelsburg* passim. Junio.

** *Panicula aequali.*

164. *FESTUCA decumbens* panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente. *Lin. syst. ed. R. I. p. 206.*

In der Jungfernheide rarius. Junio.

165. *FESTUCA elatior* panicula secunda erecta, spiculis subaristatis, exterioribus teretibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 207.*

*In pratis fertilibus ad Rummelsburg, Schoenhau-
sen, Thiergarten, Spandau passim. Aestate.*

166. *FESTUCA fluitans* panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 207.*

*Festuca amphibia. Lüders Nomencl. fl. march. p. 11.
In aquis stagnantibus, fossis, pratisque uidis fre-
quens. Aestate.*

Offic. (Semina Graminis Mannae.)

BROMUS. Lin. gen. 95.

*Cal. 2 valvis. Spiculae oblongae distichae: aristis
infra apicem.*

167. *BROMUS secalinus* panicula patente, spiculis ovatis: aristis rectis, seminibus distinctis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 208.*

*In agris secalinis beim Gesundbrunnen & alibi fre-
quens. Junio. Julio.*

168. *BROMUS mollis* panicula erectiuscula, spicis ovatis pubescentibus aristis rectis, foliis mol- lissime villosis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 209.*

Minutus vix digitalis spiculis quatuor.

Ad vias, inque versuris agrorum copiose.

Varietas s. locis humidis *in der Jungferuheide* passim. Majo. Junio.

- 169.** *BROMUS inermis* panicula erecta, spiculis subteretibus subulatis nudis submuticis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 210.*

Festuca speciosa panicula diffusa, spiculis teretibus subulatis muticis aristatisque. *Schreb. spicil. fl. lips. 59. n. 1004.*

Festuca Leysseri locustis teretibus, multifloris, glumis semimembranaceis, breviter aristatis.

Moench haff. 1. p. 41. n. 82.

Prope Spandau ad agrorum margines, ibidemque *auf dem Werder* passim. Junio, Julio.

Certo Bromi species, nec Festuca.

- 170.** *BROMUS sterilis* panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 212.*

In Thiergarten & prope Spandau passim. Aestate.

- 171.** *BROMUS arvensis* panicula nutante, spiculis ovaro-oblongis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 212.*

s. Totus ruber.

Ad margines agrorum, sepes alibique passim. Aestate.

- 172.** *BROMUS tectorum* panicula nutante, spiculis linearibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 213.*

In tectis stramineis, locis siccis, ad vias, sepes inque versuris agrorum copiose. Junio.

173. *Bromus giganteus* panicula nutante spiculis quadrifloris, aristis brevioribus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 214.*

*Ad sepes prope Fridrichsfelde & in den Papenäer-
gen passim. Junio.*

174. *Bromus gracilis* culmo indiviso, spica nu-
tante: spiculis alternis remotis teretibus subu-
latis glabris aristatis. *Leyss. halens. 26. n. 116.*

Bromus gracilis spica terminali debili, spiculis
alternis remotis teretibus subulatis glabris,
aristis longioribus. *Weigel. observ. botan. 15.
tom. I. fig. 11.*

In nemorosis umbrosis ad Tegel rarius. Julio.

175. *Bromus pinnatus* culmo indiviso, spiculis
alternis subsessilibus teretibus subaristatis. *Lin.
syst. ed. R. I. p. 216.*

Bromus pinnatus spiculis sessilibus, culmo in-
diviso, aristis folliculi gluma brevioribus.
Pollich. pal. I. p. 117. n. 117.

In den Papenbergen, & ad Tegel copiose. Junio.

A V E N A. *Lin. gen. 97.*

*Cal. 2 valvis, multiflorus: arista dorsali tortili
in medio geniculata.*

176. *Avena elatior* paniculata, calycibus bifloris,
flosculo hermaphrodito submutico, masculo
aristato. *Lin. syst. ed. R. I. p. 221.*

Holcus avenaceus calycibus bifloris, arista floris
masculi dorsali refracta. *Wiggers primit. 72.*

In pratis pinguibus ad *Fridrichsfelde*, *Pancko*,
im *Thiergarten* & alibi frequens. Junio.
Julio.

177. *AVENA sativa* paniculata, calycibus dispermis,
seminibus laevibus altero aristato. *Lin. syst.*
ed. R. I. p. 222.

Culta passim occurrit. Aestate.

178. *AVENA orientalis* panicula coarctata secunda,
spiculis bifloris horizontalibus parallelis, se-
minibus laevibus. *Schreb. spicil.* 52. n. 987.

In agris frequens colitur. Aestate.

179. *AVENA fatua* paniculata, calycibus trifloris,
flosculis omnibus aristatis basique pilosis. *Lin.*
syst. ed. R. I. p. 223.

Inter segetes, praecipue inter *secale* frequens.

Julio. Augusto.

180. *AVENA pubescens* subspicata, calycibus sub-
trifloris basi pilosis, foliis planis pubescenti-
bus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 223.

Circum *Spandau* copiose. Junio.

181. *AVENA flavescens* panicula laxa, calycibus tri-
floris brevibus, flosculis omnibus aristatis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 224.

In der Hasenheide frequens. Junio. Julio.

182. *AVENA pratensis* subspicata, calycibus quin-
quefloris. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 225.

Avena pratensis panicula simplici, glumis quin-
quefloris, foliis involutis nudis. *Huds. angl.*
ad 2. I. p. 52. n. 3.

Ad viam versus Staaken rarissime. Junio.

ARUNDO. *Lin. gen. 99.*

Cal. 2 valvis. Flosculi congesti. Cor. lanata.

183. *ARUNDO Phragmitis calycibus quinquefloris,*
panicula laxa. Lin. syst. ed. R. 1. p. 227.

In fiuviis, lacubus, fossis, aquisque stagnantibus
copiose. Augusto.

184. *ARUNDO epigejos calycibus unifloris, pani-*
cula erecta, foliis subtus glabris. Lin. syst. ed.
R. 1. p. 228.

Im Thiergarten, prope Reineckendorf, Spandau
auf den Schülerbergen, in der Spandauerheide
ad littora der Spree & alibi copiose. Julio.
Augusto.

Differt ab. *Arundine Phragmitide*

1) *Panicula coarctata.*

2) *Aequali nec secunda.*

ab. *Arundine arenaria.*

1) *Panicula subramosa, nec spicata.*

2) *Panicula foliis longiore.*

185. *ARUNDO Calamagrostis corollis lanuginosus,*
calycibus unifloris laevibus, culmo ramoso.
Lin. syst. ed. R. 1. p. 228.

Ad margines agrorum beim Gesundbrunnen, in
pratis paludosis der Spandauerheide, alibi fre-
quens. Julio.

Differt ab. *Arundine epigejos*

1) *panicula tenuiori,*

2) *calycibus obtusis, nec longe acuminatis,*

3) *calycibus stramineis, nec margine*

186. ARUNDO *Agrostis* panicula oblonga, calycibus unifloris, petalo exteriori basi aristato.

Wiggers primit. 10. n. 104. *Scop. carn.* ed. 2. n. 126.

Agrostis arundinacea panicula oblonga, petalo exteriori basi villoso aristaque torta calyce longiore. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 171.

In der Jungfernheide ad viam a Tegel ad Spandau locis apricis passim. Julio.

Calyx bivalvis muticus glaber, uniflorus. Corolla bivalvis, valvula exterior major glabra, basi aristata: arista longa tortili, valvula interior minor obtusa, extus lanata.

187. ARUNDO *Halleri* panicula incrassata, calycibus unifloris, petalo exteriori bifido, apice aristato, arista brevissima.

Arundo locustis unifloris, ex summa gluma aristatis. *Hall. helv.* n. 1521.

Agrostis Calamagrostis panicula incrassata, petalo exteriori teto lanato apice aristato, culmo ramoso. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 171. *Leers herbor. app.* p. 285.

In der Jungfernheide rarissime. Julio.

Calyx bivalvis glaber, acuminatus, corolla multo major. Corolla bivalvis valvula exterior major apice bifida, brevissime aristata, tota lana longissima aequali cincta.

LOLIUM. *Lin. gen.* 101.

Cal. i phyllus fixus multiflorus.

188. *Lolium perenne* spica mutica, spiculis compressis multifloris. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 230.

a. *Gramen loliaceum* spica lata ex plurimis spicis duplii versus dispositis constante. *Scheuchz. agrost. 29. t. 2.*

In ambulacris hortorum, pascuis siccis, ad vias copiosissime. Aestate.

189. *Lolium tenue* spica mutica tereti, spiculis trifloris. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 230.

Unter den Linden in urbe ipsa semel legi. Aestate.

Forte varietas antecedentis.

190. *Lolium temulentum* spica aristata, spiculis compressis multifloris. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 231.

Inter segetes frequens. Junio. Julio.

d. Gramina spicata: receptaculo subulato.

ELYMUS. Lin. gen. 102.

Cal. 2 valvis, lateralis, aggregatus, multiflorus.

191. *ELYMUS europaeus* spica erecta: spiculis bifloris, involucro aequalibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 233.

Hordeum spicis rigidis cylindricis, calycinis glumis aristatis. Hall. helv. n. 1527.

Hordeum cylindricum. Murray prodrom. 43.

In der Jungfernheide, unico tantum loco copiose. Julio, Augusto.

SECALE. *Lin. gen. 103.*

Cal. oppositus 2 valvis 2 florus solitarius.

192. SECALE *cereale* glumarum ciliis scabris. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 234.*

Cultum copiosissime obvium. Aestate:

HORDEUM. *Lin. gen. 104.*

Cal. lateralis, bivalvis, uniflorus, ternus.

193. HORDEUM *vulgare* flosculis omnibus hermaphroditis aristatis; ordinibus duobus exterioribus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 235.*

Colitur hic frequens. Aestate.

Offic. Semina decorticata sub nomine Hordeum perlatum.

194. HORDEUM *hexastachyon* flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus sexfariam positis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 235.*

Passim cultum occurrit. Aestate.

195. HORDEUM *murinum* flosculis lateralibus masculis longe aristatis, involucris omnibus scabris, intermediis ciliatis.

Hordeum murinum flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 237. α.*

Ad vias, fossas, in pratis, ubique fere copiosissime. Aestate.

196. *Hordeum secalinum* flosculis lateralibus masculis breviter aristatis, involucris omnibus scabris, intermediis nudis.

Hordeum secalinum flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris setaceis scabris. *Schreb.*
spicil. 148. n. 1167.

Hordeum murinum. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 237. 5.
Ad pagos, sepes, inque pratis passim. Julio.
Augusto.

TRITICUM. *Lin. gen. 105.*

Cal. 2 valvis solitarius, subtriflorus. *Corolla*
2 valvis obtusa *Receptaculi* basis callosa.

197. *Triticum aestivum* calycibus quadrifloris ventricosis, glabris, imbricatis, aristatis. *Lin.*
syst. ed. R. 1. p. 233.

Colitur hinc inde. Aestate.

198. *Triticum hybernum* calycibus quadrifloris ventricosis laevibus imbricatis submuticis. *Lin.*
syst. ed. R. 1. p. 238.

Cultum passim vidi. Aestate.

199. *Triticum repens* calycibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis. *Lin. syst. ed.*
R. 1. p. 241.

In agris, cultis, hortisque copiosissime. Aestate.
Offic. Radix Graminis minoris.

TRIGYNIA.

MONTIA. *Lin. gen. 107.*

Cal. 2 phyllus. *Cor. 1* petala irregularis. *Caps.*

200. **MONTIA** *fontana* foliis oblongo-ovatis, subcarnosis; pedunculis unifloris, fructiferis deflexis. *Moench. Hass.* I. n. 109. *Lin. Syst. ed. R.* I. p. 244.

Locis humidis ad Stegliz frequens. Majo.

HOLOSTEUM. *Lin. gen.* 110.

Cal. 5 phyll. *Cor.* 5 petala. *Caps.* 1 locularis subcylindrica, apice dehiscens.

201. **HOLOSTEUM** *umbellatum* floribus umbellatis. *Lin. Syst. ed. R.* I. p. 246.

Ad sepes inque agris & arvis frequens. Aprili. Majo.

CLASSIS IV.

T E T R A N D R I A
M O N O G Y N I A.

a. *Flores aggregati, monopetalii, monospermii, superi.*

DIPSACUS. Lin. gen. 120.

*Cal. communis polyphyllus: proprius superus.
Receptaculum paleaceum.*

202. DIPSACUS pilosus foliis petiolatis appendiculatis. Lin. syst. ed. R. I. p. 275.

Ad Schoeneberg rarius. Julio. Augusto.

SCABIOSA. Lin. gen. 121.

Cal. communis polyphyllus: proprius duplex superus. Receptacul. paleaceum. f. nudum.

* *Corollis quadrifidis.*

203. SCABIOSA Succisa corollis quadrifidis aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. Lin. syst. ed. R. I. p. 277.

β. Caule prolifero.

γ. Succisa hirsuta. Bauh. pin. 369.

δ. Flore albo.

In pratis nemorosis humidis frequens. e. g. prope Spandau in der Jungfernheide &c. Julio.

Offic. Radix Morsus Diaboli. f. Succisae. (*Herba Succisae.*)

204. *SCABIOSA arvensis* corollis quadrifidis radian-tibus, foliis pinnatifidis incisis, caule hispido.
Lin. syst. ed. R. I. p. 279.

In versuris agrorum, pascuis, pratis siccis, simi-libusve locis frequens. Junio. Julio.

Foliorum figura valde variabilis.

Offic. Herba Scabiosae. (*Radix & Flores.*)

** *Corollis quinquefidis.*

205. *SCABIOSA columbaria* corollis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 280.

In agris, arvis, pascuis, agrorum versuris pas-sim. e. g. *in den Papenbergen*, versus *Schoeneberg*, *Spandau &c.* Julio. Augusto.

b. *Flores stellati, monopetali, dicocci, superi.*

ASPERULA. *Lin. gen. 128.*

Cor. 1 petala infundibuliformis. *Sem.* 2. globosa.

206. *ASPERULA odorata* foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 294.

Im Briselang locis nemorosis humidis umbrosis frequens. Majo.

Offic. Herba Matrisylvae, f. Hepticae stellatae.

TETRANDRIA MONOGYNIA. 67

207. *ASPERULA tinctoria* foliis linearibus: inferioribus senis; intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 295.

In den Papenbergen frequens. Majo. Junio.

208. *ASPERULA cynanchica* foliis quaternis linearibus: superioribus oppositis, caule erecto, floribus quadrifidis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 296.

In collibus apricis ad Fridrichsfelde, Rummelsburg, prope *Spandau auf dem Schülerberg & alibi* frequens. Aestate.

Offic. (Herba Cynanchica.)

GALIUM. Lin. gen. 132.

Cor. 1 petala plana. Sem. 2. subrotunda.

* *Fructu glabro.*

209. *GALIUM palustre* foliis quaternis obovatis inaequalibus, caulis diffusis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 299.

Ante portam Halensem, ad Strahlau & alibi humidis uliginosisque locis satis frequens. Junio.

210. *GALIUM uliginosum* foliis senis lanceolatis retrorsum ferratoaculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 300.

In pratis paludosis, ad fossas passim. Junio.

211. *GALIUM spurium* foliis senis lanceolatis cari-

plicibus, fructibus glabris. *Lin. syst. ed. R.*

I. p. 301.

In Thiergarten locis nemorosis & alibi passim.
Aestate.

212. *GALIUM verum* foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 302.*

In memoribus, pascuis, pratis, dumetis copiose.
e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, Hasenheide, Spandauerheide &c. Junio. Julio.

Offic. (Herba Galii lutei florens.)

* *Fructu hispido.*

213. *GALIUM boreale* foliis quaternis lanceolatis trinerviis, glabris, caule erecto, seminibus hispidis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 305.*

Iisdem locis frequens. Majo. Junio.

214. *GALIUM Aparine* foliis octonis lanceolatis carinis scabris retrorsum aculeatis geniculis villosis, fructibus hispidis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 306.*

In sepibus, dumetis, ad pagos inque memoribus frequens. Majo. Junio.

c. *Flores monopetali, monocarpi inferi.*

PLANTAGO. Lin. gen. 148.

Cal. 4 fidus corolla brevior. *Cor. 4* fida: limbo reflexo. *Stam.* longissima. *Caps.* 2 locularis circumscissa.

* *Scapo nudo.*

215. PLANTAGO *major* foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricata. *Lin. syst. ed.*

R. I. p. 319.

s. Plantago latifolia glabra minor. *Bauh. pin.*
189.

y. Foliis dentatis.

Ad vias, in versuris, pratisque siccis copiosissime. Aestate.

Offic. Herba Plantaginis. (*Semina Radix.*)

Varietas *y.* & *e.* Linnei (*Plantaga rosea*) specie a nostra differt, quum P. major semper perennis; P. rosea vero biennis.

216. PLANTAGO *media* foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti.

Lin. syst. ed. R. I. p. 319.

s. Plantago latifolia hirsuta minor. *Bauh. pin.*
189.

In viis, pratis pasquisque copiose. Aestate.

Flores odorati, & ad aquam distillatam meliores, istis Plantaginis majoris.

217. PLANTAGO *lanceolata* foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Lin. syst. ed.*

R. I. p. 321.

Iisdem locis vulgaris. Aestate.

Offic. (*Herba Plantaginis minoris.*)

** *Caule ramoso.*

218. PLANTAGO *Psyllium* caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis.

Lin. syst. ed. R. I. p. 324.

In agris arenosis inter segetes copiose. Julio.
Augusto.

Offic. Semen Psyllii.

CENTUNCULUS. Lin. gen. 151.

Cal. 4 fidus, corolla longior. *Cor.* 4 fida patens.

Stam. brevia: *Capsul.* 1 locularis circumscissa.

219. CENTUNCULUS *minimus* foliis alternis ovatis. *Flor.* suec. 129, 136. Lin. syst. ed. R. 1. p. 326.

Inter Schoeneberg & Fasanerie in colle arenoso,
hinter Falkenhagen, in via versus Bredow pas-
sim. Augusto.

d. *Flores monopetali, monocarpi,*
superi.

SANGUISORBA. Lin. gen. 152.

Cal. 2 phyllus, *Germen* inter calycem corol-
lamque.

220. SANGUISORBA *officinalis* spicis ovatis. Lin.
syst. ed. R. 1. p. 327.

Im Thiergarten & Papenbergen, in pratis humi-
dis frequens. Julio. Augusto.

Offic. (*Radix Pimpinellae-italicae, s. Sangui-*
sorbae.)

e. *Flores tetrapetali, superi.*

TRAPPA. Lin. gen. 165.

Cal. 4 partit. *Cor.* 4 petala. *Nux* spinis opposi-
tis cincta e calyce ortis.

TETRANDRIA MONOGYNIA. 71

221. TRAPA *natans* nucibus quadricornibus: spinis patentibus. Lin. suppl. pl. 128. Lin. syst. ed. R. 1. p. 341.

Trapa foliis natantibus, petiolis ventricosis. Hall. helv. n. 527.

In der Müggelsee prope Coepnik frequens.
Junio.

Offic. (Nuces aquatice.)

CORNUS. Lin. gen. 155.

Involucr. 4 phyllum. Petala supera 4. Drupa nucleo 2 locu'ari.

222. CORNUS *mascula* arborea, umbellis involucrum aequantibus. Lin. syst. ed. R. 1. p. 331.

Im Thiergarten passim. Martio. Aprili.

Offic. Fruktus Corni.

223. CORNUS *sanguinea* arborea, cymis nudis, ramis rectis. Lin. syst. ed. R. 1. p. 331.

In den Papenbergen, Thiergarten & alibi frequens.
Majo- Junio.

f. Flores incompleti superi.

VISCUM. Lin. 1209.

♂. ♀. ♂. Cal. 4 partitus. Cor. O. Fil. O. Anth. calyci adnatae.

♀. Cal. 4 phyllus superus. Cor. O. Styl. O.
Bacca 1 sperma. Semen cordatum.

224. VISCUM *album* foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. Lin. syst. ed. R.

Im Thiergarten, Grunewald, Hasenheide, Jungfernheide & alibi in pinis, quercubus aliisque arboribus frequens, parasiticum. Aprili. Majo.
Offic. Stipites Visci quercini.

g. Flores incompleti, inferi

ALCHEMILLA. Lin. gen. 177.

Cal. 8 fidus. Cor. O. Sem. I.

225. *ALCHEMILLA vulgaris glabra, foliis novem lobatis ferratis.*

Alchemilla vulgaris foliis lobatis. Lin. syst. ed.

R. I. p. 349.

In pratis pinguibus ad Schoenhausen, Blankfelde infrequens. Junio. Julio.

Offic. Herba Alchemillae.

226. *ALCHEMILLA Aphanes hirsuta, foliis trilobis, lobis tri- & bipartitis.* Leers herborn. 54. n. 122.

Aphanes arvensis. Lin. syst. ed. R. I. p. 350.

In agris nach der Hasenheide zu, versus Seeburg & alibi frequens. Julio. Augusto.

URTICA. Lin. gen. 1149.

♂—♀. ♂. *Cal. 4 phyllus. Cor. O. Nectar. centrale cyathiforme.*

♀. *Cal. 4 phyllus, foliis 2 oppositis minutissimis. Cor. O. Stigma villosum Sem. 1 nitidum.*

227. *URTICA urens foliis oppositis ovalibus.* Lin. syst. ed. R. 4. p. 130.

In cultis, hortis, ad vias sepes, & dumeta copiose.
Aestate.

Offic. Herba urticae minoris.

228. URTICA dioica foliis oppositis cordatis, racemis geminis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 130.

In ruderatis, pascuis, nemoribus, ad vias & sepes ubique copiosissime. Aestate.

Offic. (*Radix, Herba & Semina Urticae majoris.*)

DIGYNIA.

BETULA. Lin. gen. 1147.

♂—♀. ♂. Ament. squamis 3. 3 floris. Cor. 4 partita.

♀. Ament. squamis 3. 2 floris. Cor. O. Semen saepius utrinque alatum.

229. BETULA alba foliis ovatis acuminatis ferratis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 125.

α. Foliis ovato-triangularibus, glabris: virgulis pendulis.

β. Foliis acute triangularibus, scabris, virgulis erectis.

In nemoribus copiose. Aprili. Majo.

Offic. Succus Betulae & Folia.

Numne α & β species distinctae?

230. BETULA Alnus foliis subrotundis, glutinosis, glabris, obtuse crenatis, pedunculis ramosis.

Betula Alnus pedunculis ramosis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 127.

β. Betula quercifolia. Lüders nomencl. fl.

In humidis nemorosis pratisque copiosissime.

Variet. β . *im Thiergarten* rarius. Februario.

Aprilie.

Offic. Cortex Alni.

In varietate β , folia sunt oblonga sinuata, laci-
niis obtuse dentatis, illis Quercus Roboris
simillima.

Semina semper absque alis in Betula Alno, non
pro charactere generico sufficient; quum Be-
tulam amicanam apud *Illustr. a Burgsdorf in Te-*
gel vidi, cui semina uno latere minutissime
alata sunt, & quae Betulam & Alnum con-
jungit.

CUSCUTA. Lin. gen. 182.

Cal. 4 fidus. *Cor.* 1 petala 4 fida. *Capf.* 2 locu-
laris, circumscissa.

231. *Cuscuta europaea* floribus sessilibus, con-
fertis, quadrifidis. *Retz. prod. fl. scand.*
n. 180.

Cuscuta europaea floribus sessilibus. *Lin. syst. ed.*

R. I. p. 352.

In agris praecipue inter linum, ad sepes, in can-
nabe, urtica, aliisque plantis frequens. e. g.
ad Strahlow, Spandau &c. Julio. Augusto.

Offic. (*Herba Cuscutae.*)

TETRAGYNIA.

ILEX. Lin. gen. 184.

Cal. 4 dentatus. *Cor.* rotata. *Styl.* O. *Bacca*

4 sperma.

232. *Ilex Aquifolium* foliis ovatis acutis spinosis.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 354.

In Thiergarten prope venatorem aulicum rarius.

Majo.

POTAMOGETON. *Lin. gen. 186.*

Cal. O. Petala 4. Styl. O. Semina quatuor.

233. *POTAMOGETON natans* foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Lin. syst. ed. R. 1.*

p. 355.

In aquis stagnantibus im Thiergarten & alibi frequens. Junio.

234. *POTAMOGETON perfoliatum* foliis cordatis amplexicaulibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 355.*

In der Spree & Havel frequens. Junio.

235. *POTAMOGETON lucens* foliis lanceolatis planis in petiolas descincentibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 356.*

In flaviis & lacubus frequens, e. g. versus Span. dau prope den Stern, im Grunewalde & prope Strahlow. Junio.

236. *POTAMOGETON crispum* foliis lanceolatis alternis, oppositisve undulatis ferratis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 356.*

In fossis, aquisque stagnantibus im Thiergarten, Jungfernheide inque flaviis copiose. Majo.

237. *POTAMOGETON compressum* foliis linearibus obtusis, caule compresso. *Lin. syst. ed. R.*

Im Grunewalde in fossis lacubusque frequens,
Junio.

238. *POTAMOGETON gramineum* foliis linearilanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus.
Lin. syst. ed. R. 1. p. 358.

Versus Spandau prope den Stern in fluviis pas-
sim. Junio.

SAGINA. *Lin. gen. 188.*

Cal. 4 phyll. Cor. 4 petala. Caps. 4 locularis,
4 valvis polysperma.

239. *SAGINA procumbens* ramis procumbentibus,
Lin. syst. ed. R. 1. p. 359.

$\beta.$ Floribus apetalis.

In pascuis humidis *beim Invalidenhouse*, prope
Rummelsburg, Gesundbrunnen & alibi frequens.
 $\delta.$ in ollis hortulanorum. Aestate.

CLASSIS V.

P E N T A N D R I A
M O N O G Y N I A.

a. *Flores monopetali, inferi, tetraspermi.*

MYOSOTIS. Lin. gen. 192.

Cor. hypocrateriformis, 5 fida, lobis emarginatis, fauce clausa fornicibus.

240. *Myosotis arvensis* semenibus laevibus, caule ramoso, foliis ovato-lanceolatis hirtis.

Myosotis annua caule ramoso, foliis ovato-lanceolatis. *Moench. haff. n. 153.*

Myosotis scorpioides semenibus laevibus, foliorum apicibus callosis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 383.* variet. α *arvensis.*

In agris, arvis, pascuis ubique vernali tempore.

241. *Myosotis scorpioides* caule subsimplici, foliis linear-lanceolatis, semenibus laevibus.

Myosotis perennis caule subramoso, foliis ligulatis, *Moench. haff. n. 154.*

Myosotis scorpioides β . *palustris* *Lin. syst. ed. R. 1. p. 383.*

α . Foliis glabris.

In fossis, paludibus, pratis humidis, locisque uliginosis abunde aestate.

- 242.** *Myosotis Lappula* seminibus acuteis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 384.*

Im Thiergarten rarius. Junio. Julio.

LITHOSPERMUM. *Lin. gen. 193.*

Cal. 5 partitus. Cor. infundibuliformis, fauce perforata nuda.

- 243.** *LITHOSPERMUM arvense* seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 385.*

In agris & arvis copiose. Majo. Junio.

ANCHUSA. *Lin. gen. 194.*

Cor. infundibuliformis, fauce clausa fornicibus. Sem. basi insculpta.

- 244.** *ANCHUSA officinalis* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 387.*

In ruderatis, ad sepes, dumeta & pagos abunde. Junio.

Offic. Flores, Radices Buglossi. (Herba.)

CYNOGLOSSUM. *Lin. gen. 195.*

Cor. infundibuliformis, fauce clausa fornicibus. Semina depressa, interiore tantum latere stylo adfixa.

- 245.** *CYNOGLOSSUM vulgare* staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 390.*

In ruderatis, nemerosis, ad vias & sepes passim.

Majo. Junio.

Offic. Radix Cynoglossi. (*Herba.*)

PULMONARIA. *Lin. gen.* 196.

Cal. prismatico pentagonus. *Cor.* infundibuliformis, fauce pervia pilosa.

246. PULMONARIA officinalis foliis radicalibus ovato cordatis scabris. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 393.

8. Pulmonaria non maculoso folio. *Clus. hist.* 2. p. 168.

Locis umbrosis *im Briselang* frequens. Majo.

Offic. Herba Pulmonariae maculosae.

SYMPHYTUM. *Lin. gen.* 197.

Corollae limbus tubulato . ventricosus : fauce clausa radiis subulatis.

247. SYMPHYTUM officinale foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 394.

In fossis, pratis paludosis *im Thiergarten, Jungfernheide* & alibi copiose. Majo. Junio seq.

Offic. Radix Consolidae majoris.

Flores rarissime albi.

BORAGO. *Lin. gen.* 200.

Cor. rotata : fauce coronata prominentiis emarginatis.

248. BORAGO officinalis foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 327.

In ruderatis interdum, in hortis frequens.
Junio.

Offic. Herba & Flores Boraginis.

ASPERUGO. *Lin. gen. 201.*

Cal. fructus compressus: lamellis plano-para-
lellis, sinuatis.

249. ASPERUGO procumbens calycibus fructus
compressis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 399.*

In ruderatis ad pagos v. g. ad Pancko, Schoenhau-
sen, Reineckendorf & alibi frequens. Majo.

LYCOPSIS. *Lin. gen. 202.*

Cor. infundibuliformis, tubo incurvato.

250. LYCOPSIS pulla foliis integerrimis, caule
erecto, calycibus fructescensibus inflatis pen-
dulis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 400.*

Im Thiergarten rarissima, semel tantum lecta.
Majo.

251. LYCOPSIS arvensis foliis lanceolatis hispidis,
calycibus florescentibus erectis. *Lin. syst. ed.*
R. I. p. 400.

In agris, cultis, inter segetes frequens. Aestate.

ECHIUM. *Lin. gen. 203.*

Cor. irregularis, fauce nuda.

252. ECHIUM vulgare caule tuberculato, hispido,
foliis caulinis lanceolatis, floribus spicatis late-
ralibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 403.*

& Flore albo.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 81

In ruderatis, ad vias, margines agrorum, in sepibus, dumetis copiosissime. Aestate.

b. *Flores monopetali, inferi, angiospermi.*

PRIMULA. *Lin. gen. 210.*

Involucrum umbellulae. Cor. infundibuliformis, ore patulo. Stigma globosum.

253. PRIMULA veris foliis dentatis rugosis, scapo multifloro, limbo corollarum concavo. *Huds. angl. ed. 2. tom. I. p. 84. n. 2.*

Primula veris foliis dentatis rugosis. Lin. syst. ed. R. I. p. 411. α. officinalis.

Im Briselang copiose, ad Pancko passim &c. Majo.

Offic. Flores Primulae veris s. Paralyseos. (Radicis & Herba.)

MENYANTHES. *Lin. gen. 215.*

Cor. hirsuta. Stigma bifidum. Caps. 1 locularis.

254. MENYANTHES trifoliata foliis ternatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 416.*

Im Thiergarten, prope der Charité & alibi frequens. Majo.

Offic. Herba Trifolii febrini.

HOTTONIA. *Lin. gen. 216.*

Cor. hypocrateriformis. Stam. tubo corollae imposita. Caps. 1 locularis.

255. *HOTTONIA palustris* pedunculis verticillato-
multifloris. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 416.

In fossis aquisque stagnantibus ad *Schoeneberg*,
im Thiergarten, Jungfernheide & alibi co-
piose. Majo. Junio.

ANAGALLIS. *Lin. gen. 220.*

Cor. rotata. Stigma capitatum. Caps. 1 locu-
laris circumscissa.

256. *ANAGALLIS arvensis* caule procumbente, fo-
liis ovato-lanceolatis calycis segmentis lan-
ceolatis. *Hall. helv. 625.*

Anagallis arvensis foliis indivisis, caule procum-
bente. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 423. β.

Anagallis phoeniceo flore. Bauh. pin. 252.

In agris, arvis, pascuis, cultis, hortisque fre-
quens. Aestate.

Offic. Herba Anagallidis.

257. *ANAGALLIS caerulea* caule procumbente, fo-
liis ovato-lanceolatis, calycis segmentis subu-
latis. *Hall. helv. 626. Schreb. spicil. p. 5.*

Anagallis arvensis α. Lin. syst. ed. R. 423.

In agris ad *Schoeneberg & ante portam Halensem*
rarius. Aestate.

Variat corollis integris ac serratis.

Certo specie distincta, saepius *A. arvensem* &
hanc speciem diversis in ollis variis humi spe-
ciebus repletis seminavi, & semper constanter
manserunt.

Lysimachia. Lin. gen. 219.

Cor. rotata. *Stigma* obtusum. *Capsula* 1 locula-
ris, globosa, mucronata, 10 valvis.

* *Floribus racemosis.*

258. *Lysimachia vulgaris* paniculata: racemis
terminalibus. Lin. syst. ed. R. 1. p. 419.

Lysimachia foliis ovato-lanceolatis, spicis pani-
culatis. Hall. helv. n. 630.

Ad latera fossarum, paludum, rivulorum, flu-
vium & aliis locis copiose. Julio. Augusto.

Variat foliis simpliciter oppositis, ternatis, qua-
ternis, usque quinis.

Offic. (*Lysimachiae Herba.*)

259. *Lysimachia thyrsiflora* racemis lateralibus
pedunculatis. Lin. syst. ed. R. 1. p. 420.

In der Jungfernheide ad viam versus Spandau &
in den Papenbergen an der Havel frequens.

Folia integerrima sessilia lanceolata racemis lon-
giora. Racemi cylindrici axillares pedun-
culati.

** *Floribus solitariis.*

260. *Lysimachia Nummularia* foliis subcorda-
tis, floribus solitariis, caule repente. Lin.
syst. ed. R. 1. p. 422.

In nemorosis humidis, im Thiergarten, Jung-
fernheide alibique frequens. Junio. Julio.

Offic. Herba Nummulariae.

VINCA. Lin. gen. 322.

Contorta. Folliculi 2 erecti, Sem. nuda.

261. *VINCA minor* caulis procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis,
Lin. syst. ed. R. I. p. 593.

Im Thiergarten prope venatorem aulicum, ac si spontanea. Aprili. Majo.

Faux corollae pilosa. Styli bini adglutinati; interdum separati. Variat glandulis ad germen 2. 3. usque 4.

Offic. Herba Vincae Pervincae.

CONVOLVULUS. *Lin. gen. 231.*

Cor. campanulata plicata. Stigmata 2. Capsula 2 locularis: 2 sperma.

262. *CONVOLVULUS arvensis* foliis sagittatis, utrinque acutis, pedunculis unifloris, calyce nudo.

Convolvulus arvensis foliis sagittatis, utrinque acutis, pedunculis subunifloris. *Lin. syst. ed. R. I. p. 434.*

In agris, arvis, cultis copiose. Aestate.

Flores rubri solum argillosum indicant.

263. *CONVOLVULUS sepium* foliis sagittatis, postice truncatis, pedunculis unifloris bracteatis: bracteis cordatis calyce longioribus.

Convolvulus sepium foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. *Lin. syst. ed. R. I. p. 434.*

Locis humidis ad sepes, dumeta frequens. Aestate.

VERBASCUM, *Lin.* gen. 262.

Cor. rotata subinaequalis. *Fil.* barbata. *Caps.* bilocularis.

264. VERBASCUM *Thapsus* foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. *Lin.* *syst.* *ed.* *R.* 1. p. 492.

Ante portam Halensem & Oranienburgicam in collibus arenosis alibique coiose. Julio, Augusto, *Offic.* Herba & Flores Verbasci.

265. VERBASCUM *Lychnitis* foliis cuneiformibus oblongis. *Lin.* *syst.* *ed.* *R.* 1. p. 493.

Ad vias, sepes, dumeta, inque coemeteriis pagorum frequens. Junio. Julio.

266. VERBASCUM *nigrum* foliis cordato-oblongis petiolatis. *Lin.* *syst.* *ed.* *R.* 1. p. 494.

In nemorosis, ad vias & pagos abunde. Junio. Julio.

Offic. (*Radix Verbasci.*)

Celsiae genus, a Verbasco tantum numero staminum differt, & cum hoc conjungendum.

DATURA, *Lin.* gen. 263.

Cal. tubulosus angulatus, deciduus; basi orbiculata persistente. *Cor.* infundibuliformis pliata. *Caps.* 2 locularis 4 valvis.

267. DATURA *Stramonium* pericarpiis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Lin.* *syst.* *ed.* *R.* 1. p. 497.

In ruderatis ad pagos passim. Julio.

Offic. Herba & Semina Stramonii s. Naturae

Planta narcotica venenata, nuperrime nos experientia virositatem illius docuit. Aestate 1781. prope Spandau auf dem Gewehrplan puer a semibus comesis delirio vitam finivit.

HYOSCYAMUS. Lin. gen. 264.

Cor. infundibuliformis obtusa. *Stam.* inclinata.
Caps. operculata 2 locularis.

268. HYOSCYAMUS *niger* foliis amplexicaulibus sinuatis. Lin. syst. ed. R. I. p. 499.

Ad pagos in ruderatis, & coemeteriis copiose.
Junio. Julio.

Offic. Semina Hyoscyami. (Radix Herba.)

SOLANUM. Lin. gen. 268.

Cor. rotata. *Anth.* subcoalitae, apice poro gemino dehiscentes. *Pomum* biloculare.

269. SOLANUM *Dulcamara* caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. Lin. syst. ed. R. I. p. 511.

In humidis paludosis, ad fossas im Thiergarten,
Jungfernheide &c. frequens. Junio. Julio.

Offic. Stipites Dulcamarae. (Radix.)

270. SOLANUM *tuberosum* caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis subdivisis. Lin. syst. ed. R. I. p. 513.

¶. Flore violaceo.

In agris & hortis copiose cultum. Julio.
Augusto,

271. *SOLANUM nigrum* caule inermi, herbaceo,
ramis subteretibus asperis, foliis ovatis angu-
latis glabris, racemis nutantibus.

Solanum nigrum caule inermi herbaceo, foliis
ovatis dentato angulatis, racemis distichis nu-
tantibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 514. *

In ruderatis ad pagos, sepes, locis cultis, ubi-
que. Aestate.

Offic. Herba Solani.

272. *SOLANUM villosum* caule inermi herbaceo,
ramis teretibus villosis, foliis ovatis angulatis
subvillosis, racemis nutantibus.

Solanum nigrum v. villosum. *Lin. syst. ed. R. I.*
p. 515.

In urbe ipsa versus portam Strahlowianam ad se-
pes in ruderatis freqnens. Aestate.

Specie a Solano nigro distincta, semper e semine
constans. *Solanum virginicum* vero mihi ma-
jori jure, varietas Solani nigri esse videtur.

c. *Flores monopetalii superi.*

PHYTEUMA, *Lin. gen. 236.*

Cor. rotata 5 partita: laciniis linearibus a basi ad
apicem aperientibus. *Stigma* 2 vel 3 fidum.

Capsula 2 f. 3 locularis polysperma.

273. *PHYTEUMA spicata* spica oblonga, capsulis
bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. *Lin.*
syst. ed. R. I. p. 471.

Rapunculus foliis radicalibus cordatis, tubis bicornibus revolutis. *Hall. helv.* 684.

In pratis prope *Briselang* passim. Majo. Junio.
Semper flore albo.

CAMPANULA 234.

Cor. campanulata, fundo clauso valvis staminiferis. *Stigma* 3 fidum. *Capsula* poris lateribus dehiscens.

* *Foliis laevioribus angustioribus.*

274. CAMPANULA *rotundifolia* foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 455.

In nemoribus, pascuis, ad vias, versuras & sepes frequens. Aestate.

275. CAMPANULA *patula* foliis strictis radicalibus lanceolato-ovalibus panicula patula, *Lin. syst. ed. R. I.* p. 455.

In pascuis nemorosis ad *Reineckendorf* & *Tegel* frequens. Junio.

276. CAMPANULA *persicifolia* foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subferratis sessilibus remotis, *Lin. syst. ed. R. I.* p. 456.

¶. *Rapunculus nemorosus* angusti-folius magno flore. *Bauh. pin.* 93.

In den Papenbergen, Jungfernheide, prope *Tegel* frequens. Julio. Augusto.

** *Foliis scabris latioribus.*

277. **CAMPANULA latifolia** foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, floribus solitariis pedunculatis, fructibus cernuis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 418.*

In den Papenbergen rarius. Julio.

278. **CAMPANULA rapunculoides** foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis, sparsis, calycibus reflexis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 458.*

In cultis & inter segetes rarius. Julio.

279. **CAMPANULA Trachelium** caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 460.*

In sepibus, dumetis, nemoribus. e. g. ad Tegel, Schoeneberg, Reineckendorf &c. passim. Julio. Augosto.

280. **CAMPANULA glomerata** caule angulato simplici floribus sessilibus, capitulo terminali. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 460.*

In den Papenbergen, ad Tegel & alibi frequens. Aestate.

d. Flores pentapetali inferi.

RHAMNUS. *Lin. gen. 284.*

- Cal. tubulosus: squamis oris 5 convergentibus. Cor. O. Bacca subrotunda 3 f. 4 sperma.*

281. RHAMNUS *cathartitus* spinis terminalibus,
floribus 4 fidis dioicis, foliis ovatis crenatis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 539.

Ante portam Halensem im Aufstall, im Thiergarten prope venatorem aulicum & alibi frequens.
Majo. Junio.

Offic. Baccae Spinae Cervinae.

282. RHAMNUS *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis, *Lin. syst. ed. R. I. p. 543.*

Im Thiergarten, prope Reineckendorf & alibi copiose. Majo. Junio.

Offic. Cortex Frangulae.

EVONYMUS. *Lin. gen. 291.*

Cor. 5 petala. Capsula 5 gona 5 locularis, colorata. Semina arillata.

283. EVONYMUS *europaeus* floribus subquadrifidis, fructibus apteris, foliis ovatis acutis ferratis.

Evonymus europaeus floribus plerisque quadrifidis, foliis sessilibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 554.*

Im Thiergarten, prope Reineckendorf, in via versus Schoenewald trans pontem lapideum ad fossam & alibi frequens. Majo.

VITIS. *Lin. gen. 305.*

Petala apice cohaerentia, emarcida. Bacca 5 sperma supera.

284. VITIS *vinifera* foliis lobatis sinuatis nudis.

Lin. syst. ed. R. I. p. 569.

Frequens culta. Junio.

Offic. Succus Baccarum fermentatus.

e. *Flores pentapetali superi.*

RIBES. Lin. gen. 301.

Petala 5 & Stamina calyci inserta. Stylus 2 fidus.
Bacca polysperma.

285. RIBES rubrum inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. Lin. syst. ed. R. I. p. 564.

In Thiergarten frequens. Aprili. Majo.

Offic. Baccae Ribium rubrorum.

286. RIBES nigrum inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. Lin. syst. ed. R. I. p. 565.
Locis depressis in der Jungfernheide passim. Aprili. Majo.

Offic. Baccae Ribium nigrorum.

287. RIBES Grossularia ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsutis. Lin. syst. ed. R. I. p. 566.

In nemoribus passim, ad sepes vulgaris. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide &c. Aprili. Majo.

HEDERA. Lin. gen. 304.

Petala 5 oblonga. Bacca 5 sperma, calyce cinerea.

288. HEDERA Helix floribus umbellatis, foliis floralibus ovatis, inferioribus lobatis.

Hedera Helix foliis ovatis lobatisque. Lin. syst.

ed. R. I. p. 568.

Im Thiergarten, Papenbergen & alibi passim.

Augusto. Septembri.

Offic. Folia & Resina Hederae arboreae. (Lignum Baccae.)

Involucrum umbellae minimum.

f. Flores incompleti inferi.

ILLECEBRUM. Lin. gen. 313.

Cal. 5 phyllus, cartilagineus. Cor. O. Stigma simplex. Caps. 5 valvis monosperma.

289. *ILLECEBRUM verticillatum floribus verticillatis nudis, caulis procumbentibus. Lin. syst. ed. R. I. p. 581.*

Paronychia serpillifolia palustris. Vaill. paris.

157. t. 15. f. I.

In pratis humidis ad Reineckendorf, & Friedrichsfelde copiose. Inter Charlottenburg & Grunewald, prope den Gesundbrunnen alibique frequens. Augusto. Septembri.

g. Flores incompleti superi.

THESIUM. Lin. gen. 315.

Cal. 1 phyllus, cui stamna inserta. Nectaria filiformia calyci inserta erecta. Sem. unicum.

290. *THESIUM Linophyllum panicula foliacea, foliis linearibus. Lin. syst. ed. R. I. p. 585.*

Im Thiergarten passim. Prope Spandau & in den Papenbergen frequens. Majo. Junio.

DIGYNIA.

a. *Flores monopetali inferi.*

ASCLEPIAS. Lin. gen. 333.

Contorta. Nectararia 5 ovata, corniculum exsertum.

291. ASCLEPIAS *Vincetoxicum* foliis cordato-ovatis basi subpilosis, caule erecto, floribus fasciculatis.

Asclepias Vincetoxicum foliis ovatis basi barbatis, caule erecto umbellis proliferis. Lin. syst. ed.

R. 1. p. 611.

In den Papenbergen, auf dem Werder prope Spandau copiose, prope Tegel passim, Junio, Julio.

Offic. Radix Vincetoxici.

GENTIANA. Lin. gen. 352.

Cor. 1 petala. Caps. 2 valvis unilocularis. Receptaculis 2 longitudinalibus.

292. GENTIANA *Pneumonanthe* corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus. Lin. syst. ed. R. 1. p. 638.

Pneumonanthe Cordi. Lüders nomcl. fl. march. 60.

In pratis humidis ad Spandau, ante portam Halensem, prope Friedrichsfelde & alibi frequens. Julio, Augusto.

293. GENTIANA *Amarella* corollis quinquefidis hypocrateriformibus, fauce barbatis. Lin. syst. ed. R. 1. p. 644.

Iu pascuis versus Grunewald rarissima. Sep-
tembri.

Offic. (Herba Gentianellae.)

294. GENTIANA Centaurium corollis quinquefi-
dis infundibuliformibus, caule dichotomo,
pistillo simplici. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 642.*

♂. Centaurium minus palustre ramosissimum, flo-
re purpureo. *Vaill. paris. 32. t. 6. f. 1.*

♀. Centaurium minimum flore inaperta. *Vaill.
paris. 32. t. 6. f. 2.*

In pratis ad Spandau frequens, alibi passim.
♂. & ♀. prope Charlottenburg versus Grune-
wald passim. Julio.

Offic. Herba florens Centaurii minoris.

b. Flores incompleti.

ULMUS. *Lin. gen. 345.*

Cal. 5 fidus. Cor. O. Capsula 1 sperma alata.

295. ULMUS campestris foliis duplicato-ferratis,
basi inaequalibus; floribus subsessilibus con-
gloineratis.

Ulmus campestris foliis duplicato-ferratis basi in-
aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 631.*

In plateis & ad vias ante urbem, ad pagos inque
nemoribus frequens. Aprili. Majo.

Offic. Cortex Ulmi. (Folia.)

296. ULMUS effusa foliis duplicato-ferratis, basi
inaequalibus; floribus longe pedunculatis

Iisdem locis passim. Aprili. Majo.

Flores 4 plo majores longe pedunculati effusi, a praecedenti diversissimi. *Ulmus hollandica*, *scabra*, *sativa Milleri* nil nisi varietates campestris sunt, & cultra ortae; ast nostra species primo intuitu diversa, & constanter manet.

HERNIARIA. Lin. gen. 336.

Cal. 5 partitus. Cor. O. Stamina 5 sterilia. Cap. sula 1 sperma.

297. HERNIARIA glabra, glabra glomerulis multifloris. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 615.*

In pascuis siccis, locisque apricis glareofis *beim Unterbaum*, ante *portam Halensem*, prope *Fridrichsfelde* & alibi frequens. Junio. Julio. Offic. (*Herba Herniariae s. Millegranae.*)

CANNABIS. Lin. gen. 1220.

♂—♀. ♂. *Cal. 5 partitus. Cor. O.*

♀. *Cal. 1 phyllus, integer, hians. Cor. O. Nux 2 valvis, intra calycem clausum.*

298. CANNABIS sativa folis digitatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 251.*

In ruderatis humidis passim, ante *portam Lipsiensem* frequens. Julio. Augusto. Offic. Sem. Cannabis.

HUMULUS. Lin. gen. 1221.

♂—♀. ♂. *Cal. 5 phyllus. Cor. O.*

♀. *Cal. 1 phyllus oblique patens integer. Cor. O.*

Sem. 1 intra calycem foliatum

299. HUMULEUS Lupulus. Lin. syst. ed. R. 4.
p. 252.

Im Thiergarten, ante portam Halensem im Auf-
stall, prope Spandau & alibi passim. Plantatus
ad Schoeneberg occurrit. Julio. Augusto.

Offic. Strobili Lupuli. (*Radix.*)

ATRIPLEX. Lin. gen. 1260.

♂. Cal. 5 phyllus. Cor. O. Sem. I. compressum.

♀. Cal. 2 phyllus. Cor. & Sem. ut in herma-
phrodito.

300. ATRIPLEX rosea caule herbaceo, foliis inca-
nis serratis, fructibus quadrangularibus den-
tatis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 323.

In ruderatis ad pagos passim, ante portam Halen-
sem in coemeterio & prope Spandau frequens.
Julio. Augusto.

301. ATRIPLEX hortensis caule erecto herbaceo,
foliis triangularibus. Lin. syst. ed. R. 4. p. 324.
♂. Tota rubra.

Loci cultis, hortisque frequens, ♂. passim. Ju-
lio. Augusto.

Offic. (*Herba Atriplicis.*)

302. ATRIPLEX hastata caule herbaceo: calycinis
valvulis feminis magnis deltoidibus sinuatis,
foliis triangularibus. Lin. syst. ed. R. 4. p. 324.
♂. Foliis obtusioribus.

In sepibus, ruderatis, ad vias & pagos passim.
Julio. Augusto.

303. **A TRIPLEX** *patula* caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 325.
In ruderatis, fimetus, ad vias & sepes frequens.
Augusto.

CHENOPODIUM. *Lin. gen. 337.*

Cal. 5 phyllus 5 gonus. **Cor.** O. **Sem.** 1 lenticulare superum.

* *Foliis angulatis.*

304. **CHENOPODIUM** *Bonus Henericus* foliis triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllois axillaribus. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 617.

Ad pagos, sepes, inque ruderatis vulgaris; e. g. ad *Pancko*, *Tegel*, *Reineckendorf*, *Neuendorf* &c. Junio. Julio.

Offic. Herba Boni Henrici.

305. **CHENOPODIUM** *urbicum* foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis, cauli approximatis longissimis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 617.

Ad pagos in ruderatis rarius v. g. ad *Pancko*, *Spandau* &c. Augusto.

306. **CHENOPODIUM** *rubrum* foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis, compositis, subfoliosis, caule brevioribus. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 617.

In ruderatis ad sepes & pagos frequens. Julio. Augusto.

Offic. (Herba Atriplicis sylvestris.)

307. CHENOPODIUM *hybridum* foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis.
Lin. syst. ed. R. 1. p. 619.

In sepibus, ruderatis, ad pagos vulgaris. Julio.
 Augusto.

Offic. (Herba Pedis anserini secundi.)

308. CHENOPODIUM *album* foliis rhomboideo-triangularibus erosis postice integris: summis oblongis, racemis erectis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 618.*

In cultis, sepibus, ruderatis, plateis urbis, ad pagos copiose. Julio. Augusto.

309. CHENOPODIUM *viride* foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis.
Lin. syst. ed. R. 1. p. 619.

Iisdem locis, eodemque tempore copiose.

310. CHENOPODIUM *glaucum* foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus globatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 621.*

In cultis, fimetis, ad fossas, pagos, in urbe & alibi abunde. Julio. Augusto.

** *Foliis integris.*

311. CHENOPODIUM *vulvaria* foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 621.*

Ad muros, sepes, vias inque ruderatis frequens.
 Julio. Augusto.

Offic. (Herba Vulvariae.)

312. **CHENOPODIUM polyspermum** foliis integerimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 621.

In ruderatis ad *Schoeneberg* rarius, inque hortis ad *Spandau* passim. Junio. Julio.

BETA. *Lin. gen. 338.*

Cal. 5 phyllus. *Cor.* O. *Semen reniforme intra substantiam baseos calycis.*

313. **BETA vulgaris** floribus congestis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 623.

Inter olera, locisque cultis; in hortis frequens culta. Julio. Augusto.

SALSOLA. *Lin. gen. 339.*

Cal. 5 phyll. *Cor.* O. *Caps. 1 sperma. Sem. cochleata.*

314. **SALSOLA Kali** herbacea decumbens, foliis subulatis spinosis, calycibus marginatis axillaribus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 624.

In campis arenosis ante portam *Oranienburgi-cam* versus *patibulum* copiosissime. Julio. Augusto.

c. Flores umbellati.

HYDROCOTYLE. *Lin. gen. 355.*

Umbella simplex. Invol. 4 phyllo. *Petala integrata. Semina orbiculato-compressa.*

315. HYDROCOTYLE *vulgaris* foliis peltatis, um.
bellis quinquefloris. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 657.
Im Thiergarten locis humidis copiose. *In der*
Jungfernheide, prope *Tegel* & alibi frequens.
Junio. Julio.

CAUCALIS. *Lin. gen. 362.*

Involucr. integra. *Petala* inflexo emarginata.
Fructus setis undique hispidis.

316. CAUCALIS *Anthriscus* foliis bipinnatis laci-
niis latis, seminis ovali aculeis rectis. *Cranz.*
austr. p. 226.

Tordylium Anthriscus umbellis confertis, foliolis
ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Lin. syst. ed. R.*
1. p. 665.

Im Thiergarten & alibi frequens, praecipue ad
margines nemorum. Junio. Julio.

317. CAUCALIS *Scandicina* foliis tripinnatis semi-
nibus acuminatis. *Wiggers primit. 23. n. 231.*

Scandix Anthriscus seminibus acutis hispidis, co-
rollis uniformibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 706.*

Im Thiergarten & alibi frequens. Majo. Junio.

DAUCUS. *Lin. gen. 364.*

Cor. subradiatae. *Flosculi* disci abortivi. *Semen*
in quatuor angulis hispidum.

318. DAUCUS *Carota* involucro universali pinna-
tifido, flosculo centrali nullo. *Wiggers pri-
mit. 23. n. 233.*

Daucus Carota seminibus omnibus hispidis, petio-
lis subtus nervosis. *Lin. syst. ed. R. 1. v. 667.*

In der Hasenheide copiose, alibique in viis cavis,
nemoribus passim. Aestate.

Offic. Semen Dauci sylvestris.

319. *Daucus mauritanicus* involucro universali
pinnatifido, flosculo centrali sterili carnoso.

Daucus mauritanicus seminibus hispidis, flosculo
centrali sterili carnoso, receptaculo communi
hemisphaerico. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 668.

In der Hasenheide passim. Junio. Julio.

Numne potius varietas praecedentis? Talem
florem sterilem rubrum carnosum, in Dauco
lucido & Carota sativa saepius observavi, &
nimio incremento, vel loco argilloso tantum
adscribendum.

CONIUM. *Lin. gen. 367.*

Involutella dimidiata sub 3 phylla. *Fructus* ellip-
ticus. *Semina* striis 4 crenulatis.

320. *Conium maculatum* caule maculato hispido,
foliolis pinnatifidis: laciniis dentatis.

Conium maculatum seminibus striatis. *Lin. syst.
ed. R. 1.* p. 672.

In ruderatis ad pagos prope Wilmersdorf, Schoe-
neberg & alibi passim. Julio. Augusto.

Offic. Herba Cicutae Stoerkii. (*Semina Conii.*)

SELINUM. *Lin. gen. 368.*

Petala cordata aequalia. *Semen* ovatum, com-
pressum, planus: striis 3 ad 5 elevatis.

321 SELINUM *palustre* caule laevi sublaetescente,
radice unica, foliis quadruplicato-pinnatis
linearibus.

Selinum palustre sublaetescens, radice unica. *Lin.*
syst. ed. R. I. p. 673.

Locis humidis *im Thiergarten*, prope *Fridrichs-*
felde & alibi passim. Julio.

Offic. (*Radix Qelsnitii s. Elsnitii.*)

322. SELINUM *Carvifolia* caule fulcato acutan-
gulo, foliis triplicato-pinnatis: pinnis la-
tiusculis simplicibus trifidisve, foliolis apice
mucronatis.

Selinum Carvifolia caule fulcato acutangulo, in-
volucro universali evanido, pistillis fructus re-
flexis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 674. *suppl.* 180.

In pascuis pratisque subhumidis prope *Schoene-*
berg, *Fasanerie*, *Reineckendorf* & alibi satis
frequens. Julio. Augusto.

Semina trifulcata: fulcis alatis.

A THAMANTA. *Lin. gen.* 369.

Petala inflexa emarginata. Fructus ovato-oblon-
gus, convexus, striatus.

323. ATHAMANTA *Cervaria* foliis duplicato-pin-
natis, foliolis oblongis obtusis trilobis, den-
tato ferratis: serraturis mucronatis.

Athamanta Cervaria foliolis pinnatis decussatis
inciso-angulatis, seminibus nudis. *Lin. syst.*
ed. R. I. p. 676.

In den Papenbergen frequens, prope Tegel & Friedrichsfelde passim. Julio. Augusto.

Involucrum partiale polyphyllum longitudine umbellae: foliis reflexis lanceolatis, apice setaceis.

324. ATHAMANTA *Oreoselinum* foliis triplicato-pinnatis: foliolis lanceolatis trifidis, integerimis, divaricatis.

Athamanta Oreoselinum foliolis divaricatis. Lin. syst. ed. R. I. p. 677.

Ad Pancko, Rummelsburg, Tegel, Spandau alibi que in apricis siccis frequens. Junio. Julio.

Involucrum partiale dimidiatum: foliis lanceolatis.

Offic. Herba Oreoselini. (Radix.)

LASERPITIUM. *Lin. gen. 374.*

Petala patentia emarginata. Semen oblongum: angulis membranaceis.

325. LASERPITIUM *prutenicum* foliolis cuneiformi-lanceolatis pinnatifidis integerrimis: extensis coalitis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 685.*

In den Papenbergen frequens. Julio. Augusto.

HERACLEUM. *Lin. gen. 375.*

Petala difformia inflexo-emarginata. Styli retroflexi. Semen marginatum ellipticum, compressum, emarginatum.

326. HERACLEUM *Sphondylium* foliolis pinnatifidis laevibus, floribus uniformibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 686.*

In sepibus ad pagos passim, inque nemoribus
humidis. Julio. Augusto.

Offic. Herba Brancae ursinae,

ANGELICA. *Lin. gen.* 377.

Corollae aequales, petalis incurvis. Semen ova-
tum, angulatum, alatum, tricostatum.

327. ANGELICA *sylvestris* foliis duplicato-pinnata,
ovatis, serratis. *Hall. helv.* 806.

Angelica sylvestris foliolis aequalibus ovato-lan-

ceolatis serratis. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 691.

In den Papenbergen frequens, alibi rarius. Ju-
lio. Augusto.

Offic. (*Radix Angelicae sylvestris.*)

SIUM. *Lin. gen.* 378.

Corollae uniformes hermaphroditi. Petala cor-
data, Semen ovatum striatum (absque alis, co-
stis & rostro.)

328. SIUM *latifolium* foliis pinnatis argute denta-
tis, umbellis terminalibus.

Siuum latifolium foliis pinnatis, umbella termi-
nali. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 693.

In aquis stagnantibus, fossis, ripis inundatis flu-
viorum copiose. Julio.

329. SIUM *angustifolium* foliis pinnatis dentatis,
umbellis axillaribus pedunculatis, involucro
universali pinnatifido. *Lin. syst. ed. R.* 1.
p. 693.

In fossis ad Friedrichsfelde rarius. Julio.

330. *Sium nodiflorum* foliis pinnatis : umbellis axillaribus sessilibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 694.

In fossis *beim Gesundbrunnen* frequens, Julio, Augusto,

331. *Sium Sisarum* foliis pinnatis : floralibus ternatis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 694.

In hortis & agris frequens cultum, Julio, Augusto.

332. *Sium Falcaria* foliis linearibus crenulatis, decurrentibus connatis, *Lin. syst. ed. R. I.* p. 694.

Sium foliis firmis, ferratis, pinnatis, nervo folioso latecente. *Hall. helv. n. 782.*

In agris *beim Gesundbrunnen*, prope *Svandau* *hinterm Gewehrplan* & vineas versus, frequens. Julio,

OENANTHE. *Lin. gen. 382.*

Flosculi difformes, *Styli* erecti persistentes. *Fructus* ellipticus angulatus, decemstriatus, calyce coronatus.

333. *OENANTHE fistulosa* stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis, *Lin. syst. ed. R. I.* p. 699.

Oenanthe foliis radicalibus rotunde lobatis, planis, caulinis fistulosis. *Hall. helv. n. 755.*

In pratis paludosis, fossis, locisque inundatis frequens. e. g. ante *portam Halensem*, *in der Zufahrt* *zur Stadt*. Julio.

PHELLANDRIUM. Lin. gen. 383.

Flosculi disci minores. Styli recurvi persistentes.
Fructus oblongus leviter decemstriatus, calyce
coronatus.

334. PHELLANDRIUM *aquaticum* foliorum rami
 ficationibus divaricatis. Lin. *syst. ed.* R. I.
 p. 701.

Phellandrium aquaticum caulis dichotomus, aquis
 immersus, foliorum ramis divaricatis. Scop.
 carn. ed. 2. n. 363.

In aquis quietis, fossis. e. g. im *Thiergarten*,
 prope *Rummelsburg*, *Reineckendorf* & alibi
 frequens. Julio.

Nostra species semper caule aqua immerso, nun-
 quam caule erecto, occurrit. *Halae Saxo-*
num istam semper caule erecto vidi. Num
 specie differt?

Offic. Semen Phellandrii s. Foeniculi aquatichi.

CICUTA. Lin. gen. 384.

Flores hermaphroditi uniformes. Fructus subo-
vatus, sulcatus.

335. CICUTA *viresa* umbellis oppositi-folis, pe-
 tiolis marginatis obtusis. Lin. *syst. ed.* R. I.
 p. 702.

In lacu prope *Reineckendorf* copiosissime, & alibi
 passim. Julio. Augusto.

Offic. Herba Cicutae aquatica Wipferi.

AETHUSA. *Lin. gen. 385.*

Semen globosum, quatuor sulcis exaratum, inde fructus octogonus.

336. AETHUSA *Cynapium* foliis conformibus.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 703.

In cultis, nemoribusque humidis passim. Julio.
Involucella dimidiata, longissima pendula.

CORIANDRUM. *Lin. gen. 386.*

Fructus sphaericus absque striis & sulcis.

337. CORIANDRUM *sativum* fructibus globosis.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 704.

In hortis, locisque cultis, inter olera rarius.
Junio. Julio.

Offic. Semen Coriandri.

SCANDIX. *Lin. gen. 387.*

Petala cordata. Styli recti. Fructus oblongus glaber, striatus, rostro terminatus.

338. SCANDIX *Pecten* seminibus rostro longissimo.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 705.

Myrrhis seminis cornu longissimo. *Hall. helv. 754.*

Ante portam Halensem semel lecta, in via versus Rüdersdorf rarius. Julio. Augusto.

339. SCANDIX *Cerefolium* seminibus nitidis ovato-subulatis, umbellis sessilibus lateralibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 706.*

Cerefolium foliis glabris, triplicato-pinnatis, lo-

In cultis, hortis, pomariis frequens. Majo.
Offic. Herba Cerefolii. (*Semina.*)

340. *Scandix temula* caule geniculato, scabro:
geniculis tumidis, foliis hirsutis, laciniis ob-
tusis. *Wiggers primit.* n. 236.

Chaerophyllum temulum caule scabro, geniculis
tumidis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 710.

In dumetis, sepibus, ruderatis, locisque um-
brofis humidis copiose. e. g. *vorm Unterbaum*,
prope *Briselang &c.* Aestate.

CHAEROPHYLLUM. *Lin. gen.* 388.

Petala inflexo cordata. Styli reflexi. Fructus levi-
ter striatus, attenuatus, laevis.

341. *CHAEROPHYLLUM sylvestre* caule striato, ge-
niculis tumidis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 708.

Cerefolium foliis triplicato-pinnatis, acute den-
tatis, glabris, nervis hirsutis. *Hall. helv.*
n. 748.

In nemorosis umbrosis frequens. e. g. *im Thier-*
garten bei den Puppen &c. Majo. Junio.

Offic. (*Herba Cicutariae.*)

SESELI. *Lin. gen.* 390.

Umbellae globosae. Fructus ovatus striatus.

342. *SESELI tortuosum* caule alto rigido, foliolis
linearibus fasciculatis. *Lin. syst. ed. R. I.* p.
715. *Pollich. pal. I.* p. 300. n. 302.

In den Papenbergen passim. Augusto.

PASTINACA. Lin. gen. 393.

Petala involuta integra. *Fructus* ellipticus, compressus, marginatus.

343. PASTINACA sativa foliis simpliciter pinnatis.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 719.

Pastinaca sylvestris foliis simpliciter pinnatis hirsutis. Mill. dict. n. 1.

B. *Pastinaca sativa* foliis simpliciter pinnatis glabris. Mill. dict. n. 2.

In pascuis & pratis passim, frequens culta. Aestate.

Offic. (Semina & Radix Pastinacae.)

ANETHUM. Lin. gen. 394.

Petala involuta integra. *Fructus* subovatus, compressus, striatus.

344. ANETHUM graveolens fructibus compressis.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 721.

In hortis frequens cultum. Aestate.

Offic. Semina & Herba Anethi.

345. ANETHUM Foenicum fructibus ovatis. Lin.

syst. ed. R. 1. p. 722.

Frequens cultum occurrit. Aestate.

Offic. Herba & Semina Foeniculi.

CARUM. Lin. gen. 395.

Petala carinata inflexo-emarginata. *Fructus* ovato-oblongus, gibbus, striatus.

346. CARUM Carvi. Lin. syst. ed. R. 1. p. 722.

Apium Carvi pinnis conjugatis, pinnis circa co-

Seseli Carum. Scop. carn. ed. 2. n. 361.

In pratis & pascuis ante portam Halensem, prope Rummelsburg, Spandau hinter den Schülerbergen & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. Semina Carvi. (*Herba.*)

PIMPINELLA. Lin. gen. 396.

Petala inflexa. Styli erecti. Semen ovato-oblongum; striis quinis elevatis.

347. PIMPINELLA *Saxifraga* caule striato glabro, foliis pinnatis glabris: radicalibus foliolis subrotundis argutedentatis: caulinis bipinnatis linearibus.

Pimpinella Saxifraga foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis: summis linearibus.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 723.

β. minor absque foliis caulinis.

In der Hasenheide, Jungfernheide, prope Tegel, Friedrichsfelde, Spandau & alibi copiose. β. locis sterilissimis. Julio. Augusto.

Offic. Radix Pimpinellae albae. (*Herba, Semina.*)

348. PIMPINELLA *nigra* caule striato piloso, foliis pinnatis villosis: radicalibus foliolis obcordatis incisis obtuse dentatis; caulinis bipinnatis: foliolis cuneiformibus dentatis.

Pimpinella Saxifraga. β. Lin. syst. ed. R. 1. p. 723.

Pimpinella *Saxifraga major altera. Bauh. pin.*

159. *Riv. t. 81.*

In der Jungfernheide & prope Tegel passim.

Julio. Augusto.

PENTANDRIA DIGYNIA. 111

Diversissima a praecedenti; tota planta villulosa, dentes foliorum obtusissimi, radices caeruleo laetescentes.

Offic. Radix Pimpinellae nigrae.

349. *PIMPINELLA magna* foliis uniformibus pinnatis, foliolis omnibus lobatis, impari trilobo.

Pimpinella magna foliolis omnibus lobatis: impari trilobo. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 723.

Ad Spandau in collibus prope den Pulvermagazinen frequens. Junio. Julio.

APIUM. *Lin. gen.* 397.

Petala aequalia. Flores disci masculi. Semina minuta, ovata, striata.

350. *APIUM Petroselinum* foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 725.

In hortis frequens colitur. Julio.

Offic. Sem. Petroselini & Radix.

351. *APIUM graveolens* foliis caulinis cuneiformibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 726.

In hortis copiose cultum. Julio.

Offic. (*Semen Apii.*)

AEGOPODIUM. *Lin. gen.* 398.

Flores uniformes. Styli longitudine corollae. Semina ovato-oblonga, gibba, striata.

352. AEGOPODIUM *Podagraria* foliis caulinis summis ternatis. Lin. syst. ed. R. I. p. 726.

Aegopodium foliis inferioribus biternatis sessili-
bus, caulinis superioribus ternatis. Necker
gallob. p. 153.

Ligusticum Podagraria. Cranz aust. p. 200.

Seseli Aegopodium. Scop. carn. ed. 2. n. 359.

Sium Podagraria. Wiggers primit. 24. n. 245.

Ad Schoeneberg, Pancko, Schoenhausen, Rum-
melsburg, Charlottenburg, Spandau & alibi
in hortis, locis cultis, ad sepes dumetaque
copiose. Junio.

Offic. (Herba Podagrariae.)

TRIGYNIA.

VIBURNUM. Lin. gen. 400.

Cal. 5 partitus superus. Cor. 5 fida. Bacca mono-
nosperma.

353. VIBURNUM *Opulus* foliis lobatis, petiolis
glandulosis. Lin. syst. ed. R. I. p. 734.

β. Viburnum roseum.

Locis paludosis ante portam Halensem, prope
Reineckendorf, Spandau & alibi passim. β. in
hortis cultum. Majo.

SAMBUCUS. Lin. gen. 402.

Cal. 5 partitus. Cor. 5 fida. Bacca trisperma.

354. SAMBUCUS *nigra* cymis quinque partitis,
caule arboreo. Lin. syst. ed. R. I. p. 737.

In sepibus, dumetis ad pagos vulgaris. Junio.
Offic. Baccae Sambuci & Flores. (*Cortex, Folia, Semina.*)

355. *SAMBUCUS Ebulus* cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 736.

Im Thiergarten & alibi rarius. Junio.
Offic. Baccae & Folia Ebuli. (*Cortex, Flores, Semina.*)

CORRIGIOLA. *Lin. gen. 409.*

Cal. 5 phyllus. *Petala* 5. *Semen* 1. triquetrum.

356. *CORRIGIOLA littoralis.* *Lin. syst. ed. R. I.* p. 743.

Corrigiola caule fasciculis florum terminato.
Hort. cliff. 112.

In fossis exsiccatis arenosis *in der Jungfernheide*, ad viam versus *Tegel*, prope den *Gesundbrunnen*, *Fridrichsfelde*, ante portam *Halensem* & alibi frequens. Junio. Julio.

ALSINE. *Lin. gen. 411.*

Cal. 5 phyllus. *Petala* 5 aequalia. *Capula* 1 foliaris trivalvis.

357. *ALSINE media* petalis bipartitis, foliis ova-to-cordatis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 746.

In cultis, hortis, agris ubique copiosissime.
 Aestate.

Offic. (*Herba Alsines.*)

AMARANTHUS. Lin. gen. 1157.

Cal. 3 f. 5 phyllus. *Cor.* O. *Capsula* unilocula-
ris circumscissa. *Semen* unicum.

358. AMARANTHUS *Blitum* glomerulis laterali-
bus: floribus triandris trifidis, foliis ovatis
retusis, caule diffuso. Lin. syst. ed. R. 4.
p. 145.

In plateis urbis, ad sepes, inque ruderatis co-
piose. Julio. Augusto.

Offic. (Herba Bliti.)

359. AMARANTHUS *hypochondriacus* racenis pen-
tandris compositis confertis erectis, foliis ova-
tis mucronatis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 148.

In cultis inter olera passim. Julio. Augusto.

TETRAGYNIA.

SPINACIA. Lin. gen. 1218.

♂. ♀. ♂. Cal. 5 partitus. Cor. O.

♀. Cal. 4 fidus. Cor. O. Semen 1, intra caly-
cem induratum.

360. SPINACIA *oleracea* fructibus sessilibus. Lin.
syst. ed. R. 4. p. 250.

Culta abunde in hortis. Aestate.

PARNASSIA. Lin. gen. 415.

Cal. 5 partitus. Petal. 5. Nectur. 5. squamoso-
glandulosa, glandulis pedicellatis. Caps.
4 valvis.

PENTANDRIA PENTAGYNYIA. 115

361. PARNASSIA *palustris.* Lin. syst. ed. R. I.

p. 749.

In pratis humidis copiose. Julio. Augusto.

PENTAGYNYIA.

STATICE. Lin. gen. 418.

Cal. 1 phyllus integer plicatus, scariosus. *Petal*a 5. *Semen* unicum, superum; *pappo* cartilagineo.

362. STATICE *Armeria* scapo simplici capitato, foliis linearibus. Lin. syst. ed. R. I. p. 750.

In pascuis fccis, ad vias, inque collibus apricis graminosis abunde. Junio. Julio.

LINUM. Lin. gen. 419.

Cal. 5 phyllus. *Petala* 5. *Capsula* 5 valvis, decemlocularis. *Semina* solitaria.

* *Foliis alternis.*

363. LINUM *usitatissimum* calycibus, capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. Lin. syst. ed. R. I. p. 753.

In agris frequens colitur. Aestate.

Offic. Semen Lini.

* * *Foliis oppositis.*

364. LINUM *catharticum* foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. Lin. syst. ed. R. I. p. 765.

In pascuis, pratisque satis frequens. e. g. ante portam Halensem, beim Unterbaum, prope Rummelsburg, Reineckendorf &c. Julio. Augusto.

Offic. (*Herba cathartica*.)

365. LINUM *Radiola* foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragyniis. Lin. syst. ed. R. I. p. 765.

In der Jungfernheide, beim Gesundbrunnen, prope Charlottenburg & alibi frequens. Julio. Augusto.

DROSERA. Lin. gen. 421.

Cal. I phyllus 5 fidus. Petala 5. Capsula I locularis, apice 5 valvis. Sem. plurima.

366. DROSERA *rotundifolia* scapis radicatis foliis orbiculatis. Lin. syst. ed. R. I. p. 766.

Drosera rotundifolia foliis orbiculatis, scapis radicatis, floribus hexagynis. Huds. angl. ed. 2. tom. I. p. 135.

In der Jungfernheide & Grunewald locis turfosis humidis copiose. Julio. Augusto.

Offic. (*Herba Roris Solis s. Rorellae*.)

367. DROSERA *longifolia* scapis radicatis, foliis oblongo-lanceolatis.

Drosera longifolia scapis radicatis, foliis ovali-oblongis. Lin. syst. ed. R. I. p. 766.

PENTANDRIA POLYGYNIA. 117

Drosera longifolia foliis oblongis, scapis radicatis, floribus hexagynis. *Huds. angl. ed. 2.*
tom. I. p. 135.

Iisdem locis frequens. Julio. Augusto.

POLYGYNIA.

MYOSURUS. *Lin. gen. 426.*

Cal. 5 phyllus, basi adnatus. **Nectar.** 5, ligulata
petaliformia. *Semina numerosa.*

368. **MYOSURUS minimus** foliis integerrimis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 778.

In agris arenosis, ad pagos & vias vulgaris.
April. Majo.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA
MONOGYNIA.

a. *Flores absque calyce, spathacei.*

ALLIUM. Lin. gen. 442.

Spatha multiflora. *Umbella* congesta. *Cor.* 6 pe-
tala patens. *Capsula* supera.

* *Foliis caulinis planis. Umbella capsuli fera.*

369. ALLIUM *Porrum* caule planifolio umbellife-
ro, staminibus tricuspidatis. Lin. syst. ed. R.
2. p. 29.

Cultum in hortis frequens. Aestate.

** *Folia caulinata plana. Umbella bulbifera.*

370. ALLIUM *carinatum* caule planifolio bulbi-
fero, staminibus subulatis. Lin. syst. ed. R.
2. p. 33.

Allium *umbella* *bulbifera*, *vagina bicorni*, *foliis*
carinatis. Hall. all. 27. t. 2. f. 2.

Prope *Spandau* in collibus *bei den Pulvermagazi-*
nen frequens. Julio.

*** *Folia caulinata teretia. Umbella bulbifera.*

371. ALLIUM *vineale* caule teretifolio bulbifero,
staminibus tricuspidatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 36.

Inter segetes copiose. Junio, Julio.

**** Folia radicalia. Scapus nudus.

372. ALLIUM *senescens* scapo nudo ancipiti, foliis linearibus subtus convexis laevibus, umbella subrotunda staminibus subulatis. Lin. syst. ed. R. 1. p. 38.

In hortis cultum frequens. Aestate.

373. ALLIUM *Cepa* scapo nudo inferne ventricoso, longiore foliis teretibus. Lin. syst. ed. R. 2. p. 41.

Copiose cultum occurrit. Aestate.

Offic. Bulbus recens Cepae.

374. ALLIUM *Schoenoprasum* scapo nudo, adaequante folia teretia subulato-floriformia. Lin. syst. ed. R. 2. p. 41.

Colitur hic frequens. Aestate.

b. Flores absque calyce & spatha.

LILIUM. Lin. gen. 443.

Cor. 6 petala campanulata : linea longitudinali nectarifera. Capsul. valvulis pilo cancellato connexis.

375. LILIUM *Martagon* foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. Lin. syst. ed. R. 2.

p. 45.

In den Papenbergen frequens. Junio.

Offic. (Radix Asphodeli.)

ORNITHOGALUM. Lin. gen. 451.

Cor. 6 petala, recta, persistens, supra medium petens. Filamenta alterna basi dilatata.

* *Staminibus omnibus dilatatis.*

376. *ORNITHOGALUM luteum* scapo anguloſo
diphylo, pedunculis umbellatis ſimplicibus.
Lin. Syst. ed. R. 2. p. 53.

In agris, horumque verſuris frequens. Martio.
Aprilī.

377. *ORNITHOGALUM minimum* scapo anguloſo
diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. *Lin.*
Syst. ed. R. 2. p. 53.

In agris ad *Ricksdorf & Spandau* paſſim. Martio.
Aprilī.

Binis in ſpeciebus stamina ſubulata, nec baſi dila-
tata ſunt.

Forte varietas praecedentis.

** *Staminibus alternis dilatatis.*

378. *ORNITHOGALUM nutans* floribus ſecundis
pendulis, neſtario ſtamineo campaniformi.
Lin. Syst. ed. R. 2. p. 56.

In pomariis paſſim. Majo.

ANTHERICUM. Lin. gen. 455.

Cor. 6 petala, patens. Capsula ovata.

379. *ANTHERICUM ramosum* foliis planis, scapo
ramoſo, corollis planis pistillo reſto. *Lin.*
Syst. ed. R. 2. p. 62.

Im *Thiergarten & Jungfernheide* paſſim, prope
Tegel frequens. Junio.

380. *ANTHERICUM Liliago* foliis planis, scapo
ſimpliciſſimo, corollis planis pistillo declinato.
Lin. Syst. ed. R. 2. p. 63.

In der Hasenheide frequens, ad *Fridrichsfelde* passim. Majo. Junio.

ASPARAGUS. Lin. gen. 457.

Cor. 6 partita, petalis tribus interioribus apice reflexis. *Pomum 3 loculare dispermum.*

381. **ASPARAGUS officinalis** caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. Lin. syst. ed. R. 2. p. 68.

In pratis atque nemoribus frequens. Ad sepes & pagos passim. Junio.

Offic. (Baccae, Semina & Radices Asparagi.)

CONVALLARIA. Lin. gen. 459.

Cor. 6 vel 4 fida. Pomum 3 vel 2 loculare ante maturitatem maculofum.

* *Lilium convallium: corollis cum panulatis.*

382. **CONVALLARIA majalis** scapo nudo tereti.

Lin. syst. ed. R. 2. p. 73.

In den Papenbergen frequens. Majo.

Offic. Flores Lilii convallii.

** *Polygonata: corollis infundibuliformibus.*

383. **CONVALLARIA Polygonatum** foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. Lin. syst. ed. R. 2. p. 74.

¶ Floribus plenis.

In der Hasenheide, Jungfernheide, Thiergarten & alibi frequens. ¶ rarius. Majo. Junio.

Offic. Radices Sigilli Salomonis.

384. CONVALLARIA *multiflora* foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti pedunculis axillaribus multifloris. Lin. syst. ed. R. 2. p. 74.
In der Jungfernheide & Briselang passim. Majo. Junio.

*** *Smilax: corollis rotatis.*

385. CONVALLARIA *bifolia* foliis cordatis, floribus tetrandris. Lin. syst. ed. R. 2. p. 75.
Majanthemum Convallaria. Wiggers primit. 15. n. 141.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Papenbergen & alibi abunde. Majo. Junio.

Numero staminum & corollae laciniis quadrifidis, pomoque biloculari, differt; sed hae ad genus distingendum haud sufficiunt.

Offic. (Herba Unifolii.)

ARISTOLOCHIA. Lin. gen. 411.

Cal. O. Cor. 1 petala, ligulata, integra. Styl. O. Stigma glabrum 6 fidum. Capsula bilocularis infera.

386. ARISTOLOCHIA *Clematitidis* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 61.

Prope Spandau ad sepes ante portam Charlottenburgicam pone domicilium sylviarii frequens. Junio. Julio.

Offic. Radix aristolochiae longae, vulgaris.

c. Gramina.

ACORUS. Lin. gen. 468.

Spadix cylindricus, tectus flosculis. Corollae hexapetala, nuda. Stylus nullus. Capsula trilocularis.

387. ACORUS *Calamus*. Lin. syst. ed. R. 2. p. 92.

Locis paludosis, inque fossis copiose. v. g. in der Jungfernheide &c. Junio. Julio.

Offic. Radix Calami aromatici.

JUNCUS. Lin. gen. 471.

Cal. 6 phyllus persistens. Cor. O. Capsula unicocularis, trivalvis.

* *Culmis nudis.*

388. JUNCUS *conglomeratus* culmo nudo stricto, capitulo laterali: floribus triandris. Ehrhart. hanoev. Magaz. 1784. Stück 8. p. 115. n. 5.

Juncus conglomeratus culmo nudo stricto, capitulo laterali. Lin. syst. ed. R. 2. p. 94.

In der Jungfernheide & prope Spandau locis depressis humidis passim. Junio. Julio.

389. JUNCUS *effusus* culmo nudo stricto, panicula laterali laxa: floribus triandris. Ehrhardt. l. c.

Juncus effusus culmo nudo stricto, panicula laterali. Lin. syst. ed. R. 2. p. 94.

Locis humidis depressis, inque pratis frequens. Junio. Julio.

390. *Juncus inflexus* culmo nudo, apice membranaceo, panicula laterali: floribus acuminateis hexandris.

Juncus inflexus culmo nudo, apice membranaceo incurvo, panicula laterali. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 95.

Cum praecedenti frequens eodem tempore.

** *Culmis foliosis.*

391. *Juncus articulatus* foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 97.

Juncus articulatus compressis, panicula semel ramosa. *Hall. helv.* n. 1322.

♂. *Juncus* foliis articulatis teretibus, panicula repetito-ramosa. *Hall. helv.* 1323.

γ. *Gramen junceum* folio articuloso, cum utriculis. *Bauh. prodr.* 12. (viviparus.)

In pratis humidis, locisque uliginosis & ad fossas copiose ♂. rarius. γ. *in der Jungfernheide, Spandauerheide ad lacum Diaboli* passim. Junio. Julio.

392. *Juncus Tenageja annuus*, culmo ramoso-paniculato, floribus solitariis, petalis ovato-oblongis, capsulis subglobosis. *Lin. suppl. pl.* 208.

In pratis prope Schoeneberg & alibi passim. Junio. Julio.

393. *Juncus bulbosus* culmo compressiusculo, foliis linearis-canaliculatis; corollis capsulisque obtusis; bractea panicula majori.

Juncus bulbosus foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 97.

Leers herborn, 266. t. 13. f. 7.

Prope *Spandau* in pratis copiose. Junio.
Julio.

Bractea interdum panicula minor, sed rarius,
saepius longior, vel ejusdem longitudinis.

394. JUNCUS *Sprengeli* culmo subtriquetro canaliculato; foliis linear-canaliculatis; corollis acutis, capsulis obtusis, bractea panicula multo minori.

In der Spandauerheide in pratis versus *Falkenhausen* frequens. Julio.

Culmus sesquipedalis & ultra, glaber striatus, hinc convexus, nervo elevato, inde concavus canaliculatus. Folia culmi nulla, nisi bracteas, ita nuncupes; radicalia multa vaginata, linear-lanceolata externe striata: vaginis glabris striatis margine membranaceis. Panicula trifida elongata; floribus pedunculatis. Bracteae binae vaginatae; vaginis striatis ventricosis margine membranaceis; ultima vagina folio canaliculato minuto instrueta; suprema apice subulata absque folio. Corollae acutae persistentes capsularum longitudine. Capsulae oblongae obtusae, acumine brevissimo instruetae. TAB. IV. fig. 8.

Diffrat a *Funco bulbofo*:

- 1) culmo triquetro canaliculato.
- 2) bracteis panicula minoribus.
- 3) vaginis bractearum ventricosis,
- 4) corollis acutis &
- 5) quod multo maior sit.

395. *JUNCUS bufonius* caule dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 98.*

- α. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis erectum. *Scheuchz. agrost. 327.*
- β. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, species altera procerior. *Scheuchz. agrost. 328.*
- γ. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, repens. *Scheuchz. agrost. 329.*
- δ. Pinheaded cobweb mushroom. *Petiv. gaz. 51. f. 7.*

Isoetes lacustris. Weigel. observ. bot. 36. t. 2. f. 7.

Subularia aquatica. Koelp. suppl. fl. Gryph. 113.

In pratis paludosis, locis depresso humidis, paucis uliginosis, ad fossas, similibusve locis copiosissime aestate. δ. vere & autumno.

Semina hujus Junci singulari modo germinant.

Primo vere cotylidones apparent oblongae, magnitudine capituli acus, colore splendido-flavae, paulo post folia minutissima accrescunt, & cotylidones fuscae evadunt. Tunc altitudine vix unicam exsuperat gramen, & plantae cryptogamiae haud absimile est. Tali in statu hoc gramen *Celebr. Weigel legit, depinxitque.* Iterata vice tales plantulas ollae imposui, & semper Juncum bufonium ex illis nasci vidi.

396. *JUNCUS capitatus* foliis setaceis, capitulo terminali, alarique subfolioso, petalis acutis integris, pericarpiis aequantibus. *Weigel observ. 28. t. 3. f. 5.*

Juncus ericetorum culmo nudo filiformi, foliis linearibus canaliculatis, capitulo subrotundo sessili terminali, triphylo. *Pollich. pal.* 1. p. 351. n. 350.

Ante portam Halensem im Aufstall, inter Pancko & Gesundbrunnen, prope Spandau ad Haaks Meyerey & alibi locis depresso frequens. Junio. Julio.

Culmus bi-vel triuncialis nudus, glaber, striatus. Flores sessiles in capitulum collecti, terminales, bracteis tribus instructi. Petala persistenta, acuta, capsulis longiores.

397. *JUNCUS pilosus* foliis planis pilosis, corymbo ramoso. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 100.

In nemoribus copiose. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, Hasenheide &c. Majo.

398. *JUNCUS campestris* foliis planis subpilosis spicis sessilibus pedunculatisque. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 104.

Iisdem locis copiosissime. Majo.

d. *Flores cum calyce & corolla.*

BERBERIS. *Lin. gen. 476.*

Cal. 6 phyllus. *Petala* 6 ad ungues glandulis 2. *Styl.* O. *Bacca* disperma tunica dupli.

399. *BERBERIS vulgaris* foliis ferratis. *Thunberg. jap.* 146.

Berberis vulgaris pedunculis racemosis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 106.

Im Thiergarten frequens. Majo.

Offic. Baccae Berberidis.

PEPLIS. Lin. gen. 452.

Perianth. campanulatum: ore 12 fido. Petala 6 calyci inserta valde caduca. Capsula bilocularis.

400. PEPLIS *Portula* floribus hexandris, foliis cuneiformibus obtusis.

Peplis portula floribus apetalis. Lin. syst. ed. R. 2.
p. 112.

In der Jungfernheide locis humidis, praecipue in der Charlottenburger Allee, & post Falkenhagen in via ad Bredow frequens. Augusto. Septembri.

TRIGYNIA.

RUMEX. Lin. gen. 485.

Cal. triphyllus. Petala 3 conniventia. Semen unicum triquetrum.

* *Hermaphroditii: valvulis granulo notatis.*

401. RUMEX *sanguineus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 115.
Locis cultis inter olera passim. Junio.

402. RUMEX *Britannica* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis obsoletis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 115.

In fossis ad Spandau vulgaris. Junio. Julio.

403. RUMEX *crispus* floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 115.

In pratis humidis, nemorosis passim. e. g. in der Jungfernheide, ante portam Halensem im Aufstall &c. Junio.

404. RUMEX *Nemolapathum* floribus hermaphroditis: valvulis linearibus obtusis integerrimis graniferis, verticillis remotis, ramis patentibus, foliis inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis. *Lin. suppl. pl. 212.*

Rumex dubius floribus hermaphroditis, valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis subundulatis basi integris. *Retzii prod. fl. Scand. 64.* n. 387.

Rumex conglomeratus. *Murr. prod. 52.*

Rumex Hydrolapathum. *Wiggers primit. n. 303.*

Ad fossas inque pratis paludosis frequens, v. g. ante portam Halensem im Aufstall, prope Spandau in via ad Haaks Meyerey &c. Julio, Augusto.

Planta bipedalis & ultra: caule ramoso, tereti, fulcato: foliis alternis glabris, margine parum undulatis: verticillis summis nudis.

405. RUMEX *maritimus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 117.

Im Thiergarten & Jungfernheide locis humidis passim, Junio.

406. RUMEX *acutus* floribus hermaphroditis valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 117.

In pratis ad *Rummelsburg*, *in der Jungfernheide* & alibi passim. Junio. Julio.

407. RUMEX *obtusifolius* floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenatis, *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 118.

Iisdem locis passim. Junio.

*** *Hermaphroditii: valvulis granulo substitutis.*

408. RUMEX *aquaticus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 119.

In fossis des *Thiergartens* passim. Julio.
Offic. (*Radix Rapontici.*)

**** *Floribus diclinis.*

409. RUMEX *Acetosa* floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 122.

♂. *Acetosa pratensis* flore albo. *Tournef. inst. 502.*

In pratis & pascuis copiose. Majo. Junio.

Offic. Herba recens Acetosae. (*Radix & Semina.*)

410. RUMEX *Acetosella* floribus dioicis, foliis lanceolatis, hastatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 123.

♂. *Acetosa lanceolata angustifolia repens.* *Bauh. pin. 114.*

♀. *Acetosa arvensis minima non lanceolata.*

Bauh. pin. 114.

δ Acetosa minor erecta, lobis multifidis. *Bocc.*
mus. 164. t. 26.

In agris, arvis, versuris, pascuis, pratis siccis
 & nemoribus copiosissime. Aestate.

SCHEUCHZERIA. *Lin. gen. 487.*

Cal. 6 partitus. *Cor.* O. *Capsulae* 3. 4. inflatae
 1 spermae.

411. SCHEUCHZERIA palustris. *Lin. syst. ed. R.*
 2. p. 126.

In der Jungfernheide & Grunewald locis turfosis
humidis frequens. Aprili. Majo.

Capsulae 3. 4. 5 usque 6. *Semina* 1 usque 2.

TRIGLOCHIN. *Lin. gen. 488.*

Cal. triphyllus. *Petala* 3. calyciformia. *Styl.* O.
Capsula basi dehiscens.

412. TRIGLOCHIN palustre capsulis trilocularibus
 sublinearibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 125.*

In pratis prope Schoeneberg copiose, & alibi fre-
quens. Junio.

413. TRIGLOCHIN maritimum capsulis sexlocu-
 laribus ovatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 126.*

In pratis ad Rummelsburg rarius. Junio.

POLYGYNIA.

ALISMA. *Lin. gen. 495.*

Calyx triphyllus. *Petala* tria. *Semina* plura.

414. ALISMA Plantago foliis ovatis acutis, fructi-
 bus obtusis trigonis. *Lin. syst. ed. R. 2.*

In aquis stagnantibus, pratis paludosis & fossis copiose. Julio.

Offic. (Herba Plantaginis aquatica.)

415. ALISMA *Damasonium* foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, capsulis subulatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 132.*

Im Grunewald ad fossas rarius. Julio.

Scapi vix spithamei, teretes laevissime striati: verticillis binis rarius tribus, trifloris, squamis tribus vel quatuor subulatis munitis. Flores hexandri, pistillis sex ad octo. Folia cordata acuta septemnervia glabra, unicalia; petioli sesquiunciales glabri.

416. ALISMA *dubia* foliis cordatis obtusis, floribus hexandris, dodecagyniis, seminibus uncinatis.

Alisma cordifolia foliis cordatis obtusis, floribus dodecandris, seminibus uncinato-muricatis.

Lin. syst. ed. R. 2. p. 133?

Im Grunewald praecipue in der Hundskaehle frequens. Augusto.

Scapi pedales, sesquipedales & ultra, teretes, striati: verticillis quatuor ad quinque, inferioribus ramosis, superioribus trifloris, squamis binis oblongo obtusis munitis. Flores hexandri, pistilla 10. 11. 12 & 14. Semina immatura uncinata erant, matura non vidi. Folia cordata obtusa novemnervia, glabra, biad triuncialia. Petioli pedales teretes striati

glabri. Num varietas praecedentis? Num
Alisma cordifolia & Damasonium una species?
Differt ab Alisma Damasonio seminibus uncina-
tis; ab Alisma cordifolia floribus hexandris.
Distinguunt Autoptae an sit cordifolia, an
Damasonium?

417. ALISMA *natans* foliis ovatis obtusis peduncu-
lis solitariis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 133.

In fossis im Grunewald copiose. Junio. Julio.

418. ALISMA *ranunculoides* foliis linear-lanceo-
latis, fructibus globosis squarrosois. Lin. syst.
ed. R. 2. p. 133.

Ante portam Halensem in fossis rarissima,
Julio.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

AESCULUS. Lin. gen. 498.

Cal. 1 phyllus, 5 dentatus, ventricosus. *Cor.* 4
vel 5 petala inaequalis. *Caps.* 3 locularis.

419. Aesculus *Hippocastanum* corollis pentapetalis patentissimis.

Aesculus Hippocastanum floribus heptandris. Lin.
syst. ed. R. 2. p. 137.

In plateis & extra urbem in viis nemoribusque copiose. Majo. Junio.

Offic. (Fructus & Cortex Hippocastani.)

In *Aesculo Pavia* nunquam stamina octo, semper septem vidi. Vera illius differentia erit: corollis tetrapetalis, petalis binis erectis minoribus longe unguiculatis, binis majoribus conniventibus.

CLASSIS VIII.

O C T A N D R I A
M O N O G Y N I A.

a. *Flores completi.*

OENOTHERA. Lin. gen. 505.

Cal. quadrifidus. *Corolla* tetrapetala. *Stamina* calycis fauce inserta. *Capsula* cylindrica infera. *Semina* nuda.

420. OENOTHERA biennis foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato villoso. Lin. syst. ed.

R. 2. p. 147.

Ante portam Halensem, in ruderatis beim Moabitelande, prope Charlottenburg, Spandau auf den Schülerbergen, hinterm Kibitzey & alibi copiose. Junio. Julio.

EPILOBIUM. Lin. gen. 506.

Cal. 4 fidus. *Cor.* 4 petala. *Capsula* oblonga infera. *Semina* papposa.

* *Staminibus declinatis.*

421. EPILOBIUM angustifolium foliis sparsis linearie-lanceolatis, floribus inaequalibus. Lin. syst. ed. R. 2. p. 151.

Epilobium flore difformi foliis lanceolatis, transversim nervosis. Hall. helv. n. 1000.

*In der Hasenheide, Thiergarten & Papenbergen
passim. Julio.*

** *Staminibus erectis regularibus, petalis
bifidis.*

422. *EPILOBIUM hirsutum* foliis oppositis lan-
ceolatis ferratis decurrenti amplexicaulibus.

Lin. syst. ed. R. 2. p. 152. &c.

Epilobium hirsutum foliis ovato-lanceolatis semi-
amplexicaulibus hirsutis, caule ramosissimo,
radice repente. *Curtis lond. t. 117.*

Prope Spandau an der Havel passim. Julio.

423. *EPILOBIUM montanum* foliis oppositis ova-
tis dentatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 152.*

Epilobium foliis ovato-lanceolatis, glabris, den-
tatis. *Hall. helv. n. 996.*

Im Thiergarten & alibi passim. Julio.

424. *EPILOBIUM roseum* foliis oppositis, alter-
nisque ovato-lanceolatis petiolatis ferratis gla-
bris. *Retzii prod. 69. n. 408.*

Chamaenerion roseum. Schreb. spicil. 147.
n. 1165.

Epilobium ramosum foliis lanceolatis ferratis de-
currentibus, inferioribus oppositis, caule ra-
moso. *Huds. angl. ed. 2. t. 1. p. 162.*

Prope Spandau & in der Jungfernheide frequens.
Julio.

425. *EPILOBIUM palustre* foliis oppositis lanceo-
latis integerrimis, petalis emarginatis, caule
erecto. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 153.*

Prope Reineckendorf ad lacum copiose.

In der Jungfernheide ad fossas, inque humidiusculis frequens. Julio.

VACCINUM. Lin. gen. 523.

Cal. superus. *Cor.* 1 petala. *Filamenta receptaculo* inserta. *Anth.* bicornes. *Pomum* quadiloculare polyspermum.

* *Foliis annotinis.*

426. VACCINUM *Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis caule angulato.

Lin. syst. ed. R. 2. p. 164.

β. Fruktu albo.

In nemoribus & sylvis copiose. v. g. im Thiergarten, Grunewald, Jungfernheide &c. β. in der Spandauerheide rarius.

Offic. Myrtillorum Baccae. (Folia.)

* * *Foliis sempervirentibus.*

427. VACCINUM *Vitis idaea* racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 167.

Im Grunewald, Spandauerheide, Jungfernheide, Papenbergen & alibi copiose. Majo. Junio.

Offic. (Baccae Vitis Idaeae.)

428. VACCINUM *Oxycoccus* foliis integerrimis revolutis ovatis, caulis repentibus filiformibus nudis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 167.

*Im Grunewald, Jungfernheide & Spandauer.
heide in regione lacus Diaboli copiose. Majo.
Junio.*

Pedunculi 2. 3. terminales. Flores nutantes.
Corolla 4 fida: laciniis revolutis.

ERICA. Lin. gen. 524.

*Cal. 4 phyllus inferus. Cor. 1 petala 4 fida. Fi.
lamenta receptaculo inserta. Anth. 2 fidae.
Capsula 4 locularis.*

429. ERICA Tetralix aristata; foliis quaternis ob.
longis ciliatis, subtus tomentosis, floribus um.
bellatis, calyce ciliato tomentoso. Thunberg
Diss. de Erica 10. n. 66.

*Erica Tetralix antheris aristatis, corollis ovatis,
stylo inclusi, foliis quaternis ciliatis, floribus
capitatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 174.*

Prope Spandau unico loco frequens. Inter
Schoeneberg & Fasanerie olim frequens nunc
rarius. Julio. Augusto.

430. ERICA vulgaris cristata; foliis oppositis sa.
gittatis. Thunberg *Diss. de Erica* 11. n. 74.

*Erica vulgaris antheris aristatis, corollis campa.
nulatis subaequalibus, calycibus duplicatis,
foliis oppositis sagittatis. Lin. syst. ed. R. 2.
p. 168.*

β. corollis albis.

In campis, pascuis, collibus sterilissimis, nemo.
ribusque copiosissime. β. rarius. Augusto.

Offic. (*Ericae Herba.*)

*b. Flores incompletz.***POPULUS.** *Lin. gen. 1228.*

♂—♀. ♂. *Ament.* laxe imbricatum. *Cal.* squamis laceris. *Cor.* turbinata obliqua integra.

♀. *Ament.* *Cal.* & *Cor.* maris. *Styl.* O. *Stigma* 4 fidum. *Caps.* 2 locularis. *Semina* multa, pappo capillari.

431. **POPULUS alba** foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 262.

Prope *Charlottenburg* frequens, & alibi passim. Aprili. Majo.

432. **POPULUS tremula** foliis subrotundis dentato-angulatis, utrinque glabris. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 262.

In nemoribus & viis copiose. Aprili. Majo.

433. **POPULUS nigra** foliis deltoidibus acuminatis ferratis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 263.

In nemoribus, viis & pagis vulgaris, mas prope *Charlottenburg*. Aprili. Majo.

Offic. Oculi Populi.

DIGYNIA.

CORYLUS. *Lin. gen. 1172.*

♂—♀. ♂. *Cal.* 1 phyll. 3 fidus squamiformis, 1 florus. *Cor.* O.

♀. *Cal.* 2 phyllus lacerus. *Cor.* O. *Nux* ovata.

434. *CORYLUS Avellana* stipulis ovatis obtusis.

Lin. syst. ed. R. 2. p. 169.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Tegel & alibi
copiose. Martio. Aprili.

Offic. Avellanae Nuces. (Lignum.)

A C E R. *Lin. gen. 1266.*

Cal. 5 fidus. Cor. 5 petala. Caps. binae monospermae, alatae.

435. *A C E R Pseudo-Platanus* racemis pendulis, foliis quinquelobis obtusis inaequaliter ferratis.

Acer Pseudo-Platanus foliis quinquelobis inaequaliter ferratis, floribus racemosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 331.*

Im Thiergarten, im Briselang frequens & alibi
passim. Majo.

436. *A C E R Platanoides* corymbo simplici erecto :
foliis quinquelobis dentatis : dentibus acuminatis.

Acer platanoides foliis quinquelobis acuminatis,
acute dentatis glabris, floribus corymbosis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 332.

Im Thiergarten copiose ad pagos inque nemoribus passim. Majo.

Floret foliis adhuc destitutum.

437. *A C E R campestre* corymbo tripartito erecto,
foliis quinquelobis, integerrimis : lobis inferioribus emarginatis.

Acer campestre foliis lobatis obtusis emarginatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 333.

In Thiergarten frequens, prope Tegel, Briselang & alibi passim. Majo.

TRIGYNIA.

POLYGONUM. Lin. gen. 537.

Cal. O. Cor. 5 partita calycina. Semen unicum angulatum.

* *Bistortae spica unica.*

438. POLYGONUM *Bistorta* caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. Lin. syst. ed. R. 2. p. 204.

In pratis versus alten Landsberg, Blankenfelde, Fridrichsfelde, Biesdorf passim, in den Remisen ad Pancko rarius. Junio.

Offic. Bistortae Radix.

** *Pericariae pistillo bifido, aut staminibus minus 8.*

439. POLYGONUM *amphibium* floribus pentandris semidigynis, spica ovata. Lin. syst. ed. R. 2. p. 205.

a. *aquaticum* foliis glabris, longe petiolatis, spica subrotunda. Moench. haff. 328.

b. *terrestre* foliis hirsutis subsessilibus, spica oblonga. Moench. haff. 328.

In der Spree inque fossis im Grunewald & alibi copiose. β. ante portam Lipsensem ad fossas frequens. Junio. Julio.

440. POLYGONUM *Hydropiper* floribus hexandris
semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis sub-
muticis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 206.

In nemoribus humidis ad Coepnick, Tegel, in
der Jungfernheide, Thiergarten & alibi co-
piose. Julio.

Offic. (*Perficariae urentis Herba.*)

441. POLYGONUM *Perficaria* floribus hexandris
digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceo-
latis, stipulis ciliatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 207.

- ꝝ. foliis angustioribus, spica rubente.
- ꝝ. foliis maculosis latioribus.

Locis humidis, ad fossas, vias, in paludibus ali-
bique copiosissime. Aestate.

Offic. (*Herba Perficariae.*)

*** *Polygona* foliis indivisis, floribus
octandris.

442. POLYGONUM *aviculare* floribus octandris
trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule
procumbente herbaceo. *Lin. syst. ed. R. 2.*
p. 209.

ꝝ. *Polygonum brevi angustoque folio.* *Bauh.*
pin. 281.

ꝝ. *Polygonum oblongo angustofolia.* *Bauh.*
pin. 281.

ꝝ. Flore albo. *Hall. helv. 1560.*

ꝝ. Foliis rubentibus. *Schwenckfeld. Silens. 163.*

Ad vias in urbe ipsa, ad agros, inque versuris,
sepibus, ubique fere copiosissime. Aestate.

Offic. Herba Polygoni. f. Centumnodiae.

***** *Helixine foliis subcordatis.*

443. POLYGONUM *Fagopyrum* foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 212.
Hic frequens colitur. Julio. Augusto.

444. POLYGONUM *Convolvulus* foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusatis.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 213.

Polygonum caule volubili, foliis sagittatis. *Hall. helv. n. 1561.*

In agris, cultis, nemoribus apricis vulgaris. Julio. Augusto.

445. POLYGONUM *dumetorum* foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato-alatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 213.

Polygonum caule volubili, foliis sagittatis, valvulis seminalibus alatis. *Hall. helv. n. 1562.*

Ad sepes & pagos, prope *Fridrichsfelde*, *Pancko*, & alibi frequens. Julio. Augusto.

TETRAGYNIA.

MYRIOPHYLLUM. *Lin. gen. 1163.*

♂—♀. ♂. *Calyx* 1 phyllus 4 dentatus. *Petala* 4 unguiculata, caduca. *Filamenta* capillaria, latere *antherae* infixae.

♀. *Cal.* & *Cor.* maris. *Styl.* O. *Caps.* 4. 1 spermae.

446. *MYRIOPHYLLUM spicatum* caule ramoso,
spicis terminalibus nudis, interruptis: floribus
bracteatis; foliis pinnatis capillaceis.

Myriophyllum spicatum floribus masculis inter-
rupte spicatis. *Lin. Syst. ed. R. 4.* p. 154.

In der Jungfernheide & Grunewald in fossis fre-
quens. Julio.

Spicae nudae superne masculae. Bracteae minu-
tae, subrotundae, acutae, sub singulo flore
tres; interdum quatuor.

Varietatem semel vidi, foliis superioribus simpli-
cibus, linearibus, integerrimis.

447. *MYRIOPHYLLUM verticillatum* caule sim-
plici, floribus verticillatis, foliis pinnatis,
pinnis linearibus carnosis.

Myriophyllum verticillatum floribus omnibus
verticillatis hermaphroditis. *Lin. Syst. ed. R.*
4. p. 154.

In der Jungfernheide prope pontem destructum
in fossis frequens, etiamque *im Grunewalde.*
Julio.

Caulis semper simplex, rarissime uno altero ve-
ramo. Flores in angulis foliorum verticillati,
absque bracteis, dioici. Omnes a me perlu-
stratae plantae semper dioicae, nunquam her-
maphroditae erant; etsi plura immo centum
usque specima perlustraverim.

OCTANDRIA TETRAGYNIA. 145

ADOXA. Lin. gen. 543.

Cal. 2 fidus, inferus. Cor. 4 f. 5 fida supera.
Pomum 4 f. 5 loculare, calyce coalitum.

448. ADOXA Moschatellina. Lin. Syst. ed. R. 2.
p. 222.

Prope Pancko & in den Papenbergen locis umbrosis passim. Aprili. Majo.

PARIS. Lin. gen. 542.

Cal. 4 phyllus. Petala 4, angustiora. Pomum quadriloculare.

449. PARIS quadrisolia foliis quaternis. Lin. Syst.
ed. R. 2. p. 221.

In den Papenbergen, prope Falckenhagen im Elsbruch, ad Spandau auf dem Eiswerder passim.
Prope Friedrichsfelde rarius, & ad alnorum truncos post Rummelsburg rarissime, Majo.
Junio.

Variat foliis quinatis.

Offic. (Radix, Herba, Raccae Paridis.)

CLASSIS IX.
ENNEANDRIA
MONOGYNIA.

QUERCUS, *Lin. gen.* 1168.

♂—♀. ♂. *Cal.* 5 *fidus*. *Cor.* O.

♀. *Cal.* 1 *phyllus*, *integerrimus*, *scaber*. *Cor.* O.

Styl. 2—5. *Semen* 1. *ovatum*.

450. *QUERCUS Robur* foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus: angulis obtusis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 163.

α. *Quercus* foliis deciduis petiolatis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus, angulis obtusis, glandibus subsessilibus. *Du Roi harbk.* 2. p. 237.

β. *Quercus femina* foliis deciduis oblongis obtusis, pinnato sinuatis, subpetiolatis: glandibus pendunculatis subsolitariis. *Du Roi harbk.* 240.

In nemoribus sylvisque copiose. Majo.

α & β. forte species distinctae.

DIGYNIA.

MERCURIALIS, *Lin. gen.* 1230.

♂—♀. ♂. *Cal.* 3 *partitus*. *Cor.* O. *Anth.* *globosae* *didymae*.

♀. *Cal.* & *Cor.* ut in mare. *Caps.* *dicocca* 2 loculi *magno frumento*.

451. MERCURIALIS *perennis* caule simplicissimo,
foliis scabris. Lin. syst. ed. R. 4. p. 265.

*Bei der Fasanerie in den Remisen rarius. Aprili.
Majo.*

452. MERCURIALIS *annua* caule brachiato, fo-
liis glabris, floribus spicatis. Lin. syst. ed. R.
4. p. 265.

*Beim Invalidenhouse rarius. Julio. Augusto.
Offic. Mercurialis Herba. (Semina.)*

HEXAGYNIA.

HYDROCHARIS. Lin. gen. 1231.

♂ — ♀. ♂. *Spatha* 2 phylla triflora. *Cal.* 3 parti-
tus. *Cor.* 3 petala. *Filament.* 3. interiora
styliformia.

♀. *Spatha* O. *Cal.* & *Cor.* maris. *Capsula* infera
6 locularis polysperma.

453. HYDROCHARIS *Morsus ranae*. Lin. syst. ed.
R. 4. p. 267.

In fossis, aquisque stagnantibus frequens. e. g.
im Thiergarten, prope Spandau hinterm Ge-
wehrplan &c. Julio. Augusto.

BUTOMUS. Lin. gen. 550.

Cal. O. *Cor.* 6 petala, petalis alternis majoribus.
Capsulae 6 polyspermae.

454. BUTOMUS *umbellatus*. Lin. syst. ed. R. 2.
p. 233.

In fossis, aquisque stagnantibus. Julio.

CLASSIS X.
DECANDRIA
MONOGYNIA.

a. Flores polypetali.

MONOTROPA. Lin. gen. 583.

Cal. O. Petala 10; horum 5 exteriora basi excavato mellifera. Caps. 5 valvis.

455. MONOTROPA *Hypopithys* floribus lateribus octandris, terminali decandro. Lin. syst. ed. R. 2. p. 280.

Im Thiergarten in der grossen Eichenallee, die nach den Zeltern führt passim. In der Jungfernheide hinterm Stern & prope Tegel rarius. Junio. Julio.

LEDUM. Lin. gen. 591.

Cal. 5 fidus. Cor. plana 5 partita. Caps. 5 locularis basi dehiscens.

456. LEDUM *palustre* floribus terminalibus corymbosis, foliis linearibus subtus ferrugineis, hirsutis.

Ledum palustre. Lin. syst. ed. R. 2. p. 289.

Ledum palustre foliis linear-lanceolatis, subtus ferrugineo tomentosis, staminibus corolla longioribus. Retzii prod. fl. scand. 77. n. 435.

In turfosis des Grunewaldes versus Spandau fre-
quens. Majo. Junio.

Offic. Rosmarini sylvestris Herba.

PYROLA. Lin. gen. 598.

Cal. 5 partitus. *Petala* 5. *Capsula* 5 locularis an-
gulis dehiscens.

457. PYROLA rotundifolia staminibus adscenden-
tibus, pistillo declinato. Lin. syst. ed. R. 2.
p. 299.

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel &
alibi frequens. Junio.

Offic. Pyrolae Herba.

458. PYROLA minor floribus racemosis dispersis,
staminibus, pistilloque rectis. Lin. syst. ed. R.
2. p. 299.

Im Grunewald, Jungfernheide, Thiergarten, pro-
pe Tegel & alibi frequens. Junio. Julio.

459. PYROLA secunda racemo unolaterali. Lin.
syst. ed. R. 2. p. 300.

Ad Tegel, Spandau, in den Papenbergen, Thier-
garten, Jungfernheide &c. frequens. Junio.
Julio.

460. PYROLA umbellata pedunculis subumbellatis.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 300.

Prope Tegel frequens, im Thiergarten rarius.
Junio. Julio.

461. PYROLA uniflora scapo unifloro. Lin. syst.
ed. R. 2. p. 300.

Im Grunewald, Papenbergen, prope Tegel haud infrequens. Im Thiergarten, Jungfernheide rarius. Junio, Julio.

b. Flores monopetali.

ANDROMEDA. Lin. gen. 593.

Cal. 5 partitus. Cor. ovata: ore 5 fido. Capsula 5 locularis.

462. ANDROMEDA *polifolia* pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 293.

Im Grunewald & hinter Tempelhoff lacubus turfosis frequens. Majo.

ARBUTUS. Lin. gen. 596.

Cal. 5 partitus. Cor. ovata: ore basi pellucida. Pomum 5 loculare.

463. ARBUTUS *Uva ursi* caulis procumbentibus, foliis integerrimis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 298.

In der Jungfernheide haud procul a nemore Tegelensi unico tantum loco. Majo.

Offic. Uvae ursi Folia.

DIGYNIA.

CHRYSOSPLENIUM. Lin. gen. 607.

Cal. 4 s. 5 fidus coloratus persistens. Cor. O. Capsula 2 rostris unilocularis polysperma.

464. CHRYSOSPLENIUM *alternifolium* foliis alternis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 307.

Prope dem *Invalidenhause*, *Pancko*, *Reineckendorf*, *Briselang*, in nemoribus & ad fossas aliquique frequens. Aprili. Majo.

Offic. (*Chrysoplenii s. Nasturtii petraei Herba.*)

SAXIFRAGA. *Lin. gen. 608.*

Cal. 5 partitus. *Cor.* 5 petala. *Capsula* birostris, unilocularis, polysperma.

465. SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 317.

In der Hasenheide ad marginem scrobis limosae copiose. *In der Jungferuheide, Thiergarten*, prope *Tegel* & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. (*Saxifragae Radix sub nomine Seminis.*)

466. SAXIFRAGA *tridactylides* foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 319.

Saxifraga foliis petiolatis, trilobatis, caule erecto, ramoso & folioso. *Hall. helv. 986.*

In agris & arvis prope Pancko & Spandau pas-
sim. Aprili. Majo.

SCLERANTHUS. *Lin. gen. 611.*

Cal. 1 phyllus. *Cor.* O. *Semen* 1. *calyce in-*
clusum.

467. SCLERANTHUS *annuus* laciniis calycis patu-
lis acutis viridibus.

Scleranthus annuus calycibus fructus patulis. *Lin.*
syst. ed. R. 2. p. 323.

Ad versuras agrorum, inque arvis passim.

In der Jungfernheide ad vias frequens. Aestate.

468. *SCLERANTHUS perennis* laciniis calycis erectis, obtusis, albido marginatis.

Scleranthus perennis calycibus fructus clausis..

Lin. syst. ed. R. 2. p. 323.

In der Hasenheide & Jungfernheide copiose.
Aestate.

Offic. (Polygoni cocciferi Herba. Coccionella polonica.)

GYPSOPHILA. *Lin. gen. 612.*

Cal. 1 phyllus, campanulatus, angulosus, 5 fidus.

Petala 5. ovata, sessilia. Capsula globosa, 1 locularis, 5 valvis, polysperma.

469. *GYPSOPHILA muralis* foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 327.*

In der Hasenheide passim. Augusto. Septembri.

SAPONARIA. *Lin. gen. 613.*

Cal. 1 phyllus nudus. Petala 5. unguiculata.

Capsula oblonga unilocularis.

470. *SAPONARIA officinalis* calycibus cylindricis, petalis integris, foliis ovato-lanceolatis.

Saponaria officinalis calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 328.

In coemeterio ad Pancko & alibi passim. Aestate.

Offic. Saponariae rubrae Radix.

471. *SAPONARIA dioica* floribus dioicis pentagonalibus, calycibus angulatis subinflatis, petalis bifidis, foliis lanceolatis.

Lichnis dioica floribus dioicis. *Lin. syst. ed. R.*

2. p. 397.

In ruderatis ad pagos, vias, inque agris, arvis & nemoribus copiose. Aestate.

Offic. Saponariae albae Radix.

Capsula semper unilocularis, nunquam quinquelocularis, styli quinque quidem saepissime adfunt, tamen cum stylis tribus & quatuor vidi. Numerus in re herbaria nil valet, ea propter ad Saponariam, quum capsula praestantior sit, amandavi.

Interdum tantum flores hermaphroditos profert. Varietatem vero rubram, nondum Berolini legi. Nescio sene, anne specie sit diversa? In varietate rubra, folia multo obtusiora, & filamenta pilosa sunt.

DIANTHUS. *Lin. gen. 614.*

Cal. cylindricus monophyllus basi squamis 4.

Petala 5 unguiculata. *Capsula* cylindrica unilocularis.

* *Flores aggregati.*

472. *DIANTHUS carthusianorum* floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubum subaequantibus, foliis trinerviis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 332.*

In collibus apricis graminosis, ad agrorum versuras, in pascuis siccioribus nemoribusque copiose. Aestate.

473. *Dianthus prolifer* floribus aggregatis capitatis squamis calycinis ovatis obtusis muticis, tubum superantibus. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 333.
Inter portam Halensem & Lipsiensem passim. Julio. Augusto.

** *Flores solitarii plures in eodem caule.*

474. *Dianthus deltoides* floribus solitariis: squamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 335.
Im Thiergarten, Hasenheide, prope Friedrichsfelde & alibi frequens. Aestate.

475. *Dianthus superbus* floribus paniculatis, squamis calycinis brevibus acuminatis, corollis multifido-capillaribus, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 337. *Jacq. observ. 1.* p. 40. t. 25.
Locis graminosis ad Schoenhausen, Rummelsburg, Spandau & alibi passim. Julio. Augusto.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS. *Lin. gen. 615.*

Cal. inflatus. Petala 5. unguiculata absque corona ad faucem. Capsula trilocularis.

476. *CUCUBALUS Behen* calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 340.

*Im Thiergarten, Jungfernheide, Papenbergen,
prope Tegel, Spandau & alibi passim. In
Briselang copiose. Julio. Augusto.*

477. *CUCUBALUS chloranthus* scapis subaphyllis,
floribus secundis: petalis linearibus bifidis,
foliis radicalibus petiolatis oblongis acutis.

TAB. V. fig. 9.

*In editioribus gramineis prope Spandau bei den
Pulvermagazinen passim, hinterm Gewehrplan
frequens. Junio. Julio.*

Radix perennis. Folia radicalia petiolata gla-
bra oblonga acuta, margine integerrimo re-
trorsum scabro. Scapus pedalis & ultra, sub-
teres, glaber, geniculatus, subnudus. Ge-
niculae foliis binis oppositis setaceis vaginan-
tibus, vaginis apice sphacilatis, munitae.
Flores paniculati secundi; pedunculis uniflo-
ris vel bifloris, durante anthesi nutantes, po-
stea erecti. Calyx cylindricus, inflatus: laci-
niis acutis. Petala sordide viridia linearia bi-
fida. Stamina longitudine corollae. Germen
pedicellatum. Styli tres corolla longiores.
Capsulae triloculares calyce inclusae.

478. *CUCUBALUS Otites* floribus dicisis, petalis
linearibus indivisis. Lin. Jyst. ed. R. 2.
p. 343.

*In collibus arenosis apricis ad Schoeneberg, Span-
dau & alibi frequens. Majo. Junio.*

SILENE. Lin. gen. 616.

Cal. ventricosus. Petala 5. unguiculata coronata ad faucem. Caps. 3 locularis.

479. SILENE nutans petalis bifidis, floribus lateribus secundis cernuis, panicula nutante. Lin. syst. ed. R. 2. p. 347.

In der Hasenheide, Papenbergen frequens. In der Jungfernheide rarius. Majo. Junio.

STELLARIA. Lin. gen. 617.

Cal. 5 phyllus, patens. Petala 5. bipartita. Caps. 1 locularis polysperma.

480. STELLARIA Holosteae foliis lanceolatis serrulatis, petalis bifidis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 357.

In nemoribus locis umbrosis humidis frequens. Majo.

481. STELLARIA graminea foliis linearibus integrimis, floribus paniculatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 357.

In der Hasenheide, Thiergarten & alibi frequens. Junio.

482. STELLARIA aquatica foliis lanceolatis, petalis bipartitis, calycem longitudine aequantibus. Pollich. pal. I. p. 429. n. 422.

Stellaria Dilleniana caule flaccido, foliis linear-lanceolatis, pedunculis terminalibus bifloris, petalis bipartitis. Moench. haff. I. p. 214. n. 364. t. 6.

Alsine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Hall. helv.* I. p. 387.

Alsine aquatica, folio gratiolae, stellato flore.

Dill. giss. p. 58.

In paludibus ad *Spandau* frequens. Junio. Julio.

Non confundenda cum *Stellaria hypercifolia*.

Wiggers primit. 34. n. 364.

ARENARIA. *Lin. gen.* 618.

Cal. 5 phyllus patens. *Petala* 5 integra. *Capsula* unilocularis polysperma.

483. ARENARIA *trinervia* foliis ovatis, acutis, petiolatis, nervosis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 360.

In der Jungfernheide, Thiergarten &c. passim.
Aestate.

484. ARENARIA *serpillifolia* foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 361.

In agris, arvis, pascuis frequens. Aestate.

485. ARENARIA *rubra* foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 362.

Arenaria rubra campestris. α .

Alsine spergulae facie, minor. f. *Spergula minor*, subcaeruleo flore. *Bauh. pin.* 251. prod. 119.

In der Jungfernheide hinterm Stern, ad Friedrichsfelde passim. Julio.

486. ARENARIA *media* foliis linearibus carnosis,
stipulis membranaceis, caulis pubescenti-
bus. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 363.

In pascuis fabulosis ad Spandau versus der Jung-
fernheide frequens. Aprili. Majo.

Diffrat a *Spergula pentandra L.*

- 1) stipulis membranaceis.
- 2) pistillis tribus.
- 3) caulis magis pubescentibus.

487. ARENARIA *tenuifolia* foliis subulatis, caule
paniculato, capsulis erectis, petalis calyce bre-
vioribus lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 365.

In agris ante portam Halensem & prope dem Vogt-
lande alibique passim. Julio. Augusto.

PENTAGYNIA.

SPERGULA. *Lin. gen. 638.*

Cal. 5 phyllūs. Petala 5. integra. Capsula ovata
unilocularis, 5 valvis.

488. SPERGULA *arvensis* foliis verticillatis, semi-
nibus nudis.

Spergula arvensis foliis verticillatis, floribus de-
candris. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 403.

In agris, arvis, pascuis, arenosis copiose. Ac-
tate.

489. SPERGULA *vernalis* foliis verticillatis, semi-
nibus marginatis: margine diaphano albo.

Spergula pentandra foliis verticillatis, floribus
pentandris. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 404.

In campis sterilissimis arenosis versus *Grunewald* copiose. *In der Hasenheide* passim. Aprili.

Flores, quos vidi, semper decandri erant, nunquam pentandri. Simillima *Arenariae mediae*, quae etiam semina albo marginata possidet.

490. *SPERGULA nodosa* foliis oppositis subulatis laevibus, caulis simplicibus. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 404.

In pratis humidis *beim Unterbaum, in der Jungfernheide*, ante portam *Halensem* & alibi frequens. Julio. Augusto.

CERASTIUM. *Lin. gen.* 637.

Cal. 5 phyllus. *Petala bifida.* *Capsula unilocularis* apice 5 dentato, dehiscens.

* *Capsulis oblongis.*

491. *CERASTIUM vulgatum* foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, caulis diffusis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 398.

In nemoribus, locisque gramineis frequens. e. g.
In der Jungfernheide &c. Aestate.

492. *CERASTIUM viscosum* erectum villoso-viscosum. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 399.

Ad sepes, pagos, inque ruderatis passim. Aprili. Majo.

Planta vix digitalis.

493. *CERASTIUM semidecandrum* floribus pentandris, petalis emarginatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 399.

Ad pagos, vias, sepes in agris frequens. Aprili. Majo.

494. *CERASTIUM arvense* foliis linear-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 400.

In versuris agrorum frequens. v. g. Prope venatorem aulicum im Thiergarten, ad Reineckendorf &c. Majo. Junio.

* * *Capulis subrotundis.*

495. *CERASTIUM aquaticum* foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 402.

Locis humidis nemorosis, ad sepes, in fossis frequens. e. g. in der Jungfernheide, Thiergarten, ante portam Halensem im Aufstall, ad Buchholtz &c. Aestate.

SEDUM. Lin. gen. 629.

Cal. 5 fidus. *Cor. 5* petala. *Squamae nectariferae 5.* ad basin germinis. *Capsulae 5.* polyspermae.

* *Planifolia.*

496. *SEDUM Telephium* foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 380.

β. *Telephium purpureum majus.* *Bauh. pin.*

Prope Tegel, Spandau, Pancko, Fridrichsfelde
& alibi frequens. & rarius. Julio. Augusto.
Offic. (Fabariae. s. Thelcephii Radix.)

** *Teretifolia.*

497. *SEDUM rupestre* foliis subulatis quinquefariam confertis basi solutis, floribus cymosis.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 383.

Retzii prod. fl. Scand. 85. n. 500.

Inter Charlottenburg & Spandau in collibus, oviam versus frequens. Junio. Julio.

Variat Staminibus 6 usque 12.

498. *SEDUM album* foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 383.*

In hortis frequens cultum. Junio.

Ad acetaria praecedenti cum specie frequens adhibetur.

499. *SEDUM acre* foliis subovatis adnato - sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 384.*

In campis arenosis, collibus, muris, tectisque stramineis copiosissime. Junio.

Offic. (*Herba Sedi minoris.*)

500. *SEDUM sexangulare* foliis subovatis adnato - sessilibus, gibbis erectiusculis, sexfariam imbricatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 384.*

Iisdem locis passim. Junio.

Costa foliorum elevata, inde folia fere triangulare videntur. Folia in caule florifero dense imbricata, cum in Sedo acri alterna. Cymae pauci-florae.

OXALIS. Lin. gen. 634.

Cal. 5 phyllus. Petala unguibus connexa. Caps. 5 locularis, angulis dehiscens, 5 gona.

501. OXALIS Acetosella scapo unifloro, foliis ternatis obcordatis, radice dentata. Lin. syst. ed. R. 2. p. 388.

Prope Tegel, in den Papenbergen frequens, ad Pancko rarius. Aprili. Majo.

Offic. Herba Acetosellae.

502. OXALIS corniculata pedunculis umbelliferis, caule ramoso. Lin. syst. ed. R. 2. p. 392.

Locis cultis & hortis vulgaris. Junio.

AGROSTEMMA. Lin. gen. 635.

Cal. 1 phyllus, coriaceus. Petala 5 unguiculata, limbo obtuso indiviso. Capsula 1 locularis.

503. AGROSTEMMA Githago hirsuta, calycibus corollam aequantibus petalis integris nudis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 393.

Inter segetes copiosissime. Junio.

Offic. (Lolii Semina.)

LYCHNIS. Linn. gen. 636.

Cal. 1 phyllus, oblongus, laevis. *Petala* 5. unguiculata: limbo subbifido. *Capsula* quinquelocularis.

504. LYCHNIS *Flos cuculi* petalis quadrifidis, fructu subrotundo. Linn. syst. ed. R. 2. p. 395.

In pratis, pascuis paludosis, nemoribusque humidis copiose. Majo. Junio.

505. LYCHNIS *Viscaria* petalis integris. Linn. syst. ed. R. 2. p. 396.

Lychnis foliis lanceolatis, floribus verticillatis, spicatis. Hall. helv. n. 927.

In den Puppenbergen frequens. Majo. Junio.

Variat interdum floribus plenis.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA
MONOGYNIA.

ASARUM. Lin. gen. 642.

Cal. 3 fidus germini connatus. *Cor.* O. *Caps.* coriacea sexlocularis.

506. ASARUM europaeum foliis reniformibus obtusis, binis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 411.

Asarum foliis reniformibus subhirsutis. *Hall. helv.* n. 1547.

In den Papenbergen rarius. Majo.

Offic. Afari Radix.

PORTULACA. Lin. gen. 659.

Cal. 2 fidus. *Corolla* 5 petala. *Capsula* unilocularis, circumscissa.

507. PORTULACA oleracea foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 423.

In ruderatis & cultis frequens. Julio.

Flos meridiano sub sole, ad horam duodecimam apertus.

Offic. Herba Portulaceae recens. (*Semina.*)

LYTHRUM. Lin. gen. 660.

Cal. 12 dentatus. *Petala* 6. *calyci inserta.* *Caps.* bilocularis polysperma.

508. LYTHRUM *Salicaria* foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. Lin. syst. ed. R. 2. p. 426.

Ad fluviorum ripas, in fossis, paludibus, pratisque inundatis copiose. Julio.

Dentes calycini inaequales. Petala 6. interdum 5.
Stamina 6. caeteris longiora.

Offic. Herba florens Lysimachiae purpureae. f. Salicariae.

509. LYTHRUM *Hyssopifolia* foliis alternis linearibus, floribus hexandris. Lin. syst. ed. R. 2. p. 428.

Ante portam Strahlowianam locis humidis rarius. Julio. Augusto.

Differt a *Lythro Thymifolia*:

- 1) foliis multo latioribus.
- 2) caule minori.
- 3) floribus hexandris hexapetalis.

DIGYNIA.

AGRIMONIA. Lin. gen. 663.

Cal. 5 dentatus; altero obvallatus. Petala 5.
Semina 2. in fundo calycis.

510. AGRIMONIA *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis, impari petiolato, fructibus hispidis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 430.

In pascuis, coemeteriis, ad pagos, sepes, vias, inque nemoribus frequens. Julio. Augusto.

Offic. Agrimoniae Herba.

CARPINUS. Lin. gen. 1171.

♂. ♀. ♂. Cal. 1 phyllus: squama ciliata. Cor. O.
♀. Cal. & Cor. maris. Germ. 2. Nuces 2. ovatae.

511. CARPINUS *Betulus* squamis strobulorum planis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 168.

Im Thiergarten, prope Buchholtz frequens, alibi in nemoribus passim. Aprili. Majo.

TRIGYNIA.

FAGUS. Lin. gen. 1170.

♂—♀. ♂. Cal. 5 fidus campanularius. Cor. O.
♂. Cal. 4 dentatus. Cor. O. Capsula muricata
4 valvis. Sem. 2.

512. FAGUS *sylvatica* foliis ovatis obsolete ferratis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 167.

Im Thiergarten, Briselang frequens & alibi passim. Aprili. Majo.

RESEDA. Lin. gen. 664.

Cal. 1 phyllus persistens. Petala laciniata. Capsula unilocularis hians.

513. RESEDA *Luteola* foliis lanceolatis integris, basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 431.

Ad Fridrichsfelde rarius. Julio. Augusto.

EUPHORBIA. Lin. gen. 665.

Cal. 1 phyllus. Cor. 4. 5 petala, calyci inserta. Capsula tricocca.

DODECANDRIA TRIGYNIA. 167

* *Umbella trifida.*

514. EUPHORBIA *Peplus umbella trifida*, dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerimis obovatis petiolatis. *Lin. syst. ed. R. 2.*

p. 444.

Tithymalus foliis rotundis, stipulis floralibus cordatis, petalis argute corniculatis. *Hall. helv. n. 1049.*

Locus cultis inque ruderatis frequens. Augusto.

** *Umbella quadrifida.*

515. EUPHORBIA *Lathyris umbella quadrifida* dichotoma, foliis oppositis integerrimis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 445.*

Inter olera nonnullis in hortis spontanea. Julio.
Augusto.

Offic. (*Cataputiae minoris Semina.*)

*** *Umbella quinquefida.*

516. EUPHORBIA *segetalis umbella quinquefida*, dichotoma, involucellis cordatis acutis, foliis linear-lanceolatis: superioribus latioribus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 450.*

Inter segetes ad *Weissensee* passim, prope *Steglitz* frequens. Majo. Junio.

517. EUPHORBIA *helioscopia umbella quinquefida*: *trifida*: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 450.*

In cultis, ruderatis, ad pagos copiosissime. Ae-

**** *Umbella multifida.*

518. *EUPHORBIA Esula umbella multifida*: bifida, involucellis subcordatis, petalis bicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus.

Lin. syst. ed. R. 2. p. 454.

Ehrhardt. hanoev. Magaz. 18 Stück 1783. p. 273. n. 26.

Ante portam Halensem ad viam versus Schoenberg rarius. Junio.

Simillima Euphorbiae Cajogalae Ehrhartii, vel Gerardianae Jacquinii.

Nostra differt ab illa:

- 1) petalis bicornibus.
- 2) ramis sterilibus.
- 3) foliis venosis nec trinerviis angustioribus.

519. *EUPHORBIA Cyparissias umbella multifida* dichotoma, involucellis subcordatis; ramis sterilibus, foliis setaceis caulinis lanceolatis.

Lin. syst. ed. R. 2. p. 454.

Euphorbia degener. Riv.

Tithymalus cyparissias, foliis punctis croceis notatis. Bauh. pin. 291.

Ad vias, agrorum versuras, in pascuis, collibus alibique copiosissime. Majo, Junio.

Offic. (Radix Esulae.)

520. *EUPHORBIA palustris umbella multifida*, subtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. *Lin. syst. ed. R. 2.*

DODECANDRIA DODECAGYNIA. 169

Tithymalus foliis ellipticis, ramis umbellam
superantibus, capsulis exasperatis. *Hall.
helv.* n. 1054.

Ad fossas prope Schoenewalde passim, in Bri-
selang hinter dem Finckenkrug copiosissime.
Majo, Junio.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM. *Lin. gen.* 667.

Cal. 12 partitus. *Petala* 12. *Capsula* 12 poly-
spermae.

521. SEMPERVIVUM tectorum foliis ciliatis, pro-
paginibus patentibus. *Lin. syst. ed. R. 2.*
p. 489.

In tectis pagorum inque hortis copiose. Julio.
Offic. Sedi majoris Herba recens.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA
MONOGYNIA.

PRUNUS. Lin. gen. 675.

Cal. 5 fidus inferus. *Petala 5.* *Drupa nux* futuris prominentibus.

522. PRUNUS *Padus* floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 403.

Im Thiergarten & alibi passim. Majo.

523. PRUNUS *Cerasus* umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 486.

In hortis frequens culta, rarius spontanea. Aprili. Majo.

Offic. Cerasorum acidorum Fructus.

524. PRUNUS *avium* umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis, subtus pubescentibus conduplicatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 487.

Im Thiergarten frequens & alibi passim. In hortis copiose plantatur. Aprili. Majo.

Offic. Cerasorum nigrorum Flores & Nuclei.

525. PRUNUS *domestica* pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis multicisis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 468.

Im Thiergarten passim, culta in hortis copio-
sissime. Majo. Aprili.

Offic. Fructus Pruni,

526. PRUNUS *spinosa* pedunculis solitariis, foliis
lanceolatis glabris, ramis spinglis. *Lin. syst.*
ed. R. 2. p. 489.

Ad Rummelsburg, Tegel, Pancko, Spandau &
alibi frequens. Aprili. Majo.

Offic. Fructus & Flores Acaciae nostratis. f. Pru-
neoli sylvestris. (*Radix, Cortex.*)

DIGYNIA.

CRATAEGUS. *Lin. gen.* 678.

Cal. 5 fidus. Petala 5. Bacca infera 2 sperma.

527. CRATAEGUS *Oxyacantha* foliis obtusis, sub-
trifidis ferratis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 494.

*In nemoribus frequens. e. g. im Thiergarten,
Jungfernheide, prope Tegel &c. Majo.*

Offic. (*Spinae albae. f. Oxyacanthae Folia, Flo-
res, Fructus.*)

TRIGYNIA.

SORBUS. *Lin. gen.* 679.

Cal. 5 fidus. Petala 5. Bacca infera 3 sperma.

528. SORBUS *aucuparia* foliis pinnatis utrinque
glabris. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 495.

*In nemoribus, praecipue im Thiergarten, Ha-
senheide & alibi frequens. Majo.*

Offic. Fructus Sorbi.

PENTAGYNYA.

MESPILUS. Lin. gen. 681.

Cal. 5 fidus. Petala 5. Bacca infera 5 sperma.

529. MESPILUS germanica inermis, foliis lanceolatis subtus tomentosis, floribus sessilibus solitariis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 497.

Prope Schoenewald in nemore ad viam versus
Pausin rarius. Majo.

Offic. (Mespili Fructus & Semina.)

PYRUS. Lin. gen. 682.

Cal. 5 fidus. Petala 5. Pomum inferum 5 loculare polyspermum.

530. PYRUS communis foliis serratis laevibus, floribus corymbosis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 500.

Im Thiergarten & alibi passim. Plantata in horis copiose. Aprili. Majo.

531. PYRUS Malus foliis serratis, umbellis sessilibus. Lin. syst. ed. R. 2. p. 501.

In nemoribus rarius. Plantata copiose. Eodem tempore.

Offic. (Mali sylvestris Fructus.)

SPIRAEA. Lin. gen. 686.

Cal. 5 fidus. Petala 5. Capsulae 2 valves, polyspermae.

* Fruticosae.

532. SPIRAEA salicifolia foliis lanceolatis obtusis serratis nudis, floribus duplicato-racemosis.

Lin. syst. ed. R. 2. p. 520.

Ad sepes & dumeta *im Moabiterlande* ac si spontanea frequens. Junio. Julio.

** *Herbaceae.*

533. SPIRAEA *Filipendula* foliis interrupte pinnatis, foliolis linear-lanceolatis interrupte serratis glaberrimis, floribus cymosis. *Lin. suppl. pl. 262.*

Spiraea Filipendula foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo, floribus corymbosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 523.*

In nemoribus, pascuis, pratisque siccis frequens. Junio. Julio.

Germina semper decem, rarius quinque.

Offic. (*Filipendulae s. Saxifragae rubrae Radix & Herba.*)

534. SPIRAEA *Ulmaria* foliis interrupte pinnatis, foliolis ovatis biserratis subtus canis, floribus cymosis. *Lin. suppl. pl. 262.*

Spiraea Ulmaria foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 523.*

In pratis uliginosis, ad fossas & alibi copiose. Julio. Augusto.

Offic. Flores Barbae Caprinae. s. *Ulmariae. (Radix & Herba.)*

POLYGYNIA.

Rosa. Lin. gen. 687.

Cal. urceolatus, 5 fidus, carnosus, collo coarc-
tatus. Petala 5. Semina plurima, hispida, ca-
lycis interiori lateri affixa.

* *Germinibus ovatis.*

535. *Rosa rubiginosa* germinibus ovatis: basi pe-
 dunculisque aculeatis, caule aculeis recurvis,
 foliis subtus rubiginosis. *Leysser halens.* ed. 2.
 p. 122. n. 495.

Rosa rubiginosa germinibus globosis, aculeatis-
 que, aculeis recurvis, foliis subtus rubigino-
 sis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 525.

Rosa eglanteria. Mill. dict. n. 1.

Ad sepes, dumeta, inque nemoribus passim.
 Junio.

536. *Rosa canina* germinibus ovatis pedunculis-
 que glabris, caule petiolisque aculeatis. *Lin.*
syst. ed. R. 2. p. 530.

In dumetis, sepibus, & nemoribus frequentissi-
 ma. Junio.

Offic. Cynosbati Fruktus (Rosae sylvestris Flores,
Bedeguar vel excrementiae carnosae insectorum.)

** *Germinibus globosis.*

537. *Rosa villosa* germinibus globosis, peduncu-
 lisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis
 aculeatis, foliis tomentosis. *Lin. syst. ed. R.*
2. p. 527.

In der Jungfernheide, prope Spandau, Tegel & alibi passim. Junio.

RUBUS. Lin. gen. 688.

Cal. 5 fidus. Petala 5. Bacca composita acinis monospermis.

* *Frutescentes.*

538. RUBUS *idaeus* foliis quinato pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 532.

Im Thiergarten copiose & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. Rubi idaei Fructus. (Folia.)

539. RUBUS *fruticosus* foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 534.*

In nemoribus, sepibus, dumetis abunde.

Offic. Rubi fruticosi Fructus.

540. RUBUS *caesius* foliis ternatis subnudis laterilibus bilobis, caule aculeato tereti. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 534.*

In agris & arvis frequens. Junio.

** *Herbacei.*

541. RUBUS *saxatilis* foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 536.*

Im Thiergarten rarius. Majo.

FRAGARIA. Lin. gen. 689.

Cal. 10 fidus. Petala 5. Receptaculum ovatum carnosum, deciduum, seminibus obsitum.

542. FRAGARIA vesca flagellis reptantibus. Lin.
syst. ed. R. 2. p. 537.

In nemoribus copiosissime. Majo.

Offic. Fragariae Radix, Fructus. (Herba.)

POTENTILLA. Lin. gen. 690.

Cal. 10 fidus. Petala 5. Semina subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco, affixa,

* *Foliis pinnatis.*

543. POTENTILLA *Ansarina* foliis interrupte pinnatis dentatis, subtus tomentosis, caule repente, pedunculis unifloris.

Potentilla Anserina foliis pinnatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris. Lin. syst. ed. R. 2. p. 539.

In pascuis, pratis, ad fossas & vias copiose.
Majo. Junio.

Offic. Anserinae Herba.

544. POTENTILLA *supina* foliis pinnatis, caule dichotomo decumbente. Lin. syst. ed. R. 2. p. 542.

In urbe sub salicibus versus portam Strahlowianam frequens. Junio. Julio.

** *Foliis digitatis.*

545. POTENTILLA *argentea* foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto. Lin. syst. ed. R. 2. p. 543.

Ad vias, sepes, inque ruderatis ad pagos fre-
quens. Aestate.

546. **POTENTILLA opaca** foliis radicalibus quin-
atis cuneiformibus ferratis, caulinis suboppo-
sititis, ramis filiformibus decumbentibus. *Lin.
syst. ed. R. 2. p. 594.*

*Im Thiergarten, Papenbergen, prope Tegel locis
nemorosis umbrosis passim. Majo.*

547. **POTENTILLA verna** foliis radicalibus qui-
natis acute ferratis retusis, caulinis ternatis,
caule declinato. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 544.*

*In collibus, nemoribusque apricis copiose. e. g.
versus Schoeneberg, im Thiergarten, Jung-
fernheide, Tegel &c. Aprili. Majo. Interdum
Septembri. Octobri.*

548. **POTENTILLA alba** foliis quinatis apice con-
niventi ferratis, caulis filiformibus procum-
bentibus, receptaculis hirsutis. *Lin. syst. ed.
R. 2. p. 546.*

Im Thiergarten frequens. Majo.

549. **POTENTILLA reptans** foliis quinatis, caule
repente, pedunculis unifloris. *Lin. syst. ed. R.
2. p. 547.*

*In nemoribus, locis subhumidis copiose. Ju-
nio. Julio.*

*Offic. Quinquefolii f. Pentaphylli Radix &
Herba.*

TORMENTILLA. Lin. gen. 691.

Cal. 8 fidus. *Petala* 4. *Semina* subrotunda, nuda, *receptaculo* parvo exsucco affixa.

550. **TORMENTILLA erecta** caule erectiusculo, foliis sessilibus. Lin. syst. ed. R. 2. p. 550.

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Friedrichsfelde, Tegel & alibi frequens. Aestate.

Offic. Tormentillae Radix. (*Herba.*)

551. **TORMENTILLA reptans** caule repente, foliis petiolatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 550.

Im Thiergarten passim. Junio. Julio.

GEUM. Lin. gen. 692.

Cal. 10 fidus. *Petala* 5. *Sem.* aristata geniculata.

552. **GEUM urbanum** floribus erectis, fructibus globosis villosis: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 551.

In nemoribus ad sepes, dumeta frequens. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, prope Spandau &c. Junio. Julio.

Offic. Caryophyllatae Radix.

553. **GEUM rivale** floribus nutantibus, fructu oblongo, aristis plumosis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 552.

Locis humidis inque pratis, im Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. (*Gei rivali Herba.*)

ICOSANDRIA POLYGYNIA. 179

COMARUM. Lin. gen. 694.

Cal. 10 fidus. *Petala* 5 calyce minora. *Recept.*
seminum ovatum, spongiosum, persistens.

554. COMARUM *palustre*. Lin. *syst. ed. R. 2.*
p. 554.

Fragaria foliis pinnatis, petalis ligulatis mini-
mis. *Hall. helv. n. 1128.*

In der Jungfernheide, locis uliginosis copiose.
Aestate.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA
MONOGYNIA.

a. Flores tetrapetali.

CHELIDONIUM. Lin. gen. 703.

*Cal. 2 phyllus. Cor. 4 petala. Siliqua 1 locularis linearis.*555. CHELIDONIUM *majus* pedunculis umbellatis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 569.

In ruderatis, ad pagos & sepes copiose. Aestate.

Offic. (Herba & Radix Chelidonii majoris.)

PAPAVER. Lin. gen. 704.

*Cal. 2 phyllus. Cor. 4 petala. Capsula 1 locularis sub stigmate persistente dehiscens.** *Capsulis hispidis.*556. PAPAVER *Argemone* capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro. Lin. syst. ed. R. 2. p. 571.

Inter segetes ad Tempelhoff, Spandau & alibi sparsim. Junio. Julio.

** *Capsulis glabris.*557. PAPAVER *Rhoeas* capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 572.

Papaver foliis semipinnatis, hispidis, fructu ovato glabro. *Hall. helv.* n. 1064.

In agris inter segetes copiose. Aestate.

Offic. Flores Papaveris Rhoeadis vel Erratici.
Semina nigra.

558. PAPAVER *dubium* capsulis oblongis glabris, caule multisfloro, setis adpressis, foliis pinnatifidis incisis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 573.

Papaver foliis hispidis pinnatis, pinnis lobatis, fructu ovato laevi. *Hall. helv.* n. 1063.

In agris ad *Spandau* frequens. Junio.

559. PAPAVER *somniferum*, calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 574.

In hortis & inter olera copiose cultum. Junio.
Julio.

Offic. Papaver albi Capita & Semina.

b. Flores pentapetali.

TILIA. *Lin. gen. 717.*

Cal. 5 partitus. *Cor.* 5 petala. *Capsula* coriacea 5 locularis, 5 valvis. *Semen* unicum, caetera abortientia.

560. TILIA europaea floribus nectario destitutis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 584.

a. Tilia foliis acuminatis ferratis subhirsutis, fructibus quadrangularibus subpilosis. *Mill. dict. n. 2.* *Du Roi harpk.* 2. n. 461.

Tilia platyphyllos foliis magnis subhirsutis. *Scop.*

curv. ed. 2. p. 641.

B. *Tilia cordata* foliis cordatis acuminatis inaequaliter serratis, fructibus quinquelocularibus tomentosis. *Mill. dict. n. 1.*

Tilia ulmifolia foliis durioribus, minoribus, nullibi villosis. *Scop. carn. ed. 2. n. 641.*

Im Thiergarten & alibi frequens. B. im Briselang rarius. Junio. Julio.

Offic. Flores Tiliae.

CISTUS. Lin. gen. 728.

Cal. 5 phyllus: foliolis duobus minoribus. Cor. 5 petala. Capsula subrotunda compressa, calyce obtecta, polysperma.

561. CISTUS Helianthemum suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 603.

Prope Friedrichsfelde in pratis frequens, ad Doebritz, Schoenhausen passim. Im Thiergarten rarius. Junio. Julio.

Capsula unilocularis, trivalvis.

c. Flores polypetali.

NYMPHAEA. Lin. gen. 709.

Cal. 4 f. 5 phyllus. Cor. polypetala. Capsula carnosa multilocularis collo angustata truncata.

562. NYMPHAEA lutea foliis cordatis integerimis, calyce petalis majore pentaphyllo. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 578.*

In der Spree & in lacubus copiose. Junio. Julio.

Offic. Nymphaea lutea. Flora (Berlin).

563. *Nymphaea alba* foliis cordatis integerrimis,
calyce quadrifido. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 578.
In fossis, lacubus der Jungfernheide & in der
Havel abunde. Junio.
Offic. (*Nymphaeae albae Radix & Flores.*)

d. Flores apetali.

- CERATOPHYLLUM.** *Lin. gen. 1162.*
♂—♀. ♂. *Cal.* multipartitus. *Cor.* O. *Stamina*
duplo plura, quam segmenta calycis.
♀. *Cal.* & *Cor.* maris. *Styl.* O. *Sem.* 1. nudum.

564. *CERATOPHYLLUM demersum* foliis dichoto-
mo bigeminis, fructibus trispinosis. *Lin. syst.*
ed. R. 4. p. 153.

In der Jungfernheide in fossis & paludibus fre-
quens. Junio. Julio.

565. *CERATOPHYLLUM submersum* foliis dicho-
tomo-trigeminis, fructibus muticis. *Lin. syst.*
ed. R. 4. p. 153.

Beim Invalidenhause aquae immersum frequens.
Junio. Julio.

CALLA. *Lin. gen. 1121.*

Spatha plana. *Spadix* tectus flosculis. *Cal.* O.
Cor. O. *Baccae polyspermae.*

566. *CALLA palustris* foliis cordatis, spatha plana,
spadice undique hermaphrodito. *Lin. syst. ed.*
R. 4. p. 75.

In paludibus ad Gros Glinicke & im Grunewalde
copiose. Junio. Julio.

Offic. (*Dracunculi palustri s. Callae Radix.*)

TRIGYNIA.

DELPHINIUM. Lin. gen. 736.

Cal. O. Petala 5. Nectar. 2 fidum postice cornutum. Caps. 3. f. 1.

567. **DELPHINIUM Consolida** nectarariis monophyllis, capsula unica, caule subdiviso. Lin. syst. ed. R. 2. p. 611.

Inter segetes copiose. Junio. Julio.

Offic. Flores Calcatrippae f. Consolidae regalis. (Herba.)

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA. Lin. gen. 741.

Cal. O. Petala 5. Nectar. 5. corniculata intra petala. Caps. 5. distinctae.

568. **AQUILEGIA vulgaris** nectarariis incurvis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 619.

Aquilegia foliis trilobatis, lobis petiolatis tripartitis, subrotundis, obtuse dentatis. Hall. helv. n. 1195.

Ad Friedrichsfelde passim. In pomariis hortisque frequens. Majo. Junio.

Offic. Flores Aquilegiae. (Semina.)

NIGELLA. Lin. gen. 742.

Cal. O. Petala 5. Nectar. 5. trifida intra corollam. Caps. 5. connexae.

569. **NIGELLA damascena** pistillis quinis, floribus involucro folioso cinctis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 621.

In hortis frequens. Aestate.

570. *Nigella arvensis* pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 621.

Ad *Spandau* in agris *hinterm Kibitzey* passim.
Prope *Schoenhausen* semel ab amico lecta est.
Julio.

HEXAGYNIA.

STRATIOTES. *Lin. gen. 744.*

Spatha diphylla. *Perianth.* trifidum. *Petala* 3.
Capsula carnosa sexlocularis, infera.

571. **STRATIOTES Aloides** foliis ensiformi-triangulis ciliato-aculeatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 623.

In der Jungfernheide, *beim Unterbaum* & in fossis ad *Ruhleben* frequens. Junio.
Flores dioici, dodecandri, monogyni.

POLYGYNIA.

SAGITTARIA. *Lin. gen. 1164.*

Cal. 3 phyllus. *Cor.* 3 petala. *Sem.* nuda plura, utrinque acuminata, margine membranaceo cincta.

572. **SAGITTARIA sagittifolia** foliis sagittatis acutis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 155.

α. *Sagitta major.* *Scop. carn. ed. 2.* n. 1181.
β. *Sagitta aquatica minor angustifolia.* *Bauh.* pin. 194.

In aquis stagnantibus, *fossis* frequens. Junio.
Julio.

ANEMONE. *Lin. gen. 752.*

Cal. O. *Petala 6-9.* *Semina plura.*

* *Hepatica*, *flore subcalyculato.*

573. **ANEMONE Hepatica** foliis trilobis integerrimis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 631.

β. *Hepatica* flore simplici subpurpureo, & rubro. *Rupp jen. 160.*

γ. *Trifolium hepaticum* flore pleno. *Bauk. pin. 339.*

In den Papenbergen frequens. *Prope Schoenhauen, Invalidenhaus & alibi passim.* Aprilii. Majo.

Offic. *Hepaticae nobilis Herba & Flores.*

** *Pulsatilla pedunculo involucrato, seminibus lanatis.*

574. **ANEMONE vernalis** pedunculo involucrato, foliis pinnatis, flore erecto. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 632.

In der Jungfernheide rarissime. Aprilii. Martio.

575. **ANEMONE Pulsatilla** pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 633.

In der Jungfernheide unico tantam loco rarius, Majo.

Offic. (*Herba Pulsatillae.*)

576. **ANEMONE pratensis** pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. *Liv. syst. ed. R. 2.* p. 633.

In pascuis nemoribus apricis. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, prope Spandau & alibi copiose. Aprili. Majo.

Offic. Pulsatillae nigricantis Herba.

*** *Anemonoides flore nudo, seminibus ecaudatis.*

577. ANEMONE *nemorosa* seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 637.

flore extus rubicundo.

Prope Spandau auf der Katzenbatterie, in den Papenbergen frequens. Im Briselang copiose. Ad Schoenhausen & im Thiergarten passim. Aprili. Majo.

578. ANEMONE *ranunculoides* seminibus acutis, foliolis incisis, petalis subrotundis, caule subbifloro. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 638.

In den Papenbergen, prope Schoenhausen passim, prope Blanckenfelde & alibi. Aprili. Majo.

Variat pedunculis 1. 2. 3 floris.

THALICTRUM. *Lin. gen. 755.*

Cal. O. Petala 4. f. 5. caduca. Sem. ecaudata.

579. THALICTRUM *minus* foliis sexpartitis, floribus cernuis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 646.

Thalictrum foliis patulis imis obtuse trilobis, supremis acutis, panicula diffusa, floribus nubantibus. *Hall. helv. n. 1139.*

In pratis & pascuis passim. e. g. ante portam Halensem, prope Rummelsburg, Friedrichsfelde, Spandau &c. Junio. Julio.

580. *THALICTRUM flavum* caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 648.

Thalictrum foliis erectis, lobulis acute trilobis, spica adscendente. *Hall. helv. 1138.*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi in pratis copiose. Julio. Augusto.

Offic. *Thalictri Radix.*

RANUNCULUS. *Lin. gen. 757.*

Cal. 5 phyllus. Petala 5. ad unges squama mella-fera. Semina nuda.

* *Foliis simplicibus.*

581. *RANUNCULUS Flammula* foliis elliptico-lanceolatis, petiolatis, crenatis, caule declinato.

a. *Ranunculus Flammula* foliis ovato-lanceolatis, petiolatis, caule declinato. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 653.

b. *Ranunculus palustris*, foliis ferratis. *Bauh. pin. 150.*

In pratis humidis, locisque uliginosis frequens. v. g. ante portam Halensem, in der Jungfern-heide &c. Junio. Julio.

Offic. (*Flammulae Herba.*)

582. *RANUNCULUS Lingua* caule erecto ramoso, foliis lanceolatis subserratis.

Ranunculus Lingua foliis lanceolatis, caule erecto,
Lin. syst. ed. R. 2. p. 653.

β. flore minori.

Prope Spandau locis uliginosis inter arundinem
frequens. β. in der Jungfernheide passim.
Junio. Augusto.

583. RANUNCULUS *Ficaria* foliis cordatis angu-
latis petiolatis, caule unifloro. Lin. syst. ed.
R. 2. p. 656.

Ficaria verna. Huds. angl. ed. 2. t. 1. p. 244.

In umbrosis humidis ad Schoenhausen, Blancken-
felde & alibi passim. Im Briselang copiose.
April. Majo.

Offic. Chelidonii minoris Herba. (Radix.)

Calyx triphyllus. Petala octo. Optime nectariis
ad apices unguorum petalorum genus Ranun-
culi ab affinibus distinguitur.

** Foliis dissectis & divisis.

584. RANUNCULUS *auricomus* foliis radicalibus
reniformibus crenatis incisis; caulinis digitatis
linearibus, caule multifloro. Lin. syst. ed. R.
2. p. 657.

In pratis nemorosis ad Schoenhausen, in der
Jungfernheide, Briselang & alibi frequens.
Majo.

585. RANUNCULUS *sceleratus* foliis inferioribus
palmatis; summis digitatis, fructibus oblon-
gis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 658.

In pratis paludosis, ad fossas copiose, Majo.
Junio.

586. **RANUNCULUS** *bulbosus* calycibus retroflexis,
pedunculis sulcatis, caule erecto multifloro,
foliis compositis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 662.

In pratiis, pascuis, locisque nemorosis copiose.
Majo. Junio.

Radice bulbosa, & calyce reflexo, facilissime ab
omnibus distinguendus. In Ranunculo Sar-
doo *Crantzii* vel Philonitide *Ehrhartii* calyx
quidem reflexus reperitur; ast radix fascicu-
lata est.

587. **RANUNCULUS** *repens* calycibus patulis, pe-
dunculis sulcatis, farmentis repentibus, foliis
compositis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 662.

In nemoribus humidis pratisque vulgaris. Ae-
state.

588. **RANUNCULUS** *acris* calycibus patulis, pe-
dunculis teretibus, foliis tripartito - multifi-
dis summis linearibus. *Lin. syst. ed. R. 2.*
p. 663.

In pratis, pascuisque copiosissime. Majo. Junia.
Offic. (Ranunculi Herba.)

589. **RANUNCULUS** *arvensis* seminibus aculeatis,
foliis superioribus decompositis linearibus.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 665.

Inter segetes, inque agris copiose. Majo.
Junio.

590. **RANUNCULUS** *hetrophyllus* foliis submersis
capillaceis, emersis reniformi palmatis. *Wig-
gers primit.* p. 42. n. 447.

POLYANDRIA POLYGYNIA. 191

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, supremis reniformibus, orbiculatis, palmatis. *Hall. helv.* n. 1163.

Ranunculus aquatilis foliis submersis capillaceis, emersis peltatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 667. α . In fossis, aquisque stagnantibus frequens. e. g. *im Thiergarten im Bassin & alibi.* Majo. Junio.

591. *RANUNCULUS aquatilis* foliis omnibus capillaceis, laciniis divergentibus. *Wiggers primit.* p. 42. n. 448.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis capillaribus, laciniis divergentibus. *Hall. helv.* 1162.

Ranunculus aquatilis γ . *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 668.

β . *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis, circumscriptione rotundis. *Roy lugdb.* 492.

Ranunculus aquatilis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 667. β .

In lacubus, aquis stagnantibus & fossis copiose. Majo. Junio.

592. *RANUNCULUS fluviatilis* foliis omnibus capillaceis, laciniis paralellis longissimis. *Wiggers primit.* p. 42. n. 449.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis capillaceis, longissimis, laciniis paralellis. *Hall. helv.* n. 1161.

Ranunculus aquatilis. δ . *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 668.

In fluviis rivulisque passim. Eodem tempore.

TROLLIUS. *Lin. gen. 758.*

Cal. O. Petala circiter 14. Nectararia linearia.
Capsulae plurimae, ovatae, monospermae.

593. *TROLLIUS europaeus* corollis conniventibus,
 nectariis longitudine stamintum. *Lin. syst. ed.*
R. 2. p. 668.

Prope *Schoenhausen* rarissime. Ad *Blanckenfelde*
 passim. Junio.

CALTHA, *Lin. gen. 761.*

Cal. O. Petala 5. Nectar. O. Capsulae plures
polyspermae.

594. *CALTHA palustris.* *Lin. syst. ed. R. 2.*
p. 673.

In pratis paludosis, locisque uliginosis copio-
 sissime. Majo.

CLASSIS XIV.

D I D Y N A M I A
G Y M N O S P E R M A.

a. *Calyces subquinquefidi.*

AJUGA. Lin. gen. 763.

Cor. labium superius minimum. Stam. labio superiore longiora.

595. AJUGA *pyramidalis* tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 8.

*In der Hasenheide, Jungferuheide & alibi passim.
Majo. Junio.*

Offic. (*Consolidae mediae Herba.*)

596. AJUGA *reptans* stolonibus reptantibus. Lin. syst. ed. R. 3. p. 9.

Im Thiergarten & alibi copiose. Majo. Junio.

TEUCRIUM. Lin. gen. 764.

Corollae labium superius nullum, ultra basin bipartitum, divaricatum.

597. TEUCRIUM *Scorodonia* foliis cordatis ferratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. Lin. syst. ed. R. 3. p. 18.

Im Thiergarten copiose. Julio. Augusto.

598 **T**EUCRIUM *Scordium* foliis oblongis sessili-
ibus dentato-ferratis, floribus geminis axilla-
ribus pedunculatis, caule diffuso. *Lin. syst.*
ed. R. 3. p. 18.

In umbrosis humidis *im Thiergarten, Jungfern-*
heide, prope *Tegel & alibi frequens*. Julio.
Offic. Scordii Herba.

SATUREJA. *Lin. gen. 765.*

Corollae laciniae subaequales. Stam. distantia.

599. **S**ATUREJA *hortensis* pedunculis bifloris. *Lin.*
syst. ed. R. 3. p. 27.

In hortis frequens culta, interdum in ruderatis;
quisquiliis forte inde dilata. Julio. Augusto.
Offic. Saturejae Herba.

HYSSOPUS. *Lin. gen. 767.*

Corollae labium inferius lacinula intermedia cre-
nata. Stam. recta distantia.

600. **H**YSSOPUS *officinalis* spicis secundis, foliis
lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 29.*

ꝝ. Hyssopns rubro flore. *Bauh. pin. 217.*

ꝝ. Hyssopus vulgaris alba. *Bauh. pin. 218.*

In hortis culta copiose ꝝ & ꝝ rarius. Aestate.

Offic. Hyssopi Herba.

NEPETA. *Lin. gen. 768..*

Corollae labium inferius lacinula intermedia cre-
nata, faux margine reflexo. Stamina appro-
ximata.

601. NEPETA *Cataria* floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 20.

Ad vias, sepes, pagos, inque ruderatis hinc inde. Aestate.

Offic. *Catariae s. Nepetae Herba & Semina.)*

LAVANDULA. *Lin. gen. 769.*

Cal. ovatus subdentatus, bractea suffultus. *Cor.* resupinata. *Stamina* intra tubum.

602. LAVANDULA *Spica* foliis lanceolatis integerimis, spicis nudis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 35.

ꝑ. *Lavendula angustifolia.* *Bauh. pin. 216.*

ꝑ. *Lavendula latifolia.* *Bauh. pin. 216.*

In rusticorum hortis frequens. Julio. Augusto.

Offic. Herba & Flores Lavendulae s. Spicae.

MENTHA. *Lin. gen. 771.*

Cor. subaequalis, 4 fida: lacinia latiore emarginata. *Stamina* erecta distantia.

* *Capitatae.*

603. MENTHA *crispa* spicis capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam aequantibus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 42.

In hortis copiose culta. Julio. Augusto.

Offic. Menthae crispeae Herba.

604. MENTHA *aquatica* floribus capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 43.

Ad fossas, in pratis humidis, ad lacus & flumi-
na abunde. Julio. Augusto.

Offic. (Menthæ aquatice Herba.)

* * *Verticillatae.*

605. **MENTHA arvensis** floribus verticillatis, foliis
ovatis acutis serratis, staminibus corollam ae-
quantibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 44.*

In pratis humidis ad fossas copiosissime. Julio.
Augusto.

Offic. Menthae equinae. s. sylvestris Herba.)

GLECOMA. *Lin. gen. 773.*

*Antheræ laterales reniformes, singulum par in
formam crucis connivens.*

606. **GLECOMA hederacea** foliis reniformibus cre-
natis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 47.*

Locis humidis umbrosis copiose. Aprili. Majo.

Offic. Hederae terrestris Herba.

LAMIUM. *Lin. gen. 774.*

*Corollæ labium superius integrum, fornicatum,
labium inferius 2 lobum: faux utrinque mar-
gine dentata.*

607. **LAMIUM laevigatum** foliis cordatis rugosis,
caule laevi, calycibus glabris longitudine tubi
corollæ. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 48.*

*In der Jungfernheide, versus Spandau unico loco
frequens. Aprili. Majo.*

608. **LAMIUM album** foliis cordatis acuminatis ser-
ratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Lin.
syst. ed. R. 3. p. 50.*

In cultis, ruderatis, ad pagos & sepes copiose.

Aestate.

Offic. Galeopsidis. f. Urticae mortuae Flores.

609. *LAMIUM purpureum* foliis cordatis obtusis petiolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 50.*

In nemoribus umbrosis, ad sepes inque cultis copiose. Aestate, praecipue Majo.

GALEOPSIS. *Lin. gen. 775.*

Corollae labium superius subcrenatum, fornacatum, inferius supra bidentatum.

610. *GALEOPSIS Ladanum* internodiis caulinis aequalibus, verticillis omnibus remotis calycibus inermibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 51.*

Inter segetes ante portam Halensem & alibi passim.

Julio. Augusto.

611. *GALEOPSIS cannabina* foliis ovato-lanceolatis, serratis, caule hirsuto, flore calyce quadruplo majore. *Hall. helv. n. 269. Pollich. palat. 2. p. 148. n. 560.*

Galeopsis Tetrahit s. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 51.*

Inter segetes ad Friedrichsfelde & alibi passim

Julio. Augusto.

612. *GALEOPSIS Tetrahit* internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis, calycibus pungentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 51.*

Galeopsis foliis ovato-lanceolatis, serratis, caule hirsuto. *Hall. helv. n. 268.*

In agris inter segetes inque sylvis copiose. Julio
Augusto.

POLLICIA,

Corollae labium superius integrum fornicatum:
inferius bi vel trifidum: faux absque dentibus.

613. POLLICIA *Galeobdolon* calycibus pungentibus, corollae labio inferiore trifido: foliis omnibus cordatis dentatis, petiolatis.

Pollichia. Franz v. P. Schrank Centur. bot. Anmerk. p. 35. n. 29.

Galeobdolon luteum. Wiggers primit. p. 44. n. 465.

Lamium Galeobdolon verticillis dimidiatis subsexfloris: ore edentulo. Crantz austr. 262.

Scop. carn. ed. 2. n. 705.

Galeopsis Galeobdolon verticillis sexfloris: involucro tetraphyllo. Lin. syst. ed. R. 3. p. 53.

In Briselang versus Pausin frequens & alibi rarius. Aprili. Majo.

614. POLLICIA *amplexicaulis* calycibus inermibus: corollae labio inferiore bifido, foliis caulinis sessilibus rotundatis incisis, radicalibus petiolatis cordato-lobatis.

Lamium amplexicaule foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 51.

Lamium foliis radicalibus petiolatis lobatis, superioribus rotundis amplexicaulibus incisis. Hall. helv. n. 273.

In agris, cultis, ruderatis, sepibusque passim.
Per totam aestatem.

BETONICA. Lin. gen. 776.

*Cal. aristatus. Corollae labium superius adseen-
dens planiusculum; tubus cylindricus.*

615. BETONICA officinalis spica interrupta, co-
rollarum labii lacinia intermedia emarginata.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 53.

Prope Tegel, in der Jungfernheide & alibi fre-
quens. Julio. Augusto.

Offic. Betonicae Herba.

STACHYS. Lin. gen. 777.

*Cor. labium superius fornicatum, labium infe-
rius lateribus reflexum: lacinia intermedia
majore emarginata. Stam. deflorata versus la-
tera reflexa.*

616. STACHYS sylvatica verticillis sexfloris, foliis
cordatis petiolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 56.*

In nemorosis ad Potzdam, specialis vero locus
me fugit. Junio. Julio.

617. STACHYS palustris verticillis subsexfloris, fo-
liis linear-lanceolatis semiamplexicaulibus ses-
ilibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 56.*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi in palu-
dibus, etiamque ad fossas frequens. Junio.
Julio.

618. STACHYS recta verticillis subspicatis, foliis
cordato-ellipticis crenatis scabris, caulis
adscendentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 60.*

In versuris agrorum ad *Wilmersdorf*, *Smargendorf*, in littoribus elevatis *der Havel* prope *Gatow* & alibi frequens. Julio.

Offic. Sideritidis Herba.

BALLOTA. *Lin. gen. 778.*

Cal. hypocrateriformis, 5 dentatus, 10 striatus.

Cor. labium superius crenatum, concavum.

619. **BALLOTA nigra** foliis cordatis indivisis serratis, calycibus acuminatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 62.

Ante portam *Lipsensem* in ruderatis copiose, ad pagos & vias alibique passim. Julio. Augusto.

620. **BALLOTA alba** foliis cordatis indivisis serratis, calycibus subtruncatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 63.

In ruderatis ad pagos rarius. Julio.

MARRUBIUM. *Lin. gen. 779.*

Cal. hypocrateriformis, rigidus, 10 striatus. *Cor.*

labium superius 2 fidum, lineare rectum.

621. **MARRUBIUM vulgare** dentibus calycinis decem, setaceis uncinatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 65.

In ruderatis, ad vias, pagos, sepes, inque coemeteriis copiose. Aestate.

Offic. Marrubii albi Herba.

CHAITURUS.

Calycis laciniae erectae. Corollae labium superius integrum fornicatum: inferius trifidum patens: tubus longitudine calycis. Stamina vix tubi longitudine.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMA. 201

622. CHAITURUS *leonuroides*.

Leonurus Marrubiastrum foliis ovatis lanceolatis-
que serratis, calycibus sessilibus spinosis. Lin.
syst. ed. R. 3. p. 68.

Ehrhardt. hanaev. Magazin 1781. 27 Stück.
p. 421. n. 21.

In memoribus versus *Rüdersdorf* rarius. Julio.
Augusto.

A Leonuro ob fructificationem valde diversam
separavi.

LEONURUS. Lin. gen. 780.

Calycis laciniae patentes. Corollae labium supe-
rius planum erectum, inferius trifidum. Sta-
mina punctis nitidis adspersa.

623. LEONURUS *Cardiaca* foliis caulinis lanceola-
tis trilobis. Lin. *syst. ed. R. 3.* p. 67.

In ruderatis ad pagos, sepes, & vias vulgaris.
Julio. Augusto.

Offic. (*Cardiacae Herba.*)

b. *Calyces bilobiati.*

CLINOPODIUM. Lin. gen. 783.

Involucr. multifidum, verticillato-subjectum.

624. CLINOPODIUM *vulgare* capitulis subrotun-
dis hispidis, bracteis setaceis. Lin. *syst. ed. R.*
3. p. 75.

Clinopodium foliis ovato-lanceolatis obiter den-
tatis, stipulis setaceis. Hall. helv. n. 239.

In der Hasenheide, Jungfernheide frequens, prope Tegel passim &c. Julio. Augusto.

ORIGANUM. *Lin. gen. 784.*

Strobilus tetragonus, spicatus, calyces colligens.

625. ORIGANUM *vulgare* spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 78.*

In den Papenbergen passim. Julio.

Offic. Origani Herba.

626. ORIGANUM *Majorana* foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 79.*

In hortis frequens cultum. Julio. Augusto.

Offic. Majoranae Herba.

THYMUS. *Lin. gen. 785.*

Calycis faux villis clausa.

627. THYMUS *Serpillum* floribus capitatis, caulis repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 79.*

β. *Serpillum vulgare majus. Bauh. pin. 220.*

γ. *Serpillum foliis citri odore. Bauh. pin. 220.*

δ. *Serpillum angustifolium glabrum. Bauh. pin. 220.*

ε. *Serpillum minus flore albo.*

In collibus aridis apricis, agrorum versuris, & nemoribus copiosissime. Aestate.

Offic. Serpilli Herba.

628. THYMUS vulgaris erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-spicatis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 80.

In hortis copiose cultus. Aestate.

Offic. Thymi Herba.

629. THYMUS Acinos floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulis rectis subramosis, foliis acutis serratis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 81.

Ad vias, agrorum margines ante portam Halensem, im Thiergarten & alibi frequens. Augusto.

SCUTELLARIA. Lin. gen. 792.

Calyx ore integro post florescentiam clauso operculato.

630. SCUTELLARIA galericulata foliis cordatolanceolatis crenatis, floribus axillaribus. Lin. syst. ed. R. 3. p. 98.

Im Thiergarten, Jungfernheide, ad Reineckendorf, Spandau, Coepnick & alibi ad fossas, fluviorumque ripas humidas copiose. Julio. Augusto.

PRUNELLA. Lin. gen. 793.

Filamenta bifurca: altero apice antherifera. Stigma bifidum.

631. PRUNELLA vulgaris foliis ovatis oblongis calycibus superne truncatis. Hall. helv. 277.

Prunella vulgaris foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis. Lin. syst. ed. R. 3. p.

In pratis, pascuis, nemoribusque uidis copiose.

Julio. Augusto.

Offic. Brunellae vel Prunellae s. Consolidae minoris Herba.

632. PRUNELLA *grandiflora* foliis ovato-oblongis, calycibus superne tridentatis. *Hall. helv.* 278.

Prunella grandiflora foliis subintegris, ex subrotundo ovatis, calycibus superne profunde tridentatis. *Pollich. pal.* n. 578.

Prunella vulgaris s. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 101.

In den Papenbergen rarius. In editioribus ad Rüdersdorf copiose. Julio. Augusto.

ANGIOSPERMIA.

a. Calyces quadrifidi.

RHINANTHUS. *Lin. gen.* 798.

Cal. 4 fidus ventricosus. *Capsula* bilocularis, obtusa, compressa.

633. RHINANTHUS *Cristagalli* corollarum labio superiore compresso breviore. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 106.

Alectorolophys calycibus glabris. *Hall. helv.* 313.

s. *Crista galli angustifolia montana.* *Bauh. pin.* 163.

In pratis & pascuis copiosissime. Aestate.

EUPHRASIA. *Lin. gen.* 799.

Cal. 4 fidus cylindricus. *Capsula* bilocularis ovato-oblonga. *Antherae inferiores altero loco basi spinosae.*

634. EUPHRASIA *officinalis* foliis ovatis lineatis
argute dentatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 108.

In pratis, pascuisque vulgaris. Junio. Julio.

Offic. (Euphrasiae Herba.)

Corollae labium superius bifidum, laciniis bifi-
dis: labium inferius trifidum, laciniis bifidis.
Stamina longitudine labii superioris. Fila-
menta apice ciliata. Antherae ciliatae unilo-
culares apice dehiscentes.

635. EUPHRASIA *Odontites* foliis linearibus om-
nibus ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 109.

In pascuis & pratis humidis copiose. Aestate.

Corollae labium superius integrum emarginatum:
inferius trifidum, lobis integerrimis. Antherae
uniloculares apice dehiscentes, infetne mucro-
natae. In *Euphrasia lutea* etiam Antheras mu-
cronatas vidi.

MELAMPYRUM. *Lin. gen. 800.*

Cal. 4 fidus. Cor. labium superius compressum,
margine replicato. Caps. bilocularis obliqua
hinc dehiscens. Semina bina gibba.

636. MELAMPYRUM *arvense* spicis conicis laxis
braeteis dentato setaceis, coloratis. *Lin. syst.*
ed. R. 3. p. 111.

Melampyrum foliis integerrimis, braeteis semi-
pinnatis. Hall. helv. n. 310.

In agris ad *Spandau* rarissime. Julio.

637. MELAMPYRUM *nemorosum* floribus secundis
lateralibus: braeteis dentatis cordato-lanceo-

latis : summis coloratis sterilibus, calycibus lanatis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 111.

In nemorosis ad Schoenhausen, Lichtenberg, in den Papenbergen & alibi copiose. Junio. Julio.

638. MELAMPYRUM *sylvaticum* floribus secundis lateralibus: conjugationibus remotis, corollis hiantibus. Lin. syst. ed. R. 3. p. 112.

Im Thiergarten frequens. Junio. Julio.

LATHRAEA. Lin. gen. 801.

Cal. 4 fidus. Glandula deppressa, ad basin futurae germinis, Capsula unilocularis.

639. LATHRAEA *Squamaria* caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. Lin. syst. ed. R. 3. p. 113.

Ad Corylorum truncos prope Schoenhausen rassisime. Aprili. Majo.

Offic. (Squamariae s. Dentariae Radix.)

b. Calyces quinquefidi.

PEDICULARIS. Lin. gen. 804.

Cal. 5 fidus. Capsula bilocularis, mucronata obliqua. Semina tunicata.

640. PEDICULARIS *palustris* caule ramoso, calycibus cristatis calloso-punctatis, corollis labio obliquis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 1:5.

In pratis paludosis ad fossas vorm Grunewald frequens. Majo. Junio.

Offic. (Pedicularis Herba.)

641. *PEDICULARIS sylvatica* caule ramoso, caly-
cibus oblongis angulatis laevibus, corollis la-
bio cordato. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 115.

In der Hasenheide post domum venatoris Braun,
& ad viam versus *Grunewald*, in pratis passim.
Junio. Julio.

ANTIRRHINUM. *Lin. gen. 808.*

Cal. 5 phyllus. *Cor.* basis deorsum prominens,
nectarifera. *Caps.* bilocularis.

* *Foliis oppositis.*

642. *ANTIRRHINUM minus* foliis plerisque alter-
nis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo dif-
fuso. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 134.

In urbe ipsa, auf den Treppen des Opernhauses
& *in tegmine arcis regiae frequens.* Aestate.

** *Foliis alternis.*

643. *ANTIRRHINUM Linaria* foliis lanceolato-
linearibus confertis, caule erecto, spicis ter-
minalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Lin.*
syst. ed. R. 3. p. 135.

In ruderatis, nemoribus glareosis, versuris, ad
pagos, fossas exsiccatas, inque coemeteriis
copiosissime. Aestate.

Offic. Linariae Flores & Herba.

*** *Corollis ecaudatis.*

644. *ANTIRRHINUM Orontium* corollis ecauda-
tis, floribus subspicatis, calycibus digitatis
corolla longioribus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 138.

Prope Spandau im Lustgarten frequens. Au-
gusto.

SCROPHULARIA. Lin. gen. 814.

Cal. 5 fidus. *Cor.* resupinata tubo subgloboso,
lacinia intermedia reflexa. *Capsula* bilocularis.

645. SCROPHULARIA nodosa foliis cordatis tri-
nervatis, caule obtusangulo. Lin. syst. ed. R.
3. p. 145.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi, ad fos-
sarum latera, inque humidiusculis frequens,
Aestate.

Offic. Scrophularie Radix.

646. SCROPHULARIA aquatica foliis cordatis pe-
tiolatis decurrentibus obtusis, caule membra-
nis angulato, racemis terminalibus. Lin. syst.
ed. R. 3. p. 145.

In fossis locisque paludosis ad Spandau, Frie-
drichsfelde, Reineckendorf, in der Jungfern-
heide & alibi passim. Julio. Augusto.

647. SCROPHULARIA vernalis foliis cordatis, cau-
linis ternis, pedunculis axillaribus solitariis
bifidis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 148.

Ad Schoeneberg rarius. Majo.

DIGITALIS. Lin. gen. 816.

Cal. 5 partitus. *Cor.* campanulata 5 fida, deor-
sum ventricosa. *Caps.* ovata bilocularis.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 209

648. *DIGITALIS ambigua* corollarum labio emarginato, foliis subtus pubescentibus. *Lin.*, *syst.* *ed. R. 3.* p. 153.

In den Puppenbergen frequens. Junio, Julio.

LIMOSELLA. *Lin.* *gen.* 837.

Cal. 5 fidus. *Cor.* 5 fida aequalis. *Stamina* per paria approximata. *Capsula* unilocularis bivalvis polysperma.

649. *LIMOSELLA aquatica* foliis lanceolatis. *Lin.* *syst. ed. R. 3.* p. 181.

Limosella foliis longe petiolatis, fine spathulatis.

Cranz austr. p. 353.

In der Jungfernheide ad marginem paludis prope *den Rehbergen* & alibi passim, Augusto.

CLASSIS XV.
T E T R A D Y N A M I A
S I L I C U L O S A.

a. Siliculis integris.

M Y A G R U M. Lin. gen. 860.

Silicula stylo conico persistente terminata, valvulis concavis, loculo submonospermo.

650. **M Y A G R U M sativum** siliculis obovatis, pedunculatis polyspermis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 208.

Inter segetes, praecipue inter Linum frequens.

Julio. Augusto.

Offic. (*Sesami nostratis Semina.*)

651. **M Y A G R U M paniculatum** siliculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugosis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 209.

Ante portam Oranienburgicam frequens. Julio. Augusto.

D R A B A. Lin. gen. 864.

Styl. O. *Silicula* integra, ovali-oblonga, valvulis planiusculis dissepimento paralellis.

652. **D R A B A verna** scapis nudis, foliis subserratis.

Lin. syst. ed. R. 3. p. 213.

foliis cauleque vilosif.

TETRADYNA MIA SILICULOSA. 211

In arvis, agris, collibus apricis copiosissime. Martio. Aprili.

b. *Siliculis apice emarginatis.*

LEPIDIUM. Lin. gen. 365.

Silicula nuda emarginata, cordata, polysperma, valvulis carinatis dissepimento contrariis.

* *Valvulis monospermis.*

653. LEPIDIUM sativum floribus tetradynamiis, foliis oblongis multifidis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 218.

In hortis ubique cultum, interdum ad sepes. Aestate.

654. LEPIDIUM ruderale floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis ramiferis linearibus integerrimis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 220.

Iberis ruderale floribus vix conspicuis, foliis imis multifidis, superioribus linearibus integerrimis. Crantz austr. 21.

Nasturtium ruderale. Scop. carn. ed. 2. n. 801.

Locis ruderatis ad pagos & sepes copiose. Aestate.

** *Valvulis polyspermis.*

655. LEPIDIUM *Bursa pastoris* floribus tetradynamiis, siliculis triangularibus: foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis subintegris.

Thlaspi Bursa pastoris siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 226.

Nasturtium siliquis triangularibus. *Hall. helv.* n. 514.

Bursa pastoris. *Wiggers primit.* p. 47. n. 503.

♂. *Bursa pastoris media.* *Bauh. pin.* 108.

♀. *Bursa pastoris major* folio non sinuato. *Bauh. pin.* 108.

In agris, locis cultis, ad sepes, vias, ubique fere copiosissime. Aestate.

Offic. (Bursae pastoris Herba.)

Silicula non alata & dissepimentum valvulis contrarium, a Thlaspidis genere separant.

THLASPI. *Lin. gen. 866.*

Silicula alata, emarginata, obcordata, polysperma, valvulis navicularibus dissepimento parerellis.

656. *THLASPI arvense* siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 222.

Inter segetes inque versuris frequens. Aestate.

657. *THLASPI campestre* siliculis subrotundis foliis sagittatis dentatis incanis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 224.

In urbe versus portam Halensem circum stabulum asuinum rarius. Majo. Junio.

IBERIS. Lin. gen. 868.

Cor. irregularis: petalis binis exterioribus majoribus. Silicula polysperma emarginata.

658. IBERIS nudicaulis herbacea, foliis sinuatis, caule nudo simplici. Lin. syst. ed. R. 3. p. 232.
β. foliis integerrimis.

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel, Spandau & alibi frequens. Aprili. Majo.

In varietate β. folia sunt spathulata integerrima, interdum une alterove dente notata.

ALYSSUM. Lin. gen. 869.

Filamenta quaedam introrsum denticulo notata. Silicula emarginata.

659. ALYSSUM incanum caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymboſis petalis bifidis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 234.
In arenosis aridis apricis ad Friedrichsfelde, Spandau, Tegel, in der Hasenheide & alibi copiose. Aestate.

660. ALYSSUM calycinum caulibus herbaceis, statinibus omnibus dentatis, calycibus persistentibus. Lin. syst. ed. R. 3. p. 234.

Ad Tempelhoff rarius. Majo. Junio.

SILIQUOSA.

- a. Calyx clausus, foliolis longitudinaliter conniventibus.

ERYSIMUM. Lin. gen. 878.

Siliqua columnaris, exacte tetraedra.

661. *Erysimum cheiranthoides* foliis lanceolatis integerrimis, siliquis patulis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 261.*

In agris ad *Spandau* & alibi passim. Julio. Augusto.

CHEIRANTHUS. *Lin gen. 879.*

Calyx clausus foliis duobus gibbis. *Germen* undique denticulo glandulato. *Sem.* plana.

662. *CHEIRANTHUS erysimoides* foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto simplicissimo, siliquis tetragonis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 262.*

Ad *Schoeneberg* & *Tegel* rarius. Majo. Junio. Videtur Erysimi species, nisi calyx gibbosus adesset.

663. *CHEIRANTHUS scapigerus* caule florifero aphylio, sterilibus simplicibus: foliis lanceolatis integerrimis.

Locis humidis *im Grunewald* rarius. Aprili. Majo.

Radix simplex perpendicularis, forte biennis. Caulis floriferus glaber, teres, spithameus racemosus, foliis destitutus. Flores alterni pendunculati. Pedunculi floribus duplo longiores teretes. Calyx patens, parum gibbus, caducus. Petala calyce longiora lutea integra, longe unguiculata. Stamina lutea longitudine calycis & ultra. Filamenta subulata. Antherae oblongae sulcatae. Germen oblongum planum. Stylus nullus. Ovarium capitatum.

apice divisum. Siliquas maturas non vidi. Caules steriles, florifero minores, glabri, teretes, laevissimi, striati, foliis obsiti. Folia alterna glabra petiolata, oblongo-lanceolata, integerrima, interdum partes prominulas observavi, sed vix dentium nomine dignas.

TAB. V. fig. 10.

Possitne locus humidus tantam producere varietatem? Sed praecocitas florendi, & tota inflorescentia dissuadent.

Differet a *Cheirantho erysimoide*:

- 1) caule florifero aphylllo.
- 2) foliis integerrimis.

ab *Erysimo cheiranthoide*:

- 1) stigmate diviso.
- 2) calyce gibbo.
- 3) caule florifero nudo.

ARABIS. Lin. gen. 882.

Calyx erectus. *Glandulae* 4. singulæ inter calycis foliola, squamae instar reflexæ. *Siliqua* longa compressa.

664. ARABIS *thaliona* foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 272.

In agris, versuris, locisque siccis apricis passim. e. g. ante portam Halensem, im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel, Reineckendorf &c. Aprili. Majo.

665. ARABIS *arenosa* foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis sinuato dentatis. Scop. carn.

*ed. 2. n. 837. t. 40. Wiggers primit. p. 50.
n. 522.*

Sisymbrium arenosum caule subfolioso ramoso, foliis lyratis rectangulo-dentatis, hispidis, pilis ramosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 255.*

Prope Tegel & in den Papenbergen hinc inde.
Majo. Junio.

Petala semper alba, nunquam violacea, uti *Celeber. Leers* observavit.

TURRITIS. *Lin. gen. 883.*

Calyx connivens erectus. Cor. erecta. Siliqua longissima angulata.

666. *TURRITIS glabra* foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 274.*

Im Thiergarten & Hasenheide haud infrequens.
Majo. Junio.

667. *TURRITIS hirsuta* foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 275.*

Arabis hirsuta. Scop. carn. ed. 2. n. 835.

In der Jungfernheide passim. Majo. Junio.

BRASSICA. *Lin. gen. 884.*

Calyx erectus connivens. Stylus brevis crassitie germinis.

668. *BRASSICA Napus* radice caulescente fusiformi. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 278.*

Inter segetes rarius, in hortis culta. Majo.

Junio.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 217

Offic. Semina Napi.

Folia radicalia lyrata; caulina amplexicaulia.
Calyx exakte Sinapis.

669. BRASSICA *Rapa* radice caulescente orbiculari
depressa carnosa. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 278.
Inter segetes in agris & arvis versus den Grune-
wald passim. Culta saepius in agris. Ae-
state.

670. BRASSICA *oleracea* radice caulescente tereti
carnosa. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 278.
cum varietatibus.

Copiose culta, variet. β interdum in ruderatis.
Aestate.

RAPHANUS. *Lin. gen.* 886.

Calyx clausus. *Siliqua* torosa subarticulata,
teres.

671. RAPHANUS *sativus* siliquis teretibus tenuis
bilocularibus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 234.
Frequens in hortis cultus. Majo. Junio.

672. RAPHANUS *Raphanistrum* siliquis teretibus
articulatis laevibus unilocularibus. *Lin. syst.*
ed. R. 3. p. 284.

$\alpha.$ Lampsana flore melino. *Tabernem.* 407.

$\beta.$ Rapistrum flore albo striato. *Bauh. hist.* 2.
p. 851.

Inter segetes in agris copiosissime. Aestate.

b. Calyx hians: foliolis superne distan-
tibus.

SINAPIS. Lin. gen. 885.

Calyx patens. Cor. unguis recti. Stylus longitu-
dine germinis. Siliqua longe rostrata.

673. SINAPIS *arvensis* siliquis multangulis torosis,
 rostro longioribus: foliis runcinatis, cum
 caule hispidis.

Sinapis arvensis siliquis multangulis toroſo-tur-
 gidis, rostro ancipiti longioribus. Lin. syst.
 ed. R. 3. p. 280.

Inter segetes in agris copiosc. Majo. Junio.

Similis *Sinapi Allioni*. Jacq. hort. v. 2. t. 168.

Differt ab illo foliis runcinatis hispidis, lobo
 exteriore maximo, laciniis obtusis, caule
 hispido.

SISYMBRIUM. Lin. gen. 877.

Calyx patulus. Cor. patens. Siliqua subangulata
dehiscens: valvulis rectiusculis.

* *Siliquis declinatis brevibus.*

674. SISYMBRIUM *Nasturtium* siliquis declinatis,
 foliis pinnatis, foliolis subcordatis. Lin. syst.
 ed. R. 3. p. 249.

Prope den *Gesundbrunnen* frequens. Julio. Au-
 gusto.

Offic. Herba recens *Nasturtii aquatici*.

675. *SISYMBRIUM sylvestre* siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis lanceolatis serratis. *Lin.* *syst. ed. R. 3.* p. 250.

Sisymbrium foliis pinnatis, pinnis dentatis diffinis. *Hall. helv.* 485.

Locus depresso ad *Spandau*, in der *Jungfernheide* & alibi passim. Junio. Julio.

676. *SISYMBRIUM amphibium* petalis calyce longioribus, siliquis declinatis oblongo ovatis, foliis integris & pinnatifidis.

Sisymbrium amphibium siliquis declinatis oblongo ovatis: foliis pinnatifidis serratis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 250. $\beta.$ *aquaticum.*

$\alpha.$ *Sisymbrium amphibium.* *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 251. $\nu.$ *terrestris.*

In fossis paludibusque s. in pratis & pascuis frequens. Majo. Junio.

677. *SISYMBRIUM palustre* petalis calyce brevioribus, siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatis; foliolis dentatis. *Hall. helv.* n. 487. *Reich. moenof.* 472. *Pollich. palat.* 2. p. 230. n. 625.

Sisymbrium amphibium. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 250. $\alpha.$ *palustre.*

Im Thiergarten & *Jungfernheide* in fossis passim. Majo. Junio.

* * *Siliquis longioribus rectis.*

678. *SISYMBRIUM Alliaria* foliis simplicibus cordatis. *Scop. carn. ed. 2. n. 825. Wiggers primit. p. 49. n. 519.*

Erysimum Alliaria foliis cordatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 260.*

Im Briselang hinterm Finckenkrug ad fossam,
prope Schoenhausen, Tegel & alibi frequens.
Majo.

Offic. (Alliariae Herba.)

Calyx coloratus valde caducus.

679. *SISYMBRIUM officinale* caule ramoso divaricato, siliquis adpressis, foliis runcinatis.
Scop. carn. ed. 2. n. 824. Wiggers primit. p. 49. n. 516.

Erysimum officinale siliquis spicae adpressis, foliis runcinatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 260.*

In ruderatis, sepibus, ad pagos & vias frequens. Aestate.

Offic. Erysimi Herba.

680. *SISYMBRIUM Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decomposito pinnatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 256.*

In nemoribus siccis, ruderatis, sepibus, ad vias & alibi copiosissime. Majo. Junio.

Offic. (Sophiae Chirurgorum Herba.)

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 221

CARDAMINE. Lin. gen. 876.

Calyx subhians. *Stigma* integrum. *Siliqua* elatice dissiliens valvulis revolutis.

681. CARDAMINE *pratensis* foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis: caulinis lanceolatis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 248.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald, prope Frledrichsfelde, Schoenhausen, Tegel, Reineckendorf & alibi copiose. Majo. Junio.

682. CARDAMINE *amara* foliis pinnatis, axillis stoloniferis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 248.

In der Jungfernheide, locis humidis, inque fossis passim. Majo.

CLASSIS XVI.
M O N A D E L P H I A
T R I A N D R I A.

JUNIPERUS. Lin. gen. 1246.

♂—♀. ♂. *Ament,* squamosum: squamis 10. 1 flor. Cor. O.

♀. *Calyx* 3 partitus. *Petala* 3. *Styl.* 3. *Bacca* infera carnosa trisperma.

683. *JUNIPERUS Sabina* foliis oppositis erectis, decurrentibus: oppositionibus pyxidatis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 277.

Im Thiergarten rarius. Aprili, Majo.

Offic. Sabinae Herba.

684. *JUNIPERUS communis* foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. Lin. syst. ed. R. 4. p. 278.

Offic. Juniperi Baccae, Lignum.

PENTANDRIA.

XANTHIUM. Lin. gen. 1152.

♂—♀. ♂. *Calyx commun.* imbricatus. Cor. composita: *propria* monopetala infundibuliformis. Recept. paleaceum.

♀. *Calyx involucrum* diphyllum, biflorum. Cor. O. *Styli* 2. *Drupa* sicca muriçata bifida. *Nucleus* bilocularis.

685. *XANTHIUM strumarium* caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 137.
Xanthium foliis semitrilobatis, aculeis uncinatis.
Hall. helv. 1621.

In ruderatis frequens. Augusto. Septembri.
Offic. (Xanthii Semina.)

DECANDRIA.

GERANIUM. Lin. gen. 897.

Monogynia. Stigmata 5. Recept. elongatum, rostratum. Semina 5 arillata: arillo aristâ tortili donato.

* *Myrrhina. Stam. 5. antherifera. Cal. 5 phyllus. Fructus declinati.*

686. *GERANIUM cicutarium* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis, caule ramoso. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 317.

ε. *Geranium pimpinellaefolio. Dill. giss. 69.*
 Ad vias in cultis, ruderatis, arvis, ubique fere copiose. Vere in autumnum usque.

** *Batrachia Staminibus 10. antheriferis.*

687. *GERANIUM palustre* pedunculis bifloris longissimis declinatis, foliis quinquelobis incisis, petalis integris. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 323.

Geranium caule diffuso, foliis rugosis semiquinquelobis, lobulis trifidis, floribus sparsis, petalis integerrimis. *Hall. helv. 922.*

Ante portam Halensem im Aufstall, in der Jungfernheide, ad Tegel & alibi locis paludosis inque fossis frequens. Junio. Julio.

688. GERANIUM *pratense* pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris. Lin. syst. ed. R. 3. p. 324.

Geranium caule erecto, foliis rugosis, hirsutis, multilobis, lobis trifidis, lobis semipinnatis floribus umbellatis, Hall. helv. n. 931.

s. albo flore.

Ad Tegel & alibi rarius, s. rarissime. Junio. Julio.

*** *Staminibus 10. antheriferis. Pedunculis bifloris, annua.*

689. GERANIUM *robertianum* pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 325.

Geranium foliis duplicato-pinnatis, pinnis ultimis confluentibus, calycibus striatis hirsutis. Hall. helv. n. 943.

In nemorosis umbrosis passim. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel &c. Majo. Junio.

Offic. (Geranii robertiani Herba.)

690. GERANIUM *molle* pedunculis bifloris, foliis que floralibus alternis, petalis bifidis, calycibus muticis, caule erectiusculo. Lin. syst. ed. R. 3. p. 326.

MONADELPHIA POLYANDRIA. 225

In ruderatis, sepibus, ad vias & pagos frequens. Aestate.

691. GERANIUM *rotundifolium* pedunculis bifloris, petalis subintegris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis.

Lin. syst. ed. R. 3. p. 328.

In cultis ad pagos, vias, sepes & alibi copiose. Aestate.

Offic. (*Pedis columbae Herba.*)

692. GERANIUM *pusillum* pedunculis bifloris, petalis emarginatis, caule depresso, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 328.*

In ruderatis, sepibus ad Spandau copiose. Aestate.

***** *Staminibus 10. antheriferis. Pedunculis unifloris.*

693. GERANIUM *sanguineum* pedunculis unifloris foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 329.*

In den Papenbergen frequens. Junio. Julio.

POLYANDRIA.

ALTHAEA. *Lin. gen. 904.*

Calyx duplex exterior 9 fidus. Arilli plurimi monospermi.

694. ALTHAEA *officinalis* foliis simplicibus tomentosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 340.*

In pratis post Staaken frequens. Julio. Augusto.

Offic. Althaeae Herba, Radix. (*Semina.*)

MALVA. *Lin. gen.* 906.

Calyx duplex exterior triphyllus. *Arilli* plurimi monospermi.

695. MALVA *rotundifolia* caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis. *Lin. syst. ed.* R. 3. p. 346.

In ruderatis, viis, ad sepes & pagos copiosissime. Aestate.

696. MALVA *sylvestris* caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis, petiolisque pilosis. *Lin. syst. ed.* R. 3. p. 347.

Locis nemorosis *im Thiergarten* & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. Malvae Radix, Flores. (*Herba.*)

697. MALVA *mauritiana* caule erecto herbaceo, foliis quinquelobatis obtusis, pedunculis, petiolisque glabriusculis. *Lin. syst. ed.* R. 3. p. 347.

In ruderatis passim. Inter olera inque rusticorum hortis frequens. Pereginae forte originis. Junio. Julio.

698. MALVA *Alcea* caule erecto, foliis multo partitis scabriusculis. *Lin. syst. ed.* R. 3. p. 348.

Ad Doebritz passim. Aestate.

Offic. Alceae Radix.

PINUS. Lin. gen. 1175.

♂ - ♀. ♂. Calyx 4 phyllus. Cor. O.

♀. Calyx strobilus: squama biflora. Cor. O.

Pistillum 1. Nux ala membranacea.

* Foliis pluribus ex eodem basi vaginali.

699. PINUS sylvestris foliis geminis: primordiis solitariis glabris. Lin. syst. ed. R. 3. p. 172.

Circum Berolinum copiosissime, magnas constitutens sylvas. Majo.

Offic. Pini Turiones & Resina.

700. PINUS Larix foliis fasciculatis obtusis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 175.

Im Thiergarten passim, in der Jungfernheide frequens plantata. Majo.

Offic. Therébinthina veneta.

** Foliis solitariis & basi distinctis.

701. PINUS Picea foliis solitariis emarginatis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 175.

Pinus Abies. Du Roi harbk. 2. p. 95.

Im Thiergarten passim. Majo.

Offic. Resina.

702. PINUS Abies foliis solitariis subulatis mucronatis laevibus bifariam versis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 177.

Pinus picea. Du Roi harbk. 2. p. 110.

Im Thiergarten frequens. Majo.

Offic. Resina.

TAXUS. *Lin. gen. 1241.*

♂... ♀. *Calyx* 4 phyllus gemmae. *Cor.* O. *An-*
therae peltatae octofidae. *Styl.* O. *Semen*
unicum in calyce baccato, apice dehiscente.

703. *TAXUS baccata* foliis approximatis. *Lin. syst.*
ed. R. 3. p. 279.

Im Thiergarten passim. Majo.

CLASSIS XVII.

D I A D E L P H I A
H E X A N D R I A.

FUMARIA. Lin. gen. 920.

Cal. diphyllus. *Cor.* ringens. *Filament.* 2. membranacea, singula: *Antheris* 3.

704. FUMARIA *Halleri* radice bulbosa, caule simplici, bracteis cuneiformibus apice incisis.

Fumaria radice bulbosa, solida, caule simplici multifloro, bracteis digitatis. Hall. helv. n. 349.

Fumaria bulbosa caule simplici, bracteis longitudo florum 3. Lin. syst. ed. R. 3. p. 378.

β. radice cava.

Prope Schoenhausen, Friedrichsfelde & alibi pas- sim. Aprili. Majo.

Offic. Aristolochiae rotundae fabaceae Radix.

Distinctissima bracteis incisis a *Fumaria bulbosa* & Linnei. Radix aetate cava evadit.

705. FUMARIA *officinalis* pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. Lin. syst. ed. R. 3. p. 380.

Fumaria foliis multifidis subrotunde lanceolatis, fructibus monospermis. Hall. helv. 346.

In agris, cultis, ad vias copiose. Aestate.
Offic. Fumariae Herba.

OCTANDRIA.

POLYGALA. Lin. gen. 921.

Calyx 5 phyllus: foliolis duobus alaeformibus coloratis. *Legumen* obcordatum biloculare.

706. POLYGALA vulgaris floribus cristatis racemosis, caulis herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linearie lanceolatis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 383.

α. flore rubro.

γ. flore variegato.

δ. foliis inferioribus obtusis.

In nemoribus frequens. v. g. im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald &c. Majo. Junio seq.

Offic. Polygalae vulgaris Radix. (Folia.)

Varietas δ. cum *Polygala amara* in nonnullis convenit, tamen valde diversa.

DECANDRIA.

a. Calyce bilabiato.

SPARTIUM. Lin. gen. 929.

Calyx bilabiatus. deorsum productus. *Stigma* longitudinale, supra villosum. *Filamenta* gemini adhaerentia.

707. SPARTIUM scoparium foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 402.

*Bei dem Quappenkruge copiose. Im Thiergarten,
prope Spandau & alibi frequens. Majo. Junio.
Offic. Genistae Flores. (Semina.)*

GENISTA. Lin. gen. 930.

*Calyx bilabiatus. Vexillum oblongum deorsum
reflexum. Pistill. deprimens carinam. Stigma
involutum.*

* *Inermes.*

708. GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris,
ramis striatis teretibus erectis. Lin. syst. ed.
R. 3. p. 406.

Prope Tegel, Spandau, im Thiergarten & alibi
copiose. Junio. Julio.

Offic. (*Genistae tinctoriae Herba.*)

709. GENISTA *pilosa* foliis lanceolatis obtusis,
caule tuberculato decumbente. Lin. syst. ed.
R. 3. p. 407.

*In der Hasenheide, Jungfernheide, Grunewald &
alibi frequens in ericetis. Majo. Junio.*

** *Spinosae.*

710. GENISTA *germanica* spinis compositis, ramis
floriferis inermibus, foliis lanceolatis. Lin.
syst. ed. R. 3. p. 408.

*In der Hasenheide, Papenbergen & alibi passim.
Junio. Julio.*

PHASEOLUS. Lin. gen. 940.

*Carina cum staminibus styloque spiraliter
torta.*

711. *PHASEOLUS vulgaris* caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pedicellatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 441.*

In hortis vulgaris cultus. Aestate.

712. *PHASEOLUS nanus* caule erecto laevi, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis compressis rugosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 444.*

In agris & hortis frequens colitur. Aestate.

CORONILLA. *Lin. gen. 956.*

Calyx bilabiatus: dentibus superioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* isthmis interceptum, rectum.

713. *CORONILLA varia* herbacea, leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 493.*

Im Thiergarten passim. Prope *Wedding*, *Reineckendorf* & alibi frequens. Junio. Julio.

b. *Calyce quinquepartito.*

ONONIS. *Lin. gen. 935.*

Calyx 5 partitus: laciniis linearibus. *Vexillum* striatum. *Filamenta* connata absque fissura. *Legumen* turgidum sessile.

714. *ONONIS arvensis* floribus racemosis geminis, foliis ternatis: superioribus solitariis, ramis inermibus. *Retz prod. fl. Scand. n. 781. Observ. bot. fasc. 1. p. 23. n. 78. & fascicul. 2. p. 21. n. 67.*

Ononis arvensis $\alpha.$ *mitis.* Lin. *syst. ed. R.* 3.

p. 424.

Prope Tegel & ad margines nemorum rarius.

Julio. Augusto.

Sequenti simillima; differt tam ramis semper
inermibus, caule herbaceo & majori.

715. *Ononis spinosa* floribus racemosis solitariis;
foliis ternatis solitariisque ramis spinosis.
Retzii prod. fl. Scand. p. 137. n. 782. *Observ.*
botan. fascicul. 1. p. 23. n. 78. & *fascicul.* 2.
p. 2. n. 6.

Ononis arvensis $\beta.$ *spinosa.* Lin. *syst. ed. R.* 3.

p. 424.

$\beta.$ Junior planta non spinosa. *Hall. helv.* 356.

$\gamma.$ flore albo. *Hall. helv.* n. 351.

In agris, arvis copiose $\gamma.$ rarius. e. g. *in der Hasenheide*, *Jungfernheide*, prope Tegel &c.
Aestate.

Offic. (Ononidis Herba.)

Junior planta spinis destituta, adulta vero donata.

Cum praecedenti specie seminavi, & haec spinas accepit, illa semper spinis destituta erat.

PISUM. Lin. gen. 944.

Cal. laciniae superiores 2 breviores. *Stylus* triangulus, supra carinatus. *Stigma* villosum.

716. *Pisum sativum* petiolis teretibus, stipulis inferne roduntatis crenatis, pedunculis multifloris. Lin. *syst. ed. R.* 3. p. 457.

In agris & hortis copiose cultum. Aestate.

717. *Pisum arvense* petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedunculis unifloris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 457.*

Rarius inter segetes. Aestate.

Flores nunquam albi.

LATHYRUS. *Lin. gen. 946.*

Calycis laciniae superiores 2. breviores. Stylus planus, supra villosus, superne latior.

718. *LATHYRUS pratensis* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis: foliolis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 467.*

Lathyrus scapis multifloris, foliis lanceolatis, capitulo simplicibus. *Hall. helv. n. 436.*

In pratis prope Charlottenburg, Tegel, in der Jungferuheide, ad Reineckendorf & alibi frequens. Junio.

719. *LATHYRUS sylvestris* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 467.*

Lathyrus caule alato, foliis geminis ensiformibus. *Hall. helv. n. 434.*

In der Hasenheide frequens. Junio. Julio.

720. *LATHYRUS palustris* pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 468.*

Lathyrus foliis senis, floribus racemosis. *Hall. helv. n. 431.*

In pratis propter *Hennigsdorf*, ad fossam *hinterm Gewehrplan* prope *Spandau &c.* trequens.

ERVUM. Lin. gen. 948.

Cal. 5 partitus longitudine fere corollae: laciniis subaequalibus.

721. *ERVUM Lens* pedunculis subbifloris, seminibus compressis convexis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 476.

Frequens cultum in agris. Aestate.

722. *ERVUM tetraspermum* pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 476.

Inter segetes in agris passim. Aestate.

723. *ERVUM hirsutum* pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 477.

Inter segetes in agris copiosissime, inque hortis & pratis passim. Aestate.

HEDYSARUM. Lin. gen. 961.

Cor. carina transverse obtusa. Legumen articulis monospermis.

724. *HEDYSARUM Onobrychis* foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calycem aequantibus, caule elongato. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 514.

In agris passim colitur. Junio. Julio.

LOTUS. Lin. gen. 969.

Cal. tubulosus semiquinquefidus. *Alae* sursum longitudinaliter connientes. *Filamenta* cuneiformia apice truncata. *Antherae* minimae.

725. *Lotus corniculatus* capitulis depresso, caulis decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 568.

8. *Lotus pentaphyllos* flore majore luteo, splendente. *Bauh. pin.* 332.

In agris, versuris, pratis, pascuis, nemoribus copiose. 8. locis humidis. Aestate.

MEDICAGO. Lin. gen. 971.

Pistillum incurvatum e carina elastice exsiliens, eandemque deflectens. *Legumen* compressum cochleatum.

* *Floribus spicatis.* *Caule* saepius erecto, absque stipulis.

726. *MEDICAGO sativa* pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 574.

In der Jungfernheide unico loco & in coemeterio ad Tegel frequens. Culta passim. Julio. Augusto.

727. *MEDICAGO falcata* pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 574.

Prope Friedrichsfelde, Reineckendorf, Tegel & alibi frequens. Aestate.

728. MEDICAGO *lupulina* spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulis procumbentibus. Lin. syst. ed. R. 3. p. 575.

In agris, pascuis, pratis siccis, arvis, nemoribus apricis copiose. Aestate.

** *Polymorphae.* Pedunculis paucifloris, caule diffuso: stipulis munito.

729. MEDICAGO *minima* caule diffuso, stipulis integris, leguminibus ternatis cochleatis: aculeis uncinatis.

Medicago polymorpha leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. Lin. syst. ed. R. 3. p. 575. variet. λ. *minima* leguminibus cochleatis subternatis, spinulis uncinatis, stipulis integris. Lin. syst. ed. R. 3. p. 578.

In agris versus *Hasenheide* rarius. Majo. Junio.

Varietates Medicaginis polymorphae a Perill. Linneo indicatae, verae species sunt, licet in nonnullis convenient. Cultura non unam in alteram mutat, semper observavi.

c. *Calyce quinquedentato.*

ANTHYLLIS. Lin. gen. 936.

Cal. ventricosus 5 dentatus. Legumen subrotundum calyce testum.

730. ANTHYLLIS *Vulneraria* herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato. Lin. syst. ed. R. 3. p. 403.

In der *Hasenheide* passim. In pratis vor Falckenbach copiose &c. Junio.

OROBUS. Lin. gen. 945.

Cal. cylindricus, basi obtusus 5 dentatus: laci-
niis superioribus profundioribus, brevioribus.
Stylus linearis.

731. OROBUS *vernus* foliis pinnatis ovatis, stipulis
semisagittatis integerrimis, caule, simplici.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 459.

In den Papenbergen rarissime. Majo.

732. OROBUS *tuberosus* foliis pinnatis lanceolatis,
stipulis semisagittatis integerrimis, caule sim-
plici. Lin. syst. ed. R. 3. p. 460.

In der Hasenheide, Jungfernheide, Thiergarten
& alibi frequens. Majo. Junio.

733. OROBUS *niger* caule ramoso, foliis sexjugis,
ovato-oblongis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 460.

In den Papenbergen frequens. Junio. Julio.

VICIA. Lin. gen. 947.

Stigma obtusum sub apice transverse barbatum.

* *Pedunculis elongatis.*

734. VICIA *cassubica* pedunculis subsexfloris, fo-
liis denis ovatis, acutis, stipulis integris. Lin.
syst. ed. R. 3. p. 470.

In der Hasenheide frequens. Junio.

735. VICIA *Cracca* pedunculis multifloris, flori-
bus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescenti-
bus, stipulis integris. Lin. syst. ed. R. 3. p. 471.

Vicia foliis linearibus sericeis, racemis multifloris
reflexis, stipulis integerrimis. Hall. helv. n. 424.

In pratis & pascuis copiosissime. Junio. Julio.

736. *VICIA Gerardi* pedunculis multifloris, foliolis linearibus obtusis trinerviis, stipulis integris, caule erecto.

Vicia Gerardi pedunculis multifloris, foliolis oblongis, subpubescentibus, stipulis integris, caule erecto. *Murr Syst. ed. 14.* p. 564? *Jacq. aust. vol. 3. t. 229?*

In der Hasenheide rarius. Junio.

Flores semper violacei nec caerulei. Foliola linearia obtusa trinervia mucrone minutissimo, subpubescentia. Stipulae superiores lineares, inferiores subhastatae.

Adhuc incertus sum, an vera sit *Vicia Gerardi*; quum splendidissimum opus *Perill. Jacquinii* non possideo.

* * *Floribus axillaribus, subsessilibus.*

737. *VICIA sativa* leguminibus sessilibus subbinitatis erectis, foliis retusis, stipulis notatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 472.

Inter segetes passim. Saepius culta. Junio. Julio.

738. *VICIA monantha* pedunculis unifloris aristatis, foliolis lanceolatis obtusis, stipulis bifidis. *Retzii observ. botan. fascicul. 3.* p. 39. n. 81.

In agris passim. e. g. prope den *Fasanengarten*, *Tegel &c.* Majo. Junio.

739. *VICIA lathyroides* leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliolis senis: inferioribus obcordatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 473.

Inter Pancko & Schoenhausen in der Allee, im Thiergarten bei den Puppen, prope Spandau & alibi passim. Majo.

Cirrhis instruitur & destituitur, Retzii Observ. botan. fasc. I. p. 24. n. 83. Semper absque cirrhis vidi.

740. *VICIA sepium* leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrescentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 474.*

In pratis ad pagos & sepes locis humentibus passim. e. g. prope Buchholtz, Reineckendorf &c. Majo. Junio.

741. *VICIA Faba* caule eretto, petiolis absque cirrhis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 475.*

In hortis frequens colitur. Aestate.

ORNITHOPUS. *Lin. gen. 957.*

Legumen articulatum, teres, arcuatum.

742. *ORNITHOPUS perpusillus* foliis pinnatis, leguminibus incurvatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 494.*

Ornithopodium caule prostrato, foliis pinnatis, siliquis umbellatis, articulatis. *Hall. helv. n. 393.*

Ornithopodium minus. *Bauh. pin. 350.*

$\beta.$ *Ornithopodium majus.* *Bauh. pin. 350.*

$\gamma.$ *Ornithopodium* radice tuberculis nodosa, *Bauh. pin. 350.*

In agris bei der Hasenheide copiose. Ad Pancko, Blanckenfelde &c. frequens, $\beta.$ rarius. Majo. Junio.

ASTRAGALUS. Lin. gen. 965.

Legumen biloculare gibbum.

743. ASTRAGALUS *glycyphyllo*s caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. Lin. syst. ed. R. 3. p. 529.

In der Hasenheide passim. Junio. Julio.

744. ASTRAGALUS *arenarius* caulescens ramosus erectus tomentoso albus, foliolis complicatis, pedunculis subquadrifloris. Retz observ. botan. fascicul. 3. p. 41. n. 87. tab. 3.

Astragalus arenarius subcaulescens procumbens, floribus subracemosis erectis, foliolis tomentosis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 533.

In der Hasenheide rarius. Prope Wedding copiose. Junio. Julio.

TRIFOLIUM. Lin. gen. 968.

Flores subcapitati. Legumen vix calyce longius, non dehiscentia, deciduum.

* *Meliloti leguminibus nudis polyspermis.*

745. TRIFOLIUM *officinale* leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. Lin. syst. ed. R. 3. p. 547.

¶. *Melilotis officinarum germaniae, flore albo.* Tournef. inst. r. herb. 407.

In ruderatis, sepibus, coemeteriis, ad pagos & alibi passim. Aestate.

Offic. Meliloti citrinae & albae Herba florens.

*** *Lotoidea leguminibus tectis polyspermis.*

746. TRIFOLIUM hybridum capitulis umbellari-
bus, leguminibus tetraspermis, caule adscen-
dente. Lin. syst. ed. R. 3. p. 549.

Locis cultis, in agris, ad vias inque pratis passim.
e. g. ad Schoeneberg, Reineckendorf &c. Majo.
Junio.

747. TRIFOLIUM repens capitulis umbellaribus,
leguminibus tetraspermis, caule repente. Lin.
syst. ed. R. 3. p. 549.
β. foliis maculatis.

In agris, arvis, locis cultis copiosissime; per to-
tam aetatem.

Offic. (*Trifolii albi Flores.*)

**** *Lagopoda calycibus villosis.*

748. TRIFOLIUM pratense spicis globosis subvil-
losis, cinctis stipulis oppositis membranaceis,
corollis monopetalis. Lin. syst. ed. R. 3.
p. 552.

β. foliis albo maculatis.

γ. foliis viridibus.

In pratis, pascuis ubique copiosissime. Ae-
state.

749. TRIFOLIUM alpestre spicis subglobosis villo-
sis terminalibus, caule erecto, foliis lanceola-
tis ferrulatis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 553.

*Im Thiergarten rarius. In der Hasenheide & Pa-
penbergen frequens. Junio. Julio.*

750. **T R I F O L I U M arvense** spicis villosis ovalibus,
dentibus calycinis setaceis villosis aequalibus.

Lin. syst. ed. R. 3. p. 555.

In agris post messem copiose.

Offic. (Lagopi Flores.)

***** *Vesicaria calycibus inflatis ventricosis.*

751. **T R I F O L I U M fragiferum** capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulis repentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 559.*

Trifolium caule repente, spicis glabris, calycibus sericeis, ampullescentibus. Hall. helv. n. 370.

In pratis versus *Hasenheide*, *hinterm Thiergarten*, ante portam *Halensem im Aufstall* & alibi frequens. Julio. Augusto.

***** *Lupulina vexillis corollae inflexis.*

752. **T R I F O L I U M montanum** spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 560.*

Trifolium caulinulo paucifloro, foliis elliptico-lanceolatis, nervosis, subtus subhirsutis. Hall. helv. n. 372.

In der Hasenheide, Papenbergen, in via inter Seeburg & Dalgow alibique frequens. Junio. Julio.

753. **T R I F O L I U M aureum** spicis ovalibus imbricatis vexillis deflexis persistentibus caly-

cibus nudis, stipulis lanceolatis nudis, foliolo impari sessili, caule erecto. *Pollich. pal.* tom. 2. p. 344. n. 708.

In der Spandauerheide in plantariis passim. Junio. Julio.

754. *TRIFOLIUM agrarium* spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus subpubescentibus, stipulis cordatis ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffuso. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 560.

Trifolium agrarium spicis ovalibus imbricatis; vexillis deflexis persistentibus, calycibus subpubescentibus, stipulis cordatis ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffuso. *Pollich. pal.* tom. 2. p. 342. n. 707.

In agris, arvis, cultis, pratis siccis, ad vias copiose. Aestate.

CLASSIS XVIII.

P O L Y A D E L P H I A
P O L Y A N D R I A.

H Y P E R I C U M . *Lin.* 981.

Cal. 5. partitus inferus. *Petala* 5. *Filamenta* multa in 5 phalanges basi connata *Capsula*.

* *Trigyna*, *calycibus*, *bracteisque glabris*.

755. H Y P E R I C U M quadrangulare floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 595.

In Thiergarten & prope Spandau passim. Julio.

756. H Y P E R I C U M perforatum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis pellucido-punctatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 595.

In nemoribus & pratis nemorosis, inque versuris agrorum copiosissime. Aestate.

Offic. Hyperici Flores, Herba. (*Semina*.)

757. H Y P E R I C U M humifusum floribus trigynis axillaribus solitariis, caulis ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 596.

Hypericum caule prostrato, foliis ovatis, calycibus ferratis punctatis. *Hall. helv.* n. 1039.

In Grunewald frequens. Julio. Augusto.

** *Trigyna*: *calycibus bracteisque ferrato-*
glandulosis.

758. *HYPERICUM montanum* floribus trigynis,
calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti
erecto, foliis ovatis glabris. *Lin. syst. ed. R.*
4. p. 597.

Hypericum foliis ovatis, ora punctata, calyci-
bus lanceolatis ferratis glanduligeris. *Hall.*
helv. n. 1042.

In nemorosis umbrosis ad *Tegel* frequens. Julio.
 Augusto.

759. *HYPERICUM dubium* floribus trigynis, caule
 subquadrato herbaceo, foliis ovatis, calyci-
bus obtusissimis. *Leers herborn.* p. 165.
n. 594.

Im *Brijelang & Papenbergen* frequens. Julio.
 Augusto.

CLASSIS XIX.

S Y N G E N E S I A
A E Q U A L I S.

a. *Semiflosculosi, corollis omnibus ligulatis.*

TRAGOPOGON. Lin. gen. 984.

Receptaculum nudum. Cal. simplex. Pappus stipitatus plumosus.

760. TRAGOPOGON pratensis calycibus corollae radium aequantibus, foliis integris strictis.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 611.

In pratis, pascuis, nemoribus apricis humidis frequens. Junio. Julio.

Offic. (Barbae Hirci Radix.)

761. TRAGOPOGON major calycibus corolla radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis, corollis ad apicem rotundatis. Murr. syst. 14. p. 710. Jacq. austr. v. I. t. 29.

Prope Spandau passim. Julio.

SCORZONERA. Lin. gen. 985.

Receptaculum nudum. Cal. imbricatus, squamis margine scariosis. Pappus stipitatus plumosus.

762. *Scorzonera humilis* caule subnudo unifloro, foliis lato-lanceolatis nervosis planis.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 615.

Scorzonera caule unifloro nudo, foliis lanceolatis. *Hall. helv. n. 10.*

In der Jungfernheide passim. *Majo. Junio.*

763. *Scorzonera purpurea* foliis linearis-subulatis integris canaliculato-triquetris pedunculis cylindricis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 616.*

In der Jungfernheide rarissime. *Junio. Julio.*

Sonchus. Lin. gen. 987.

Receptaculum nudum. Cal. imbricatus conicus.
Pappus pilosus sessilis.

764. *Sonchus palustris* pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi sagittatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 620.*

Loci uliginosis paludosis ad Spandau, Reineckendorf rarius. *Julio. Augusto.*

765. *Sonchus arvensis* pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis acute dentatis, amplexicaulibus basi obtusis.

Sonchus arvensis pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 621.*

In pratis, pascuis agris humentibus frequens.
Aestate.

766. *Sonchus oleraceus* foliis amplexicaulibus dentatis integris & semipinnatis calycibus laevis. *Hall. helv. n. 21.*

Sonchus oleraceus pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 621. *varietas α Β laevis.*

Sonchus laevis. *Jacob. Catalog. plant. Faverh.* 109.

β. *Sonchus laevis minor paucioribus laciniis.* *Jacob. Catalog. plant. Faverhamiens.* p. 109.

Ad sepes, in ruderatis cultis oleraceis copiosissime. Aestate.

Offic. (Sonchi laevis Herba.)

767. *Sonchus asper* foliis amplexicaulibus rigidis integris & semipinnatis, dentatis, calycibus laevibus. *Hall. helv. n. 22.*

Sonchus oleraceus γ δ asper. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 621.

Sonchus asper laciniatus. *Jacob. Cat. pl. Faverh.* 109.

β. *Sonchus asper non laciniatus.* *Jacob. Cat. pl. Faverh.* 109.

In ruderatis, ad sepes inque cultis passim. Aestate.

Cum Celeber. Hallero hanc speciem ab oleraceo separavi, quum diversissima & constans.

LACTUCA. *Lin. gen. 988.*

Receptaculum nudum. Cal. cylindricus imbricatus, squamis margine membranaceis. Semina laevia. Pappus stipitatus pilosus.

768. *LACTUCA sativa* foliis rotundatis caulinis cordatis, caule corymboso. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 625.

In hortis copiose colitur. Aestate.

Offic. (Semen Lactucae.)

769. *LACTUCA Scariola* foliis verticalibus carina aculeatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 625.*

Lactuca foliis semipinnatis, nervo spinoso. *Hall. helv. n. 14.*

Im Thiergarten, ante portam Halensem, in ruderatis rarius. In urbe auf der langen Brücke frequens. Aestate.

Offic. (Semen Scariolae.)

CHONDRILLA. *Lin. gen. 989.*

Receptaculum nudum. Calyx cylindricus strictus, calyculatus. Anthodii flores duplii serie. Semina muricata. Pappus stipitatus pilosus.

770. *CHONDRILLA juncea* foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 627.*

Chondrilla juncea foliis radicalibus erofo-pinnatifidis lyratis, caule basi aculeato, floribus spicatis. *Gouan illustr. 54.*

Ante portam Oranienburgicam copiose & alibi passim. Julio. Augusto.

PRENANTHES. *Lin. gen. 990.*

Receptaculum nudum. Calyx calyculatus. Anthodii flores simplici serie. Pappus pilosus subsessilis.

771. *PRENANTHES muralis* floribus paniculatis, anthodiis quinquefloris; foliis runcinatis: lobis acutis ferratis, terminali triangulari-trilobo.

Prenanthes muralis flosculis quinis, foliis runcinatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 630.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Papenbergen & alibi passim. Julio. Augusto.

Pappus stipitatus.

Offic. (Chondrillae Herba.)

TARAXACUM.

Receptaculum convexum nudum. Calyx oblongus, calyculatus dupli foliorum serie. Pappus stipitatus plumosus.

772. *TARAXACUM officinale* squamis calycinis exterioribus reflexis, foliis runcinatis acute dentatis glabris.

Taraxacum officinale. *Wiggers primit. n. 595.*

Hedypnois Taraxacum calyces squamae exteriiores & imae reflexae. *Scop. carn. ed. 2.* n. 957.

Leontodon Taraxacum calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis laevibus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 631.

♂. Dens leonis angustiore folio. *Bauh. pin.* 126.

♀. folio latiore & parum inciso.

In pratis, pascuis, pomariis ubique copiosissime. Aestate praecipue Junio.

Offic. Radix & Herba recens Taraxaci.

LEONTODON. *Lin. gen. 991.*

Receptaculum planiusculum nudum. Calyx imbricatus. Pappus plumosus sessilis.

773. *LEONTODON autumnale* caule ramoso, pedunculis superfluis foliis lanceolatis dentato-

tis integerrimis glabris. *Lin. syst. ed. R. 3.*
p. 633.

Picris caule nudo brachiato, foliis glabris semi-pinnatis. Hall. helv. n. 28.

In der Hasenheide, Thiergarten, ad Spandau & alibi passim. Augusto.

774. *LEONTODON hispidum* calyce toto erecto,
foliis dentatis integerrimis hispidis: pilis fur-
catis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 634.

Iu der Hasenheide versus den Rollbergen passim.
Julio.

775. *LEONTODON hirtum* calyce toto recto, fo-
liis dentatis hirtis: setis simplicissimis. *Lin.*
syst. ed. R. 3. p. 634.

Crepis foliis lanceolatis dentato sinuatis hispidis,
setis subulatis, scapo unifloro. *Sp. pl. I.* p. 799.
Cum praecedenti in der Hasenheide. Julio. Au-
gusto.

HIERACIUM. *Lin. gen. 992.*

Receptaculum nudum. Cal. imbricatus ovatus.

Pappus pilosus sessilis.

* *Scapo nudo unifloro.*

776. *HIERACIUM Pilosella* foliis integerrimis ova-
tis subtis tomentosis, stolonibus repentibus,
scapo unifloro. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 638.

*In pascuis aridis arenosis, collibus, nemoribusque
apricis copiosissime. Per totam aestatem.*

Offic. Pilosellae s. Auriculae muris Herba &

Flores.

** *Scapo nudo multifloro.*

777. *HIERACIUM dubium* foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 638.

Hieracium caule nudo paucifloro, stolonibus reptantibus, foliis longe pilosis lanceolatis.
Hall. helv. n. 53.

In pratis humidis *vor der Hasenheide & prope Spandau* passim. Junio. Julio.

778. *HIERACIUM cymosum* foliis lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, floribus subumbellatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 639.

Hieracium caule subnudo, foliis hirsutis, lanceolatis, floribus umbellatis, petiolis ramosis.

Hall. helv. n. 51.

Im Briselang in plantariis copiose. Junio. Julio.

*** *Caule folioso.*

779. *HIERACIUM sylvaticum* caule ramoso folioso, foliis radicalibus ovatis petiolatis, caulinis sessilibus, pedunculis multifloris. *Gouan illustr. p. 56.* *Retzii observ. botan. fascicul. I. p. 27. n. 90.*

Hieracium murorum caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis caulino minori. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 643. var. 2.

Im Thiergarten & Jungfernheide passim. Julio.
Augusto.

Offic. (Pulmonariae gallicae Herba.)

Varietatem α . *Hieracii mirorum Lin.*, hic non-dum observavi, diversissima est & *Celebr. Gouanius* istam recte separavit.

780. *HIERACIUM paludosum* caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 643.

Hieracium foliis glabris dentatis, imis petiolatis, superioribus amplexicaulibus, calycibus hirsutis. *Hall. helv. n. 45.*

In Elsbruch versus *Falkenhagen* passim. Junio.

781. *HIERACIUM sabaudum* caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 647.

Hieracium foliis hirsutis, dentatis, inferioribus ellipticis, superioribus ovato-lanceolatis.

Hall. helv. n. 35.

In den Papenbergen passim. Julio. Augusto.

782. *HIERACIUM umbellatum* foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 647.

α , foliis pene ovatis, vix dentatis, caule humili, pene unifloro. *I. c. p. 648.*

γ . angustissimis, quasi lineariae foliis. *Ibid.*

Ante portam Halensem, prope *Tegel*, *Spandau*, *Friedrichsfelde* & alibi frequens. α , rarius, β .

& γ . vulgares. Julio. Augusto.

CREPIS. *Lin. gen. 993.*

Receptaculum nudum. *Calyx* calyculatus, squamis deciduis. *Pappus* pilosus.

783. *CREPIS tectorum* foliis lanceolato runcinatis sessilibus laevibus, inferioribus dentatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 652.

In nemoribus, pratis, pascois ubique fere copiosissime. Julio. Augusto.

Planta polymorpha.

784. *CREPIS Dioscoridis* foliis radicalibus runcinatis, caulinis hastatis, calycibus subtomentosis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 654.

Ante portam Halensem im Aufstall passim. Julio. Augusto.

Calyses externe pilis minutissimis albis obsiti. Pappus sessilis.

HYOSERIS. *Lin. gen. 995.*

Receptaculum nudum. Cal. subaequalis. Pappus pilosus calyculatusque, (vel nullus.)

785. *HYOSERIS minima* caule diviso nudo, pendunculis incrassatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 658.

Lapsana foliis ovatis dentatis, caulis nudis sub flore tumentibus. *Hall. helv. n. 4.*

In agris arenosis inter segetes frequens e. g. prope Friedrichsfelde, Charlottenburg &c. Julio. Augusto.

Pappus nullus.

Lapsanae ad sociavit *Celeber. Haller* & idem fecisset, nisi calyx diversissimus esset.

LAPSANA. *Lin. gen. 998.*

Receptaculum nudum. Cal. calyculatus, squamis singulis interioribus canaliculatis. Pappus nullus.

786. *LAPSANA communis* calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 663.*

Lapsana caule brachiato, foliis ovatis, longe petiolatis, petiolis pinnatis. *Hall. helv. n. 6.*

In nemoribus, cultis, hortisque copiose. Aestate.

CICHORIUM. *Lin. gen. 1000.*

Receptaculum subpaleaceum. *Cal. calyculatus. Semina corona 5 dentata, obsolete pilosa.*

787. *CICHORIUM Intybus* floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 665.*

Ad agrorum margines, sepes, inque ruderatis passim. In hortis frequens colitur. Julio, Augusto.

Offic. *Cichorii sylvestris & hortensis Radix.*

788. *CICHORIUM Endivia* floribus solitariis pendunculatis, foliis integris crenatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 665.*

β. *Endivia crispa. Bauh. pin. 125.*

Cultum in hortis frequens. Aestate.

Offic. (*Endiviae Herba.*)

Varietas *β.* ad acetaria pertinet.

HYPochaeris. *Lin. gen. 997.*

Receptaculum paleaceum. *Cal. subimbricatus.*

Pappus stipitatus plumosus.

789. *HYPochaeris maculata* caule subnudo: ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 661.*

Hypochaeris caule unifloro, foliis dentatis hirsutis. *Hall. helv. 2. n. 2. t. 1.*

Achyrophorus maculatus. *Scop. carn. 2. p. 116.*
n. 986.

β. foliis immaculatis.

Ad Doebritz, in den Papenbergen, versus Coepnick
in nemorosis umbrosis passim. Junio. Julio.
Offic. (Costae Herba.)

790. *HYPOCHEAERIS glabra*, glabra, calycibus imbricatis, caule ramoso nudo, foliis dentato-sinuatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 662.*

Hypochaeris foliis glabris, semipinnatis. *Hall. helv. n. 3.*

Ante portam Halensem & alibi passim. Julio.
Augusto.

791. *HYPOCHEAERIS radicata* foliis runcinatis obtusis scabris, caule ramoso nudo laevi, pedunculis squamosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 662.*

Hypochaeris foliis semipinnatis hirsutis, caule nudo brachiato. *Hall. helv. n. 3.*

In pascuis, versuris, nemoribusque apricis frequens. e. g., *im Thiergarten, Hasenheide &c.*
Aestate.

b. Capitati.

ONOPORDON. *Lin. gen. 1006.*

Receptaculum nudum favosum. *Cal. imbricatus*
subrotundus ventricosus; *squamis mucronatis.* *Pappus sessilis pilosus.*

792. **ONOPORDON** *Acanthium calycibus squarro-*
sis, squamis patentibus, foliis ovato-oblongis
sinuatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 690.*

In ruderatis, ad sepes, pagos, inque coemeteriis
passim. Julio. Augusto.

Offic. (Acanthii vulgaris Herba & Semina.)

CARDUUS. *Lin. gen. 1004.*

Receptaculum pilosum. Cal. ovatus imbricatus;
squamis spinosis. Pappus sessilis pilosus.

793. **CARDUUS nutans** foliis semidecurrentibus
 spinosis, floribus cernuis : squamis calycinis
 superne patentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 675.*

Carduus foliis semipinnatis, pinnis angulosis,
spinosis, floribus solitariis nutantibus. Hall.
helv. n. 167.

Ad vias, pagos, in versuris agrorum, arvis,
pascuisque siccis copiose. Julio. Augusto.

794. **CARDUUS acanthoides** foliis decurrentibus
 sinuatis margine spinosis, calycibus peduncu-
 latis solitariis erectis villosis. *Lin. syst. ed. R.*
3. p. 675.

Carduus foliis ovatis & semipinnatis, subtus to-
mentosis spinosis, calycibus molliter spinosis.
Hall. helv. n. 165.

In agris, arvis, coemeteriis ad Tempelhof, Schoen-
hausen & alibi infrequens. Julio. Augusto.

795. **CARDUUS crispus** foliis decurrentibus sinua-
 tis margine spinosis, floribus aggregatis ter-

minalibus, squamis calycinis inermibus subaristatis patulis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 676.*

In agris locisque cultis rarius. Julio. Augusto.

796. **CARDUUS marianus** foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 682.*

In der Jungfernheide passim. Julio. Augusto.

Offic. Cardui mariae Semina.

CNICUS. *Lin. gen. 1005.*

Receptaculum pilosum. Cal. ovatus imbricatus squamis spinosis. *Pappus sessilis plumosus.*

797. **CNICUS oleraceus** calyce bracteis cincto: squamis ramoso-spinosis, bracteis concavis integris subcoloratis; foliis glabris amplexicaulibus pinnatifidis.

Cnicus oleraceus foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis concavis integris subcoloratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 687.*

Ad sepes prope *Pancko*, inque nemorofis humidis versus *Falckenhagen* passim. Julio. Augusto.

798. **CNICUS lanceolatus** foliis decurrentibus pinnatifidis, pinnis bilobis, spinosis, calycibus nudis, oblongis, spinosis, villosis.

Carduus lanceolatus foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciiniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis, villosis, caule piloso. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 674.*

In ruderatis, pascuis siccis, ad vias, sepes & pagos vulgaris. Julio. Augusto.

799. *Cnicus palustris* foliis decurrentibus pinnatifidis margine spinosis, floribus rectis fasciculatis, calycibus inermibus.

Carduus palustris foliis decurrentibus dentatis, margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 677.

β. flore albo.

In pratis, pascuis & agris humentibus frequens. Julio. Augusto.

Affinis nimium *Serratulae arvensi*, quae certo hujus generis foret; nisi calyx cylindricus, optimus *Serratulae* character adesset.

800. *Cnicus acaulis* acaulis foliis pinnatifidis: pinnis incisis, margine spinosis; calyce conico glabro.

Carduus acaulis acaulis, calyce glabro. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 686.*

α. caule biunciali.

In pratis humidis ad *Schoeneberg* frequens, alibi. que. Julio. Augusto.

Calyx conicus: squamis muticis. In varietate β. caulis tantum biuncialis vix triuncialis glaber.

801. *Cnicus dubius* caule villofissimo, folioso, pedunculis unifloris, foliis petiolatis pinnatifidis: pinnis trilobis margine spinosis: calyce cylindraceo glabro.

In der Jungfernheide in via versus *Tegel* rarissime. Julio. Augusto.

Caulis subteres, striatus, pilis albidis dense testus, ramosus, pedalis. Folia petiolata pinnatifida: pinnae trilobae integrae, margine spinis albis rigidis munitae, costa uti caulis villosa. Pedunculi uniflori. Calyx cylindraceus: squamae oblongae acutae, superiores muticae, inferiores spina alba apice armatae. Corollae purpureae. Semina compressa. Pappus plumosus apice pilosus. TAB. VI. fig. 11.

Cirsium Halleri aliorumque auctorum a *Cnicus Linnei* nullo modo differt; bracteae nimurum calycem obvallantes, quae essentialem *Cnici* characterem constituunt, non omnibus a *P. illustris Linneo* indicatis speciebus, propriae sunt. *Cnicum & Cirsium* itaque uno sub genere complector, & pappo plomo a *Carduis* distinguo, quum pappus in *Syngenesia* praestansissimus.

SERRATULA. *Lin. gen. 1003.*

Receptaculum setosum. Calyx subcylindricus muticus. Pappus sessilis.

802. SERRATULA *tinctoria* foliis lyrato-pinnatifidis; pinna terminali maxima, flosculis conformibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 668.*

α. Serratula foliis omnibus incisis. *Hall. helv. 163.*

β. Serratula foliis inferioribus integris, superioribus incisis. *Hall. helv. 163.*

v. *Serratula foliis omnibus integris.* *Hall. helv.*

163.

In nemoribus, pratisque prope *Tegel*, *Spandau*
& alibi frequens. Julio. Augusto.

Offic. *Serratulae Herba.*

803. *SERRATULA arvensis* foliis dentatis spinosif.

Lin. syst. ed. R. 3. p. 673.

Carduus caule angulofo, ramofo, foliis semipinnatis, pinnis angulosif, spinosis, calycibus inermibus, cylindricis. *Hall. helv. n. 171.*

In pratis, pascuis, locisque cultis copiose. Julio.
Augusto.

Pappus plumosus.

ARCTIUM. *Lin. gen. 1002.*

Receptaculum paleaceum. Cal. globosus: squamis apice inflexo-hamatis. Pappus simplex minutus.

804. *ARCTIUM Lappa* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 667.*

a. *Lappa major montana, capitulis tomentosif.*
Bauh. pin. 198.

In ruderatis, sepibus & coemeteriis abunde. Ju-
lio. Augusto.

Offic. *Bardanae Radix.*

CARLINA. *Lin. gen. 1008.*

*Receptaculum paleaceum. Cal. radiatus: squamis interioribus longissimis coloratis nitidis, Pap-
pus plumosus.*

805. CARLINA vulgaris caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radio albis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 694.

In sylvis arenosis sterilibus vulgaris. e. g. *im Grunewald, Jungfernheide, Hasenheide,* prope *Spandau & alibi.* Julio. Augusto.

Offic. (Heracanthae Radix.)

c *Discoidei.*

BIDENS. *Lin. gen. 1012.*

Receptaculum paleaceum. Calyx erectus, polyphyllus, basi radiis patentibus cinctus. Cor. flosculo uno alterove radiante instruitur. Pap. pus aristis rectis 2 vel 3 scabris.

806. BIDENS tripartita foliis trifidis petiolatis: laciniis lanceolatis, dentatis; radiis calycinis corollis majoribus.

Bidens tripartita foliis trifidis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis. Lin. syst. ed. R. 3. p. 703.

In paludibus, pratis, ad fossas copiose. Julio. Augosto.

Radius corollae nullus. Folia recentia trita, odorem Anethi vel Foeniculi spargunt.

807. BIDENS minima foliis lanceolatis sessilibus, floribus seminibusque erectis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 703.

Im Grunewald, locis turfosis humidis frequens. Julio. Augosto.

Certo varietas sequentis, specimina possideo,
quae sensim in *Bidentem cernuam* degenerant.

808. *BIDENS cernua* foliis lanceolatis amplexicau-
libus, floribus cernuis seminibus erectis. *Lin.*
syst. ed. R. 3. p. 704.

*. *Bidens* foliis sessilibus, floribus nutantibus,
circumvallatis. *Hall. helv. n. 120.*

*. *Coreopsis Bidens* foliis lanceolatis serratis op-
positis, amplexicaulibus. *Lin. syst. ed. R. 3.*
p. 891.

In der Jungferuheide, Grunewald, prope *Span-*
dau & alibi locis paludosis ad fossas frequens.
Julio. Augusto.

Bidens & Coreopsis unum constituunt genus, quum
nonnullae *Bidentis* species in *Coreopsis* trans-
eunt. e. g. *B. cernua, pilosa &c.* Radius in
Syngenesia nunquam fidendus.

EUPATORIUM. *Lin. gen. 1015.*

Receptaculum nudum. Cal. imbricatus oblongus.
Stylus semibifidus. Pappus sessilis.

809. *EUPATORIUM cannabinum* foliis digitatis.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 717.

Eupatorium foliis ovato-lanceolatis, tripteris.
Hall. helv. n. 136.

Locus paludosis ad fossas frequens. e. g. im Thier-
garten, Jungfernheide, prope Spandau &c.
Julio. Augusto.

Pappus sessilis pilosus, nec plumosus, ut in con-
generibus.

Offic. Eupatorii cannabini Herba.

SUPERFLUA.

a. *Discoidei.*

TANACETUM. *Lin. gen. 1024.*

Receptaculum convexum nudum. *Cal.* imbricatus hemisphaericus. *Cor.* radii obsoletae trifidae, (interdum nullae, omnesque flosculi hermaproditi.) *Pappus* submarginatus.

810. **TANACETUM vulgare** foliis bipinnatis incisis ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 736.*

Ad agrorum versuras, ripasque fluviorum rarius. Julio. Augusto,

Offic. Tanaceti Flores & Herba.

GNAPHALIUM. *Lin. gen. 1026.*

Receptaculum nudum. *Cal.* imbricatus: squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis. *Pappus* sessilis pilosus.

* *Chrysocoma.*

811. **GNAPHALIUM arenarium** herbaceum foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, corymbo composito, caule simplicissimo. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 754.*

In agris, arvis, & collibus arenosis copiosissime. Junio. Julio.

Offic. Stoechadis citrini Herba florens.

812. **GNAPHALIUM luteo-album** herbaceum, foliis semiamplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis, utrinque pubescentibus, floribus conglomeratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 755.*

Filago foliis mollissimis, tomentosis, obtusis, umbellis convexis, electrinis. Hall. helv. 147.

Ante portam Halensem, in arvis versus Grunewald, in der Jungfernheide, prope Spandau & Reineckendorf frequens. Julio, Augusto.

*** *Argyrocomae.*

813. *GNAPHALIUM dioicum* farmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 759.*

♂. Floribus brevioribus & elegantioribus. *Hall. helv. 157. a.*

♀. Flosculis omnibus femineis ob pappum & tubas longiori. *Hall. helv. 157. b.*

In aridis apricis *in der Hasenheide, Grunewald, Jungfernheide, Spandauerheide & alibi copiose.* Majo. Junio.

Planta mascula, floribus rubris; feminea, albis.

Offic. (Pedis cati Flores.)

*** *Filaginoidea.*

814. *GNAPHALIUM sylvaticum* caule herbaceo simplicissimo, floribus sparsis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 761.*

Filago foliis linearibus, alis spiciferis. Hall. helv. n. 148.

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel, Spandau &c. in sylvis arenosis passim. Julio, Augusto.

§15. *Gnaphalium uliginosum* caule herbaceo ramoso diffuso, floribus confertis terminalibus.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 762.

Filago caule ramosissimo, diffuso, umbella sessili terminato. *Hall. helv. n. 151.*

- ꝑ. foliis tomentosis.
- ꝑ. foliis nudis.

Locis humidis uliginosis frequens. Julio. Augusto. Varietas ꝑ. foliis tomento destitutis semel vidi, rarissima est.

ARTEMISIA. *Lin. gen. 1025.*

Receptaculum subvillosum vel nudiusculum. *Cal.* imbricatus: squamis rotundatis conniventibus. *Cor.* radii nullae. *Pappus* nullus.

* *Receptaculo nudo.*

§16. *Artemisia campstris* foliis multifidis, linearibus, caulis procumbentibus virgatis.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 740.

- ꝑ. rubens.

In campis aridis arenosis, versuris agrorum, nemoribus apricis copiosissime. Augusto. Septembri.

§17. *Artemisia vulgaris* foliis pinnatifidis planis incisis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 744.

- ꝑ. *Artemisia rubra.* *Tabern. p. 7.*

In ruderatis, ad pages, sepes inque coemeteriis frequens. Julio, Augusto.

Offic. Artemisiae Herba.

* * *Receptaculo piloso.*

818. ARTEMISIA *Absinthium* foliis compositis multifidis, floribus subglobose pendulis; receptaculo villoso. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 743.

Ad pagos in ruderatis passim. e. g. *beim Gesundbrunnen, Spandau &c.* Julio. Augusto.

Offic. Absinthii vulgaris Herba.

b. Radiati.

SENECIO. *Lin. gen. 1033.*

Receptaculum nudum. Cal. cylindricus, calyculatus: squamis apice sphacelatis. Pappus pilosus.

* *Floribus flosculosis.*

819. SENEPIO *vulgaris* corollis nudis, foliis pinnatis sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 789.

In hortis locisque cultis vulgaris. Aestate.

Offic. (*Senecionis Herba.*)

* * *Floribus radiatis: radio revoluto.*

820. SENEPIO *viscosus* corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis: squamis calycinis laxis, longitudine perianthii. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 791.

Senecio foliis viscidis, pinnatis, pennis semipinnatis, angulosis, calycibus hirsutis. *Hall. helv. n. 60.*

In nemoribus, praecipue im Thiergarten & alibi frequens. Julio. Augusto.

821. **S E N E C I O** *sylvaticus* corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboso erecto. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 792.

Senecio foliis pinnatis, pinnis alternis majoribus, semipinnatis, angulosis, calycibus laevibus, radiis brevissimis revolutis. *Hall. helv. n. 59.*

Im Grünwald & Spandauerheide passim. Julio.
Augusto.

*** *Floribus radiatis; radio patente. Foliis pinnatifidis.*

822. **S E N E C I O** *erucifolius* corollis radiantibus, foliis pinnatifidis dentatis subhirtis, caule erecto.

Lin. syst. ed. R. 3. p. 794.

In nemorosis hinter Tegel rarius, versus Rüdersdorf frequens. Augusto.

Forte varietas sequentis.

A *Senecione tenuifolio* *Jacq.* diversissimus.

823. **S E N E C I O** *Jacobaea* corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniiis lacinulatis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 796.

β. *Jacobaea vulgaris* flore nudo. *Raj. angl. 2.*
p. 82.

In der Hasenheide frequens. Varietas β. rarissima. Julio. Augusto.

Offic. (Jacobaeae Herba florens.)

*** *Floribus radiatis: radio patente. Foliis indivisis.*

824. **S E N E C I O** *paludosus* corollis radiantibus, foliis ensiformibus acute ferratis, subtus subvillosis, caule stricto. *Lin. syst. ed. R. 3,* p. 797.

Senecio foliis linearibus ferratis, floribus umbellatis. *Hall. helv.* n. 66.

In den Papenbergen locis humidis frequens. Junio. Julio.

ERIGERON. *Lin. gen.* 1031.

Receptaculum nudum. *Cal.* oblongus cylindricus: squamis erectis. *Cor.* radii lineares, angustissimae. *Pappus* pilosus.

825. **ERIGERON canadense** caule floribusque paniculatis, hirtis, foliis lanceolatis, ciliatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 779.

Erigeron canadense racemis lateralibus; foliis imis lanceolatis, dentatis: superioribus linearibus ciliatis. *Scop. carn. ed. I.* p. 386. n. 3. *Ed. 2.* p. 159. n. 1060.

In agris, hortis, ruderatis, nemoribus, locis cultis copiosissime. Aestate.

826. **ERIGERON acre** caule alterne ramoso, petiolis unifloris, semi-flosculis pappum aequantibus. *Hall. helv.* n. 58.

Erigeron acre pedunculis alternis unifloris. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 781.

In ruderatis & sylvis apricis frequens. e. g. *In der Jungfernheide, ad Spandau, Tegel &c.* Julio. Augusto.

Radius caeruleus.

Offic. Conyzae Herba.

SOLIDAGO. Lin. gen. 1035.

Receptaculum nudum. Cal. squamae imbricatae, clausae. Cor. radii circiter 5—10 remotae. Pappus pilosus.

827. SOLIDAGO *Virgaurea* caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 817.

Solidago caule angulato, hirsuto, foliis ovato-lanceolatis dentatis, racemis multifloris spicatis. Hall. helv. n. 69.

In nemoribus frequens. e. g. im Thiergarten, Grunewald, Jungfernheide, versus Coepnick, Spandau &c. Augusto.

Chrysocoma a *Solidagine* solo radio differt. Interdum una alterave *Chrysocomae* species radio instruitur, & tunc *Solidaginis* species est. Numne bonum bina genera in unum conjungere?

Offic. Consolidae Sarracenicae s. Virgae aureae Herba florens.

CINERARIA. Lin. gen. 1036.

Receptaculum nudum. Cal. simplex, polyphyl-lus, aequalis. Pappus pilosus.

828. CINERARIA *palustris* floribus corymbosis, foliis radicalibus petiolatis lanceolatis ferrato-sinuatis, caulinis amplexicaulibus integris.

Cineraria palustris floribus corymbosis, foliis lato-lanceolatis dentato-sinuatis, caule villoso,
Lin. syst. ed. R. 3. p. 820.

In pratis *beim Gesundbrunnen*, ad *Doebritz* & in valle zwischen den *Morellenbergen* ad *Span-dau* passim. Junio. Julio seq.

INULA. *Lin. gen. 1037.*

Receptaculum nudum. *Anth.* basi in setas 2 desinentes? *Pappus pilosus.*

829. **INULA britannica** foliis amplexicaulibus lanceolatis distinctis ferratis subtus villosis, caule ramoso erecto villoso. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 824.

In pratis humidis *hinter Schoeneberg* & alibi passim. Julio. Augusto.

830. **INULA dysenterica** foliis amplexicaulibus cordato - oblongis subtomentosis, caule villoso paniculato, squamis calycinis setaceis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 825.

Aster foliis amplexicaulibus, undulatis, subtus tomentosis. *Hall. helv. n. 79.*

Ante portam Coepenickeanam, & *Halensem im Aufstall*, versus *Spandau* alibique in nemorosis humidis passim. Julio. Augusto.

Offic. (Arnica Svedensis.)

831. **INULA Pulicaria** foliis amplexicaulibus undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis: radio brevissimo. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 826.

Aster foliis amplexicaulibus undulatis, hirsutis, radiis brevissimiis. *Hall. helv. n. 80.*

Ante portam Strahlowianam, & prope *Spandau* frequens, ad *Tegel rarius*. Julio. Augusto.

832. INULA *salicina* foliis lanceolatis recurvis serato-scabris, ramis angulatis, floribus inferioribus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 828.

In pratis humidis, ad fossas *hinter Schoeneberg*, versus *Grunewald*, *in der Jungfernheide* & alibi passim. Julio. Augusto.

833. INULA *hirta* foliis sessilibus lanceolatis recurvis subserrato-scabris, caule teretiusculo subpilofo, floribus inferioribus altioribus. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 828.

In pratis, pascuis, ad ripas fluviorum, fossas copiose. Junio. Julio.

Interdum pro *Arnica* flores exsiccati venduntur.

BELLIS. *Lin. gen. 1042.*

Receptaculum nudum conicum. Cal. hemisphaericus: foliolis aequalibus. Sem. obovata. Pappus nullus.

834. BELLIS *perennis* scapo nudo. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 838.

In pascuis, pratis, pomariis, viis, versuris, & ubique fere copiosissime. Omni tempore, etiam sub nive.

Offic. Bellidis Flores & Herba.

CHRYSANTHEMUM. *Lin. gen. 1048.*

Receptaculum nudum convexum. Cal. haemisphaericus imbricatus: squamis margine scarosis, interioribus diaphanis membranaceis. Pappus nullus.

CLASSIS XIX,

* *Leucanthema.*

835. *CHRYSANTHEMUM Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: superne serratis, inferne dentatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 845.*

Matricaria foliis radicalibus petiolatis, ovatis, crenatis, caulinis amplexicaulibus dentatis.
Hall. helv. n. 98.

In pratis, nemoribusque frequens. e. g. *in der Hasenheide &c.* Junio. Julio.

Offic. (*Bellidis majoris Herba, Flores.*)

836. *CHRYSANTHEMUM inodorum* foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 847.*

In agris circum *Spandau* frequens. Julio. Augusto.

** *Chrysanthemum.*

837. *CHRYSANTHEMUM segetum* foliis amplexicaulibus, superne laciniatis; inferne dentato-serratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 849.*

In agris versus *Grunewald* rarissime. Julio. Augusto.

MATRICARIA. *Lin. gen. 1049.*

Receptaculum nudum. *Cal. hemisphaericus* imbricatus: squamis interioribus subaequalibus opacis. *Pappus nullus.*

838. *MATRICARIA suaveolens* receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 853.*

In ruderatis ad pagos, sepes frequens. Ae.
estate.

839. MATRICARIA *Chamomilla* receptaculis co-
nicis, radiis patentibus, seminibus nudis,
squamis calycinis margine aequalibus. *Lin.*
syst. ed. R. 3. p. 853.

In ruderatis ad sepes passim. Aestate.

Num varietas praecedentis?

Offic. *Chamomillae Herba. Flores.*

ANTHEMIS. *Lin. gen. 1052.*

Receptaculum paleaceum. Cal. hemisphaericus,
subaequalis. *Flores* radii plures, quam 5.
Pappus nullus.

840. ANTHEMIS *arvensis* receptaculis conicis, pa-
leis setaceis, seminibus coronato-marginatis.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 862.

Chamaemelum foliis glabris, duplicato-pinnatis,
nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine
laevi. *Hall. helv. n. 103.*

In agris, arvis frequens. Aestate.

841. ANTHEMIS *Cotula* receptaculis conicis: pa-
leis setaceis, seminibus nudis. *Lin. syst. ed. R.*
3. p. 863.

Chamaemelum foliis glabris, duplicato pinnatis,
nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine
exasperato. *Hall. helv. n. 104.*

In ruderatis prope *Spandau* abunde. Junio. Julio.

Offic. (*Chamomillae foetidae s. Cotulae Flores*
& *Herba.*)

ACHILLEA. Lin. gen. 1053.

Receptaculum paleaceum. Cal. ovatus imbricatus.

Flores radii 5-10. Pappus nullus.

842. ACHILLEA *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute-serratis. Lin. *syst. ed. R. 3.* p. 869.
Achillea foliis linearibus lanceolatis acutissime serratis. Hall. *helv. n. 117.*

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel & alibi passim. Junio. Julio..

Offic. (Ptarmicae Flores, Herba, Radix.)

843. ACHILLEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis ; laciniis linearibus dentatis, caulis superne sulcatis. Lin. *syst. ed. R. 3.* p. 871.

*β. Millefolium purpureum majus. Bauh. *pin. 140.**

In pascuis, pratis, versuris, viis, nemoribus, ubique fere copiosissime. Aestate.

Offic. Millefolii Herba & Flores.

FRUSTRANEA.

CENTAUREA. Lin. gen. 1066.

Receptaculum setosum. Cor. radii longiores, irregularis, infundibuliformes. Pappus pilosus.

* *Cyani calycibus squamis ferrato-ciliatis.*

844. CENTAUREA *Cyanus* calycibus ferratis : foliis linearibus integerrimis infimis dentatis. Lin. *syst. ed. R. 3.* p. 901.

β. flore albo & rubro.

Inter segetes copiosissime. Junio. Julio.

Offic. Flores Cyani.

845. **CENTAUREA paniculata** calycibus ciliatis : squamis planis, foliis bipinnatifidis, rameis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 901.*

In versuris, collibus, muris, agris, nemoribus apricis frequens. Junio. Julio seq.

846. **CENTAUREA Scabiosa** calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis : pinnis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 904.*

Cyanus foliis pinnatis, pinnis dentatis obtusis, squamis calycinis triangularibus. *Hall. helv. n. 186.*

In versuris agrorum inque arvis passim. e. g. versus *Schoeneberg, Charlottenburg &c.* Junio. Julio.

** *Rhaponticum: calycinis squamis aridis scariosis.*

847. **CENTAUREA Jacea** calycibus scariosis, laceris, foliis lanceolatis : radicalibus sinuato-dentatis : ramis angulatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 906.*

In nemorosis, pratis, pascuis, arvis copiose. Julio. Augusto.

Pappus setis brevissimis, paucis, mox deciduis constat. Leers herborn. p. 185. n. 674.

NECESSARIA.

TUSSILAGO. *Lin. gen. 1032.*

Receptaculum nudum. *Cal.* squamae aequales, discum aequantes, submembranaceae. *Pappus* pilosus.

848. **TUSSILAGO Farfara**. scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis, denticulatis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 786.

Prope *Spandau*, *Smaragendorf* & *Wilmersdorf* passim. Martio. Aprili.

Offic. *Farfarae*, s. *Tussilaginis Flores & Herba*.

849. **TUSSILAGO hybrida** thyrso oblongo, flosculis feminineis nudis plurimis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 787.

Petasitis floribus spicatis, pendulis, petiolis multifloris, calycibus aequalibus, flosculis paucissimis androgynis. *Hall. helv. n. 140.*

In Thiergarten rarius. Aprili. Majo.

850. **TUSSILAGO Petasitis** thyrso ovato, flosculis, feminineis nudis paucis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 787.

Petasitis floribus dense spicatis, flosculis androgynis. *Hall. helv. n. 138.*

Prope *Schoenhausen*, *Spandau*, & alibi in humidiisculis passim. Aprili. Majo.

Offic. (*Petasitidis Radix & Flores.*)

Quod ad observationem *Celber. Ehrhartii* spectat, (vid. *hanov. Magaz. 1784. 8 Stück* p. 123.) ingenue fateor, me nondum veritate convictum

esse, quod *Tussilago hybrida* & *Petasitis unam* speciem constituant. Forma externa, & loca dissita eorum, ubi sponte enascuntur, hanc opinionem sat refutant, puto. Est, ut cum se mine maturo experimenta instituantur.

CALENDULA. *Lin. gen.* 1073,

Receptaculum nudum. Cal. polyphyllus ac- qualis. *Semina disci membranacea. Pappus nullus.*

851. **CALENDULA arvensis** seminibus cymbiformi- bus muricatis incurvatis: extimis erectis pro- tensis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 924.*

Calendula foliis lanceolatis, amplexicaulibus, dentatis, floribus concoloribus. *Hall. helv.* n. 94.

In agris rarissime. Aestate.

852. **CALENDULA officinalis** seminibus cymbifor- mibus muricatis, incurvatis omnibus. *Lin.* *syst. ed. R. 3. p. 924.*

In hortis frequens aestate.

Offic. Calendulae Flores. (*Herba, Semina.*)

FILAGO.

Receptaculum nudum. Cal. imbricatus. Flores feminei inter squamas calycis locati. Pappus pilosus.

853. **FILAGO germanica** panicula dichotoma, flo- ribus rotundatis axillaribus hirsutis, foliis aeu- tis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 939.*

Filago caule dichotomo, corymbo sphaerico, in angulis sessili. *Hall. helv. n. 153.*

In der Hasenheide, Jungfernheide, beim Wedding & alibi frequens. Julio. Augusto.

854. *FILAGO montana* caule subdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribusque. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 940.*

Filago caule dichotomo, floribus glomeratis spicatis. *Hall. helv. n. 115.*

Prope den Gesundbrunnen, im Thiergarten, ad Tegel, Jungfernheide, Spandau & alibi pas- sim. Julio. Augusto.

855. *FILAGO arvensis* caule paniculato, foliis conicis lateralibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 940.*

Filago caule erecto ramosissimo, foliis motissimis, tomentosis, florum acervis sessilibus in spicas continuatis. *Hall. helv. n. 154.*

In agris, arvis frequens. e. g. ad Reineckendorf &c. Julio. Augusto.

Semen floris hermaphroditii absque pappo.
Leers herborn. n. 679.

MONOGAMIA.

JASIONE. *Lin. gen. 1090.*

Cal. comun. polyphyllus; proprius quinquefidus, persistens. *Cor. 5. petala regularis.* *Capsula infera bilocularis polysperma.*

856. JASIONE *montana*. Lin. *syst. ed. R.* 3.

p. 953.

Rapunculus foliis linearibus subasperis, spica planiuscula, petalis liberis. Hall. helv. n. 678.

β. flore albo.

In collibus arenosis, inque versuris agrorum copiose β. rarius. Aestate.

VIOLA. Lin. *gen. 1092.*

Cal. 5 phyllus. Cor. 5 petala irregularis, postice cornuta. Capsula supra trivalvis, unilocularis.

* *Acaules.*

857. VIOLA *hirta* acaulis, foliis cordatis pilosohispidis. Lin. *syst. ed. R.* 3. p. 963.

In den Papenbergen & Jungfernheide rarius. Aprili. Majo.

858. VIOLA *palustris* acaulis, foliis reniformibus.

Lin. *syst. ed. R.* 3. p. 963.

Viola foliis subrotundo-cordatis: pedunculis radicatis. Fl. lapp. 278.

Im Thiergarten, Grunewald, Jungfernheide & Papenbergen frequens. Aprili. Majo.

859. VIOLA *odorata* acaulis, foliis cordatis stolonibus reptantibus. Lin. *syst. ed. R.* 3. p. 964.

β. Viola martia alba. Bauh. pin. 199.

γ. flore rubente.

In hortis, pomariis copiose. Martio. Aprili.

Offic. Violae Flores. (Semina Herba.)

*** *Caulescentes.*

860. *VIOLA canina* caule adultiore adscendente,
foliis oblongo-cordatis. *Lin. syst. ed. R. 3.*
p. 964.

Viola caule procumbente ramoso, foliis petiola-
tis cordatis. *Hall. helv. n. 563.*

In nemoribus copiose. Aprili. Majo.

**** *Stipulis pinnatifidis; Stigmate urceolato.*

861. *VIOLA tricolor* caule angulato diffuso, foliis
oblongis retusis, stipulis pinnatifidis, corolla
calyce multo majori.

Viola caule anguloſo, diffuso, foliis ovatis den-
tatis, flore calyce duplo longiore. *Hall. helv.*
n. 568.

Viola tricolor caule triquetro diffuso, foliis ob-
longis incisis, stipulis pinnatifidis. *Lin. syst.*
ed. R. 3. p. 967. β.

In cultis, agris, hortis frequens. Aestate.

Offic. (Floris trinitatis Herba.)

862. *VIOLA arvensis* caule inferne angulato, diffuso,
foliis oblongis retusis, stipulis pinnatifidis, co-
rolla calycis fere longitudine.

Viola arvensis. *Murr. prod. 73. Reich fl. moe-*
nof. n. 640.

Viola caule diffuso, ramoso, foliis ovatis, dentatis,
flore calyce paulo majori. *Hall. helv. n. 569.*

Viola tricolor. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 767. var. α.*
bicolor.

In agris, arvis, nemoribus copiose. Aestate.

BRYONIA. Lin. gen. 1194.

Cal. 5. dentatus. *Cor.* 5. partita. *Filamenta* 3.
Anth. 5. *Styl.* 3 fidus. *Bacca* subgloboso po-
lysperma.

863. BRYONIA *alba* foliis palmatis utrinque cal-
loso-scabris, floribus monoicis. *Syst. ed. M.*
14. p. 869, n. 1.

In dumetis ad Spandau frequens. Junio. Julio.

Baccae nigrae.

Offic. Bryoniae Radix.

864. BRYONIA *dioica* foliis palmatis utrinque cal-
loso-scabris, floribus dioicis. *Syst. ed. M.* 14.
p. 870.

In dumetis & sepibus frequens, e. g. ad Pancko,
& alibi. Junio. Julio.

Baccae rubrae.

C L A S S I S X X .

C R Y P T O G A M I A

F I L I C E S .

a. Spiciferae.

EQUISETUM. *Lin. gen.* 1284.

§. *Receptaculum peltatum stipitatum. Indusia subcylindrica, corniculata. Filamenta bina: apicibus binis antheriferis. Semen unicum nudum.*

865. **EQUISETUM sylvaticum** frondibus compositis; spica terminali flaccida.

Equisetum sylvaticum caule spicato, frondibus compositis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 372.

In pratis nemorosis ad *Reineckendorf*, *Tegel* & *in den Papenbergen* frequens. Aprili usque, Junio.

Vere appropinquante scapi nudi spiciferi terra esurgunt, postea squamulae dejiciuntur, & scapus in frondem ramosissimam mutatur; tunc spica marcessit, fit nutans, & paulo-post ex toto evanescit.

Confer. *Hedwig Theor. pl. crypt.* p. 33. t. 1 & 2.

866. **EQUISETUM arvense** scapo fructificante nudo: fronde sterili verticillato-ramosa decumbente.

Equisetum arvense scapo fructificante nudo; sterili frondoso. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 372.

ꝝ. fronde sterili erecto.

In agris, arvis, pascuis siccis e. g. ad *Schoeneberg, Ricksdorf, Reineckendorf, im Thiergarten & alibi copiose.* Martio. Aprili.

Verticilli frondis 12 ad 15.

Non confundendum cum *Equiseto Telmateja Ehrhartii.*

Offic. (Equiseti minoris Herba.)

867. *EQUISETUM palustre* caule angulato, frondibus simplicibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 373.

Equisetum caule sulcato; ramis multifloris, foliis indivisis. *Hall. helv. n. 1677. var. a.*

In fossis, pratis paludosis, *hinter Schoeneberg, beim Unterbaum, im Thiergarten, Jungfernheide & & alibi frequens.* Majo. Junio.

868. *EQUISETUM Heleocharis* caulibus aequalibus, subramosis, teretibus, striatis, fistulosis, viridibus; ramis subsimplicibus, quinquesulcatis, sterilibus; dentibus vaginarum plurimis, subulatis, acutissimis: vaginularum quis-nis dorso minime sulcatis. *Ehrhart hanoev. Magazin 1783. 18 Stück p. 286. n. 30.*

ꝝ. *Equisetum fluviatile* caule striato, frondibus subsimplicibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 373.

ꝝ. *Equisetum limosum* caule subnudo laevi. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 373.

In fossis, pratis paludosis, locisque inundatis frequens. Majo. Junio.

869. **EQUISETUM hyemale** caule nudo scabro, basi subramoso. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 374.*

Equisetum caule subnudo, asperrimo, vaginis caulinis indivisis, ramis stoliatis. *Hall. helv. n. 1679.*

In den Papenbergen rarius. Majo. Junio.

Offic. (Equiseti majoris vel mechanici Herba.)

LYCOPODIUM. *Lin. gen. 1302.*

Cal. squama oblonga. **Capsulae** reniformes dehiscentes polyspermae sessiles.

870. **LYCOPODIUM clavatum** foliis sparsis filamentos, spicis teretibus pedunculatis geminis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 441.*

Lycopodium ramis prolixis, spicis petiolatis gemellis, foliis linearibus pilo cristatis. *Hall. helv. n. 1722.*

Im Grunewald, Spandauerheide, Jungfernheide & alibi copiose. Julio. Augusto.

Offic. Lycopodii Semen.

871. **LYCOPODIUM inundatum** foliis sparsis integrimis, spicis terminalibus foliosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 442.*

Lycopodium spicis sessilibus, foliis linearibus confertissimis, incurvis. *Hall. helv. 1721.*

Locis paludosis im Grunewald & Jungfernheide frequens. Augusto. Septembri.

872. **LYCOPODIUM annotinum** foliis sparsis quinqüefariis subserratis, surculis annotinis arti-

culatis, spicis terminalibus glabris erectis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 443.

Lycopodium ramis prolixis, spicis sessilibus, foliis linearibus subserratis. Hall. helv. n. 1720.

In der Jungfernheide & hinter Tegel frequens.

Augusto. Septembri.

873. *Lycopodium complanatum* foliis bifariis connatis: superficialibus solitariis, spicis geminis pedunculatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 445.*

Lycopodium spicis petiolatis quaternis, caulis complanatis, foliis adpressis. Hall. helv. n. 1723.

In der Jungfernheide, hinter Tegel copiose. Julio. Augusto.

Spicae semper quaternae.

Lycopodium Selaginem hic crescere audivi, sed locus natalis me fugit, & ipse istud non inveni.

OPHIOGLOSSUM. Lin. gen. 1288.

Indusium totam tegens spicam. Capsulae imbricatae plurae polyspermae.

874. *Ophioglossum vulgatum* fronde ovata.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 377. Hedwig Theor. 41. t. 4.

Ophioglossum folio unico, ovato-lanceolato obtuso. Hall. helv. n. 1685.

In der Jungfernheide, Thiergarten, Papenberg locis umbrosis humidis frequens. Majo. Junio.

Offic. (Ophioglossi Herba.)

OSMUNDA. Lin. gen. 1289.

Indusium capsulas arcte in forma globi tegens.

* *Spicae latere frondis insidentes.*

875. OSMUNDA *Lunaria* scapo caulinō solitario,
fronde pinnata solitaria. Lin. syst. ed. R. 4.
p. 379.

α. Osmunda spicis lateralibus, fronde solitaria,
pinnata: pinnis lunulatis.

β. Osmunda spicis lateralibus, frondibus gemitis
natis bipinnatis: pinnis incisis.

Lunaria racemosa ramosa major. Bauh. pin. 355.

Inter Charlottenburg & Spandau in collibus ovia-
riam versus, auf den Rollbergen, inter Doebritz
& Dalgow in der Heide frequens.

Varietas β. in umbrosis ad Pancko, in horto bota-
nico & inter Doebritz & Dalgow in der Heide,
rarissime. Majo. Junio.

Varietas β. certo specie differt, cum semper locis
paludosis umbrosis nascitur, & nunquam in
collibus apricis, ut α.

Offic. (*Lunariae Herba.*)

* * *Spicae apice frondis insidentes.*

876. OSMUNDA *regalis* frondibus bipinnatis: apice
racemiferis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 381.

Locis paludosis hinter Charlottenburg frequens,
im Grunewald passim, prope Tegel olim co-
piose nun rarius. Junio. Julio:

b. *Epiphylospermae.*

ACROSTICHUM. Lin. gen. 1290.

Capsulae totam inferiorem frondis partem tegentes, *indusio* tectae.877. ACROSTICHUM *Spicant* fronde fructificante pinnata, sterili, pinnatifida: laciniis lanceolatis obtusis integerrimis.*Struthiopteris* *Spicant* frondibus sterilibus pinnatifidis: pinnulis densis oblongis sulcatis; fructificantibus majoribus laxius pinnatis; pinnulis angustioribus. Weiss. crypt. 287.*Osmunda* *Spicant* frondibus lanceolatis pinnatifidis: laciniis confluentibus integerrimis parallellis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 383.

b. fronde apice fissa.

In der Jungfernheide & prope Tegel passim.

Offic. (Spicanti Herba.)

PTERIS. Lin. gen. 1291.

♂—♀. *Capsulae* lineam marginalem formantes, *indusio* tectae.878. PTERIS *aquilina* frondibus supradecompositis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis: superioribus minoribus.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 396.

Cincinalis aquilina Lüders nomencl. fl. march. p. 76.

b. Monstrofa, lineis atris planis in medio folii.

In sylvis copiosissime. Julio. Augusto.

ASPLENIUM. Lin. gen. 1295.

♂—♀. *Capsulae* in lineolis disci frondis sparsae;
lineis *indusio* tectis.

879. ASPLENIUM *trichomanoides* frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 404.

In fossis exsiccatis muscosis *in der Jungfernheide* rarius. Martio. Aprili.

Offic. (*Adianthi rubri. s. Trichomanis Herba.*)

880. ASPLENIUM *Rutamuraria* frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 406.

Asplenium fronde laxa ramosa, ramis secundis trifoliis, superioribus semitrilobis rhomboides, circumferratis. Hall. helv. n. 1691.

In moenis *Spandavianis* & in muris ad *alten Landsberg.* Martio. Aprili.

Offic. *Adianthi albi. s. Ruta murariae Herba.*

POLYPODIUM. Lin. gen. 1298.

♂—♀. *Capsulae* in glomerulos dispositae, *indusio* tectae & per inferiorem frondis partem sparsae.

* *Fronde pinnatifida.*

881. POLYPODIUM *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. Lin. syst. ed. R. 4. p. 412.

Polypodium foliis pinnatis, radice squamata.

Hall. helv. n. 1696.

In den Papenbergen, ad Tegel, in der Jungfernheide, & alibi passim in arborum truncis putridis, inque viis cavis. Vere & autumno.

Offic. Polypodii Radix,

** *Fronde subbipinnata, cuius pinnae confluunt basi, ut semipinnata potius, quam perfecte duplícato-pinnata sit.*

882. POLYPODIUM *Phegopteris* frondibus subbipinnatis: pinnis oppositis, superioribus pinnula trapeziformi conjunctis, infimo pari deflexo: pinnulis obtusis; glomerulis capsularum dimidiam marginis partem occupantibus.

Polypodium Phegopteris frondibus subbipinnatis: foliolis infimis reflexis: paribus, pinnula quadrangulata coadunatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 418.

In sylvis umbrosis ad Tegel passim. Julio. Augusto.

Stipes glaber, hinc sulco exaratus, inde convexus. Frondes pilis albis sparsis obsitae. Rachis pilis fuscis recta. Pinnulae integerrimae obtuse, extimae confluentes, & terminans lanceolata: infimae vero praecipue in superiore frondis parte quadrangulares cum oppositis conjunctae. Glomeruli capsularum nunquam usque ad apicem positi, semper dimidiam marginis partem occupant.

883. POLYPODIUM *montanum* frondibus subbipinnatis: pinnis alternis, pinnulis integerrimi-

mis lanceolatis obtusiusculis, glomerulis marginalibus.

Polypodium montanum frondibus subbipinnatis, foliolis inferioribus parvis triangularibus remotis, superioribus lanceolatis approximatis, pinnis oblongis obtusis obliquis integerrimis, punctis floriferis marginalibus. *J. A. Vogler* *Diss. de Polypod. mont. Gissae 1781.*

Polypodium Oreopteris Ehrhardt. pl. crypt. decas 3. n. 22.

In nemorosis humidis ad *Tegel* passim. Julio. Augusto.

Stipes glaber bisulcatus. Frondes pedales. Pinnulae integerrimae. Glomeruli totam pinnulae marginem occupant.

Dissert a *Polypodio Phegopteride*:

- 1) pinnis alternis.
- 2) pinnulis acutioribus.
- 3) glomerulis totam marginem occupantibus.
- 4) quod omnes pinnulae lanceolatae, nec infimae trapeziformes sint.
- 5) pinnis omnibus erectis.

a *Polypodio Thelypteride* fructificationibus marginalibus.

Plura vide in Dissertatione *J. A. Vogleri*.

884. POLYPODIUM *Thelypteris* frondibus subbipinnatis: pinnulis integerrimis: glomerulis capsularum undique tectis.

Polypodium Thelypteris fronde bipinnata, pinnis pinnatifidis integerrimis, subtus undique pol-line tectis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 421.

Ante portam Halensem im Aufstall, prope Spandau in plantariis versus den Papenbergen & alibi in umbrosis passim. Julio. Augusto.

Minor praecedenti, & semper pinnulae glomerulis tectae sunt.

A genere *Acrostichii* differt glomerulis capsularum.

885. *POLYPODIUM cristatum* frondibus subbipinnatis: pinnulis oblongis, obtusis serratis: ferraturis ciliatis; glomerulis capsularum duplii serie dispositis,

Polypodium cristatum frondibus subbipinnatis: foliolis ovato-oblongis: pinnis obtusiusculis apice acute serratis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 420.

Polypodium Filix femina cristata δ. frondibus subtripinnatis: pinnis summis pinnatifidis, imis pinnatis; pinnulis repetito pinnatifidis, omnibus undique ferratis, ferraturis spinosis. *Weiss. crypt. 317.* & variet γ. *spinosa*.

In der Jungfernheide, Spandauerheide, in plantariis etiamque prope Tegel & alibi frequens. Julio. Augusto.

Superior frondis pars tantum capsulas gerit, inferior sterilis. Pinnulae inferiores pinnatifidae. Apex semper dentibus binis terminatur. Indusium peltatum.

886. POLYPODIUM *Filix mas* frondibus bipinnatis; pinnis oblongis obtusis crenatis, glomerulis duplii serie dispositis, stipite superne paleaceo.

Polypodium Filix mas frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis stipite paleaceo. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 421.* *Gunner. norweg. I. p. 4. n. 4. t. I. f. 4.*

In Thiergarten, Jungfernheide & alibi copiose,
Julio.

Offic. Filicis Radix. (Herba.)

887. POLYPODIUM *Filix femina* frondibus bipinnatis: pinnatis lanceolatis pinnatifidis, acutis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 421.

Polypodium Filix femina dentata B. frondibus bipinnatis; pinnis pinnatis confertis, pinnulis pinnatifidis, primis majoribus, lacinulis acute bifidis. *Weiss crypt. p. 315.*

In der Jungfernheide, Thiergarten, Grunewald &c. frequens. Julio. Augusto.

888. POLYPODIUM *rhaeticum* frondibus bipinnatis: foliolis pinnisque remotis lanceolatis: serraturis acuminatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 422.*

In Thiergarten frequens. Julio. Augusto.

Celeber. Weiss cum Polypodio regio hanc speciem confundit, licet longe diversa sit.

*** *Fronde supradecomposita.*

889. POLYPODIUM *Dryopteris* frondibus triplicato-bipinnatis: pinnulis oblongis obtusis integrerrimis: glomerulis marginalibus

Polypodium Dryopteris frondibus supradecompositis: foliolis ternis bipinnatis. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 427.

Prope *Tegel* haud infrequens. Augusto.

Pinnulae obtusae superiores integrae, inferiores pinnatifidae. Glomeruli marginales.

c. *Rhizospermae.*

MARSILEA. *Lin. gen. 1299.*

Capsula radicalis unilocularis polysperma.

390. **MARSILEA natans** foliis oppositis simplicibus.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 437.

Marsilea salvinoides foliis oppositis, utrinque pilosis, longe radicatis, globiferis. *Neck. act. pal. v. 3. phys. 297. t. 21.*

Salvinia vulgaris aquis innatans, foliis subrotundis punctatis lacte virentibus. *Michel gen. 107. t. 58.*

Prope *Spandau* ubi bina flumina junguntur, *Spree* nimirum & *Havela*, in loco collibus cincto, inter lignum natans. Floret Junio, Augusto semina profert.

MUSCI.

A. F R O N D O S I.

a. *Peristome nullo.*

PHASCUM. *Lin. gen. 1305.*

♂—♀. *Theca* cum rudimento operculi, nunquam adscendente, sed inaperta de setula decidente.

891. PHASCUM *subulatum* caulescens, foliis lan-
ceolato-linearibus patulis. Schreb. de Phasco
p. 8, n. 1.

Phascum subulatum acaule anthera sessili, foliis
subulato-setaceis patulis. Lin. syst. ed. R. 4.
p. 451.

Bryum ericetorum capitulis subsessilibus ovoideis,
calyptre conica, primordialibus plumosis.
Necker meth. musc. p. 231. n. 43.

Ad latera fossarum exsiccatarum in der Hasenhei-
de & Jungfernheide frequens. Martio. Aprili.

892. PHASCUM *piliferum* caulescens, foliis oblon-
pis piliferis erectis. Schreb. de Phasco p. 8.
n. 2. tab. 1. fig. 6. 7.

Iisdem locis in der Jungfernheide rarius. Ver-
nali tempore.

893. PHASCUM *cuspidatum* caulescens, foliis mu-
ticis concavis conniventibus. Schreb. de Phasco.
p. 8. n. 3. tab. 1. fig. 1. 2.

Phascum acaulon α. acaule anthera sessili, foliis
ovatis, acutis, conniventibus. Lin. syst. ed.
R. 4. p. 450.

Bryum bulbiferum capitulis subglobosis nitidis,
calyptre basi dilatata, primordialibus bulbosis.
Necker method. musc. p. 230. n. 42.

In hortis, locis cultis, coemeteriis, & agris fre-
quens. Autumno praecipue vero, vernali
tempore.

894. *Phascum muticum* acaule, foliis ovatis muticis concavis conniventibus. *Schreb. de Phasco* p. 8. n. 4. t. 1. f. 11. 12.

Phascum acaulon. ♂. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 450.
Sphagnum acaulon bulbiferum minus. *Dill.*
musc. 252. tab. 32. fig. 12.

In fimento putrido ad margines vaporariorum
in hortis, inque fossis exsiccatis & alibi. Vere,

b. Peristomate nudo.

SPHAGNUM. *Lin. gen. 1304.*

♂ — ♀. *Masculus flos* clavaeformis. *Anth. planae ellipticae* filo succulento cinctae. *Peristoma nudum.*

895. *SPHAGNUM palustre* surculo ramoso: ramusculis dependentibus; thecis terminalibus.

Sphagnum palustre ramis deflexis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 448.

Hypnum cubile ramis lateralibus deflexis, primordialibus subrotundis terminalibus congestis. *Necker method. musc. 188. n. 45.*

Sphagnum palustre molle deflexum, squamis cymbiformibus. *Dill. musc. 240. tab. 32. f. 1.*

♂. *Sphagnum palustre* molle deflexum, squamis capillaceis. *Dill. musc. 243. t. 32. f. 2.*

Im Grunewald, Jungfernheide, hinter Tempelhof, prope Tegel, Spandau &c. copiosissime magnas obducens paludes. Junio.

In varietate ♂. folia sunt concava oblonga obtusa,
in ♂. plana subulata acuta.

Numne distinctae species? quum ♂. in aquis & fossis fluentibus. ♀. vero in paludibus stagnantibus occurrit.

G Y M N O S T O M U M. *Hedwig* 2. p. 87. n. 4.
♂. ♀. *Masculus flos disciformis. Peristoma nudum.*

896. **G Y M N O S T O M U M pyriforme** foliis explanatis oblongis acutis; thecis pyriformibus.

Bryum pyriforme antheris erectis obovatis, culis acaulibus, foliis ovatis muticis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 474.

Bryum serpillifolium, capsulis pyriformibus. *Dill. musc. 345. t. 44. f. 6.*

In der Jungfernheide, prope Spandau, Buchholtz, Charlottenburg &c. in fossis exsiccatis & hortis frequens. Februario. Martio seq.

897. **G Y M N O S T O M U M Heimii** trunco erecto, foliisque spatulato-acuminatis, ad apicem denticulatis; thecis oblongis erectis. *Hedwig stirp. crypt. I. fascil. 3. pag. 80. tab. 30.*

In fossis ad Spandau rarius. Vere.

898. **G Y M N O S T O M U M truncatulum** foliis explanatis apiculatis; thecis truncatis. *Hedwig stirp. crypt. I. fascil. I. t. 5. p. 13.*

♂. *Bryum truncatulum* antheris erectis subrotundis: operculo mucronato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 481.*

Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. musc. 347. tab. 45. fig. 1. Hedwig. l. c. fig. 1. 2. 5. 6. 12. 8c.*

$\delta.$ capsulis axillaribus. *Hedwig.* l. c. fig. 7.
14. &c.

Ad fossas, in pratis, hortis vulgaris. Vere & au-
tumno.

In varietate $\alpha.$ capsulae terminales, operculum:
acumine brevi incurvo; folia mucronata. In
 $\beta.$ capsulae axillares folia angustiora mucrone
breviori, & acumine operculi longiori ma-
gis erecto.

899. *Gymnostomum ovatum* foliis ovatis, con-
cavis piliferis; thecis ovatis. *Hedwig stirp.*
crypt. I. *fascicul.* 1. *pag.* 16. *t.* 6.

In agris limosis, & tumulis coemeteriorum pa-
sim. Vere.

c. *Peristome figurato, ordine simplici.*

TETRAPHIS. *Hedwig musc.* 2.

p. 87. n. 5.

$\delta.$. $\varphi.$ *Mascul.* flos capituliformis pulverulentus.
Peristoma dentibus quatuor pyramidalibus.

900. **TETRAPHIS pellucida** surculo simplici, foliis
ovatis; thecis cylindricis.

Georgia Mnemosynum. *Ehrhart hanoev. Magaz.*

1780. 59. *Stück.* *pag.* 931.

Mnium pellucidum caule simplici, foliis ovatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 457.

Im Grunewald, Thiergarten, Jungfernheide &
alibi passim. Februario. Martio.

LEERSIA. *Hedwig musc.* 2. p. 88. n. 7.

♂ — ♀. *Mascul.* Fl. geminaeformis in foliorum alis. *Peristoma* dentibus 16. angustis erectilibus integris.

901. **LEERSIA pulvinata** surculo ramoso foliis oblongis piliferis: thecis subrotundis nutantibus: calyptulis minutis.

Bryum pulvinatum antheris subrotundis pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 480.

Bryum pulvinatum surculo caespitofo aggregato, foliis piliferis, setaceis, capitulis ovatis intra folia sepultis. *Necker method. musc.* p. 200. n. 9.

In tectis, tigulis, inque lapidibus magnis, muris, sepibusque copiose. Autumno & vere.

902. **LEERSIA cirrhata** surculo ramoso, foliis lanceolatis acutis; thecis oblongis, operculo acuminato, calyptulis dimidiatis.

Mnium cirrhatum foliis arefactione revolutis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 46.

Bryum cirratum surculo ramoso, foliis linearibus, siccitate contortis, capitulis erectis cuspidatis. *Necker method. musc.* p. 213. n. 25.

In collibus aridis arenosis inter *Pancko* & *Gesundbrunnen*, prope *Schoeneberg* & alibi passim. Autumno. Rarius capsulas profert.

903. **LEERSIA vulgaris** surculo simplici, foliis lanceolatis; thecis cylindricis: calyptulis campaniformibus marginis integris: theca longioribus

Leersia vulgaris calyptra laxa conica aequali, vaginulae membrana pileiformi. *Hedwig stirp. crypt.* I. fascil. 2. pag. 46. t. 18.

Bryum extinctorium anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 474. α .

Bryum calyptra extinctorii forma minus. *Dill. musc. 349. tab. 45. fig. 8.*

In moeniis Spandavianis, inque truncis arborum putridis in der Jungfernheide, versus Papenbergen rarius. Autumno.

GRIMMIA. *Hedwig musc. 2.* p. 89. n. 8.

σ . . φ . *Mascul.* Fl. in foliorum alis gemmaeformis, in summitate disciformis. *Peristoma dentibus 16*, latiusculis, reflexis, integris.

904. **GRIMMIA** *Polyodon* surculo ramoso, foliis lanceolatis carinatis; thecis ovatis terminalibus, sessilibus: operculo acuminato: calyptris glabris minimis.

Grimmia Polyodon. *Ehrhart. hanov. Magazin 1781. 69. Stück.* p. 1092.

Bryum apocarpum antheris sessilibus terminalibus, calyptris minimis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 471. variet. α .

Bryum apocarpum surculo ramoso, foliis carinatis acutis, capitulis sessilibus, ovatis, terminalibus. *Neck. method. musc. 199.* n. 8. α .

Sphagnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis. *Dill. musc. 245. tab. 22. fig. 1.*

In saxis & ad salices prope *Spandau* passim.

Vere.

905. *GRIMMIA striata* surculo ramoso, foliis lanceolatis, acutis; thecis oblongis sessilibus, axillaribus, terminalibusve: operculo acuminato: calyptulis pilosis.

Bryum striatum antheris subfessilibus, sparsis, calyptulis striatis sursum pilosis. *Lin. syst. ed. R.*

4. p. 473. α .

Polytrichum striatum capitulo laterali ovato subfessili, foliis integerrimis exappendiculatis, primordialibus gemmosis. *Neck method. musc.*

p. 121. n. 4. α .

Polytrichum bryoides α . *striatum*. *Weiss crypt.* 175.

Weissia polytrichoides. *Wiggers primit.* p. 76.
n. 821.

Polytrichum brii ruralis facie, capsulis sessilibus majus. *Dill musc.* 430. tab. 55. f. 8.

In arboribus vulgaris. Vere & autumno.

906. *GRIMMIA sylvatica* surculo ramoso: foliis lanceolatis; thecis oblongis pedunculatis terminalibus axillaribusve: operculo mucrone obtuso; calyptulis villosis.

Bryum striatum. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 473. δ .

Polytrichum striatum. *Neck. method. musc.* l. c. γ .

Polytrichum crispum capillaceum, calyptulis acutis pilosissimis. *Dill. musc.* 433. t. 55. fig. 11. a. b. c.

In der Jungfernheide, Grunewald, Thiergarten, arboribus, locis umbrosis insidens passim.

Hyeme

Diversissima a praecedenti, ut pro varietate declarare nequeam. Differt praecipue thecis penduculatis. Varietas vero rupestris ad priorem speciem pertinet, & modo loco orta videtur; hic nondum vidi.

WEISSIA. *Hedwig musc. 2.* p. 90. n. 9.

♂.. ♀. *Mascul.* fl. terminalis capituliformis. *Peristoma* dentibus 16 integris.

907. WEISSIA *Dicksoni* surculo ramoso, foliis linear-lanceolatis; thecis oblongis: operculo acuminato: calyptris dimidiatis.

Bryum virens capsulis erectis oblongis, foliis subulatis strictis. *Dickson fascicul. crypt.* pag. 4.

Bryum capillaceum breve, pallide & laete virens, capsulis ovatis. *Dill musc. 380.* t. 48. f. 43.

Bryi viriduli. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 476. synonima nec planta.

In der Jungfernheide, Grunewald, Thiergarten & alibi frequens. Hyeme.

Cespites hemisphaericos format, & folia exsiccatione crispa evadunt.

Celeber. *Dickson verum Bryum viridulum* in herbario *Linnei* vidit, & differentiam ejus indicavit. vide *Ejusd. Fascicul.* pag. 3. tab. I. fig. 5.

908. WEISSIA? *paludosa* acaulis, foliis setaceis lanceolatis; thecis oblongis: operculo acuminato: calyptris dimidiatis.

Bryum paludosum acaulon, foliis setaceis, antheris obtusissimis, patulis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 476.

Bryum trichodes acaulon palustre minimum, setis & capsulis brevissimis. Dill *musc.* 387. *tab.* 49. *fig.* 53.

In der Jungferuheide, in fossis humentibus umbrosis rarius. Vere.

Nunquam caespitosa semper solitaria sparsa.

909. *WEISSIA recurvirostra* foliis lanceolatis, imbricato-patulis; theca gracili: operculi rostello recurvo. *Hedwig stirp. crypt.* I, *fascic.* 1. *pag.* 19. *tab.* 7.

Versus Spandau bei der Steinmühle, & in plantariis der Jungfernheide versus Tegel rarius. Hyeme.

POLYTRICHUM. *Lin. gen.* 1309.

♂.. ♀. *Mascul.* flos disciformis. *Peristoma* dentibus 32 integris membrana apicibus adglutinata.

* *Thecis cum apophysi.*

910. *POLYTRICHUM commune* surculo simplici, proliero, foliis linear-lanceolatis ferrulatis; thecis oblongis tetraëdris: calyptis villosis.

Polytrichum commune capsulis paralellipipedis, foliis ferrulatis acutis. *Schreb. spicil.* pag. 73. n. 733.

Polytrichum commune caule simplici. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 455. *

Polytrichum commune surculo capitulifero simpliculo: stellifero annotino-articulato, capitulis adultis tetraëdris obliquis, *Necker method.*

musc. 135. n. 7.

Polytrichum commune α. *majus*. *Weiss. crypt.* 168.

Polytrichum quadrangulare vulgare, *Juccae foliis ferratis*. *Dill. musc.* pag. 420, fig. 1.

In Grunewald frequens. Vere.

911. *POLYTRICHUM juniperinum* surculo simplici proliferō: foliis linearī-lanceolatis integerrimis mucronatis; thecis oblongis tetraēdris, calyptis villosis.

Polytrichum commune. β. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 456.

Polytrichum commune β. *minus*. *Weiss. crypt.* 171.

Polytrichum. *Schreb. spicil.* 73. n. 734.

Polytrichum quadrangulare, *juniperi* foliis brevioribus & rigidioribus. *Dill musc.* 464. t. 54. f. 2.

In der Jungfernheide, Thiergarten, Grunewald & alibi copiose. Vere & autumno.

Offic. (Adianti aurei Herba.)

912. *POLYTRICHUM piliferum* surculo simplici, foliis lanceolatis integerrimis, apice piliferis; thecis oblongis tetraēdris: calyptis villosis.

Polytrichum piliferum capsula paralellipipeda, foliis integerimis, piliferis, caule simplici. *Schreb. spicil.* 74. n. 1031.

Polytrichum commune γ. *pilosum*. *Weiss. crypt.* 172.

Polytrichum commune γ. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 456.

Polytrichum quadrangulare minus juniperi foliis pilosis. *Dill musc.* 426. tab. 54. fig. 3.

In collibus apricis graminosis, & in ericetis sterilibus copiose. e.g. in der Jungfernheide, Spanauerheide, ad Schoeneberg &c. Hyeme & vere.

** *Thecis absque apophysī.*

913. POLYTRICHUM *nanum* surculo simplici, foliis lanceolatis apice subserratis; thecis subrotundis: calyptoris villosis.

Polytrichum nanum foliis obscure serratis; theca subrotunda, nutante. *Hedwig stirp. crypt. I. fasc. 2. pag. 35. tab. 13.*

Mnium polytrichoides calyptra villosa. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 464. a.*

In der Jungfernheide, Grunewald, Hasenheide & alibi frequens. Hyeme.

914. POLYTRICHUM *aloides* surculo simplici, foliis lanceolatis, apice ferrulatis; thecis cylindricis: calyptoris villosis.

Polytrichum aloides foliis versus apicem evidenter ferrulatis; theca cylindrica obliquata. *Hedwig stirp. crypt. I. fasc. 2. pag. 37. tab. 14.*

Mnium polytrichoides. β. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 464.*

In der Jungfernheide passim. Vere.

915. POLYTRICHUM *undulatum* surculo simplici, foliis lanceolatis ferratis, undulatis; thecis cylindricis: operculi acumine longe producto: calyptoris dimidiatis glabris.

Polytrichum undulatum foliis lanceolatis ferratis, undulatis, patentibus; calyptra ad apicem paraphysiphora, theca cylindrica cernua. *Hedwig stirp. crypt. I. fascicul. 2. pag. 43. t. 16. 17.*

Catharinea Callibryon. Ehrhart hanoev. Magaz.

Bryum undulatum antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ferratis. *Lin. syst. ed. R.*

4. p. 477.

β. *Polytrichum undulatum* β. minus, thecis foliisque erectioribus. *Hedwig. l. c. pag. 43. t. 17. fig. 13 & 14.*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi copiose.
Hyeme.

TRICHOSTOMUM. *Hed. musc. 2.*

p. 90. n. II.

♂ — ♀. *Flos mascul. gemmiformis. Peristoma dentibus 15 bifidis longis erectis.*

916. TRICHOSTOMUM *hypnoides* surculo ramoso decumbente, foliis oblongis apice piliferis; thecis oblongis: calyptaris integris.

Bryum hypnoides antheris erectis, surculo erectiusculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 477. α.

Bryum hypnoides α. *hirsutum. Retz prod. fl. Scandanav. 2. p. 213. n. 1234.*

Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum. *Dill. musc. 372. t. 47. fig. 34. B.*

Prope Falckenhagen rarius. Hyeme.

Cum capsulis nondum legi.

917. TRICHOSTOMUM *pallidum* surculo simplici brevissimo, foliis capillaceis subulatis vaginantibus; thecis cylindricis: operculis conicis: calyptaris dimidiatis.

Trichostomum pallidum humile, foliis capillari-
bus; theca ovato-cylindrica; operculo coni-
co. *Hedwig stirp. I. fascic. 3. p. 69. tab. 27.*

Bryum pallidum capsulis urceolatis erectis, pecti-
ne spirali, foliis capillaceis, surculis acauli-
bus. *Schreb. spicil. 80. n. 1029.*

Prope Spandau & in der Jungfernheide in plan-
tariis sparsim. Vere.

918. *TRICHOSTOMUM pusillum* surculo simplici,
brevissimo, foliis subulatis vaginantibus; the-
cis oblongis: operculis conicis: calyptis di-
midiatis.

Trichostomum pusillum foliis ex ovato-concavis,
basi subulatis, thecis erectis oblongis. *Hedwig
stirp. crypt. I. fascicul. 3. pag. 74. tab. 28.*

Locis arenosis in plantariis & fossis exsiccatis der
Jungfernheide passim. Autumno.

Dentes peristomatis ad basin usque divisi, nec
torti, ut in praecedenti specie.

FISSIDENS. Hedwig musc. 2. p. 91. n. 12.

♂—♀. *Flos mascul. gemmiformis. Peristoma den-*
tibus 16. brevioribus inflexis.

919. *FISSIDENS bryoides* fronde simplici pinnata,
apice setifera: pinnis oblongis acutis; thecis
oblongis: operculis acutis.

Hypnum bryoides fronde simplicissima pinnata lan-
ceolata apice pedunculifera. *Lin. syst. ed. R.
4. p. 483.*

Hypnum taxiforme exiguum versus summitatem capsuliferum. Dill musc. 262. t. 34. f. 1.

In der Jungferuheide & Papenbergen rarius ad emortuarum arborum truncos. Hyeme.

920. *Fissidens taxifolius* fronde pinnata simpli-ci, basi setifera: pinnis oblongis acutis; thecis oblongis: operculo acuminato.

Hypnum taxifolium fronde simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculifera. Lin. syst. ed. R. 4. p. 482.

Hypnum taxifolium: surculo simplicissimo basi stipitifero, capitulis incurvis, apice subulatis, foliis imbricatis acutis. Necker method. musc. p. 151. n. 1.

Inter Grunewald & Fasanerie in pratis humidis turfosis passim. Hyeme.

921. *Fissidens adianthoides* fronde pinnata sub-ramosa, medio setifera: pinnis oblongis acutis; thecis subcylindricis: operculi acumine brevi.

Hypnum adianthoides fronde pinnata ramosa erecta medio pedunculifera. Lin. syst. ed. R. 4. p. 484.

Hypnum adianthoides: surculo ramoso, erecto, medio stipitifero, capitulis obliquis subulatis, foliis imbricatis acutis. Necker method. musc. p. 153. n. 3.

Inter Grunewald & Fasanerie in pratis uidis turfosis frequens. Hyeme.

922. *Fissidens denticulatus* fronde pinnata sub-simplici, basi setifera: pinnis cuneiformibus acutis, conjugatis; thecis cylindricis: operculo obtuso.

Hypnum denticulatum fronde pinnata simplici: pinnis duplicatis basi pedunculiferis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 413.*

Hypnum denticulatum: surculo simpliciusculo decumbente, basi setifero, capitulis obliquis; foliis ordine duplii acutis, recurvatis. *Neck. method. p. 154. n. 5.*

Locis uidis nemorosis, inque arborum truncis.
e. g. im *Thiergarten*, *Jungfernheide*, *Papenbergen* & alibi frequens. *Hyeme.*

DICRANUM. *Hedwig musc. 2. p. 91. n. 13.*

♂. ♀. *Mascul. flos capituliformis terminalis. Peristoma dentibus 16 brevibus bifidis inflexis.*

923. *Dicranum purpureum* surculo ramoso, foliis oblongis acutis carinatis; thecis subcylindricis, setis axillaribus.

Mnium purpureum caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 460.*

Bryum purpureum capsulis inclinatis striatis, operculo conico, foliis linear-lanceolatis carinatis, caule subdiviso. *Schreb. spicil. 79. n. 738.*

In viis, sylvis, nemoribus & alibi copiosissime.
Vere.

924. Dicranum *scoparium* surculo ramoso, foliis linearie lanceolatis recurvis secundis; thecis erectis oblongo-cylindraceis: operculis conicis acuminatis.

Bryum scoparium antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 477.

Hypnum scoparium foliis falcatis heteromallis, vaginis multifloris. *Hall. helv. n. 1777.* *Weiss. crypt. 213.*

In der Jungfernheide, Thiergarten & alibi copiose. Vere.

Saepius uno ex Perichaetio plures nascuntur setas.

925. Dicranum *heteromallum* surculo subsemplifici, foliis setaceis recurvis secundis, thecis ovatis: operculis acuminatis recurvis.

Dicranum heteromallum foliis e membranacea basi subulatis, secundis; theca ovata, operculo rostrato. *Hedwig stirp. 1. fasc. 3.* p. 68. tab. 26.

Bryum heteromallum antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 480.

Im Thiergarten, Hasenheide, Jungfernheide in fossis exsiccatis arenosis copiose. Hyeme.

926. Dicranum *glaucum* surculo ramoso, foliis ovatis acutis imbricatis; thecis oblongis: operculis acuminatis recurvis.

Bryum glaucum antheris erectiusculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, surculis ramosis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 472.

Bryum glaucum: surculo ramoso, fragili, imbri-
cato, foliis lanceolatis, operculo capitulorum
rostrato. *Necker method. musc. 226. n. 37.*

In der Jungfernheide, Grunewald & alibi fre-
quens. Vere.

TORTULA. *Hedwig musc. 2. p. 92. n. 14.*

♂—♀. *Mascul. flos* gemmiformis. *Peristomat.*
spiraliter convolutis.

927. TORTULA muralis surculo brevissimo, sub-
diviso, foliis ovatis, acutis, apice piliferis; the-
cis oblongis: operculis conicis acutis.

Bryum murale antheris erectis, foliis piliferis
rectiusculis, surculis simplicibus caespitosis.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 476.

Bryum murale capitulis oblongis erectis, cuspi-
datis, foliis oblongis concavis piliferis. *Neck.*
method. 196. n. 5.

In muris, tegulis, lapidibus &c. copiose. Vere.

728. TORTULA subulata surculo brevissimo sim-
plici, foliis ovatis obtusiusculis; thecis cylin-
draceis: operculo conico, acuto.

Bryum subulatum antheris erectis subulatis, surcu-
lis acaulibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 475.*

Bryum subulatum capitulis subulatis, foliis supe-
rioribus acutis patentibus primordialibus
subradicalibus. *Necker method. p. 194. n. 2.*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi passim in
fossis humidiusculis. Vere.

BARBULA. *Hedwig* *musc.* 2. p. 92. n. 15.

♂. ♀. *Mascul.* *flos* *capituliformis*. *Peristoma* *ciliis* *spiraliter convolutis*.

929. *BARBULA ruralis* surculo ramoso, foliis reflexis obovatis, obtusis, apice piliferis; thecis cylindricis: operculis conicis acutis.

Bryum rurale antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 475.

Bryum rurale capsulis subnutantibus; pedunculis annotinis lateralibus; foliis supra medium dilatatis, piliferis, patulis. *Scop. carn. ed. I.* p. 145. n. 17. *ed. 2.* n. 1308.

In campis, nemoribus, tectis stramineis, ligneisque, muris &c. copiosissime. *Hyeme*.

930. *BARBULA unguiculata* surculo subramoso, foliis linear-lanceolatis, carinatis; thecis subcylindricis: operculo conico.

Barbula unguiculata foliis linear-lanceolatis, carinatis, surrectis, perigonialibus masculi floris cum fasciculo, theca obliqua. *Hedwig stirp. I. fasc. 3.* p. 59. t. 23.

Bryum unguiculatum antheris erectis oblongis, pedunculis axillaribus, foliis erectis, acutis, carinatis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 479.

Bryum unguiculatum capsulis urceolatis, operculo longo obliquo, foliis lanceolatis tortilibus, caulinis erectis. *Schreb. spicil.* 78.

In fossis, tumulis coemeteriorum & alibi frequens. *Hyeme*.

d. Peristomate figurato, ordine dupli.

NECKER A. *Hedwig* musc. 2. p. 93. n. 16.

♂.. ♀. *Mascul.* fl. gemmiformis. *Peristoma* dentibus 16. ciliisque apice liberis.

931. NECKER A *crispa* surculis ramosis erectiusculis, foliis distichis oblongis obtusis rugosis; thecis oblongis: operculo rostrato, rostro reflexo.

Hypnum crispum surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis planis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 487.

Hypnum crispum surculo ramoso vago erectiusculo stipitifero, capitulis obliquis acuminatis, foliis undatis obtusis distichis. *Necker method.*

p. 153.

Prope Falkenhagen rarissime. Hyeme.

932. NECKER A *dendroides* surculo erecto inferne nudo, superne fasciculato-ramoso, folioso, foliis linear-lanceolatis imbricatis; thecis subcylindricis erectis: operculis rostello incurvo.

Hypnum dendroides surculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis, antheris erectis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 496.

Hypnum dendroides sericeum, setis & capsulis longioribus erectis. *Dill. musc. 313. tab. 40.*
fig. 48.

C. surculo ramoso, ramis fasciculatis.

In nemorosis humidis *im Thiergarten, Jungfernheide, Papenbergen &c.* frequens. Hyeme.

In varietate $\beta.$ surculus nudus non simplex est, sed in tres vel quatuor ramos dividitur.

933. NECKERA *curtipendula* surculis ramosis erectis teretibus foliosis, foliis oblongo-ovatis, acutis, imbricatis; thecis nutantibus ovatis: operculis acuminatis.

Hypnum curtipendulum surculis vagis, teretibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 497.

Hypnum dentatum *curtipendulum*, viticulis rigidis. *Dill. musc. 333. t. 43. f. 69.*

Im Briselang & alibi rarius. Hyeme.

934. NECKERA *viticulosum* surculis ramosis decumbentibus, foliis oblongis acutis patulis; thecis oblongis: operculis conicis.

Hypnum viticulosum surculis repentibus, ramis vagis teretibus; foliis patulis acuminatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 494.*

Hypnum surculo germinante crassiore: adulto graciliore, reptante capitulifero, primordialibus pilosis. *Necker method. 169. n. 23.*

In den Papenbergen, Briselang & alibi in arborum truncis rarius. Majo.

935. NECKERA *serpens* surculis ramosis decumbentibus vagis, filiformibus, foliis minutissimis oblongis acuminatis; thecis oblongo-cylindricis: operculis obtusis.

Hypnum serpens surculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 500.

Hypnum serpens surculis repentibus, ramis filiformibus: foliis oblitteratis, capsulis cylindraceis inclinatis, mucrone brevissimo erecto. *Schreb. spicil. 99. n. 760.*

In arborum truncis vulgaris. Autumno.

936. **NECKERA cupressiformis** surculis ramosis decumbentibus, foliis oblongo-lanceolatis recurvis secundis; thecis cylindricis: operculo acuminato recto.

Hypnum cupressiforme surculis subpinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 492.*

Hypnum cupressiforme surculo pinnato, ramis apice deflexis, remotis, capitulis ovatis, erectis. *Necker method. 166. n. 19.*

α. surculis latis, brevibus.

β. *Hypnum crispum cupressiforme*, foliis aduncis. *Dill. musc. 287. t. 37. f. 23.*

γ. surculis apice filiformibus, longe repentibus.

In terra & arborum truncis copiosissime. Autumno.

937. **NECKERA aduncu** surculo ramoso erecto, foliis linear-lanceolatis falcatis carinatis apice setaceis, secundis; thecis obliquis oblongis; operculis conicis obtusis.

Hypnum aduncum surculis erectiusculo. subramosis, foliis secundis recurvis subulatis, ramis recurvatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 493.

Hypnum aduncum surculo erecto simpliciusculo, ramis recurvis, capitulo obliquo apice obtuso, *Necker method. 167.* n. 20.

In der Jungfernheide, Papenbergen &c. frequens, locis uidis. Majo.

938. *NECKERA sericea* surculo ramoso repente, foliis oblongis, seta terminatis, arête imbri- catis; thecis cylindricis erectis: operculis acuminatis recurvis.

Hypnum sericeum surculo repente, ramis confer- tis erectis, foliis subulatis, antheris erectis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 499.

Hypnum sericeum: repens, ramis anotinis ramosis erectis, capitulo erecto, acuminato, primordialibus acuminatis. *Necker method. musc. 173.* n. 17.

Hypnum vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. *Dill. musc. 323. tab. 42. fig. 59.*

In arborum truncis vulgaris. Vere.

939. *NECKERA lutescens* surculis ramosis vagis, foliis oblongis acuminatis; thecis oblongis, obliquis: operculis acuminatis recurvis.

Hypnum lutescens surculis vagis procumbentibus, foliis subulatis, antheris obliquis. *Huds. angl. ed. I.* p. 421. In editione novissima varietas *Hypni sericei* p. 506.

Hypnum lutescens surculis vagis procumbentibus,
foliis ovatis lanceolatis subulatis striatis, cap-
fulis obliquis. *Schreb. spicil.* 98. n. 1071.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi passim. Vere.

940. *NECKERA albicans* surculo ramoso adscen-
dente, foliis oblongo-lanceolatis, apice seta-
ceis; thecis oblongis obliquis: operculis co-
nicis obtusis.

Hypnum albicans surculo adscendente, ramis te-
retibus arête imbricatis, foliis ovatis, mucro-
natis, capitulis axillaribus obliquis. *Necker me-
thod. musc.* 180. n. 36. *Withering britan.* 2.
p. 688. n. 36.

Hypnum sericeum gracile albicans, capsulis sub-
rotundis. *Dill. musc.* 328. t. 42. f. 63. (*figura
non optima.*)

Hinter Spandau versus Falkenhagen passim ad
terram. Vere.

LESKIA. Hedwig musc. 2. p. 93. n. 17.

♂.. ♀. *Mascul. flos* geminiformis. *Peristoma extern.*
dentibus 16 acutis; *intern.* ciliis uniformibus,
basi membranacea connexis.

941. *LESKIA trichomanoides* surculo ramoso, foliis
distichis oblongis sublunatis obtusis; thecis
subcylindricis: operculi rostello reflexo.

Hypnum trichomanoides fronde ramosa: foliis
distichis imbricatis acinaciformibus obtusis.
Schreb. spicil. 88. n. 1053.

Hypnum pennatum trichomanoides splendens
ramosum. *Dill. musc.* 269. t. 24. f. 9.

*Im Thiergarten, Grunewald, Papenbergen,
Jungfernheide &c. ad arborum radices locis
humidis umbrosis passim. Vere.*

942. *LESKIA polyantha* surculis ramosis, ramis brevissimis, foliis subulatis acutis, thecis oblongis, operculis conicis obtusis.

Hypnum polyanthos, surculis ramosissimis, ramis erectis teretibus multifloris, capsulis erectis.
Schreb. spicil. 97. n. 1070.

Im Thiergarten & Jungfernheide in arborum truncis rarius. Hyeme.

943. *LESKIA palustris* surculis repentibus vagis, ramosis, foliis ovatis acutis secundis; thecis cylindraceis: operculis obtusis.

Hypnum palustre surculis repentibus, ramis confertis erectis, foliis ovatis secundis, antheris erectiusculis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 495.*

Hypnum heterophyllum surculo repente simplici, ramis erectis setas subaequantibus: operculo mucronato. *Necker method. 168.*

Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens. *Dill musc. 293. t. 37. f. 27.*

In fossis uidis, ad salicum truncos passim. Autumno.

944. *LESKIA marchica* surculo ramoso erecto, foliis ovatis acuminatis; thecis subrotundis obliquis: operculis mucrone crasso adunco.

Iisdem locis ubi *Marsilea natans* reperitur, in ligno putrido natante. Majo. Junio.

Surculus erexit ramosus, inferne fuscus, radicibus fibrosis minutissimis dense obsitus: ramis brevibus teretibus.

Folia ovata acuminata carinata obscure virentia laxe imbricata. Flos masculus gemmiformis terminalis. Setae rubrae sesquiunciales, axillares, filiformes. *Perichaetium* vaginatum, inferne ventricosum, superne truncatum, margine integro, foliis lanceolatis apice setaceis cinctum. Theca subrotunda obliqua gibba striata. Operculum minutum planum, mucrone umbilicato obtuso parum deflexo. Tab. VI. fig. 12. a. b. c.

Habitu externo in nonnullis cum *Mnio fontano* convenit, differt tamen:

- 1) Foliis ovatis acuminatis, quae in *Mnio fontano* apice setacea sunt.
- 2) Ramis brevioribus.
- 3) Floribus gemmiformibus, nec disciformibus.
- 4) Theca minori gibbosa.
- 5) Peristomate.

HYPNUM. Lin. gen. 1312.

♂.. ♀. Flos mascul. gemmiformis. Peristoma extern. dentibus 16. acutis; intern. ciliis e membra difformibus.

* *Surculis pinnatis.*

945. HYPNUM *filicinum* surculo simpliciter pinnato, foliis oblongis acuminatis reflexis secundis; thecis subcylindricis: operculis convexis.

Hypnum filicinum surculis pinnatis: ramulis distantibus, foliolis imbricatis incurvis acutis secundis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 483.*

Hypnum filicinum α. *spicatum* surculis pinnatis: pinnis foliosis, simplicibus, distantibus, versus apicem approximatis in spicam: foliis imbricatis, falcatis. *Weiss. crypt. 228.*

Hypnum repens *filicinum* *crispum*. *Dill. musc. 282. t. 36. f. 19.*

Prope Tegel haud infrequens, *in den Papenbergen rarius*. *Martio. Aprili.*

946. *HYPNUM proliferum* surculis duplicato-pinnatis, proliferis, foliis lanceolatis imbricatis; thecis oblongis; operculis acuminatis incurvis.

Hypnum proliferum surculis proliferis, plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 489.*

Hypnum parietinum surculo pinnato, ramis arcuato-subulatis teretibus, capitulis aggregatis obliquis, operculo subulato. *Necker method. 157. n. 8.* (synonimum *Linnei a Perill. Necero citatum*, falsum est, & ad sequentem speciem pertinet.)

Hypnum filicinum, *Tamarisci* soliis majoribus splendentibus. *Dill. musc. 274. t. 35. f. 13.*

In nemoribus & sylvis inque fossis exsiccatis copiose. Vere.

947. *HYPNUM delicatulum* surculis duplicato-pinnatis proliferis apice cuspidatis, foliis oblongis,

acuminatis ; imbricatis thecis cylindraceis : operculi rostello obtuso incurvo.

Hypnum delicatulum surculis subproliferis plano-pinnatis cuspidatis , pedunculis aggregatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 489.

Hypnum filicinum, tamarisci foliis minimis non splendentibus, setis capsulis brevioribus. *Dill. musc. 546. t. 83. f. 6.*

Inter Grunewald & Fasanerie, in den Papenbergen & alibi locis udis passim. *Hyeme.*

Setae solitariae vel geminatae, rarius aggregatae.

948. *HYPNUM parietinum* surculis subtriplicato pinnatis proliferis, foliis ovatis acutis imbricatis ; thecis cylindraceis : operculi rostello incurvo.

Hypnum parietinum surculo plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 490.*

Hypnum tamariscifolium surculo repente, ramis planiusculis proliferis, capitulis confertis incurvis. *Necker method. 158. n. 9.*

Hypnum filicinum, Tamarisci foliis minoribus, non splendentibus. *Dill. musc. 276. t. 35. f. 14.*

In nemoribus & fossis exsiccatis umbrosis frequens. *Vere.*

Rarius theciferum.

949. *HYPNUM praelongum* surculis subsimpliciter pinnatis, subproliferis, foliis lanceolatis laxe imbricatis ; thecis oblongis : operculis conicis, rostro subulato longo incurvo.

Hypnum praelongum surculis subpinnatis decumbentibus; ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 490.

Hypnum praelongum surculo reptante, ramis subaequalibus setis axillaribus, capitulis subcernuis, foliis ferrulatis patulis. *Necker method. 174.* n. 28.

In der Jungfernheide, Thiergarten & alibi in arborum truncis & ad terram frequens. Hyeme. Cum thecis nondum legi, a *Clariss. ac Amiciss.* D. Hedwig specimen cum thecis accepi, unde descriptionem depropensi.

950. *HYPNUM abietinum* surculis simpliciter pin-
natis, ramosis, filiformibus, foliis oblongis
obtusis dense imbricatis.

Hypnum abietinum surculis pinnatis teretiusculis
remotis inaequalibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 491.

Hypnum abietinum primordialibus obtusis, ramis
teretibus subulatis, foliis ovatis, acutis, rachi
siccata appressis. *Necker method. 163.* n. 15.

*In arenosis sterilibus ad Schoeneberg, inter Pancko
& Gesundbrunnen alibique frequens.*

Thecas nunquam vidi.

** *Surculis erectis.*

951. *HYPNUM triquetrum* surculis ramosis, foliis
oblongis acutis subreflexis patulis; thecis ob-
longis: operculis obtusis.

Hypnum triquetrum ramis vagis recurvis, foliis
ovatis recurvatis patulis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 487.

Hypnum triquetrum surculo adscendente: ramis supremis recurviusculis setiferis: infimis rep- tantibus, foliis imbricato patulis. *Necker method.* 185. n. 43.

In nemoribus, sylvis, pratisque copiose. Vere. Thecas rarius observavi.

952. *HYPNUM squarrosum* surculis ramosis, foliis lanceolatis acutis reflexis; thecis oblongis: operculis acutis.

Hypnum squarrosum ramis vagis, foliis lanceola- tis, complicato carinatis, quinquefariam recur- vatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 494.

Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, minus. *Dill. musc.* 304. t. 39. f. 39.

In nemoribus subhumidis, inque pratis fre- quens. e. g. *Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald &c.* Vere.

Hypnum. *Dill.* t. 38. f. 38, nondum legi, & differe videtur.

953. *HYPNUM purum* surculis ramoso pinnatis, apice subulatis, foliis ovatis obtusis dense im- bricatis; thecis oblongis: operculis acu- minatis.

Hypnum purum surculis pinnato-sparsis subula- tis, foliis ovatis obtusis conniventibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 497.

Hypnum purum surculo adscendente ramoso se- tifero: ramis incurvo-subulatis teretibus, fo- liis conniventibus, obtusis, mucronatis.

Necker method. 160. n. 11.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens.

Hyeme.

954. *HYPNUM illecebrum* surculis ramoso-pinnatis suberectis, apice obtusis, foliis oblongis obtusis mucronatis, dense imbricatis.

Hypnum illecebrum surculis ramisque vagis teretibus erectiusculis obtusis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 498.

Hypnum illecebrum surculo vago procumbente, ramis teretibus arcte imbricatis, foliis concavis obtusis, mucrone terminali. *Necker method. 178.* n. 34.

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel, Papenbergen & alibi passim, sed semper absque thecis.

955. *HYPNUM Schreberi* surculis pinnato-ramosis apice subulatis, foliis oblongis acutis, laxe imbricatis; thecis oblongis; operculis conicis.

Hypnum compressum ramis apice attenuatis, foliis ovato-lanceolatis, setis elongatis, capsulis inclinatis, operculo conico. *Schreb. spicil. 96.* n. 1067.

Hypnum compressum surculo eretto, ramoso, ramis basi setiferis, planis recurviusculis, stipite triplo brevioribus. *Necker meth. 159.* n. 10.

Hypnum cupressiforme tenius & compressius.

Dill musc. 312. t. 40. fig. 47.

Im Thiergarten, Jungfernheide &c. frequens.

Hyeme.

Non confundendum cum Hypno compresso Linnei.

956. *Hypnum cuspidatum* surculis pinnato-ramo-
sis apice longe cuspidatis, foliis oblongo-acu-
minatis; thecis cylindraceis: operculis conicis.

Hypnum cuspidatum surculis vagis: apice foliis
convolutis acuminatis. *Lin. syst. ed. R. 4.*
p. 499.

Hypnum cuspidatum surculo erectiusculo, ramis
summis pungenti-cuspidatis, setis axillaribus
longissimis. *Necker method. 163.* n. 16.

Locis udis nemorosis inque pratis abunde. Vere.

* * * *Surculis vagis.*

957. *Hypnum fluitans* surculis ramosis vagis, fo-
liis ovatis acutis patulis; thecis oblongis obli-
quis: operculis conicis.

Hypnum fluitans foliis lanceolatis alternis remo-
tis. *Schreb. spicil. 92.* n. 1060. *Weiss. crypt.*
p. 226.

Hypnum fluitans surculo longissimo, ramoso, fo-
liis inferioribus lanceolatis, remotis: supe-
rioribus approximatis, imbricato-patulis.
Necker method. musc. 185. n. 42.

α. ramis longissimis apice acutis.

Hypnum erectum f. *fluitans*, foliis oblongis,
acutis perangustis. *Dill musc. 299.* tab. 38.
fig. 33.

β. surculis ramisque minoribus.

Varietas α. in lacu horti botanici prope Schoene-
berg & β. in arborum truncis, locis humidis
in der Jungfernheide. Vere.

Semel varietatem β. cum theca adhuc immatura inveni, cuius descriptionem addam. Perichaetii folia erant oblonga apice setacea. Seta uncialis rubra filiformis. Theca oblonga obliqua; operculum conicum obtusum.

958. *Hypnum rutabulum* furculis ramosis vagis, foliis ovatis acutis, mucronatis patulis; thecis oblongis obliquis: operculis conicis acutis.

Hypnum rutabulum ramis vagis subrepentibus, foliis ovatis mucronatis imbricatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 488.

Hypnum rutabulum ramis vagis erectiusculis, foliis ovatis acutis mucronatis patulis, operculis conicis. *Schreb. spicil. 90.* n. 1057.

Hypnum dentatum vulgatissimum, operculis obtusis. *Dill. musc.* 295. t. 38. f. 29.

In arborum truncis, sepibus & alibi copiosissime. Hyeme.

Valde variat.

959. *Hypnum striatum* furculis ramosis vagis, foliis ovatis acutis patulis; thecis oblongis obliquis: operculo mucronato, mucrone incurvo.

Hypnum striatum ramis vagis recurvis, foliis ovatis lineatis acutis undique patentibus, operculis mucronatis. *Schreb. spicil. 91.* n. 1058.

Hypnum vulgare dentatum, operculis cuspidatis. *Dill. musc.* 297. t. 38. f. 30.

In der Jungfernhede, Papenbergen &c. infrequens.

Vere.

960. *Hypnum velutinum* surculis ramosis repentibus, foliis ovatis acuminatis; thecis oblongis: operculis conicis obtusis.

Hypnum velutinum surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris subnuntantibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 500.

Hypnum velutinum reptans, ramis erectis teretibus seta duplo brevioribus, capitulis ovatis subcernuis. *Necker method. 172.* n. 26.

In arborum truncis passim. e. g. *in der Jungfernheide*, prope *Tegel*, *Puppenbergen* &c. Vere.

961. *Hypnum intricatum* surculis ramosis, ramis brevibus, foliis lanceolatis acutis patulis; thecis oblongis obliquis: operculis conicis acutis.

Hypnum intricatum? surculis repentibus, ramis brevibus: foliis laxis lanceolatis acuminatis, capsulis obliquis cernuis mucrone obliquo. *Schreb. spicil. 99.* n. 1072.

In fossis exsiccatis, arborum truncis *in der Jungfernheide*, *Thiergarten* & alibi frequens. Vere.

Convenit cum *Hyp. intricato Schreberi*, sed mucronem in operculo nunquam vidi. Operculi semper conici acuti, in speciminibus a me per-scrutatis, erant.

BRYUM. *Lin. gen. 1311.*

♂. ♀. *Mascul.* flos capituliformis. *Peristoma extern.* dentibus 16 acutis: *inter.* e membrana carinata ciliis difformibus.

962. *BRYUM androgynum* surculo ramoso erecto,
foliis lanceolatis patulis; thecis cylindricis:
operculis acuminatis, seta terminali.

Mnium androgynum caule ramoso, androgynum.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 458.

Mnium angustifolium capitulo pulverifero ovato,
glabro: foliato, globofo, surculis simplicibus
ramosisque. *Necker method. 234.* n. 2.

Mnium perangustis & brevibus foliis. *Dill. musc.*
230. t. 31. f. 1.

Im Thiergarten, Grunewald, Jungfernheide &c.
ad arborum radices passim. Hyeme & vere.

963. *BRYUM argenteum* surculo ramoso, erecto,
foliis oblongis apice subulatis, dense imbrica-
tis; thecis nutantibus oblongis: operculis
convexis, seta axillari.

Bryum argenteum antheris pendulis, surculis cy-
lindricis imbricatis laevibus. *Lin. syst. ed. R.*
4. p. 479.

Bryum argenteum surculo nitido arcte imbricato,
foliis ovatis concavis, capitulis ovatis nutan-
tibus, stipite subradicali. *Necker method. 201.*
n. 10.

In tegulis, tectis, sepibus, hortis, agris, nemo-
ribusque copiose. Vere.

964. *BRYUM fissum* surculis repentibus subsimpli-
cibus, foliis distichis trapeziformibus, apice
bifidis.

Mnium fissum foliis distichis bifidis. *Lin. syst. ed.*
R. 4. p. 470.

Mnium trichomanis surculo repente pennato apice globulifero, foliis bidentatis. *Necker method.*

236. n. 5.

Jungermannia fissa. *Scop. carn. ed. 2. n. 1345.*

Im Thiergarten & Jungfernheide in fossis frequens.

Fructificationes nondum vidi.

MNIUM. *Lin. gen. 1310.*

♂.. ♀. *Mascul.* *flos disciformis.* *Peristoma exterum* dentibus 16 acutis; *intern.* e membrana ciliis difformibus.

965. *Mnium fontanum* surculo subramoso eretto, foliis lanceolatis, apice setaceis incurvis; thecis subrotundis obliquis, operculo conico umbilicato obtuso.

Mnium fontanum caule simplici geniculis inflexis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 459.

Bryum fontanum surculo simplici tereti, capitulis obliquis subrotundis. *Necker method.* 209.

n. 21.

Bryum palustre scapis teretibus, stellatis, capsulis magnis, subrotundis. *Dill. musc. 340.*

t. 44. f. 2.

In der Jungfernheide rarius. Majo. Junio.

966. *Mnium palustre* surculo ramoso dichotomo, foliis subulatis acutis carinatis; thecis oblongis: operculis conicis.

Mnium palustre caule dichotomo, foliis subulatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 459.*

Bryum palustre surculo erecto dichotomo, stipitibus axillaribus capituliferis, capsulis obliquis. *Necker method.* 210. n. 22.

Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis.

Dill. musc. 233. t. 31. f. 3.

In der Jungfernheide & prope Spandau rarius.

Majo.

967. *Mnium hornum* surculo subsimplici, foliis oblongis obtusiusculis; thecis oblongis nutantibus: operculis convexis: calyptaris rectis.

Mnium hornum antheris pendulis, pedunculo curvato, surculo simplici, foliolis margine scabris. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 462.

Bryum hornum surculo capitulifero ramosiusculo: stellifero simplici, primordialibus plumosiss. *Necker method.* 215. n. 26.

Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis nutantibus. *Dill. musc.* 402. t. 51. f. 71.

In der Jungfernheide passim. Aprili. Majo.

968. *Mnium crudum* surculo simplici, foliis lanceolatis acutis; thecis nutantibus ovatis: operculis conicis: calyptaris recurvatis.

Mnium crudum antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 463.

Bryum crudum surculo simplici, capitulis nutantibus, foliis intermediis latioribus: summis linearibus. *Necker method.* 223. n. 34.

Bryum pendulum molle, foliis lanceolatis & gramineis. *Dill. musc.* 401. t. 51. f. 70.

Iisdem locis, eodemque tempore rarius.

969. *MNIUM serpillifolium* surculo simplici, foliis obovatis obtusis; thecis nutantibus ovatis: operculis conicis acutis,

Mnium serpillifolium pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Lin. syst. ed. R. 4* p. 467. *a. punctatum.*

Bryum punctatum capsulis cernuis, pedunculis aggregatis, foliis obovatis integerrimis obtusis punctatis. *Schreb. spicil.* 89. n. 755.

Bryum serpillifolium surculo simplici sculo, capitulis subaggregatis cernuis, foliis obovatis, obtusis, nitidis, integerrimis. *Necker method.* 216. n. 27.

Bryum pendulum, serpilli folio rotundiore pellicido, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 416. t. 53. fig. 81.

In nemoribus umbrosis fossis subhumidis frequens. Vere.

Variat pedunculis solitariis & aggregatis, & surculo fructificante erecto, sterili repente.

970. *MNIUM cuspidatum* surculo subsimplici, foliis ovatis acutis serratis; thecis nutantibus oblongis: operculis convexis.

Mnium serpillifolium *s. cuspidatum.* *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 467.

Bryum cuspidatum capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis ovatis acutis ferratis.
Schreb. spicil. 84. n. 1049.

Bryum polymorphum surculo reptante pennato: capitulifero erecto; simplici, foliis mucronatis ferratis. Necker method. 218. n. 29.

Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. Dill. musc. 413. t. 53. f. 79.

In Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens. Vere.

Variat surculis sterilibus reptantibus & erectis, apice ramosos emittens surculos; fructificantibus setis solitariis ac aggregatis. Folia mucrone donata sunt.

971. *Mnium roseum* surculo simplici proliferō, foliis oblongis acutis; thecis nutantibus oblongis: operculis convexis.

Mnium serpillifolium γ. *proliferum*. Lin. syst. ed. R. 4. p. 468.

Mnium roseum surculis simplicibus & proliferis, foliis rosaceo congestis, lanceolatis, acutis, tenuissime argute crenulatis, pedunculis aggregatis. Weiss. crypt. 157.

Bryum roseum capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis lanceolatis acutis. Schreb. spicil. 84. n. 1048.

Bryum stellare roseum majus, capsulis ovatis pendulis. Dill. musc. 411. t. 52. f. 77.

Im Grunewald, Jungfernheide, Papenbergen & alibi locis umbrosis passim. Vere.

Surculi steriles non repentes.

972. *MNIUM ligulatum* surculo subsimplici, foliis oblongo-lanceolatis ferrulatis, undulatisque; thecis nutantibus oblongis: operculis convexis.

Mnium serpillifolium d. *undulatum*. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 468.

Mnium undulatum surculis erectis, ramis fasciculatis, foliolis ellipticis, undulatis, argute dentatis; pedunculis aggregatis. *Weiss. crypt.*

158.

Bryum ligulatum capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis ferrulatis.

Schreb. spicil. 84. n. 753.

Bryum dendroides. *Necker method. 218. n. 28.*

Bryum dendroides polycephalon, phyllitidis folio undulato pellucido, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc. 410. t. 52. f. 76.*

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald, prope Tegel & alibi in pratis frequens. Vere.

Variat surculis simplicibus & apice ramosis.

973. *MNIUM cespititium* surculis subramosis, ramis brevissimis, foliis lanceolatis apice setaceis; thecis ovatis nutantibus: operculis convexis.

Bryum caespititium antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-setaceis, pedunculis longissimis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 180.*

Bryum caespititium foliis lanceolatis acuminatis, nitidis, stipite subradicali, capitulis ovatis obtusis. *Necker method.* 228. n. 40.

Bryum pendulum ovatum caespititium pilosum-que seta bicolori. *Dill musc.* 396. t. 50. f. 66.

In der Jungfernheide, Thiergarten & alibi in locis graminosis siccis frequent. Martio, Aprili.

KOEHLREUTERA. *Hedwig musc.* 2. p. 95.

♂—♀. *Mascul.* flos disciformis. *Peristoma exteru.* dentibus 16. apice cohaerentibus obliquis: *intern.* cilia totidem membranacea plana.

974. KOEHLREUTERA *hygrometrica* surculo subsimplici, foliis oblongis acuminatis, thecis ovatis nutantibus: operculis planis.

Mnium hygrometricum acaule, anthera nutante, calyptora reflexa tetragona, *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 460.

Bryum hygrometricum acaule, capitulis turbinateis, obtusis siccitate tetragonis, seta arcuata, primordialibus aggregatis. *Necker method.* 221. n. 31.

In fossis umbrosis humidis abunde. Martio. Aprili.

WEBERA. *Hedwig musc.* 2. p. 95. n. 22.

♀. *Peristoma extern.* dentibus 16. acuminatis: *intern.* membranaceo carinato, cum & absque ciliis.

975. WEBERA *pomiformis* surculo ramoſo, foliis linearī-lanceolatis ſeta terminatis, imbricatopatulis; thecis ſphaericis: operculo plano.

Bryum pomiforme antheris erectis ſphaericis. *Lin.*

Syst. ed. R. 4. p. 473.

Bryum pomiforme surculo eretto, capitulis laterilibus globofolis. *Necker method. 208.* n. 19.

Inter Charlottenburg & Spandau in colle oviariam
versus rarius. Vere.

976. WEBERA *pyriformis* surculo subsimplici foliis linearibus; thecis pyriformibus nutantibus: operculis conicis.

Webera pyriformis caule simpliciſſimo, foliis perichaetii capillaribus longiſſimis recurvis, capsula pyriformi. *Hedwig stirp. I. fascicul. 1.*
p. 5. t. 3.

Minium pyriforme antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, floribus femineis ſetiferis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 464.

In der Jungfernheide rarius. Junio.

977. WEBERA *nutans* surculo simplici, foliis ovato-lanceolatis conniventibus; thecis cylindraceis: operculis conicis mucronatis.

Webera nutans foliis lanceolatis, capsulis oblongis nutantibus. *Hedwig stirp. I. fascicul. 1.*
pag. 9. tab. 4.

Bryum nutans foliis lanceolatis subulatis, capsulis urceolatis cernuis, operculo conico. *Schreb.*

*In der Jungfernheide & alibi passim. Majo.
Junio.*

BUXBAUMIA. *Lin. gen. 1307.*

♂—♀. *Mascul. flos discoideus. Peristoma externum
dentibus 16. truncatis; internum membranaceo
plicatum.*

978. BUXBAUMIA *aphylla* furculis foliisque nullis;
theca ovata dimidiata: operculo conico oblique.

Buxbaumia aphylla. Lin. syst. ed. R. 4. p. 453.

Buxbaumia caulescens bulbo villis tecto. *Schmidel
diss. de Buxb. 25. n. 1.*

In sylvis aceriosis declivis & fossis exsiccatis, e. g.
in der Jungfernheide, prope *Tegel* & alibi
frequens. Per hyemem.

979. BUXBAUMIA *foliosa* furculo nullo, foliis linearibus obtusis; theca sessili ovata dimidiata: operculo conico obliquo.

Buxbaumia foliosa acaulis, capsula subsessili, foliis cincta. Lin. jun. Diss. Method. muscillast. 33. tab. I. f. 4. a. b.

*Buxbaumia sessilis. Schmidel Diss. de Buxb. 26.
n. 2.*

Bryum hallerianum acaule, capitulis sessilibus, foliis extimis patentibus obtusis: intimis erectis mucronatis. *Necker method. 233.
n. 44.*

Sphagnum acaulon maximum foliis in centro ci-
liaribus. *Dill. musc. 253. t. 22. f. 12.*

Webera diphyscium. Ehrhart hanoev. Magaz. 1779.

17. Stück pag. 257.

In ericetis der Jungfernheide rarius. Hyeme.

Folia perichaetii aristata.

FONTINALIS. *Lin. gen. 1306.*

♂—♀. *Mascul.* *flos* gemmiformis. *Peristoma ext. tern.* dentibus 16, *intern.* reticulatum.

980. **FONTINALIS antipyretica** surculo ramoso vago, foliis lanceolatis laxe imbricatis; thecis subcylindricis: operculis planis mucronatis.

Fontinalis antipyretica foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Lin. lyft. ed. R. 4. p. 451.*

Hypnum antipyreticum surculis trifariis, capitulis subsessilibus axillaribus; primordialibus oblongis teretibus. *Necker method. 191, n. 48.*

In aquis hinter Spandau passim.

Rarius cum thecis.

MEESIA. *Hedwig musc. 2. p. 97. n. 25.*

♀ — ♂ — ♀. *Mascul.* *flos* disciformis. *Peristoma ext. tern.* dentibus 16. curtis; *intern.* reticulatum,

981. **MEESIA longiseta** surculo ramoso, foliis lanceolatis acutis carinatis patulis; thecis obliquis oblongo-cylindricis: operculis conicis.

Meesia longiseta foliis ovato-lanceolatis patulis; theca cernua in pedunculo praelongo: operculo conico. *Hedwig stirp. I. fasc. 3. pag. 56.*

Mnium triquetrum foliis trifariis patulis, subulato-lanceolatis carinatis, *Lin. spec. II.* p. 1578. (exclusis synonymis ac varietatibus.) *Pollich pal. 3.* p. 70. (optima descriptio, ast synonima falsa.)

In turfosis humidis, *in der Jungfernheide* haud procul venatorem *Philipp* frequens, & prope *Spandau* passim. Majo. Junio.

982. *MEESIA uliginosa* surculo subsimplici, foliis oblongo-lanceolatis obtusis; thecis obliquis pyriformibus: operculis conicis umbilicatis.

Meesia uliginosa foliis linearis ligulatis, obtusis, capsula pyriformi cernua. *Hedwig stirp. I. fasc. 1.* p. 1. t. 1 & 2.

Bryum trichodes antheris erectiusculis: ore ciliato absque annulo, pedunculo longissimo. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 478.

In der Jungfernheide rarius. Majo.

983. *MEESIA nutans* surculo subramoso, foliis ovatis acutis; thecis pyriformibus nutantibus: operculo convexo.

Mnium triquetrum γ. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 469.

Bryum triquetrum γ. *Huds. angl. 2.* p. 491.

Bryum palustre complicatum rubens, capsulis turbinatis pendulis. *Dill musc. 406.* t. 51. f. 74.

Cum *Marsilea* natante, & *Leskia marchica* ad *Spandau* in ligno natante putrido. Junio.

B. HEPATICI.

JUNGERMANNIA. Lin. gen. 1313.

♂—♀. Capsula 4 valvis. Semina filo instructa.

* Frondibus pinnatis secundis.

984. JUNGERMANNIA *asplenoides* frondibus simpliciter pinnatis, foliolis ovatis subciliatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 503.

Jungermannia foliis pinnatis, subrotundis, serratis, apice floriferis. Hall. helv. n. 1868.

Lichenastrum *asplenii* facie, pinnis laxioribus.

Dill musc. 482. t. 69. f. 5.

In den Papenbergen rarius.

Capsulas nondum vidi.

985. JUNGERMANNIA *lanceolata* frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis, apice floriferis, foliolis integerrimis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 504.

Jungermannia foliis pinnatis ovatis confertis, ex apice florifera. Hall. helv. n. 1871.

Lichenastrum *trichomanis* facie minus, ab extremitate florens. Dill musc. 486. t. 70. f. 10. e.

In fossis exsiccatis in der Jungfernheide & versus Tegel passim. Vere.

986. JUNGERMANNIA *bidentata* frondibus simpliciter pinnatis, foliis bidentatis; capsulis terminalibus.

Jungermannia *bidentata* frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 505.

Jungermannia bidentata surculis procumbentibus ramosis, apice floriferis, foliis ovatis bicuspидatis, stipulis lanceolatis quadridentatibus.
Schreb. spicil. 104. n. 1081.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi in fossis exsiccatis frequens.

987. JUNGERMANNIA *bicuspidata* frondibus simpliciter pinnatis, foliis bicuspidiatis, medio capsuliferis.

Jungermannia bicuspidata frondibus simpliciter pinnatis medio floriferis, foliolis bidentatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 505.

Jungermannia bicuspidata surculo procumbente, foliis distichis quadratis bidentatis, stipulis nullis. Schreb. spicil. 105. n. 1082.

Cum praecedenti in fossis frequens.

*** *Frondibus imbricatis.*

988. JUNGERMANNIA *complanata* surculis repentibus: foliis inferne auriculatis duplicato imbricatis, ramis aequalibus. Liu. syst. ed. R. 4. p. 509.

Jungermannia complanata surculo reptante, foliis subrotundis serie dupli ordinatis, subtus appendiculatis; vaginis ramorum plano-truncatis. Necker method. 142. n. 21.

In fagorum truncis im Thiergarten, & alibi frequens. Hyeme & vere.

989. JUNGERMANNIA *dilatata* surculis repentibus foliis inferne auriculatis duplicato im-

bricatis, ramis apice latioribus. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 509.

Jungermannia dilatata surculo reptante imbricato, foliis serie dupli orbiculatis: ramorum apice latiusculo. *Necker method. 140. n. 19.*

In arboribus iunioribus *im Thiergarten & alibi copiose.* Vere.

990. *JUNGERMANNIA tamariscifolia* surculis decompositis apice floriferis, foliis subrotundis subtus auriculatis, stipulis ovatis emarginatis. *Schreb. spicil. 108. n. 1086.*

Jungermannia tamarisci foliis imbricatis serie dupli: superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo-majoribus. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 510.

In fagorum truncis passim. Vere.

991. *JUNGERMANNIA platiphylla* surculis procumbentibus subtus imbricatis, foliis cordatis acutis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 510.*

Jungermannia platiphylla surculo decumbente imbricato, appendicibus subtus ordine dupli cordatis acutis. *Necker method. 142. n. 22.*

In fagorum truncis *im Thiergarten & prope Spandau rarius.*

In hac & praecedenti specie capsulas haud vidi.

992. *JUNGERMANNIA pulcherrima* surculis erecti usculis confertis, foliis ovatis imbricatis subbifidis ciliatis. *Lin. jun. Diss. Method. musc.*

Jungermannia pulcherrima surculis erectiusculis,
foliis duplicato imbricatis inferne auriculatis,
ciliatis: ciliis articulatis. *Weber spicil. fl. goett.*

214.

Lichenastrum scorpioides pulchrum villosum.

Dill. musc. 811. t. 69. f. 3. (non optima.)

In der Jungfernheide inter muscos, praecipue
inter *Dicranum scoparium* passim.

Nondum capsulas observavi.

*** *Acaules frondibus simplicibus.*

993. JUNGERMANNIA *epiphylla* acaulis, foliolo
frondi innato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 513.*

Jungermannia epiphylla sublobata apice latior
capitulo globoſo: primordialibus frondosis
obtusissimis marginalibus. *Necker method.*

127. n. 2.

Im Grunewald & Jungferuheide in fossis umbrosis
subhumidis frequens. Aprili, Majo.

994. JUNGERMANNIA *pinguis* acaulis, fronde
oblonga sinuata pinguis. *Lin. syst. ed. R. 4.*
p. 513.

Jungermannia foliosa lacera, ex oris florifera.

Hall. helv. n. 1884.

Jungermannia pinguis sinuata, obtusiuscula ex
lateribus capitulifera: primordialibus convo-
lutis linearibus frondosis. *Necker method.*

126. n. 1.

Cum praecedenti in fossis, ast rarius, semper
absque capsulis.

995. *JUNGERMANNIA furcata* acaulis, fronde linearie ramosa: extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 514.

Jungermannia foliis linearibus dichotomis, inferne florifera. *Hall. helv. 1885.*

Jungermannia furcata linear-ramosa, dichotoma basi capitulifera: primordialibus frondosis terminalibus. *Necker method.* p. 128. n. 3.

In fossis subudis inque arborum truncis *in der Jungfernheide* passim.

Semper absque capsulis vidi.

MARCHANTIA. *Lin. gen. 1315.*

♂—♀. *Receptaculum* peltatum inferne seminiferum. *Cyathi vivipari.*

996. *MARCHANTIA polymorpha* foliis obtuse lobatis; receptaculis planis, orbiculatis.

Marchantia polymorpha calyce communi decemfido. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 515.

α. Receptaculis decem vel duodecimfidis, laciniis liberis, linearibus.

Marchantia stellata pileus laciniatus: laciniis teretiuseculis, apice dilatatis, sub quibus globuli pilosi. *Scop. carn. ed. 2. n. 1354.*

Lichenis fontani majoris, & domestici minoris Varietates. *Dill. musc.* p. 523. 527. *tab. 76.* fig. 6. E. F. *Tab. 77. fig. 7.* B. C. E.

β. Receptaculis decemfidis, laciniis conjunctis, oblongis, obtusis.

Marchantia umbellata pileus planus, crenulatus,
sub quo globuli imherbes. *Scop. carn. ed. 2.*
n. 1355.

Lichenis fontani majoris, & domestici minoris
Varietates umbellatae. *Dill. musc. 523. 527.*
tab. 76. fig. 6. A. B. C. D. tab. 77. fig. 7. A. D.
Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald, pro-
pe Tegel & alibi, in fossis humidis umbrosis
copiose. Hyeme & vere.

Celeber. Scopoli varietates nostras ♂ & ♀. distin-
guit, sed ut videtur una in alteram sensim
transfeit.

ALGAE.

a. Terrestres.

RICCIA. *Lin. gen. 1317.*

♂ — ♀. *Capsulae* subrotundae in superficie
frondis.

997. **RICCIA crystallina** frondibus superficie pa-
pillosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 519.*

*Riccia fronde reticulata aequabili, lobis denticu-
latis, obtusis, simplicibus, & cordatis. Hall.
helv. n. 1896.*

Lichen palustris, rutae folio. Dill. musc. 355.
t. 78. f. 12.

Locis humidis in via versus Pancko passim.
Vere.

998. **RICCIA glauca** frondibus glabris canaliculis
bilobis obtusis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 520.*

Riccia fronde fulco divisa, lobis bifurcatis, lobulis lanceolatis obtusis. *Hall. helv.* 1897.

Lichen minimus, foliis venosis bifariam, vel trifariam dividendo progredientibus. *Dill. musc.* 533. t. 78. f. 10.

In der Jungfernheide versus Tegel rarius. Autumno.

999. *RICCIA fluitans* frondibus dichotomis linearifiliformibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 520.

Riccia fluitans fronde dichotoma linear-ramosa, plana: primordialibus obtusis. *Necker method.* 41. n. 1.

Lichenastrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum. *Dill. musc.* 231. t. 74. f. 47.

Prope Tegel in palude bei der Schencke frequens. Vere & autumno.

ANTHOCEROS. *Lin. gen.* 1318.

♂—♀. *Capsula linearis bivalvis. Semina dissepi-*mento adhaerentia.

1000. *ANTHOCEROS punctatus* frondibus sinuat-
is, crispis punctatis.

Anthoceros punctatus frondibus indivisis sinuatis
punctatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 521.

Anthoceros foliis minoribus, magis laciniatis.
Dill. musc. 476. t. 68. f. 1.

In fossis umbrosis im Thiergarten passim.
Martio.

1001. *ANTHOCEROS laevis* frondibus sinuatis
laevis.

Anthoceros laevis frondibus indivisis sinuatis lae-
vibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 522.

Anthoceros laevis fronde sinuata integra obtusa.
Necker method. 44. n. 3.

Anthoceros foliis majoribus, minus laciniatis.

Dill. musc. 476. t. 68. f. 2.

Cum praecedenti eodem tempore.

PELTIGERA.

Receptaculum seminum oblongum peltiforme.

1002. *PELTIGERA aphtosa* fronde obtuse lobata,
superne verrucosa, inferne alba villosa.

Lichen aphtosus coriaceus repens lobatus obtusus
planus, verrucis sparsis, pelta marginali ad-
scendente. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 544.

Lichen aphtosus fronde lobata repente supra ver-
rucata: peltis oblongis marginalibus adcen-
dentibus. *Necker method. 80.* n. 46.

In der Jungfernheide rarius. Hyeme.

1003. *PELTIGERA canina* fronde obtuse lobata,
subtus venoso-villosa, peltis oblongis adcen-
dentibus.

Lichen caninus coriaceus repens lobatus, obtusus
planus subtus venosus villosus, pelta marginali
adscendente. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 535.

α. *Lichen caninus* fronde simplici obtusa sinuato-
lobata, subtus venoso-villosa: peltis ovalibus
adscendentibus. *Necker method. 79.* n. 44.

$\beta.$ *Lichen ruffescens* fronde lobata obtusa, avenia
marginē sinuata subtus villosa, peltis subro-
tundis. *Necker method.* 79. n. 45.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald &
alibi copiose. $\alpha.$ rarius. Hyeme.

Offic. Musci canini herba.

$\alpha.$ superne venosa; $\beta.$ vero absque venis superne
est. Num specie differunt?

LICHEN. *Lin. gen.* 1319.

Receptaculum seminum subrotundum subcon-
vexum, saepius marginatum, scutiforme.

* *Crustacei.*

1004. LICHEN aurantiacus leporosus, albido-ci-
nereus, scutellis aurantiacis. *Hoffmann lich.*
n. 55. *Lightfoot scot.* 2. p. 810. n. 19.

In sepibus, truncisque arborum, praecipue Po-
puli tremulae. Passim omni tempore.

Crusta in nostro vix conspicua cinerea.

1005. LICHEN subfuscus crustaceus albicans, scu-
tellis subfuscis: margine cinereo subcrenato.
Hoffmann lich. 51. n. 67. t. 5. f. 3. *Lin. spec.*
pl. 2. p. 1601.

$\beta.$ minor crusta subcinerea, scutellae margine
albo integerrimo. *Hoff. l. c.*

$\gamma.$ crusta cinerea scutellae lutescens tenuissime
marginatae. *Ibid. l. c.*

In truncis fagorum im Thiergarten, Falkenhagen
& alibi frequens. Omni tempore.

1006. LICHEN ater crustaceus albicans rugosus, scutellis atris margine albo subcrenato. Huds. angl. ed. 2. p. 530. n. 32. Hoffmann lich. n. 68.

Lichen subfuscus crustaceus albicans, scutellis nigris: iunioribus arceolatis cavis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 530.

In fagorum cortice, inque lapidibus magnis passim. Omni tempore.

1007. LICHEN pallescens crustaceus albicans, scutellis pallidis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 529.

In arborum cortice praecipue salicum copiose.

Crusta grisea tenuissima. Scutellae juniores convexae virides, postea pallide flavescentes, denique fuscae planae. Celeber. Schreber hanc speciem cum *murali* suo conjungit, a quo tam longe diversus. In *L. murali* crista semper margine foliacea est, ast in hac specie nunquam foliola marginalia observantur. Longissime ab illo differt *Lichen pallidus* & *pallescens Hoffmanni*.

1008. LICHEN angulosus crustaceus albidus, scutellis confertis albidis in tubercula demum abeuntibus. Schreb. spicil. 136. n. 1137.

In arborum cortice frequens.

Scutellae admodum confertae, ut mutua pressione angulosae videantur.

1009. LICHEN androgynis crustaceus albicans, tuberculis pulverulentis, scutellis pallidis: mar-

gine albo, crenulato-pulverulento. Hoffmann lich. n. 70. t. 7. fig. 3.

In arborum truncis *in den Papenbergen & prope Falkenhagen* rarius. Hyeme.

Crusta obscure grisea tuberculis & scutellis ob-sita. *Tubercula subpedunculata* albido-cinerea pulverulenta. *Scutellae spadiceae* margine griseo crenulato, juniores margine crassiore integro.

* * *Crustacei imbricati.*

1010. *LICHEN candelarius* crustaceus flavus, scutellis luteis. Lin. Syst. ed. R. 4. p. 528. Hoffmann lich. n. 72. t. 9. f. 3.

Lichen fulvus fronde subrotunda : germinante asperiuscula, primordialibus nudis crustaceo-pulverulentis. Necker method. 51. n. 12.

In tectis, muris antiquis, lapidibus, sepibusque frequens.

1011. *LICHEN muralis imbricatus* flavo-virescens, scutellis concoloribus demum lutescentibus: margine pallido. Schreb. spicil. 130. n. 126. Hoffmann lich. n. 81. t. 11. f. 1.

In asseribus, trabibus, tectis, tegulis, lapidi-busque copiose.

Interdum *crusta marginalis* foliacea evanescit, & tunc *Lich. palescenti* simillimus, verumtamen figura orbiculari facillime distingendus.

1012. *LICHEN granosus imbricatus* : foliolis ob-longis lobatis, incisis, cinereis, laevibus, scu-

tellis nigris margine crenulato. *Schreb. spicil.*

128. n. 1122.

In salicibus aliisque arboribus ad *Spandau* passim.
Scutellae in disco confertae, & acervatae, juniores
margine tumido, adultiores margine crenato,
granulae griseae saepius inter illas, interdumque
in margine scutellarum ipso ob-servantur.

1013. LICHEN *crispus* imbricatus; foliis lobatis
truncatis crenatis atro viridibus, scutellis con-
coloribus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 533.

Lichen crispus gelatinosus, foliis imbricatis loba-
tis truncatis crenatis atroviridibus, scutellis
crenulatis. *Schreb. spicil. 127.* n. 1121.

Lichen murorum fronde imbricata: frondulis ex-
timis latioribus obtuse crenatis, scutellis con-
coloribus. *Necker method. 85.* n. 53.

Locis nudis circum *quercus magnas* in der Jung-
fernheide rarius. *Hyeme & vere.*

Madidus gelatinosus est, siccus vero calcarens.

Scutellae badiae.

*** *Imbricati foliacei.*

1014. LICHEN *stellaris* imbricatus: foliolis ob-
longis laciniatis angustis cinereis, *Lin. syst. ed.*
R. 4. p. 535.

♂. laciniis angustioribus scutellis cinerascentibus.

♀. pulverulentus.

In arborum truncis ramisque, & asseribus fre-
quens. *Hyeme.*

1015. LICHEN *pulverulentus imbricatus*; foliolis lobatis crenatis obtusis viridibus, polline conspersis, scutellis nigris margine crenatis.
Screb. spicil. 128. n. 1123.

In truncis arborum praecipue salicum inque se-
pibus frequens.

Celebcr. Hoffmann cum L. omphalode perperam
conjunxit.

Scutellae nigrae pulvere griseo testae, margo ere-
nulatus pulverulentus.

1016. LICHEN *centrifugus imbricatus*, foliolis ob-
solete multifidis laevibus albidis centrifugis,
scutellis rufo fuscis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 531.
Hoffmann lich. n. 95. t. 10. f. 3.

Lichen centrifugus fronde germinante pulveru-
 lenta, subrotunda subtus villoso-atra: frondul-
 lis interioribus centrifugis. *Necker method.*
 99. n. 67.

β. fronde pulverulenta viridi.

In lapidibus terminalibus majoribus *hinter Span-*
dau rarius.

1017. LICHEN *caperatus pallide viridis*, rugosus,
 margine undulatus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 342.*

Lichen caperatus fronde juniori supra rugosiuscu-
 la: germinante pulverulenta, frondulis exti-
 mis laevibus, latioribus obtusis. *Necker me-*
thod. 95. n. 64.

In truncis quercuum *im Thiergarten & alibi pas-*
 sim. Vere.

Scutellas rarissime observavi, semel unicam vidi,
color illius erat spadiceus, ceterum iis praecedentis speciei similis.

1018. *LICHEN quercinus* frondibus obtuse lobatis
glaucis glabris; scutellis badiis margine
crenato.

Sub ramulis quercuum annosarum *im Thiergarten*&
prope Tegel rarius. Hyeme & vere.

Frons oblonga, subimbricata, glabra, albogrisea, vel glauca, plana, ligno arête adpressa, lobi bifidi obtusissimi & brevissimi; frons subtus nigerrimis atque brevissimis radiculis dense obsita. Scutellae in disco frequentes, ad marginem versus parciores, badiae planae, marginatae, orenatae. TAB. VII. fig. 13.

Non confundendus cum *Lichene querno Dicksoni*.

Similis *Licheni Burgessii* a quo differt:

- 1) scutellis sessilibus nudis.
- 2) fronde adpressa adiaphana.

a *Lichene saxatili* differt:

- 1) fronde adpressa, nec lacunosa.
- 2) margine scutellarum crenato.

1019. *LICHEN saxatilis* imbricatus, foliolis sinuatibus scabris lacunosis, scutellis badiis. *Lin, syst. ed. R. 4. p. 572.*

Lichen saxatilis fronde lacunata laevi scutellifera: germinante asperiuscula, primordialibus pulverulentis. *Necker method. 90. n. 59.*

Lichenoides vulgarissimum cinereo-glaucum lacunosum & cirrhosum. *Dill. musc. 188. t. 24. f. 83.*

In arboribus copiosissime, rarius in lapidibus.
Scutellae rarissime reperiuntur.

1020. *Lichen physodes imbricatus*, laciniis angustis apice inflatis; scutellis pedicellatis.

Lichen physodes imbricatus: laciniis subinflatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 534.

Lichen physodes fronde scutellifera laevi: frondulis subtubulosis apice dilatiusculis fariniferis.

Necker method. 91. n. 60.

Lichen laciatus $\beta.$ *physodes.* *Weiss. crypt. 57.*

In arborum truncis frequens. *Hyeme.*

Diverfissimus a praecedenti:

1) laciniis apice inflatis.

2) scutellis pedicellatis, quae in praecedenti sessiles.

1021. *Lichen parietinus imbricatus*, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 534.*

Lichen fronde rugosa, rotunde lobata, flava concolore. *Hall. helv. n. 2021.*

In arborum truncis, sepibusque copiosissime.

1022. *Lichen olivaceus imbricatus*, foliolis lobatis nitidis olivaceis, scutellis crenatis. *Schreb. spicil. 131. n. 1128.*

Lichen olivaceus imbricatus: foliolis lobatis nitidis lividis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 530.*

Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus verrucosis. *Dill. musc. 184. t. 24. f. 78.*

$\beta.$ *pulverulentus.*

In arboribus passim.

1023. *Lichen pullus imbricatus*, foliolis lobatis, olivaceis, scutellis integerrimis. *Schreb. spicil.* 131. n. 1127.

Lichen pullus fronde laevi scutellifera: germinante distorta, primordialibus granulosis. *Necker metnod.* 94. n. 63.

Lichenoides olivaceum scutellis laevibus. *Dill. musc.* 182. t. 24. f. 77.

In ramulis arborum frequens. *Hyeme.*

Ab hac specie satis diversi sunt: *Lichen pullus* *Jacq. musc.* v. 2. t. 9. f. 3. & *Lichen pullus* *Ligchtfoot scot.* v. 2. p. 825. n. 37.

1024. *Lichen hispidus* foliaceus laciniatus albidus: laciniis apice obtusis inflatis, ciliatis; scutellis nigris sessilibus.

Lichen hispidus foliaceus laciniatus albus: laciniis adscendentibus obtusis pilosis, scutellis sessilibus. *Schreb. spicil.* 126. n. 1120.

Lichen terellus. *Scop. carn. ed.* 2. n. 1406.

Lichen ciliaris *B. albidus.* *Weiss. crypt.* 63.

In truncis arborum, fruticum, inque sepibus asseribus, trabibusque frequens. *Hyeme.*

Apices foliorum semper tumidi pulverulenti ciliati. Variat ciliis albis & nigris. Scutellae nigrae margine integro griseo.

**** *Foliacei erecti.*

1025. *Lichen ciliaris* foliaceus *erectiusculus*: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 535.

In arboribus copiose,

1026. LICHEN *glaucus* foliaceus depresso glaber:
marginē criso farinaceo. *Lin. syst. ed. R. 4.*
p. 542.

Lichen glaucus fronde laciniata, nitida, marginē
criso farinosa subtus atra: punctis scutelli-
formibus brunneis. *Necker method. 100. n. 69.*
Lichenoides endiviae foliis crispis & splendenti-
bus. *Dill. musc. 192. t. 25. f. 96.*

In betularum truncis rarius.

1027. LICHEN *fraxineus* foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 540.*

Lichen fraxineus fronde oblonga, erecta utrinque
lacunata scutellataque: scutellis sessilibus & sti-
pitatis. *Necker method. 105. n. 75.*

In arboribus, praesertim salicibus copiose.

1028. LICHEN *calicaris* foliaceus erectus ramosus
lacunosus glaber, scutellis terminalibus, api-
cibus reflexis corniculatis.

Lichen calicaris foliaceus erectus linearis ramosus
lacunosus convexus mucronatus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 539.*

Lichen rostratus mas. *Scop. carn. ed. 2. n. 1382.*

In arborum truncis passim.

Variat frondibus minoribus tenuissimis subtus
albicantibus, sed facile scutellis albidis planis
a *Lichene prunastri* distingendus.

1029. LICHEN *farinaceus* foliaceus erectus compressus ramosus: verrucis marginalibus farinosis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 539.

Lichen lacunosus, complanatus, ramis acutissimis, orbiculis farinosis marginalibus frequentissimis. *Hall. helv. n. 1981.* *Lichen rostratus femina.* *Scop. carn. ed. 2.* n. 1382.

In pinibus aliisque arboribus frequens.

Nunquam scutellas vidi, semper tubercula farinosa ad latera frondis observavi. *Celeber. Scopoli* non male cum praecedenti conjunxit.

1030. LICHEN *prunastrum* foliaceus erectus lacinatus, subtus candidus; scutellis fuscis concavis.

Lichen prunastrum foliaceus erectiusculus lacunosus: subtus tomentosus albus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 541.

β. margine albo verrucoso.

In arboribus copiose. Vere.

Rarius scutellas vidi.

1031. LICHEN *furfuraceus* foliaceus erectus, laci-niatus, subtus niger pulverulentus, apicibus abidis; scutellis fuscis concavis.

Lichen furfuraceus foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis subtus lacunosis atris.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 538.

Lichen cornubus planiusculis ovatis, superne farinosis, inferne atris & reticulatis. *Hall. helv. n. 1976.*

β. rotus pulverulentus.

In arboribus frequens, rarius cum scutellis. Vere & autumno.

Aetate ex toto pulverulentus fit, & apices albescunt.

1032. LICHEN pulmonarius foliaceus laciniatus obtusus glaber; supra lacunosus: subtus tomentosus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 537.

Lichen pulmonarius foliaceus, laciniatus, repens supra reticulato-lacunosus; scutellis sparsis.

Scop. carn. I. p. 101. n. 32. ed. 2. n. 1392.

Im Thiergarten & prope Tegel passim, in den Papenbergen frequens.

Offic. Pulmonariae arboreae Herba.

***** *Umbilicati.*

1033. LICHEN carneus umbilicatus laevis, superne carneus lacunosus, inferne niger.

Sub annosartum quercuum ramulis im Thiergarten, prope Tegel & in den Papenbergen passim. Hyeme & vere.

Uberiorem descriptionem dedi in den Beschaeftigungen der Berliner Gesellschaft Naturforsch. Freunde 7 Theil cum inconc.

Scutellas nondum vidi, sed tubercula ut in aliis umbilicatis observavi.

Aqua conspersus gelatinosus fit, & colorem fuscescentem induit.

***** *Filamentosii.*

1034. LICHEN plicatus filamentosus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 558.

Usnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. musc.*

56. t. 11. f. 1.

In den Papenbergen & Briselang passim, absque scutellis.

1035. *LICHEN floridus* filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 561.

Lichen floridus fronde ramosa erecta tereti solidâ apice scutellifera: scutellis ciliatis. *Necker method. 69. n. 27.*

g. *Lichen hirtus* filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 560.

Lichen hirtus fronde ramosissima laevi verrucose tereti: verrucis farinaceis congestis sparsisque. *Necker method. 69. n. 28.*

Variet. α im Grunewald, prope Tegel & in den Papenbergen frequens. β . in pinibus sepibusque copiose.

Offic. (*Usneae carni humani Herba.*)

1036. *LICHEN jubatus* filamentosus: axillis compressis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 559.

Lichen barbatus, pendulus, filamentis nigris prolixis. *Hall. helv. 1968.*

Usnea jubata nigricans. *Dill. musc. 64.* t. 12. f. 7.

In pinibus laricibusque im Thiergarten & in der Jungfernheide passim. Vere.

Sentellae miutissimae nudae.

1037. LICHEN *chalybeiformis* filamentosus ramo-
sus divaricatus decumbens implicato-flexuo-
sus. Lin. syst. ed. R. 4. p. 560.

Lichen fruticosus diffusus, caulis vagis, flexuo-
sus, rigidis, teretibus. Hall. helv. 1969.

Usnea rigida horsum vorsum extensa. Dill.
musc. 66. t. 13. f. 10.

In arborum truncis *in der Jungfernheide & Gru-
newald* passim.

1038. LICHEN *hippotrichodes* filamentosus teres
niger apice divisus.

Lichen hippotrichodes teres capillaris, niger, sub-
simplex, extremitatibus divisus. Weber spicil.

232. n. 266.

Lichen setosus filamentosus simplex subcompressus
nigricans, tuberculis globosis acuminatis atris.
Leyss. halens. 1171.

Locis depresso*s im Thiergarten, Jungfernheide in
Pinuum* foliis dejectis copiose.

Tubercula nondum vidi.

1039. LICHEN *radiciformis* filamentosus, teres,
ramosissimus, glaber, radiciformis. Lin. jun.
Diff. method. musc. illust. 37.

Lichen radiciformis longissimus ex fusco nigri-
cans glaber radiciformis. Weber spicil. 282.

n. 267.

α. ramis teretibus.

β. ramis planis.

Sub salicu*m aliorumque arborum* cortice putref-
scens varius. Saccardo pessimi. No-

1040. LICHEN *subterraneus* filamentosus, ramosus, teres, albidus, versus basin lutescens, & ubi adhaeret rubro fucatus. *Beschaeftig. der Berl. Gesellschaft Naturf. Freunde.* 6. Band. p. 156. t. 1. f. 2.

Infra terram, praecipue solo arenoso, in Glosatarum (Lepidopterorum) chrysalidibus putrescentibus. Vere.

Difficile dictu an Lichen, an forsan Byssi species? Num *Byssus radiciformis* Scopoli idem? certe simillimus.

Huic generi omnes Lichenes *Linnei* scutelliferi adnumerantur.

CLADONIA. *Wiggers primit.* 90.

Receptaculum seminum in tuberculum elevatum.

Corpus fistulosum, saepius ramosum.

* *Scyphiferae.*

1041. CLADONIA *coccifera* scyphifera simplex tuberculis coccineis.

a. *Lichen cocciferus* scyphifer simplex integerimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 550.

Coralloides scyphiforme, tuberculis coccineis.

Dill musc. 82. t. 14. f. 7.

b. *Lichen cornucopioides* scyphifer simplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Lin. syst. ed. R.*

4. p. 951.

Coralloides scyphiforme: marginibus radiatis

& foliatis. *Dill musc. 82.* t. 14. f.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald & alibi frequens. Hyeme & vere.

Offic. (Musci pyxidati herba. s. Herba ignis.)

1042. CLADONIA polymorpha scyphifera subsimplex, tuberculis fuscis.

a. *Lichen pyxidatus scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 551.*

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. Dill. musc. 79. t. 14. f. 6. A. B. C.

b. *Lichen pyxidatus prolifer. β. caule simplici, calyce turbinato: centro simpliciter prolifero. Lin. syst. ed. R. 4. p. 552.*

Coralloides sciphyforme tuberculis fuscis. Dill. musc. 79. t. 14. f. 6. D. F. G. H. I. L. M.

γ. *Lichen fimbriatus scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. Lin. syst. ed. R. 4. p. 552.*

Coralloides scyphiforme gracile, marginibus ser. ratis. Dill. musc. 84. t. 14. f. 8. 9.

δ. *Lichen cornutus scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus integris. Lin. syst. ed. R. 4. p. 553.*

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. Dill. musc. 90. t. 15. f. 14.

In der Jungfernheide, Thiergarten, Hasenheide, Grunewalde &c. copiose. Vere, hyeme & autumno.

1043. CLADONIA radiata scyphifera subramosa,

Lichen radiatus scyphifer subramosus, cylindraceus, elongatus, scyphis inaequaliter dentatis radiatisque. Schreb. spicil. 122. n. 1114.

Coralloides scyphiforme cornutum. Dill. musc. 92. t. 15. f. 16.

In Grunewald & Jungfernheide passim. Vere.
Rarissime tubercula vidi.

1044. *CLADONIA foliacea scyphifera:* scyphis simplicibus, foliis multifidis, subtus candidis.

Lichen foliaceus foliis adscendentibus multifidolaciniatis, subtus niveis scyphiferis: scyphulis conicis brevissimis. Schreb. spicil. 122. n. 1115.

Lichen foliaceus foliis suberectis laciniatis crispis scyphiferis, scyphis brevissimis conicis. Huds. angl. ed. 1. p. 457. n. 62.

Lichen pyxidatus ð. foliaceus. Huds. angl. ed. 2. p. 552. n. 86.

In der Jungfernheide, Hasnheide, inque collibus arenosis ad Schoeneberg, inter Pancko & Gesundbrunnen alibique passim. Vere.

Tubercula nondum observavi. Folia semper subtus candida, scyphi simplicissimi minuti.

1045. *CLADONIA gracilis scyphifera dichotomoramosa,* tuberculis fuscis.

Lichen gracilis scyphifer ramosus denticulatus filiformis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 553.

Coralloides scyphiforme ferratum elatius, caulis gracilibus glabris. Dill. musc. 88. t. 14. f. 13.

In der Jungfernheide rarius. Vere.

** *Fruticulosae.*

1046. CLADONIA *rangiferina* fruticulosa, ramo-
fissima glauca, ramulis nutantibus.

Lichen rangiferinus fructiculosus perforatus ra-
mosissimus, ramulis nutantibus. *Lin. syst. ed.*
R. 4. p. 554. β. sylvaticus.

In sylvis arenosis e. g. im Thiergarten, Hasen-
heide, Grunewald, Jungfernheide &c. co-
piose. Vere.

1047. CLADONIA *uncialis* fruticulosa, virescens
dichotomo-ramosa, apicibus acutis.

Lichen uncialis fructiculosus perforatus, ramulis
brevissimis acutis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 555.*
Coralloides perforatum minus molle & tenue.

Dill. musc. 99. t. 16. f. 22.

Inter praecedentem frequens. Vere.

1048. CLADONIA *aculeata* fruticulosa, fusca, com-
pressa, ramosissima, diffusa, aculeata.

Lichen aculeatus foliaceus diffusus compressus
ramosissimus; ramulis furcatis spinulosis.
Schreb. spicil. 125. n. 1119.

Coralloides fruticuli specie fuscum spinosum.

Dill. musc. 112. t. 17. f. 31.

In der Jungfernheide, Hasenheide, inque collibus
arenosis ad Schoeneberg frequens.

Semper absque tuberculis.

1049. CLADONIA *paschalis* fruticulosa ramosa,
crusta obducta, tuberculis fuscis.

Lichen paschalis fructiculosus solidus tectus folio-
lis crustaceis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 557.*

Coralloides crispum & botryoides alpinum. Dill.

musc. 114. t. 17. f. 33,

*In collibus arenosis ad Schoeneberg passim, im
Grunewald frequens.*

1050. CLADONIA *subulata* fruticulosa ramosa api-
cibus simplicibus subulatis.

Lichen subulatus fruticulosus sudichotomus, ra-
mis simplicibus subulatis. Lin. syst. ed. R. 4.
p. 556.

Coralloides corniculis longioribus & rarioribus.

Dill. musc. 102. t. 16. f. 26.

In der Jungfernheide & Grunewald passim.

1051. CLADONIA *botrytes* fructiculosa, subramo-
sa, tuberculis terminalibus sphaericis flavo-
brunneis maximis.

Lichen botrytes subramosus, ramulis fungulo lu-
teo - suscescente terminantibus. Hagen lich.
121. n. 64. t. 2. f. 9.

In den Papenbergen rarius. Hyeme.

Fere omnium elegantissima tuberculis maximis.

Variat stipite simplici ac ramoso, altitudine
sesquiunciali ad unciam, immo semiuncia-
lem usque.

VERRUCARIA. Wiggers.

Receptaculum seminum elevatum verruciforme.

* *Stipitatae.*

1052. VERRUCARIA *Beomyces* crusta glauco - vi-
rescens tuberculis carneis stipitatis

Lichen Beomyces leporosus albicans, tuberculis stipitatis carneis. *Lin. suppl. pl. 450.* Hoffmann lich. 45. t. 8. f. 3.

In der Jungfernheide & Grunewald passim. Hyeme. Vere.

1053. **VERRUCARIA fungiformis** crusta glauco-virescens, tuberculis fuscis stipitatis.

Lichen fungiformis crusta e glauco virescens; tuberculis stipitatis constanter fuscis. *Weber spicil. 196. n. 252.* Hoffmann lich. n. 46. tab. 8. fig. 2.

In der Jungfernheide rarius. Vere.

Tubercula multo minora sphaerica, quae in praecedenti planiora.

** *Sessiles.*

1054. **VERRUCARIA Icmadophila** crusta glauco-virescens, tuberculis planis carneis subsessilibus.

Lichen Icmadophila leporosus cinereus, tuberculis sessilibus planis carneis. *Lin. suppl. pl. 450.*

In der Jungfernheide rarius. Vere.

Tubercula interdum brevissime stipitata.

1055. **VERRUCARIA Elveloides** crusta virescens, tuberculis convexis, aetate concavis.

Lichen elveloides crustaceus glauco virescens, tuberculis sessilibus, planis, adultioribus undulatis. *Weber spicil. 186. n. 243.*

a. tuberculis aurantiacis.

b. tuberculis rubicundis.

In salicis truncis ad *Spandau* rarius: Autumno.
Diversissima a praecedenti tuberculis minoribus
aetate concavis. Ad terram istam hic nondum
observavi, sed in rupibus terra tectis in *Thu-*
ringia tuberculis paullo majoribus fuscescenti-
bus hanc speciem saepius vidi. Crusta semper
tenuissima, in arboribus laete virens, ad ter-
ram glauco-virescens.

1056. VERRUCARIA *sanguinea* cinereo-virescens,
tuberculis atris.

Lichen sanguinarius leporosus cinereo-virescens,
tuberculis atris. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 525.

α. *Lichen limitatus* crusta glauca aut cinereo-vi-
rens; linea marginali, repanda, nigra. Tu-
bercula piurima nigra. *Scop. carn. ed. 2.*
n. 1370.

β. crusta vix conspicua, tuberculis nitidis nigris.
In arborum cortice copiose, β. in lapidibus
passim.

Perperam *sanguinea* dicitur, ob tubercula intus
sanguinea.

1057. VERRUCARIA *nigra* crusta atra, tuberculis
planis concoloribus.

Lichen niger leporosus ater, tuberculis subrotun-
dis concoloribus. *Lin. suppl. pl. 449.* *Huds.*
angl. ed. 2. p. 524. n. 4. *Hoffmann lich. n. 26.*
tab. 3. f. 6. (non optima.)

In lapidibus coemeteriorum, praecipue in code
passim. Vere.

1058. VERRUCARIA *fuscoatra* crusta fusca, tuberculis planis atris.

Lichen fuscoater leporosus fuscis, tuberculis atris.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 525.

In coemeteriorum lapidibus sparsim. Vere.

Crusta grumosa brunneo fusca, tubercula convexa planiuscula atra.

1059. VERRUCARIA *pertusa* crusta albicans, tuberculis impressis atris.

Lichen pertusus leporosus: verrucis subtebellatis laevigatis pertusis, poro uno altero cylindrico. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 524. Hoffmann lich.*

16. n. 18. t. 3. f. 4.

In arborum cortice passim. Hyeme.

Crusta albovirescens, tubercula impressa nigerrima.

1060. VERRUCARIA *faginea* crusta albicans, tuberculis planis farinosis concoloribus.

Lichen fagineus leporosus albus, tuberculis albis farinaceis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 526.*

$\beta.$ crusta orbiculari, tuberculis minimis.

$\gamma.$ crusta grisea tuberculis magnis concavis.

In fagis aliisque arboribus frequens.

1061. VERRUCARIA *tuberculosa* crusta orbicularis cinerea tuberculosa, tuberculis minimis fuscescentibus.

Lichen tuberculosus pulverulento crustaceus, verrucosus subcinereus. *Hoffmann lich. p. 9. n. 11.*

t. 2. f. 1.

In arborum truncis *in der Jungfernheide & Pa-*
penbergen rarius.

1062. VERRUCARIA *rugosa* albicans, tuberculis
minutissimis, in lineas & punctas confertas,
dispositis.

Lichen rugosus leporosus albicans, lineolis sim-
plicibus punctisque nigris confertis. *Lin. syst.*
ed. R. 4. p. 525.

In fagorum cortice frequens.

Tubercula nudis oculis invisibilia, per lentem
vero oblonga videntur. Lineae atrae &
punctae confertissimae.

1063. VERRUCARIA *scripta* albicans, tuberculis
atris planis linearibus varie flexis.

Lichen scriptus leporosus albicans, lineolis ni-
gris ramosis characteriformibus. *Lin. syst. ed.*
R. 4. p. 522.

In truncis fagorum aliarumque arborum frequens.

Lineae atrae (Tubercula) ramosae & varie flexae,
adhuc semine farctae convexae sunt, post e-
missionem vero illius medio sulco exaratae vi-
dentur.

1064. VERRUCARIA *hebraica* albicans, tuberculis
planis linearibus apice divisis.

Lichen hebraicus leporosus albicans, lineolis ni-
gris divaricatis. *Hoffmann lich. 13. n. 15. t. 3.*
f. 2. e. Ligchtfoot scot. 2. p. 800. 1. a.

In fagis & quercubus passim.

Crusta tenuissima albicans, lineolae apice divisae
furciformes. atrae.

1065. VERRUCARIA pulicaris albicans tuberculis planis linearibus brevissimis.

Lichen pulicaris leporosus albicans lineolis nigris brevissimis simplicibus. Hoffm. lich. p. 14. n. 16. t. 3. f. 2. f. Ligchtfoot scot. 2. p. 801. n. 1. 3.

In arborum truncis passim,
Crusta albonigricans.

1066. VERRUCARIA typographica albicans lineolis planis atris rectis.

In prunorum, cerasorum juniorum truncis.

Crusta oblonga tenuissima albovirescens.

Lineae atrae planae rectae absque ulla flexione.

TAB. VII. f. 14.

LEPRA. Wiggers.

Pulvis subtilissimus, per lentem a glebis varie formatis constans.

1067. LEPRA antiquitatis pulvis ater.

Byssus antiquitatis pulverulenta atra. Lin. syst. ed. R. 4. p. 595.

Lichen antiquitatis. Hoffmann lich. 1. t. 3. f. 5.

In muris asseribus, sepibus, tectis ubique fere.

1068. LEPRA flava pulvis flavus.

Lichen flatus pulverulentus flatus. Schreb. spicil.

139. n. 1145. Hoffmann lich. 2. n. 2. t. 1. f. 4.

Byssus candelaris pulverulenta flava ligna adnascens. Lin. syst. ed. R. 4. p. 596.

In sepibus truncisque arborum abunde.

1069. LEpra *incana* pulvis incanus.

Byssus incana pulverulenta incana, farinae instar strata. *Lin. Syst. ed. R. 4.* p. 596.

Lichen incanus pulverulentus albus, glebulis rotundatis. *Schreb. spicil. 139.* n. 1147.

In der Jungfernheide ad terram inque fossis passim.

Pulvis post pluvias virescens, sicca vero tempestate albido griseus, aetate paullo flavesiens.

1070. LEpra *lactea* pulvis candidus.

Byssus lactea pulverulento-crustacea albissima.

Lin. Syst. ed. R. 4. p. 597.

Lichen lacteus pulverulento-crustaceus, albissimus. *Schreb. spicil. 139.* n. 1148.

In arborum truncis inque muscis frequens. Aestate grisea evadit.

1071. LEpra *rubens* pulvis ruber.

Lichen rubens pulverulentus ruber. *Hoffm. lich. 4.* n. 5. t. 1. f. 5.

α. *Lichen croceus* pulverulentus croceus. *Schreb. spicil. 139.* n. 1146.

β. pulvis ruber sparsus in glebis majoribus.

In arborum cortice, sepibusque passim. β. in betularum epidermide.

1072. LEpra *rosea* pulvis e glebis maximis sparsis roseis constans.

Lichen roseus pulverulentus conglomeratus roseus. *Schreb. spicil. 140.* n. 1150.

In cortice tiliarum, salicumque passim. e. g. ad
Schoeneberg, Pancko &c.

1073. LEpra *botryoides* pulvis acervatim sparsus
luteoviridis.

Byssus botryoides pulverulenta viridis. Lin. syst.
ed. R. 4. p. 596.

Tremella botryoides pulverulenta viridis. Schreb.
spicil. 141. n. 1153.

Lichen botryoides. Hagliche p. 40. n. 6.

Ad terram in hortis frequens.

Color constans eluteo viridis. Glebae acervatim
dispositae.

1074. LEpra *viridis* pulvis laete viridis.

Lichen viridis pulverulentus viridis. Schreb. spi-
cil. 139. n. 1149.

In quercuum annosarum cortice inque sepibus
passim.

Byssus. Lin. gen. 1324.

Lanugo per lentem filis innumeris constans.

1075. Byssus *Flos aquae* filamentis plumosis na-
tantibus. Lin. syst. ed. R. 4. p. 593.

In aquis frequens.

Num vera planta, aut putredine orta?

1076. Byssus *phosphorea* lanuginosa violacea lig-
nis adnascens. Lin. syst. ed. R. 4. p. 594.

In arborum truncis putridis, praecipue in quer-
cu. Vere & autumno.

1077. Byssus *velutina* filamentosa viridis: fila-
mentis ramosis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 594.

Ad terram inque hortulanorum ollis frequens.
Vere & autumno.

1078. *Byssus coriacea* perennis densissima albicans. *Schreb. spicil. 144. n. 1161.*

In quercum truncis passim.
Aetate flavescit.

1079. *Byssus barbata* filamentis erectiusculis summitatibus ramosis subfastigiatis fulvis. *Huds. angl. ed. 2. p. 606. n. 9.*

Byssus arborea barbata fulvi coloris. *Dill. musc. 9. t. 1. f. 19.*

In truncis arborum putridis rarius.

1080. *Byssus candida* filamentis ramosissimis, ramis fasciculatis albidis. *Huds. angl. ed. 2. p. 607. n. 10.*

Byssus tenerima villosa & elegantissima ramulosa. *Dill. musc. 7. t. 1. f. 15.*

In foliis dejectis quercum putrescentibus, frequens.

Recens allii instar olet.

1081. *Byssus bombycinus* lanuginosa albissima, filamentis longioribus implexis lignis adnascens. *Retz prod. fl. Scand. p. 244. n. 1518.*

Byssus floccosa evanida floccosa nivea. *Schreb. spicil. 144. n. 1160. Dill. musc. 5. t. 1. f. 9.*

In cellis ad trabes, afferes &c. passim.

1082. *Byssus sceptica* capillacea mollissima parcella fragilissima pallida. *Lin. syst. ed. R. 4.*

Byssus tenerima murina doliaris. *Dill. musc.* 6.

t. 1. f. 12.

In cellis, locisque suffocatis passim.

b. *Aquaticae.*

CONFERVA. *Lin. gen.* 1323.

Tubercula inaequalia, in fibris capillaribus longissimis.

* *Filamentis simplicibus, aequalibus, geniculis destitutis.*

1083. **C**ONFERVA *rivularis* filamentis simplicifimis aequalibus longissimis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 587.

Conferva fluviatilis sericea vulgaris & fluitans.

Dill. musc. 12. t. 2. f. 1.

In der Spree versus Spandau beim Stern frequens.
Aestate.

1084. **C**ONFERVA *fontinalis* filamentis simplicifimis aequalibus digito brevioribus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 587.

Conferva minima, byssi facie. *Dill. musc.* 14.
t. 2. f. 3.

In fossis paucim. Aestate.

** *Filamentis ramosis aequalibus.*

1085. **C**ONFERVA *bullosa* filamentis aequalibus ramosis, aëreas bullas includentibus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 587.

Conferva palustris bombycina. *Dill. musc.* 18.

t. 2. f. II.

In fossis paludibusque frequens. e. g. *im Thiergarten, Jungfernheide &c.* Aestate.

1086. **CONFerva** *canalicularis* filamentis aequalibus basin versus ramosioribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 588.*

Conferva *rivulorum capillacea*, densissime congestis ramulis. *Dill. musc. 21. t. 4. f. 15.*

In der Pancke frequens. Aestate.

*** *Filamentis anastomosantibus.*

1087. **CONFerva** *reticulata* filamentis reticulato-coadunatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 589.*

Conferva *reticulata*. *Dill. musc. 20. t. 4. f. 14.*

In aquis stagnantibus, fossis, ad fluviorum littora copiose. Aestate.

**** *Filamentis nodosis.*

1088. **CONFerva** *gelatinosa* filis ramosis moniliformibus: articulis globosis gelatinosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 590.*

Chara batrachosperma caule ramofo filamentoso; ramis foliaceis capillaceis, in glomeres lubricos geniculatos articulatim circa caulem dispositis. *Weiss. crypt. 33. c. tab. aen.*

Conferva *fontana nodosa*, spermatis ranarum instar lubrica, major & fusca. *Dill. musc. 36. t. 7. f. 42.*

In der Pancke & in fossis limpidissimis passim. Aestate.

F U N G I.

AGARICUS. Lin. gen. 1325.

Capsulae in lamellas dispositae.

* *Acaules & dimidiati.*

1089. **AGARICUS quercinus** acaulis, lamellis labyrinthiformibus. Lin. syst. ed. R. 4. p. 607.

Agaricus coriaceus, durus, sessilis, squamosus & multiplex, lamellis ramosis, sinuosis & sibi invicem implexis. Gled. method. 134. n. 30.
Schaeffer fung. 57.

In *quercum* aliarumque arborum truncis emortuis frequens. Omni tempore.

Variat colore albido griseo, & albidus striis zonalibus variis. Lamellae semper albidae.

1090. **AGARICUS antiquus** acaulis fuscus, lamellis pallidioribus labyrinthiformibus.

Battara fung. t. 38. f. A. B. (*optima*.)

In asseribus truncisque putridis. Superne obscurefuscus glaber, absque striis zonalibus. Lamellae lutescentes ramoso sinuatae, inter se conjuncta, & anastomosantes.

Non confundendus cum *A. afferculorum* Batschii.

Schaeffer 76, a quo differt lamellis flavescen-tibus & labyrinthiformibus, etiamque pileo superne fusco, nec zonis ornato.

1091. **AGARICUS peclinatus** acaulis coriaceus, lamellis simplicibus sinuatis. Huds. angl. ed. 2. p. 623. n. 48.

In arboribus rarius.

Lamellae tenuissimae albidae.

1092. AGARICUS *alneus* acaulis lamellis bifidis
pulverulentis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 607. *Wei-*
gel observ. 41. ob. 35. t. 2. f. 6. (bona.)

Agaricus sessilis squamosus, lobatus & villosus;
lamellis dissectis. *Gleditsch method. 134.* n. 31.

In arboribus rarius. e. g. *im Thiergarten, Jung-*
fernheide.

1093. AGARICUS *depluens* acaulis albidus villosus
lamellis fuscescentibus interruptis.

Agaricus depluens pileo dimidiato cano sericeo;
lamellis subcarneis, fusco-rubellis, latis, laxis,
quadruplici ordine digestis. *Batsch. fung. cant.*
1. p. 167. t. 24. f. 122.

In arborum truncis passim. Autumno.

1094. AGARICUS *lateralis* substipitatus, pileo al-
bido laevi, lamellis subsimplicibus pallidis,
stipite laterali. *Huds. angl. ed. 2.* p. 624.

Agaricum squamosum rufescens, pediculo dona-
tum, subtus lamellis densis. *Mich. gen. 123.*
t. 65. f. 7?

In arborum truncis emortuis frequens. Autum-
no. Vere.

Stipes brevissimus albidus, aetate lutescens pla-
nus. Pileus dimidiatus planus concolor. La-
mellae fuscae dense tenues apice bifidae.

1095. AGARICUS *ochraceus* acaulis flabelliformis,
supra pulvinatus ochraceus, lamellis albidis.

margine cinerascentibus. *Syst. ed. M. 14.*

p. 977. n. 39. *Jacq. Miscel. vol. 2. p. 110.*
t. 16. f. 2.

¶. *Agaricatum cespitosum, fordide luteum, Cochlearis seu Spatulae forma, glabrum. Michel gen. 123. n. 19. t. 65. f. 6.*

¶. *Agaricum cespitosum, fulvum, Cochlearis seu Spatulae forma, hirsutum. Mich. gen. 123. n. 20. t. 65. f. 5.*

In arborum emortuarum truncis *in den Papenbergen* passim. Autumno.

** *Stipite annulato.*

1096. *AGARICUS fimetarius* stipitatus, pileo campanulato albo subsquamoso, lamellis nigricantibus, stipite albo fistuloso, annulo fugaci.

Agaricus fimetarius pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuosis, stipite fistuloso. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 604.*

Agaricus Mitella pileo oblongo campanulato albo, floccis latiusculis, dense imbricatis, squamoso-squarroso; stipite subelongato, valido, albo, lamellis nigris. *Batsch fungi 63. n. 65.*
Schaeffer fung. tab. 7. 8.

¶. pileo albo minus squamoso striato, apice rubicundo, lamellis rufescentibus.

Agaricus ovatus cespitosus; pileo ovato striato; lamellis defluentibus; stipite cylindrico fistuloso, annulato, longo, annulo fugaci. *Scop. carn. ed. 1. p. 23. n. 28. ed. 2, p. 425. n. 1479.*

Agaricus Chamaeleo pileo oblongo campanulato
albo caesio floccoso-squamoso, floccis distan-
tibus, sparsis, flaventibus; lamellis nigro fla-
ventibus; stipite subelongato valido albo.

Batsch. fung. 63. n. 64. *Schaeffer fung.*
t. 46. 47.

In cellis, pomariis, fimetis passim. Autumno.

Agaricus fimetarius Batschii, diversissimus a no-
stro & nova species.

1097. *AGARICUS campestris* stipitatus, pileo con-
vexo squamato-albido, lamellis rufis. *Lin.*
syst. ed. R. 4. p. 601. *Schaeff. fung.* t. 310. 311.

Agaricus pileolo ampio, hemisphaerico, forni-
cato; petiolo brevi, annulo permanente cincto.

Gleditsch method. 115. n. 21.

β. *Agaricus candidus*, pileolo fornicato, squa-
moso, petiolo annulato, cylindrico & crasso.

Gleditsch method. 117. d.

Agaricus pellitus pileo pallido cano, maculis
magnis piloso-squamiformibus, extrorsum
acutis, laxe sparsis, imbricato radicato, stipite
crassissimo, concolore, integro; lamellis sub-
brunneis. *Batsch fung.* 55. n. 41. *Schaeffer*
fung. t. 33.

In hortis, locis cultis, suburbanis frequens, in-
que pratis & pasuis passim. Augusto ad Octo-
brem usque.

Locis siccis crescens esculentus, locis vero humi-
dis fit nocivus.

1098. *Agaricus fascicularis* stipitatus, pileo convexo luteo, lamellis virescentibus, stipite flavo (annulo fugaci.) *Huds. angl. ed. 2. p. 615. n. 20.* *Schaeffer fung. 49.*

Agaricus carneolus. *Batsch fung. 83. n. 116.*

β. *Agaricus jenensis* pileo convexo-conico, luteo, medio ferrugineo: stipite elongato, linearis, valido, concolore subsquamulofo, volva pulverulenta, striata, adnata, brunnea; lamellis olivaceis. *Batsch fung. 83. n. 113. t. 7. f. 29.*

Ad arborum praecipue salicium putridarum trun-
cos copiose. Autumno.

1099. *Agaricus equestris* stipitato, pileo pallide
flavo, disco obscuriore, lamellis sulphureis,
annulo fugaci.

Agaricus equestris stipitatus, pileo pallido: disco
stellatim luteo, lamellis sulphureis. *Lin. syst.
ed. R. 4. p. 602.* *Schaeff. fung. t. 79.* *Sterb.
fung. t. 21. fig. c.*

In pratis ad Spandau rarius. Autumno.

1100. *Acaricus squarrosum* stipitatus, pileo um-
bonato lutescente, squamoso, squamis fuscis
squarrosis, stipite infra annulum squarroso,
lamellis pallidis.

Agaricus squarrosum pileo ferrugineo, squamulis
piloso-furfuraceis revolutis, imbricato; stipite
valido subclavato concolore, inferne usque ad
volvam laceram reflexopatentem squamosam

Batsch. fung. 86. n. 123. t. 8. f. 31. Schaeffer
fung. 61. 80.

In den Papenbergen rarius. Autumno.

1101. AGARICUS procerus stipitatus annulo mobili, pileo convexo albido squamoso, squamis fuscescentibus, lamellis albis stipite bulboso.

Agaricus procerus stipitatus, pileo hemisphaerico lacerato squamoso rufescente cinereo, lamellis albis, stipite longo, cylindrico acetabulo inferto. Huds. angl. ed. 2. p. 612. Schaeff. fung. tab. 22. 23.

Agaricus clypeatus stipitatus, pileo hemisphaerico viscidō acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico albo. Lin. syst. ed. R. 4. p. 603?

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi copiose.
Autumno.

Esculentus sub nomine *Buberitze*.

1102. AGARICUS *Mappa* stipitatus, annulo fixo inverso, pileo planiusculo flavo, fusco variegato, lamellis albidis, stipite bulboso volvato.

Agaricus Mappa pileo flavo cinerascente, pallido, maculis inaequalibus fuscescentibus plerumque picto; stipite elongato lamellisque subconcoloribus albis. Batsch fung. 57. n. 50. Schaeffer tab. 20.

In der Jungferuheide passim. Autumno.

1103. AGARICUS verrucosus stipitatus pileo planiusculo fuscescente, albo maculato, lamellis albis, stipite bulboso.

Agaricus verrucosus stipitatus, pileo convexo cinereo verrucoso, verrucis lamellisque albis, stipite basi bulbose. *Huds. angl. ed. 2. p. 613.*
Schaeffer t. 90. 91.

In der Jungfernheide & ad Tegel rarius, versus Autumnum.

1104. *AGARICUS conspurcatus stipitatus*, pileo fordide albo, disco fuscescente squamoso, squamis concoloribus, lamellis ullis, annulo, stipeque concolore.

Agaricus exiguus, candidus, pileolo in vertice papillato & squamis atrorufis lacero; lamellis candidis, petiolo fistuloso, crasso, brevi & annulato. *Gleditsch method. 130. b. & 129. a.*

Fungus minimus, pileolo in medio papillato, undique atro-rufescente, cute lacera & veluti squamosa, lamellis albis, pediculo vix fistuloso & annulato, medii coloris. *Micheli gen. 176. t. 78. f. 8.*

Cum praecedenti passim. Autumno.

Stipes uncialis.

1105. *AGARICUS muscarius stipitatus*, lamellis dimidiatis solitariis, stipite volvato; apice dilatato basi ovato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 599.*
Schaeffer fung. t. 27.

Agaricus imperialis. Batsch fung. 59. n. 55.

In sylvis copiose. Autumno.

** *Stipite nudo, pileo umbonato.*

1106. AGARICUS giganteus stipitatus, pileo infundibuliformi umbonato maximo albo, lamellis interruptis, stipite brevissimo crasso.

Agaricus giganteus stipitatus pileo maximo albo in medio depresso umbonato, stipite brevissimo. *Leyßer fl. halens.* 1213.

In der Jungfernheide & Thiergarten passim. Autumno.

Omnium maximus, pileus diametro pedali, stipes vero nncialis.

1107. AGARICUS lividus stipitatus, pileo convexo livido, lamellis albidis, stipite longo albo. *Huds. angl. ed. 2,* p. 616. *Schaeffer* 14.

In den Papenbergen & alibi passim. Autumno & vere.

1108. AGARICUS clypeatus stipitatus, pileo hemisphaerico viscido acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico albo. *Huds. angl. ed. 2.* p. 619. *Schaeffer fung. tab. 52. fig. 7. 8. 9.*

In nemorosis humidis, lignisque putrefcentibus frequens. Autumno.

Pileus sordide fuscescens margine striatus, umbo obscurore. Lamellae albae, stipesque concolor.

1109. AGARICUS aquosus stipitatus, pileo campanulato obtuso fusco flavescente; lamellis atrogriseis, stipite fistuloso griseo villoso. *Huds.*

In truncis arborum putrescentibus frequens.
Autumno.

1110. *AGARICUS conicus* stipitatus, pileo campanulato acuto striato livido nitido, lamellis albis, stipite fistuloso cinereo. *Huds. angl. ed. 2.* p. 620. *Schaeffer tab. 52.* f. 1-6.

In lignis putridis copiose. Autumno.

1111. *AGARICUS esculentus* stipitatus, pileo convexo argillaceo, stipite gracili fistuloso, ex albo sordide flavescente, lamellis albis. *Jacq. Miscel. vol. 2.* p. 103. t. 14. f. 4. *Murr. syst. 14.* p. 976. n. 29. *Schaeffer fung. t. 59?*

In nemorosis etiamque in agrorum versuris haud infrequens. Vere.

Sub nomine *Kroesling* notus.

1112. *AGARICUS alliaceus* stipitatus, pileo convexo opaco supra fusco subtus albo, stipite fistuloso nigro nudo. *Jacq. austr. t. 82.* *Murr. syst. ed. 14.* p. 976. n. 26.

Agaricus plicatus stipitatus, pileo planiusculo margine luteo rufo, lamellis pallidioribus, stipite longo rufo. *Huds. angl. ed. 2.* p. 621. n. 43. *Schaeffer fung. t. 99.*

Im Thiergarten, Hasenheide & alibi frequens.
Autumno & vere.

Pileus sordide fuscos, interdum albicans; lamellae albidae; stipes niger tenuis, etiamque rufescens.

1113. AGARICUS *caesius* stipitatus, pileo albo glaucescente convexo oblongo, lamellis subramosis, stipite concolore subfistulofo.

Agaricus caesius griseo-caesius, semidiaphanus pileo laxe conico, stipite linearie elongato validusculo, basi lanoso villoso, lamellis lanceolatis duplici, triplicive ordine digestis, pileo propriis. *Batsch. fung. cont.* I. p. 113. n. 94. t. 18. f. 94.

In foliis acerosarum arborum dejectis *in der Jungfernheide* rarius. Octobr. Novemb.

Minutus, altitudine 6 linearie.

1114. AGARICUS *integer* stipitatus, pileo planiusculo rubro, lamellis albis integris aequalibus, stipite concolore.

Agaricus integer stipitatus, lamellibus omnibus magnitudine aequalibus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 598. *Schaeffer fung.* t. 58 & 65, *malaē figuræ.*

Omphalomyces coccineus. *Baatra fung.* 37. t. 15. f. E. *bona.*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi passim.
Autumno.

*** *Stipite nudo, pileo absque umbone.*

1115. AGARICUS *coccineus* stipitatus pileo hemisphaerico stipiteque subfistulofo coccineis, lamellis aurantiacis. *Murr. syst. ed. 14.* p. 975. n. 21. *Jacq. Misc. v. 2.* p. 106. *Schaeff. fung.* 302.

In der Jungfernheide rarius. Autumno.

1116. AGARICUS *violaceus* stipitatus, pileo fuscente convexo vertice depresso; margine violaceo, lamellis violaceis, stipite caerulefcente.

Agaricus violaceus stipitatus, pileo rimofo: margine violaceo tomentoso, stipite caerulescente, lana ferruginea. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 602.
Schaeffer fung. t. 34.

In der Jungfernheide & Papenbergen infrequens.
Autumno.

1117. AGARICUS *farinaceus* stipitatus, pileo convexo, vertice subdepresso rubro violaceo, lamellis violaceis, stipite fuscescente.

Agaricus farinaceus stipitatus, pileo convexiusculo purpurascente fusco, lamellis convexis distantibus incarnatis pulverulentis, stipite longo. *Huds. angl. ed. 2.* p. 616. n. 26.
Schaeffer fung. 13.

In der Jungfernheide frequens. Autumno.

Variat pileo fusco & rubro-violaceos, lamellis obscurioribus & pallidis.

1118. AGARICUS, *Chantarellus* stipitatus, pileo infundibuliformi luteo lamellis venosis ramosis decurrentibus.

Agaricus Chantarellus stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus. *Lin. syst. ed. R. 4.*
p. 597.

Schaeffer fung. t. 82. non optima figura.

In der Jungfernheide & versus Spandau passim.

Autumno.

Esculentus sub nomine Pfefferling.

1119. *AGARICUS deliciosus* stipitatus, pileo vertice depresso luteo-fuscescente, lamellis luteis subdecurrentibus, succo luteo farctis.

Agaricus deliciosus stipitatus, pileo testaceo : succo lutescente. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 600.
Schaeffer fung. t. II.

In sylvis ad Spandau & Coepnick frequens. Autumno.

Esculentus sub nomine Reitzker vel Ritschke.

1120. *AGARICUS cinnamomeus* stipitatus pileo convexo fusco, lamellis luteis, stipite concolore.

Agaricus cinnamomeus stipitatus, pileo sordide flavo, lamellis luteo-rufis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 602. *Schaeffer fung. t. 4.*

In dcr Jungfernheide & Thiergarten passim. Autumno.

1121. *AGARICUS striatus* stipitatus, pileo campanulato cinereo striato glabro, lamellis griseis margine crispis, stipite fistuloso. *Huds. angl. ed. 2.* p. 617. *Schaeffer fung. 17. 68.*

In ruderatis ad sepes passim. Autumno.

Pileus fuscescens. Lamellae aetate nigra. Stipes semper albus.

1122. AGARICUS *adustus* stipitatus, pileo campanulato striato, griseo, vertice fusco, lamellis albis, stipite fuscescente.

Agaricus adustus pileo convexo, conico, plicis lati, plicato-fulgato, fusco, marginem versus pallente-griseo; lamellis pallidis, stipiteque elongato linearie subconcoloribus. *Batsch fung.* 67. n. 70. *Schaeffer fung.* t. 32.

In lignis putrescentibus passim. Autumno.

1123. AGARICUS *variabilis* stipitatus, pileo subcampanulato fusco, striato, lamellis pallidioribus, stipite concolore.

Agaricus variabilis. *Batsch fung.* 67. n. 73. *Schaeffer fung.* t. 63.

Im Thiergarten & Jungfernheide passim. Autumno.

1124. AGARICUS *lignorum* stipitatus, pileo campanulato flavo fuscescente striato, lamellis griseis, stipite subulato albo.

Agaricus lignorum. *Scop. carn.* ed. 2. n. 1482. *Schaeffer fung.* 66.

In lignis putrescentibus passim.

1125. AGARICUS *piperatus* stipitatus, pileo planiusculo lactescente, margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 600. *Schaeffer fung.* t. 83.

Agaricus piperatus pileo concavo saepius lactescente, lamellis ramosis, stipite nudo cylindrico. *Scop. carn.* ed. 1. p. 33. n. 39. ed. 2.

Agaricus pileo pulvinato integerrimo, & in centro profundius depresso, lamellis connexis, angustis & compactis; petiolo continuo, cylindrico & crasso. *Gleditsch method.* 97. n. 10.

In pratis, pascuis &c. im Thiergarten, Jungfernheide alibique passim. Septemb. Octobr.

1126. *AGARICUS excavatus stipitatus*, pileo concavo albo, lamellis, stipiteque flavescentibus.

Agaricus pileo orbiculari integerrimo candido, in vertice concavo, lamellis cum petiolo dilute flavescentibus. *Gleditsch method.* 107. d.

Leyffer fl. hal. n. 1215.

In foliis dejectis sylvarum passim. Octobr.

Novembr.

1127. *AGARICUS umbelliferus* pileo convexo, pliato membranaceo, tenero: lamellis remotis; stipite procero, capillaceo, nudo, lamellis concolore. *Scop. carn. ed. 1. p. 30. c. ed. 2. p. 457. n. 1571.*

Agaricus umbelliferus stipitatus, pileo pliato membranaceo, lamellis basi latioribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 605.*

In foliis dejectis in sylvis passim. Autumno.

Pileus albus.

1128. *AGARICUS Androsaceus* stipitatis albus, pileo pliato membranaceo; stipite nigro. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 606.*

Agaricus pileo convexo pliato membranaceo; lamellis remotis; stipite nigro procero capil-

laceo nudo. *Scop. carn. ed. I. p. 29. ed. 2.
n. 1570.*

In der Jungfernheide in foliis dejectis pini sylvestris passim. Autumno.

1129. *AGARICUS rosellus stipitatus*, pileo planiusculo ochraceo, lamellis rubicundis, stipite concolore torto.

Agaricus rosellus pileo ochraceo, subcarneo; stipite solido fibroso torto; lamellis fulvello-roseis, majoribus stipiti adnatis. *Batsch fung. cont. 121. n. 99. t. 19. f. 99.*

In der Jungfernheide & Papenbergen locis graminosis rarius. Autumno.

1130. *AGARICUS clavularis* stipitatus, pileo hemisphaerico glaucescente, lamellis concoloribus aequalibus, stipite bulbofo.

Agaricus clavularis tener, subcaesius, pileo umbilicato, obsolete plicato; laminis paucis; stipite gracili, basi distinete bulbosa, bulbo confluente dilatato. *Batsch fung. cont. 89. n. 81. t. 17. f. 81.*

In arborum praecipuo annosarum tiliarum cortice passim. Autumno.

Minutissimus fungus vix semiuncialis.

BOLETUS. Lin. gen. 1326.

Capsulae in pileo latentes, apice apertae.

* *Acaules & dimidiati.*

1131. *BOLETUS fomentarius* acaulis pulvinatus inaequalis obtusus, poris teretibus aequalibus

In arborum truncis *in den Papenbergen* infrequens. Omni tempore.

Stipes nullus. Pileus dimidiatus planus obtusus, superne cervinus pulverulentus fulcis concentricis inaequalis; inferne pallide griseus, margine albus. Pori aequales teretes.

1132. *BOLETUS ignarius* acaulis pulvinatus laevis, poris tenuissimis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 608. *Schaeffer fung. t. 137. 138.*

In arborum truncis passim. Persistens.

Superne convexus griseus: margine lutescente; inferne albidus poris tenuissimis.

1133. *BOLETUS hepaticus* acaulis convexus sublobatus rufis laevis poris teretibus flavis. *Huds. angl. ed. 2.* p. 625. n. 5. *Schaeffer fung. 116-120.*

In arborum truncis passim.

Edulis.

1134. *BOLETUS fulvus* acaulis totus fulvus inaequalis, poris tenuissimis aequalibus teretibus.

Agaricum durum, crassum, assulatum, Ilicibus innascens griseum. *Michel gen. 121. tab. 62.*

In arboribus vulgaris.

1135. *BOLETUS suberosus* acaulis pulvinatus laevis, poris acutis difformibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 608.

In arborum truncis emortuis passim.

Pori inaequales flexuosi confluentes.

1136. BOLETUS *coriaceus* acaulis *coriaceus* convexus lobatus flavus laevis, poris tenuissimis.

Huds. angl. ed. 2. p. 625. n. 4. Schaeffer fung. t. 131. 132.

In arborum cinctuarum truncis.

1137. BOLETUS *versicolor* acaulis fasciis discoloribus, poris albis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 609.*

In arborum truncis copiose.

Color valde variabilis.

1138. BOLETUS *adustus* acaulis fuscescens margine nigro, poris tenuissimis reticulatis.

In truncis arborum putrescentibus frequens.

Gregarius durus minutus margine quasi adusto nigro. Pori tenues reticulati subplani.

1139. BOLETUS *suaveolens* acaulis totus albus, superne laevis, poris inaequalibus.

Buletus suaveolens acaulis, superne laavis, salicinus. Lin. syst. ed. R. 4. p. 609. Ensttin Diss. de Bolet. suaveol. Erlang. 1784. c, tab. (figura optima.)

In arborum truncis passim.

Offic. (Fungus salicis.)

Odorem *Anisi* vel *Radicis Iridis florentinae* recentis, praecique post pluvias spargit. Pori inaequales interdum confluentes.

1140. BOLETUS *Medulla panis* crustaceus albus effusus difformis. *Murr. syst. ed. 4. p. 977.*

In den Papenbergen ad arborum truncos passim.

1141. BOLETUS *Buglossum* acaulis utrinque granulato-papillosum, papillis poruliferis, superne convexiusculus carneus, inferne planus subaeratus, substantia fibroso-gelatinosa. Retz. prod. fl. scand. 2. p. 250. n. 1576.

Boletus lucidus stipitatus, pileo coriaceo-castaneo lucido fulcis circularibus, poris minutissimis albis, stipite laterali. Curt. lond. 4. t. 224. Leysser halens. n. 1245.

In truncis arborum putridis *in den Papenbergen* rarius. Autumno.

Esculentus, prae aliis laudatur.

** *Stipitati.*

1142. BOLETUS *perennis* stipitatus perennis pileo utrinque planiusculo. Lin. syst. ed. R. 4. p. 609. Schaeffer fung. t. 125.

In der Jungfernheide infrequens.

Stipes apice attenuatus fuscus. Pileus planus superne fuscus, striis concentricis atro fuscis, disco cinereo; inferne fuscus, poris inaequilibus saepe confluentibus. Aetate fit infundi. buliformis, & exsiccatus cinerascit.

1143. BOLETUS *luteus* stipitatus, pileo convexo viscido fusco, poris rotundatis flavis, stipite cylindrico annulato.

Boletus luteus stipitatus, pileo pulvinato subviscido, poris rotundatis convexis flavissimis,

stipite albido. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 610.

Schaeffer fung. t. 114.

In der Jungfernheide, Spandauerheide & alibi
passim. Autumno.

Esculentus.

1144. *BOLETUS bovinus stipitatus*, pileo con-
vexo pulvinato glabro, poris angulatis, sti-
pite attenuato.

Boletus bovinus stipitatus, pileo glabro pulvinato
marginato, poris compositis acutis: porulis
angulatis brevioribus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p.
610. *Schaeffer fung. t. 103. 104.*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens,
Autumno.

Esculentus.

1145. *BOLETUS crassipes stipitatus*, pileo convexo
glabro, poris subangulatis, stipite medio
crassiore reticulato. *Schaeffer fung. t. 105.*

107. 134.

Iisdem locis passim. Autumno.

Diversissimus a praecedente, stipite medio
crassiore.

Esculentus.

H Y D N U M. *Lin. gen. 1327.*

Capsulae acuminatae prominentes.

1146. *HYDNUM imbricatum stipitatum*, pileo
subconvexo squamofo; squamis imbricatis
subrectis.

Hydnum imbricatum stipitatum, pileo convexo imbricato. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 612. *Schaeffer fung. t. 140.*

In der Jungfernheide rarius. Autumno.

Esculentum.

Stipes brevis crassus glaber sordide flavescens nunquam in medio, semper magis lateralis. Pileus orbiculatus subconvexus saepius uno latere incisus, sordide flavus; squamis in centro imbricatis, apice reflexis; inferne capsulis acutissimis sordide flavis densissime obsitus.

1147. *Hydnum repandum* stipitatum, pileo convexo rufo subtus albo, stipite ad basin incrassato.

Hydnum repandum stipitatum, pileo convexo laevi flexuoso. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 612.

In den Papenbergen passim. Autumno.

Esculentum.

1148. *Hydnum auriscalpium* stipitatum, pileo dimidiato hirsuto fusco, inferne albicante, stipite fusco.

Hydnum auriscalpium stipitatum, pileo dimidiato. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 613. *Schaeffer fung. t. 143.*

In strobulis pini sylvestris dejectis in der Jungfernheide, Papenbergen haud infrequens. Autumno. vere.

1149. *Hydnum parasiticum* acaule arcuato-rugosum tomentosum. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 613?

Echinus nigricans, squamis ellipticis, longissimis aculeis. *Hall. helv.* n. 2318.

In ligno putrido inque afferibus & trabibus frequens.

Lamina tenuis squamis apice divisis longis dense obsita, cum descriptione *Halleri* convenit, an Linneana species sit, me fugit?

1150. *Hydnum gelatinosum* stipitatum gelatinosum, pileo dimidiato supra glaberrimo. *Murr. syst. 14.* p. 978. *Jacq. austr. v. 3. t. 239.*

Echinus crystallinus gelatinosus. *Hall. helv.* n. 2319.

In lignis putridis passim. Autumno.

Saepe absque stipite.

1151. *Hydnum coralloides* ramosissimum, candidum, aculeis longis terminalibus.

Hydnum coralloides stipes ramosus; ramis ultimis subtus echinatis. *Scop. carn. ed. 2.* n. 1602.

Clavaria ramosa; extremis ramulis teretibus, subulatis, recta deorsum descendenteribus. *Scop. carn. ed. 1.* p. 61. n. 5. *Schaeffer fung. t. 142.*

Semel in ligno betulino, pro foco destinato istud vidi. Autumno.

THAELAEPHORA.

Fungus inferne papillas loco foraminum vel lamellarum preferens

1152. THAELAEPHORA *mesenteriformis* compli-
cata lacera scabra fusca. Sterb. fung. t. 27.
f. k?

In pinetis arenosis *in der Jungfernheide* passim.
Autumno.

Stipes fere nullus, toto hoc in genere. Laminae
contortae fuscae superne squamis concolori-
bus minutis obsitae, margine lacerae; externe
pulverulentae per lentem papillosae. TAB.
VII. fig. 15.

1153. THAELAEPHORA *hirsuta* explanata, flava,
extus hirsuta.

An *Helvella pineti*. Lin. syst. ed. R. 4. p. 616?

Helvella agaricus. Withering brittan. 2. p.

773.

In ligno putrido frequens. Persistens.

Agarico vel Boleto acauli similis, sed nunquam
poros vel lamellas vidi, loco vero eorum pa-
pillas observavi.

1154. THAELAEPHORA *glabra* explanata, laevis
sordide albida.

Helvella corrugata. Withering brit. 2. p. 773?

Marsili de generat fungor. fig. 27, in nonnullis
cum nostra specie convenit.

In lignis putridis vulgaris.

PHALLUS. Lin. 1328.

Capulae reticulatim dispositae.

1155. *PHALLUS esculentus* pileo ovato celluloso,
stipite nudo rugoso. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 613.
Schaeffer tab. 199.

In sylvis circa *Berolinum* rarius, in foro inter-
dum venalis exstat, sed locum natalem, spe-
cialem nondum scio. Vere.

Esculentus sub nomine *Spitz morchel.*

1156. *PHALLUS impudicus* volvatus stipitatus, pi-
leo celluloso. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 614.
Schaeffer fung. t. 196. 197. 198.

In nemorosis umbrosis sub *Corylo avellana* ad
Pausin, *Schoenewald* hinter *Spandau* & prope
Coepnick passim. Autumno.

HELVELLA. *Lin. gen. 1330.*

Pileus plicatus. Capsulae latentes.

1157. *HELVELLA Mitra* stipite integro, pileo de-
flexo adnato rugoso brunneo.

Helvella Mitra pileo deflexo adnato lobato diffor-
mi. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 615. *Schaeffer*
fung. t. 158. 160. 161.

In sylvis prope *Spandau*, *Coepnick*, inque locis
suburbanis &c. frequens. Vere.

Esculenta sub nomine *Morchel, Maurache.*

1158. *HELVELLA sulcata* stipite sulcato, rimofo,
pileo plicato adnato crispo nigricante.

Elvela petiolata, lamina in formam capituli de-
orsum plicato-laciniata & crispa; petiolo fistu-

n. 1. Michel gen. pl. 204. tab. 86. fig. 7.
Schaeffer fung. tab. 154.

β . *Tota alba.*

Prope Spandau, in der Jungfernheide sparsim.
 β . rarius. Vere & autumno.

Esculenta.

CYATHUS. Haller helv. 127.

Fungus cyathiformis intus capsulas lentiformes planas proferens.

1159. *Cyathus laevis campanulatus externe villosus, interne laevis.*

Peziza lentifera campanulata lentifera. Lin. syst. ed. R. 4. p. 616.

Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti sericeum. Michel gen. 222. t. 102. f. 1.

In ligno putrido im Thiergarten, ad terram in hortis alibique passim. Autumno, vere.

1160. *Cyathus striatus campanulatus externe hirsutus, interne striatus.*

Peziza striata campanulata lentifera villosa, interne striata. Huds. angl. ed. 2. p. 634. n. 2.

Cyathoides cyathiforme, obscurum externe hirsutum interne plumbeum glabrum & striatum.

Michel gen. 222. t. 181. f. 2.

Ad terram in hortis inque ligno putrido passim. Autumno, vere.

1161. *Cyathus cylindricus cylindricus arhizus*

Cyathoides luteum crucibuliforme. Michel gen.

222. t. 102. f. 3.

Peziza crucibuliformis. Scop. carn. ed. 2. n. 1630.
In asseribus trabibusque putrescentibus in hortis
passim. Autumno, vere.

Peziza laevis Hudsoni a Cyatho nostro differt,
quod ventricosa sit, & figura *Schaefferi* no-
stram speciem haud exprimat.

PORONIA. Gleditsch syst. n. 1217.

Fungus patelliformis. *Semina* in superficie exter-
na per puncta minutissima ejaculans.

1162. PORONIA Gleditschii.

Peziza punctata turbinata truncata, disco puncta-
to. Lin. syst. ed. R. 4. p. 617.

In stercore bovino prope Spandau & versus Gru-
newald passim. Hyeme.

Fungus stipitatus: stipite fusco cylindrico. Pi-
leus orbiculatus utrinque planus, inferne fuscus,
superne albus, disco nigro punctato.

PEZIZA. Lin. gen. 1331.

Fungus saepius concavus, absque visilibus
fructificationibus; *Semina* minutissima pulve-
ris instar, elastice explodens.

1163. PEZIZA cornucopiae infundibuliformis,
disco patente sinuato punctato. Lin. syst. ed.
R. 4. p. 617.

a. fusca. Schaeffer fung. t. 165.

b. rufescens. Schaeffer fung. t. 166.

In den Papenbergen rarius. Autumno.
Semina in superficie externa ejaculans.

1164. PEZIZA *stipitata*, stipitata hemisphaerica,
externe fusco hispida, stipite cylindrico. *Huds.*
angl. ed. 2. p. 636. *Schaeffer fung. t. 167.*

In den Papenbergen rarius. Autumno.

Stipes subulatus fuscescens, hispidus. Pileus
externe hemisphaericus hispidus albido-fusces-
cens, interne concavus glaber obscurior.

1165. PEZIZA *copularis* stipitata lutea, stipite
brevissimo, campanulata margine crenata.

Peziza copularis globoso-campanulata: margine
crenato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 618.*

Inter muscos *in der Jungfernheide* rarissima.
Autumno.

1166. PEZIZA *lacera* sessilis campanulata albicans
margine lacero.

In truncis putridis in den Papenbergen infre-
quens. Hyeme.

Semiuncialis campanulata externe albicans, in-
terne flavescens gelatinosa, margo inaequaliter
lacerus, laciniis acutis longis. TAB. VII.
fig. 16.

1167. PEZIZA *cochleata* turbinata cochleata, interne
aurantiaco coccinea, externe albicans.

Peziza cochleata turbinata cochleata. *Lin. syst.*
ed. R. 4. p. 619.

Fungoides auriculum judae referens, intus rufuscens, extus candicans, & quasi farinosum.

Vaill. paris. 57. t. 11. f. 8.

In Thiergarten passim. Autumno.

Semina externa in superficie, ut in *Peziza cornucopiae* ejaculans.

1168. *Peziza crenata* turbinata margine crenulata
interne fusca externe albido pulvere conspersa.

Peziza cochleata B. *Batsch fung. cont. 123. n. 157.*
t. 28. f. 157.

In truncis putridis & ad terram passim in der Jungfernheide. Autumno.

Diffr. a praecedenti:

- 1) margine crenato.
- 2) colore interne fusco, &
- 3) quod semina interne ejaculet.

1169. *Peziza leporina* coriacea spathulata concava fusca externe pallida.

Peziza leporina sessilis ; elongata, spathulata, spathiformis, erecta ; inferne cylindrica, angustior, semiclausa ; superne dilitata oblonga, lateraliter patens tota, ore deorsum in rimam manubrii decurrente. *Batsch fung. 117. n. 6.*
Schaeffer fung. t. 156.

In den Papenbergen passim. Autumno.

1170. *Peziza rhizophora* hemisphaerica convexa fusca sessilis, inferne albida concava, radibus simplicibus teretibus donata.

Phallus acaulis convexus glaber; subaggregatus; ovalis vel rotundatus, crassus; supra fuscus, infra albus, radicibus disci pluribus, crassis, albis. *Batsch fung.* 129. n. 1. *Schaeffer fung.* t. 153.

In pinetis arenosis *im Grunewald & Jungfernheide* passim. Autumno.

Singularis fungus, ob radices crassas.

1171. *PEZIZA scutellata* sessilis plano-convexa, margine piloso.

Peziza scutellata plana; margine convexo piloso.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 618.

In der Jungfernheide in truncis putrescentibus, ad pontem destructum. Junio in autumnum usque.

Sessilis plano-convexa violaceo-coccinea, margine integro, pilis longis nigerrimis obsito.

1172. *PEZIZA nivea* sessilis nivea; planata tota, vel margine angusto cincta. *Batsch fung.* 117. n. 1. t. 12. f. 56.

In truncis putridis. Autumno passim.

1173. *PEZIZA cinerea* sessilis plana diaphana cinerea.

Peziza cinerea sessilis, cinerea, reflexa, margine crispo sinuato lobato. *Batsch fung. cont.* 197. n. 137. tab. 26. f. 137.

In truncis arborum putridis passim. Autumno.

1174. PEZIZA *calyciformis* stipitata convexa, intus fuscescens extus cinerascens.

Peziza calyciformis pileo ochraceo, glabro, subtus cum stipite carneo-furfurosa. *Batsch fung. cont.* 195. n. 135. t. 26. f. 135.

In arborum truncis, ramulisve dejectis putrefactibus. Autumno.

Variat colore albo saepissime.

1175. PEZIZA *flava* sessilis plana orbiculata flava.

In truncis arborum putridis frequens. Autumno.

Paullo major, quam *P. cinerea*, tota plana absque margine elevato, flava.

CLAVARIA. Lin. gen. 1332.

Fungus glaber saepius clavaeformis, absque visibilibus fructificationibus.

* *Indivise.*

1176. CLAVARIA *ligneæ* simplicissima clavaeformis dura nigra.

In lignis putridis *in den Papenbergen* rarissime. Autumno.

Figura externa cum *Cl. pistillari* a Michelio tab. 87. f. 1. depicta exacte convenit, ut nullo modo diversa videatur, ast substantia ejus lignea immo durissima est, interne alba externe nigerrima. Num fortassis varietas?

Distinguunt, qui recentem *Clavariam pistillarem*

1177. CLAVARIA *ophioglossoides* clavata integer-rima compressa obtusa. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 620.

In der Jungfernheide bei den Rehbergen frequens.
Aestate & autumno.

Semper nigerrima coriacea compressa.

1178. CLAVARIA *parasitica* clavata, nigra, simplicissima, stipite tereti, corpore oblongo tereti obtuso papilloso.

Im Thiergarten beim Hofjaeger passim. Autumno.

Singularis fungus semper *Lycoperdoni* mox descripturo insidens. Simillima *Clavariae ophioglossoidi* differt tamen substantia molliori, duratione minori, & quod nunquam compressa & corpus semper papillosum sit. Aestate apice excavatur. TAB. VII. fig. 17.

1179. CLAVARIA *granulata* clavata alba simplicissima; teres, corpore fistuloso, radice granulata nigra.

Clavaria gyrans stipite elongato, capillari; clavula terminali sub-elongata, cylindrica, termino utrinque oblongata. *Batsch. fung. cont.* 235. n. 164. t. 28. f. 164.

In fruticetis umbrosis in der Jungfernheide rarius. Autumno.

Omnium minutissima alba. Stipes capillaris,

laris granulata, granulae sphaericae nigrae.

TAB. VII. fig. 18.

1180. CLAVARIA *simplicissima*, simplicissima flava
subulata, teres, apice fusca.

Iisdem locis passim. Autumno.

1181. CLAVARIA *cespitosa* cespitosa, caulis sim-
plicissimis, basi nonnunquam unitis, oblongo-
clavatis farctis aquose luteolis. Murr. syst. 14.
p. 980. Jacq. Misc. v. 2. p. 98. t. 12. f. 2.

In graminosis in der Jungfernheide passim. Au-
tumno; vere.

** *Ramosae.*

1182. CLAVARIA *Hypoxylon ramosa cornuta com-
pressa*. Lin. syst. ed. R. 4. p. 621. Weigel ob-
serv. 50. t. 3. f. 5.

In lignis putridis im Thiergarten, Jungfern-
heide, Papenbergen & alibi frequens. Au-
tumno. vere.

Nigra apicibus albicantibus.

1183. CLAVARIA *coralloides* ramis confertis ramo-
fissimis inaequalibus. Lin. syst. ed. R. 4. p.
621. Schaeffer fung. t. 175-177.

Clavaria caule crassissimo, ramis innumeris, ce-
spitosis, breviter dentatis. Hall. helv. n. 2201.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi fre-
quens. Autumno.

1184. CLAVARIA *muscoides* ramosa inaequalis corniculata, apicibus acutis.

Clavaria muscoides ramis ramosis acuminatis inaequalibus luteis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 622.
Schaeffer fung. t. 173.

Inter Muscos in der Jungfernheide passim.

1185. CLAVARIA *cornea* subdivisa minuta fuscens.

Clavaria cornea. *Batsch fung. cont. 229.* n. 161.
t. 28. f. 161.

In lignis putridis in den Papenbergen passim.
Hyeme.

Minuta, 3 linearis, fuscens apice bifido obtuso obscuriore. Interdum simplex etiamque trifida.

PUCCINIA. *Michel. gen. 213.*

Corpus cylindraceum seminibus caudatis radiatim positis, elastice exsiliensibus, farctum.

1186. PUCCINIA *simplex* corpore cylindrico simplicissimo obtuso.

Puccinia non ramosa major pyramidata. *Michel. gen. 213.* tab. 92. f. 1.

In arborum truncis praeceps Pruni armeniacae rarius. Autumno.

STEMONITIS. *Gleditsch syst. n. 1219.*

Fungus volva discidente filis reticulatis factus, seminaque nuda elastice ejaculans.

1187. *STEMONITIS typhina* stipite nigro capitulo cylindrico fusco rubente. *Wiggers* pri-
mit. 110. n. 1154.

Clathrus nudus stipitatus, capitulo oblongo axi
longitudinali adnato. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 615.

Clathroidastrum. *Michel gen. 214. tab. 94.*

In arborum truncis putridis rarius. Autumno.

1188. *STEMONITIS fusca* stipite nigro, capitulo
cylindrico fusco maturitate fisso.

Clathrus pertusus. *Batsch fung. cont. 263. t. 30.*
fig. 176.

In truncis arborum putridis *in den Papenbergen*
& *Jungfernheide* haud infrequens. Autumno.

Capitulum semper fuscum multo minus & acu-
tiuscum, acetate finditur.

1189. *STEMONITIS crocata* tota crocea stipitata
capitulum cylindricum obtusum rudimento
volvae circumdate.

Clathrus crocatus capitulo cylindrico oblongo,
cute fugaci, confeeto e lana stipata, molli,
elastica, pulvere fusco croceo referta; insi-
stente caliculi circumscisso terminali stipitis va-
lidiuscum una cum calyculo, fulvo-crocei, ni-
tidissimi & striati. *Batsch fung. cont. 265.*
n. 177. t. 30. fig. 177.

In ligno putrido & inter muscos *in den Papen-
bergen* passim.

Rudimento calyciformi a praecedentibus di-
stincta.

1190. *STEMONITIS pyriformis* sessilis pyriformis
volva difficile discedente tota fulva.

Arcyria pyriformis gregaria sessilis pyriformis
flava. *Wiggers primit.* 110. n. 1153.

Trichia gregaria sessilis, pyriformis, flava. *Hall.*
hist. n. 2168. t. 48. f. 7.

In truncis arborum putridis *in der Jungfern-*
heide infrequens. Autumno.

Nostra fere duplo major, quam ista in opere *Cel.*
Halleri depicta. Volva difficile discedit.

LYCOPERDON. *Lin. gen.* 1333.

Fungus seminibus filo instructis interne ex toto
repletus.

* *Solidæ, subterranea absque radice.*

1191. *LYCOPERDON cervinum* globosum solidi-
uscum lacerum centro farinifero radice de-
stitutum. *Lin. Syst. ed. R. 4.* p. 623.

Ad radices arborum infra terram *in der Jung-*
fernheide passim.

Offic. *Tubera cervina.*

Cortex glaber nec asper.

1192. *LYCOPERDON scabrum* subterraneum fus-
cescens, scabrum subglobosum.

Infra terram *im Thiergarten beim Hoffjaeger* pas-
sim. Autumno, hyeme.

Oblongum vel subglobosum mox magnitudine
Nucis Juglandis mox Pruni spinosae fructus,
tusco-luteum, scabrum, per lentem squamis
angulosis truncatis oblitum. Squamas figura

valde irregulares, & mutua pressione interdum planae, vel compressae, interdum tri-vel quadragonae, apex earum semper truncatus, in junioribus obtusus. Substantia interna nigra est, & e glebis oblongis ut in L. cervino composita; aetate deliquescere videtur. TAB. VII. fig. 19.

Radix *Clavariae parasiticae* n. 1179. certo non est, nam interdum absque Clavariis hunc fungum observavi, & cui bono substantia nigra glebosa, qua cum farcta est, si radix esset? Quod adhuc magis, eum radicis partem non esse, refutat, est: quod Clavaria nunquam cum radiculis substantiam penetrat; semper radiculae externam superficiem circumdant.

Differt a *Lycoperdone Tubere* squamis truncatis multo minoribus, saepius planis; quae in *Tubere* cristallis similes fere semper pentagonae & magis dissitae sunt.

** *Pulverulenta, radicata supra terram.*

1193. LYCOPERDON *Bovista* subrotundum: lace-rato-dehiscens. Lin. syst. ed. R. 4. p. 623.

α . maximum glabrum. Schaeffer tab. 191.

β . oblongum subscabrum minor. Schaeffer fung. t. 186.

γ . oblongum verrucosum. Schaeffer fung. 189.

δ . oblongum maculatum. Schaeffer fung. 190.

ε . elongatum stipitatum. Schaeffer fung. 187.

In pascuis, versuris, pratis siccis, collibus, & ad
margines nemorum copiose. Autumno.

Offic. Crepitus lupi. Fungus chirurgorum.

1194. *Lycoperdon muricatum* sessile pyriforme,
superficie externa muricata, subrotundo ore.

Lycoperdon muricatum sessile globoso-pyriforme, depresso, totum pyramidibus validis acutioribus polyedris subdistantibus muricatum. *Batsch fung.* 145. n. 4. *Schaeffer fung.* t. 84.

In graminosis, versuris agrorum passim. Autumno.

1195. *Lycoperdon gemmatum* stipitatum subglobosum, aculeis acutis dense obsitum.

Lycoperdon gemmatum stipitatum subglobosum, utrinque subdepresso, pyramidibus validis distantibus muricatum; stipite subelongato, valido, incrassato, etiam muricato, distilat, linearis. *Batsch. fung.* 147. n. 14. *Michel gen.* t. 97. f. 1.

In der Jungfernheide passim. Autumno.

1196. *Lycoperdon pyriforme* stipitatum subglobosum umbonatum glabrum, subrotundo ore.

Lycoperdon pyriforme stipitatum, globosum, acuminatum, scabrum, stipite incrassato confluente, acumine aptero dehiscens. *Batsch fung.* 147. n. 12. *Schaeffer fung.* t. 185.

In nemoribus passim. Autumno.

1197. *Lycoperdon pedunculatum* stipite longo,
capitulo globo glabro: ore cylindrico inte-
gerrimo. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 625.*

Prope *Spandau* & ante *portam Halensem* rarius.
Autumno.

1198. *Lycoperdon equinum* stipitatum stipite
cylindrico, capitulo sphaerico pulverulento
circuinsciffo.

In ungulis equorum putridis frequens.

Album magnitudine tuberculi *Verrucariae Beo-*
mycis. Stipes fere cylindricus. Capitulum
exakte globosum pulvere albido tectum circum-
scissum. Semina fusca. *TAB. VII. fig. 20.*

*** *Stellata.*

1199. *Lycoperdon stellatum* volva multifida ca-
pitulo subrotundo sessili ore integro,

Lycoperdon stellatum volva multifida patente, ca-
pitulo glabro: ore acuminato dentato. *Lin.*
syst. ed. R. 4. p. 624. Michel gen. t. 100.
fig. 4. 6.

Im *Grunewald* & *Papenbergen* rarius. Au-
tumno.

1200. *Lycoperdon Geaster* volva multifida, ca-
pitulo oblongo sessili acuminato, ore piloso.
Batsch fung. 151. n. 22. Michel gen. t. 100.
fig. 1.

In der Jungfernheide rarius. Autumno.

1201. LYCOPERDON *pedicellatum* volva multifida,
capitulo oblongo acuminato pedicellato, ore
fimbriato. *Batsch. fung.* 151. n. 25. *Michel*
gen. t. 100. f. 2.

In der Jungfernheide rarius. Autumno.

***** *Parasitica.*

1202. LYCOPERDON *Epidendrum* subglobosum
purpurascens ore lacero, seminibus rubris.

Lycoperdon Epidendrum cortice farinaque pur-
purea. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 626.

In der Jungfernheide versus Spandau in truncis
arborum passim. Vere & autumno.

1203. LYCOPERDON *vesparium* gregarium cylindricum rufescens, ore integerrimo subrotundo, seminibus rufis.

Lycoperdon vesparium gregarium, cellis dense connatis, scariosis, membranaceis, croceofulvallis, semen bombycinum saturate croceum continentibus. *Batsch fung. cont.* 253. n. 172. t. 30. f. 72.

In arborum truncis putridis in den Papenbergen
rarius. Autumno.

1204. LYCOPERDON *favogineum* gregarium, globulis subrotundis luteis, seminibus luteis.

Lycoperdon favogineum gregarium; globulis dense approximatis vesicularibus, semen bombacinum luteum recondentibus. *Batsch fung. cont.* 257. n. 173. t. 30. f. 173.

In truncis putridis frequens. Autumno.

1205. *Lycoperdon lumbricale* filiforme teres reticulatum luteum, seminibus luteis.

Lycoperdon lumbricale teres, ramosum & proserpens; constans tunica vesiculari pellucida, semen luteum bombacinum continente. *Batsch fung.* 259. n. 174. t. 30. f. 174.

In der Jungfernheide ad arborum cortices rarissime. Autumno.

CARPOBOLUS. *Michel. gen. 221.*

Fungus volvatus capsulam globosam ejaculans.

1206. CARPOBOLUS albicans.

Lycoperdon Carpobolus volva multifida, fructu globoſo ex seminibus combinatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 624.*

Carpobolus. *Michel gen. 221. n. 1, tab. 101. fig. 1.*

In lignis putridis im Thiergarten & Papenbergen rarissime. Autumno.

NAEMASPORA.

Fungus oblongus semina filo instructa ore emitens.

1207. NAEMASPORA glabra oblonga fusca glabra.

Sphaeria bombarda gregaria; oblonga, nigro fusca, apice poro tenerrimo semen album exprimente. *Batsch fung. cont. 271. n. 181. tab. 30. f. 181.*

In betularum truncis putrescentibus im Thiergarten frequens. Vere.

Hujus generis est forte *Lichen colliculosus.* Hoff.
manni lich. tab. 2. f. 2?

Sphaeria Halleri.

*Fungus sphaericus seminibus ecaudatis farctus, per
poros in superficie sparsos saepius emitens.*

1208. Sphaeria *lycoperdoides* convexa nigra spar-
sa, medulla atra.

Sphaeria lycoperdoides composita convexa subfo-
litaria, medulla farinosa atra. Weigel observ.
botan. 47. n. 10. t. 3. f. 2.

Lycoperdon variolosum parasiticum sessile subro-
tundatum, cortice exteriore fulvo deciduo; fa-
rina atra compacta. Lin. syst. ed. R. 4. p. 626.
s. cortice fulvo.

In arborum emortuarum ramulis frequens.
Hyeme.

1209. Sphaeria *rubra* convexa rubra tota exaspe-
rata. Wiggers primit. 84. n. 935.

In ligno fagorum putrescente. Hyeme.

Tota fusco-rubra exasperata.

1210. Sphaeria *tremelloides* subglobosa purpurea
glabra sparsa.

Sphaeria tremelloides composita solitaria subpe-
dunculata subglobosa purpurea subgelatinosa.
Weigel observ. bot. 46. n. 8. tab. 3. f. 1.

Tremella purpurea subglobosa sessilis, solitaria
glabra. Lin. syst. ed. R. 4. p. 564.

In ramulis arborum fruticumque emortuis co-
piose. Autumno. vere.

1211. SPHAERIA *olivacea* solitaria oblonga con-
vexa olivacea pulverulenta, carne concolore.

In foliis Daturae stramoniae, caulis plantarum,
inque fructibus Daturae, Cucurbitae
Peponis, lagenariae aliarumque plantarum
frequens. Autumno.

Pulverulenta junior laetius virescit, aetate ni-
gescit, fit olivacea, pulvis interne contentus
olivaceus. An *Sphaeria Brassicae Dicksoni*?

1212. SPHAERIA *confluens* oblonga fusca depressa
confluens.

In ligno putrescente *in der Jungfernheide* & alibi
haud infrequens. Hyeme.

Fusca oblonga pulverulenta depressa saepius in
lineas longas confluens. TAB. VII. fig. 21.

1213. SPHAERIA *globularis* gregaria globosa atra.

Sphaeria globularis gregaria globata clausa ni-
gra, nitoris expers, indurata. *Batsch fung.*
cont. 271. n. 180. t. 30. f. 180.

In den Papenbergen passim. Autumno.

In ligno putrido.

1214. SPHAERIA *mammosa* solitaria mammifor-
mis olivacea. *Dickson fascicul. crypt. p. 22.*
Hall. hist. helv. 2181.

Lichen Agaricus crustaceus, initio subhirsutus
& oleae conditae coloris, per siccitatem glaber

niger, & veluti deustus, receptaculis florum mammiformibus elegantissimis. Michel gen. 104. ord. II. t. 55. f. 1.

In ligno putrido *in den Papenbergen rarius.*
Hyeme.

Nostra tota nigra.

TREMELLA. Lin. gen. 1320.

Corpus gelatinosum partibus frutificaibus in illo latentibus.

1215. TREMELLA *Agaricoides* stipitata nigra inquinans, pileo subconvexo. Retz. prod. fl. scand. 2. p. 235. n. 1424.

Peziza brunnea interne atra absque nitore; externe rugulosa, fuscobrunnea carnosa polymorpha. Batsch fung. 125. n. 26. t. 11. f. 50. Schaeffer fung. t. 158.

Peziza sessilis, infundibuliformis, extus hirsuta umbrina, intus nigerrima. Hall. helv. n. 2219. t. 48. f. 8.

Lycoperdon truncatum parasiticum subrotundum truncatum. Lin. syst. ed. R. 4. p. 626. Junior planta.

Auf den Holzplaezen in ligno fagi putrido frequens. Autumno.

1216. TREMELLA *rufa* longitudinaliter dimidiato. infundibuliformis. Murr. syst. 14. p. 965. Jacq. Misc. v. 1. p. 143. t. 14.

In truncis putridis *in der Jungfernheide & Papenbergen* rarius. Autumno.

Tota rubescens vel rufescens. Nostra semper minor figura *Jacquini*.

1217. TREMELLA *Auricula* subrotunda concava plicata nigrescens.

Peziza Auricula concava rugosa auriformis, *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 619.

Ad Sambuci nigrae truncos aliarumque fruticum passim. Vere & autumno.

Offic. *Auricula Judae.* Fungus sambuci.

1218. TREMELLA *Noftoc* sessilis subrotunda pli- cata undulata fusco virens. *Huds. angl. ed. 2.* p. 564. n. 5.

Tremella Noftoc plicata undulata. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 562.

Tremella terrestris sinuosa pinguis & fugax. *Dill. musc. 52.* t. 10. f. 14.

Ad terram passim post pluvias. Autumnali tem- pore & vere.

1219. TREMELLA *arborea* sessilis subrotunda un- dulata nigrescens. *Huds. angl. ed. 2.* p. 563.

Tremella sagarum sessilis membranacea difformis venosa subfuscata. *Retz. prod. fl. scand.* n. 1422.

Tremella nigricans. *Withering brit.* 2. p. 732.

Tremella arborea nigricans, minus pinguis & fugax. *Dill. musc.* 54. t. 10. f. 15.

In arborum rāmulis dejectis inque asperibus sepi-
busque putrescentibus. Autumno & vere.

1220. TREMELLA *mesenteriformis* sessilis subro-
tunda plicato-rugosa flava.

Tremella mesenteriformis in plicas multiplices in-
torta. Murr. *syst.* 14. p. 965. Jacq. *Miscel.*
v. 1. p. 142. t. 13.

In arborum truncis putridis *in den Papenbergen*
rarius. Autumno.

1221. TREMELLA *crispa* terrestris tenera crispa.
Schreb. *spicil.* 140. n. 1151. Dill. *musc.* 52.
t. 10. f. 12.

Tremella tenerrima. Withering *brit.* 2. p. 732.
Ad terram sub quercubus magnis, inque locis
suburbanis post pluvias.

1222. TREMELLA *viridis* oblonga laete viridis
convexa.

Tremella viridis hemisphaerica viridis lubrica
faxis adnata. Retz. *prod. fl. scand.* n. 1428.

In lacu ad Reineckendorf & alibi plantis insidens
aquaticis. Aestate.

Simillima *Tremellae hemisphaericæ* L. & litho-
philæ nostræ *in den Schriften der Gesellsch.*
Naturf. Freunde zu Berl. *descripta.*

Ita inter se differunt: 1) *Tremella hemisphaerica*
magis rotunda, e luteo virescens est, punctis.
que adpersa. 2) *Tremella lithophila* vero
fusco viridis, magis plana, & per lentem viri-
dis disco fusco semper observatur. 3) *Tre-*

mella viridis denique laete viridis absque punctis, per lentem absque disco fusco reperitur & nunquam tam regularis quam reliqui, interdum oblonga interdum vero subrotunda.

1223. *TREMELLA granulata* gelatinosa sphaerica aggregata viridis. *Huds. angl. ed. 2.* p. 566.

Ulva granulata sphaerica aggregata. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 586.

Ulva radicata sphaerica aggregata; radicibus ramosis, viridis. *Retz prod. fl. scand. 2.* n. 1492.

In paludosis humidis prope *Spandau* ubi Marsilea natans reperitur. Junio.

1224. *TREMELLA moniliformis* globosa pallide viridis, in lineas disposita.

Post pluvias in hortis. Aestate.

Valde fugax sempex globosa in lineas reticulatim disposita.

1225. *TREMELLA stipitata* stipitata, tota rubra diaphana, corpore cylindraceo.

In arborum truncis putridis ad *Falkenhagen* rarius. Hyeme.

Figura externa *Tremonitidi typhinae* similis, sed tota gelatinosa diaphana rubra.

MUCOR. *Lin. gen. 1334.*

Fungus filiformis capsulis globosis.

* *Perennis.*

1226. *MUCOR furfuraceus* perennis viridis, foliis
furfuraceis, stipite filiformi capitulo globoso.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 628.

Lichen capitatus. Schreb. spicil. 134. n. 1134.

In truncis betulorum *im Thiergarten* frequens,
ad terram inque quercuum truncis *in der*
Jungfernheide passim.

** *Fugaces.*

1227. *MUCOR Mucedo* stipitatus, capsula globosa.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 628.

In pane, aliisque esculentis.

1228. *MUCOR leprosus* setaceus, seminibus radi-
calibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 628.*

In cellis locisque suffocatis. Autumno.

1229. *MUCOR glaucus* stipitatus, capitulo subro-
tundo aggregato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 629.*

In fructibus variis copiosissime.

1230. *MUCOR crustaceus* stipitatus, spicis digitatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 629.

In esculentis variis etiamque fructibus.

1231. *MUCOR cespitosus* stipite ramoso, spicis
ternatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 629.*

In variis putrefcentibus.

1232. *MUCOR scepticus* unctuosus flavus. *Lin. syst.*
ed. R. 4. p. 630.

In fimetis, locis suburbanis, inque sylvis passim.

1233. MUCOR *Lycogala* capitulo aqueo, gelatino-
so, pellucido, fugaci, globofo, sessili. *Scop.*
carn. ed. 1. p. 67. n. 6. *ed. 2.* n. 1645.

In arboris trunko putrido semel obſervavi. Au-
gusto.

1234. MUCOR *urceolatus* stipitatus fugax, stipite
ſuperne ventricoso pellucido rorido, capitulo
ſubrotundo elatiſco nigro. *Dickson fascicul.*
crypt. pl. 25. t. 3. f. 6.

In ſtercore equino in pratis nemorofis rarius.
Aestate.

TANTUM.

INDEX GENERUM.

A.

Acer 435-437.
Achillea 842-843.
Acorus 387.
Acrostichum 877.
Adoxa 448.
Aegopodium 352.
Aesculus 419.
Aethusa 336.
Agaricus 1089-1130.
Agrimonia 510.
Agrostemma 503.
Agrostis 131-136.
Aira 142-149.
Ajuga 595-596.
Alchemilla 225-226.
Alisma 414-418.
Allium 369-374.
Alopecurus 129-130.
Alsine 357.
Althaea 694.
Alyssum 659-660.
Amaranthus 358-359.
Anagallis 256-257.
Anchusa 244.
Andromeda 462.
Anemone 573-578.
Anethum 344-345.
Angelica 327.
Anthemis 840-841.
Anthericum 379-380.
Anthoceros 1000-1001.
Anthoxanthum 63.
Anthyllis 730.
Antirrhinum 642-644.

Apium 350-351.
Aquilegia 568.
Arabis 664-665.
Arbutus 463.
Arctium 804.
Arenaria 483-487.
Aristolochia 386.
Artemisia 816-820.
Arundo 183-187.
Asarum 506.
Asclepias 291.
Asparagus 381.
Asperugo 249.
Asperula 206-208.
Asplenium 879-880.
Astragalus 743-744.
Athamanta 323 324.
Atriplex 300-303.
Avena 176-182.

B.

Ballota 619-620.
Barbula 929-930.
Bellis 834.
Berberis 399.
Beta 313.
Betonica 615.
Betula 229-230.
Bidens 806-808.
Boletus 1131-1145.
Borago 248.
Brassica 668-670.
Briza 158.
Bromus 167-175.
Bryonia 863-864.

Bryum 962-964.

Butomus 454.

Buxbaumia 978-979.

Byssus 1075-1082.

C.

Calendula 851-852.

Calla 566.

Callitricha 3-4.

Caltha 594.

Campanula 274-280.

Cannabis 298.

Cardamine 681-682.

Carduus 793-796.

Carex 85-115.

Carlina 805.

Carpinus 511.

Carpobolus 1206.

Carum 346.

Caucalis 316-317.

Centaurea 844-847.

Centunculus 219.

Cerastium 491-495.

Ceratophyllum 564-565.

Chaerophyllum 341.

Chaiturus 622.

Chara 2.

Cheiranthus 662-663.

Chelidonium 555.

Chenopodium 304-312.

Chondrilla 770.

Chrysanthemum 835-837.

Chrysosplenium 464.

Cichorium 787-788.

Cicuta 335.

Cineraria 828.

Circaeа 25.

Cistus 561.

Cladonia 1041-1051.

Clavaria 1176-1185.

Clinodiplosis 661.

Cnicus 797-801.

Comarum 554.

Conferva 1083-1088.

Conium 320.

Convallaria 382-385.

Convolvulus 262-263.

Coriandrum 337.

Cornus 222-223.

Coronilla 713.

Corylus 434.

Crataegus 527.

Crepis 783-784.

Cucubalus 476-478.

Cuscuta 231.

Cyathus 1159-1161.

Cynoglossum 245.

Cynosurus 159.

Cyperus 83. 84.

D.

Dactylis 160.

Datura 267.

Daucus 318-319.

Delphinium 567.

Dianthus 472-475.

Dicranum 923-926.

Digitalis 648.

Dipsacus 202.

Draaba 652.

Drosera 366-367.

E.

Echium 252.

Elymus 191.

Epilobium 421-425.

Equisetum 865-869.

Erica 429 430.

Erigeron 825-826.

Eriophorum 80-81.

Ervum 721-723.

Erysimum 661.

INDEX GENERUM.

425

Eupatorium 809.
Euphorbia 514-520.
Euphrasia 634-635.
Evonymus 283.

F.

Fagus 512.
Festuca 161-166.
Filago 853-855.
Fissidens 919-922.
Fontinalis 980.
Fragaria 542.
Fraxinus 22.
Fumaria 704-705.

G.

Galeopsis 610-612.
Galium 209-214.
Genista 708-710.
Gentiana 292-294.
Geranium 686-693.
Geum 552-553.
Glecoma 606.
Gnaphalium 811-815.
Gratiola 59.
Grimmia 904-906.
Gymnostomum. 896-899.
Gypsophila 469.

H.

Hedera 288.
Hedysarum 724.
Helvella 1157-1158.
Heracleum 326.
Herniaria 297.
Hieracium 776-782.
Hippuris 1.
Holcus 139-141.
Holosteum 201.
Hordeum 193-196.
Hottonia 255.

Humulus 299.
Hydnum 1146-1151.
Hydrocharis 453.
Hydrocotyle 315.
Hyoscyamus 268.
Hyoseris 785.
Hypericum 755-759.
Hypnum 945-961.
Hypochaeris 789-791.
Hyssopus 600.

I.

Jasione 856.
Iberis 658.
Ilex 232.
Illecebrum 289.
Inula 829 833.
Iris 68. 69.
Juncus 358-368.
Jungermannia 984-995.
Juniperus 683-684.

K.

Koehlretera 975.

L.

Laetula 768-769.
Lamium 607-609.
Lapsana 786.
Lasperpitium 325.
Lathraea 639.
Lathyrus 718-720.
Lavandula 602.
Ledum 456.
Leerfia 901-903.
Lemna 5-8.
Leontodon 773-775.
Leonurus 623.
Lepidium 653-655.
Lepra 1067-1074.
Leskia 947-948.

Lichen 1004-1040.

Ligustrum 23.

Lilium 375.

Limosella 649.

Linum 363-365.

Lithospermum 243.

Lolium 188-190.

Lychnis 504-505.

Lycoperdon 1191-1205.

Lycopodium 870 873.

Lycopsis 250-251.

Lycopus 61.

Lysimachia 258-260.

Lythrum 508-509.

M.

Malva 695 698.

Marchantia 996.

Marrubium 621.

Marsilea 890.

Matricaria 838. 839.

Medicago 726-729.

Meesia 981-983.

Melampyrum 636-638.

Mentha 603-605.

Menyanthes 254.

Mercurialis 451-452.

Mespilus 529.

Milium 137.

Mnium 965-973.

Monotropa 455.

Montia 200.

Mucor 1226-1234.

Myagrum 650-651.

Myosotis 240-242.

Myosurus 368.

Myriophyllum 446-447.

N.

Naemaspura 1207.

Nardus 718.

Neckeria 931-940.

Nepeta 601.

Nigella 569-570.

Nymphaea 562-563.

O.

Oenanthe 333.

Oenothera 420.

Ononis 714-715.

Onopordon 792.

Ophioglossum 874.

Ophrys 49-52.

Orchis 42-47.

Origanum 625-626.

Ornithogalum 376-378.

Ornithopus 742.

Orobus 731-733.

Osmunda 875-876.

Oxalis 501-502.

P.

Panicum 121-126.

Papaver 556-559.

Paris 449.

Parnassia 361.

Pastinaca 343.

Pedicularis 640. 641.

Peltigera 1002. 1003.

Peplis 400.

Peziza 1163-1175.

Phalaris 119. 120.

Phallus 1155. 1156.

Phascum 891-894.

Phaseolus 711. 712.

Phellandrium 334.

Phleum 127. 128.

Phyteuma 273.

Pimpinella 347-349.

Pinguicula 56.

Pinus 699-702.

Pisum 716. 717.

INDEX GENERUM.

427

- P.*
 Plantago 215-219.
 Poa 150-157.
 Pollichia 613. 614.
 Polycnemum 70.
 Polygala 706.
 Polygonum 438-445.
 Polypodium 882-889.
 Polytrichum 910-915.
 Populus 431-433.
 Poronia 1162.
 Portulaca 507.
 Potamogeton 233-238.
 Potentilla 542-549.
 Prenanthes 771.
 Primula 253.
 Prunella 631. 632.
 Prunus 522-526.
 Pteris 878.
 Puccinia 1186.
 Pulmonaria 246.
 Pyrola 457-461.
 Pyrus 530. 531.
- Q.*
 Quercus 450.
- R.*
 Ranunculus 581-592.
 Raphanus 671. 672.
 Reseda 513.
 Rhamnus 281. 282.
 Rhinanthus 633.
 Ribes 285-287.
 Riccia 997-999.
 Rosa 535-537.
 Rubus 538-541.
 Rumex 401-410.
- S.*
 Sagina 239.
 Sagittaria 572.
- Salix 9-21.
 Salsola 314.
 Salvia 62.
 Sambucus 354-355.
 Sanguisorba 220.
 Saponaria 470-471.
 Satureja 599.
 Satyrium 48.
 Saxifraga 465-466.
 Scabiosa 203-205.
 Scandix 338-340.
 Scheuchzeria 411.
 Schoenus 82.
 Scirpus 71-77.
 Scleranthus 467-468.
 Scorzonera 762. 763.
 Scrophularia 645-647.
 Scutellaria 630.
 Secale 192.
 Sedum 496-500.
 Selinum 321. 322.
 Sempervivum 521.
 Senecio 819-824.
 Serapias 53-55.
 Serratula 802. 803.
 Sefeli 342.
 Silene 479.
 Sinapis 673.
 Sisymbrium 674-680.
 Sium 328-332.
 Solanum 269-271.
 Solidago 827.
 Sonchus 764-767.
 Sorbus 528.
 Sparganium 116-117.
 Spartium 707.
 Spergula 488-490.
 Sphaeria 1208-1214.
 Sphagnum 895.
 Spinacia 360.
 Spiraea 532-534.

Stachys 616-618.
 Statice 362.
 Stellaria 480 482.
 Stemonitis 1187-1190.
 Stipa 138.
 Stratiotes 571.
 Symphytum 247.
 Syringa 24.

T.

Tanacetum 810.
 Taraxacum 772.
 Taxus 703.
 Tetraphis 900.
 Teucrium 597-598.
 Thaelaephora 1152-1154.
 Thalictrum 579. 580.
 Thesium 290.
 Thlaspi 656. 657.
 Thymus 627-629.
 Tilia 560.
 Tormentilla 550. 551.
 Tortula 927. 928.
 Tragopogon 760-761.
 Trapa 221.
 Tremella 1215-1225.
 Trichostomum 916-918.
 Trifolium 745-754.
 Triglochin 412. 413.
 Triticum 197-199.

Trollius 593.
 Turritis 666. 667.
 Tussilago 848-850.
 Typha 78. 79.

U.

Ulmus 295. 296.
 Urtica 227. 228.
 Utricularia 57. 58.

V.

Vaccinium 426-428.
 Valeriana 64-67.
 Verbascum 264-266.
 Verbena 60.
 Veronica 26-41.
 Verrucaria 1053 - 1067.
 Viburnum 353.
 Vicia 734-741.
 Vinca 261.
 Viola 857-862.
 Viscum 224.
 Vitis 284.

W.

Webera 975-977.
 Weissia 907-909.

X.

Xanthium 685.

INDEX

SYNONYMORUM, NOMIMUM TRI-
VALIUM & OFFICINALIUM.*A.*

Abies 701. 702.
Absynthium 818.
Acacia 526.
Acanthium 792.
Acanthoides 794.
Acetosa 409. 410.
Acetosella 410. 501.
Achyrophorus 789.
Acinos 629.
Acorus 68.
Adianthoides 921.
Adianthum 879. 880. 911.
Agaricoides 1215.
Agaricum 1094. 1095.
Agrostis 186. 187.
Alcea 698.
Alliaria 678.
Alnus 230.
Aloides 571. 915.
Amarella 293.
Anagallis 31.
Androsaceus 1128.
Anfarina 543.
Anthriscus 316. 317.
Antipyretica 980.
Aparine 214.
Aphanes 226.

Apium 346.
Arabis 667.
Arcyria 1190.
Argemone 556.
Aristolochia 704.
Armeria 362.
Arnica 830. 833.
Asphodelus 375.
Asplenioides 984.
Aster 830. 831.
Atriplex 306.
Auricomus 584.
Auricula 776-1217.
Auriscalpium 1148.
Avellana 434.
Avena 147-149.

B.

Barba caprina 534.
 — *hirci* 760.
Bardana 804.
Batrachosperma 1088.
Beccabunga 30.
Bedeguar 536.
Behen 476.
Bellis 836.
Beomyces 1052.

430 INDEX SYNONYMORUM &c.

- Betulus 511.
 Bifolium 51.
 Bistorta 438.
 Blitum 358.
 Boeothryon 72.
 Bonus Henericus 304.
 Botryoides 1073.
 Botrytes 1051.
 Bovista 1193.
 Branca ursina 326.
 Britannica 402.
 Bromus 160. 161.
 Brunella 631.
 Bryoides 919.
 Bryum 891. 893. 896. 898.
 901. 908. 915. 917. 923.
 930. 965. 975. 977. 979.
 982. 983.
 Buglossum 244. 1142.
 Bursa pastoris 655.
 Byssus 1067 - 1070. 1073.

C.

- Calamagrostis 185 - 187.
 Calamus 387.
 Calcatrippa 567.
 Callibryon 915.
 Caprea 19.
 Cardiaca 623.
 Carduus 798 - 800. 803.
 Carota 318.
 Carvi 346.
 Carvi folia 322.
 Caryophyllata 552.
 Cataria 601.
 Catharinea 915.
 Centaurium 294.
 Centumnodia 442.
 Cepa 373.
 Cerasus 522. 524.
- Cerefolium 339. 341.
 Cervaria 323.
 Chaerophyllum 340.
 Chamaedrys 35.
 Chamaeleo 1096.
 Chamaemelum 840. 841.
 Chamaenerion 424.
 Chamomilla 839. 841.
 Chantarellus 118.
 Chara 1088.
 Cheiranthoides 661.
 Chelidonium 583.
 Chloranthus 477.
 Chondrilla 771.
 Cicuta 320.
 Cicutaria 341.
 Cicutarium 686.
 Cincinalis 878.
 Clathroidastrum 1187.
 Clathrus 1187 - 1189.
 Clavaria 1151.
 Clematitis 386.
 Coccinella 468.
 Columbaria 205.
 Consolida major 247.
 — — media 595.
 — — minor 631.
 — — regalis 567.
 — — ferracenica 827.
 Convolvulus 444.
 Conyzza 826.
 Coralloides 1041 - 1043.
 1045. 1047 - 1050. 1151.
 1183.
 Coreopsis 808.
 Cornucopioides 1163.
 Costa 791.
 Cotula 841.
 Cracca 735.
 Crepis 775.
 Crepitus lupi 1102.

INDEX SYNONYMORUM &c. 431

Crista galli 633.
Crus galli 124.
Cyanus 844-846.
Cyathoides 1160. 1161.
Cynanchica 208.
Cynapium 336.
Cynosbati 536.
Cyparissias 519.
Cyperoides 101. 104.

D.

Damasonium 415.
Dendroides 932-972.
Dens leonis 772.
Dentaria 639.
Digitaria 125.
Diphyscium 970.
Dryopteris 889.
Dulcamara 269.

E.

Ebulus 355.
Echinus 1149. 1150.
Elfnitium 321.
Elvela 1158.
Elveloides 1055.
Endivia 788.
Epidendrum 1202.
Erysimoides 662.
Erysimum 677. 678.
Efula 518. 519.
Eupatoria 570.

F.

Faba 741.
Fabaria 496.
Fagopyrum 443.
Falcaria 332.

Farfara 848.
Festuca 169.
Ficaria 583.
Filago 812. 814. 815.
Filipendula 533.
Filix femina 885. 887.
— *mas* 886.
Flammula 581.
Flos aquae 1075.
— *cuculi* 504.
Foeniculum 334. 345.
Fragaria 554.
Frangula 282.
Fungus 1104. 1139. 1193.
1217.

G.

Galeobdolon 613.
Galeopfis 608-613.
Geaster 1200.
Genista 707.
Gentianella 293.
Georgia 900.
Githago 503.
Glycyphylus 743.
Gramen arvense 156.
— — *cyperoides* 104.
— — *junceum* 391.
— — *loliaceum* 188.
— — *majus* 86.
— — *minus* 199.
— — *nemorosum* 395.
— — *paniceum* 124.
— — *paniculatum* 142.
Gratia Dei 59.
Grossularia 287.

H.

Hedera 606.
Hedypnois 772.

432 INDEX SYNONYMORUM &c.

- Heleocharis* 868.
- Helianthemum* 561.
- Helioscopia* 517.
- Helix* 14. 288.
- Helvella* 1153. 1154.
- Hepatica* 206. 572.
- Heracantha* 805.
- Herba cathartica* 264.
- *ignis* 1041.
- Hippocastanum* 419.
- Holcus* 176.
- Holosteum* 488.
- Hordeum* 191.
- Horminum* 62.
- Hydrolapathum* 404.
- Hydropiper* 440.
- Hypnoides* 916.
- Hypnum* 895. 919 - 922.
924. 931 - 943. 980.
- Hypopithys* 455.
- Hypoxylon* 1182.
- Hyssopifolia* 509,

- I.*
- Jacea* 847.
- Jacobaea* 823.
- Iberis* 654.
- Icmadophila* 1054.
- Intybus* 787.
- Isoetes* 395.
- Juncus* 80.
- Jungermannia* 952.

- K.*
- Kali* 314.

- L.*
- Ladanum* 610.
- Lamium* 613. 614.
- Lampsana* 672.
- Lappa* 804.
- Lappula* 242.
- Lapsana* 785.
- Larix* 700.
- Lathyris* 515.
- Lens* 721.
- Leontodon* 772.
- Leonuroides* 622.
- Leonurus* 622.
- Leucanthemum* 835.
- Lichen* 996 - 998. 1002.
1003. 1041 - 1065. 1067 -
1074. 1226.
- Lichenastrum* 984. 985.
992 - 999.
- Lichenoides* 1019. 1022.
1023. 1026.
- Ligusticum* 352.
- Lilac* 24.
- Liliago* 380.
- Lilium convallium* 382.
- Linagrostis* 81.
- Linaria* 643.
- Lingua* 22. 582.
- Linophyllum* 290.
- Lolium* 503.
- Lonchophyllum* 54.
- Lunaria* 875.
- Lupulus* 299.
- Luteola* 513.
- Lychnis* 471.
- Lychnitis* 265.
- Lycogala* 1233.
- Lycoperdoides* 1208.
- Lycoperdon* 1206. 1208.
1215.
- Lysimachia* 508.

INDEX SYNONYMORUM &c 433

M.

- Majanthemum* 385.
- Majorana* 626.
- Malus* 531.
- Mappa* 1102.
- Marrubiastrum* 622.
- Martagon* 375.
- Matricaria* 835.
- Matrisylva* 206.
- Medulla panis* 1141.
- Melica* 142. 143.
- Melilotus* 745.
- Millefolium* 843.
- Millegana* 297.
- Mitella* 1096.
- Mitra* 1157.
- Mnemosynum* 900.
- Mnium* 900. 902. 913.
914. 923. 964. 974. 976.
981. 983.
- Morio* 43.
- Morsus Dioboli* 203.
— *ranae* 453.
- Moschatellina* 448.
- Mucedo* 1228.
- Muscoides* 1184.
- Muscus* 1003. 1041.
- Myrtillus* 426.

N.

- Napus* 668.
- Nasturtium* 464. 654. 655.
674.
- Nemolaphatum* 404.
- Nidus avis* 49.
- Nostoc* 1218.
- Nummularia* 260.
- Nux aquatica* 221.

O.

- Odontites* 635.
- Oelsnitium* 321.
- Onobrychis* 724.
- Ophioglossoides* 1177.
- Opulus* 353.
- Orchis* 48.
- Oreopteris* 883.
- Oreoselinum* 324.
- Ornithopodium* 742.
- Orontium* 644.
- Osmunda* 877.
- Oties* 478.
- Oxyacantha* 527.
- Oxycoccus* 428.

P.

- Padus* 522.
- Palmata* 46.
- Paralysis* 253.
- Paronychia* 289.
- Peeten veneris* 338.
- Pentaphyllum* 549.
- Peplus* 514.
- Persicaria* 441.
- Pervinca* 261.
- Pes ansarinus* 307.
— *cati* 813.
— *columbae* 691.
- Petasitis* 849. 850.
- Petroselinum* 350.
- Peziza* 1159. 1162. 1215.
1217.
- Phallus* 1170.
- Phegopteris* 882.
- Phragmitis* 183.
- Picea* 701. 702.
- Picris* 773.
- Pilosella* 776.

434 INDEX SYNONYMORUM &c.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Pimpinella 220. | Rosmarinus 456. |
| Pinheaded 395. | Ros solis 366. |
| Plantago 414. | Ruta muraria 880. |
| Platanoides 436. | Rutabulum 958. |
| Pneumonanthe 292. | |
| Poa 144. | S, |
| Podagraria 352. | Sabina 683. |
| Polygonatum 383. | Sagitta 572. |
| Polygonum 468. | Salep 44. |
| Polyodon 904. | Salicaria 508. |
| Polytrichoides 913. 914. | Salvinia 890. |
| Polytrichum 905. 906. | Salvinoides 890. |
| Porrum 369. | Satyrium 42. |
| Portula 400. | Saxifraga 347. 348. 533. |
| Pseudacorus 68. | Scabiosa 846. |
| Pseudocyperus 105. | Scandix 317. |
| Pseudoplatanus 435. | Scapigerus 663. |
| Psyllium 218. | Scariola 769. |
| Ptarmica 842. | Schoenolagurus 80. |
| Pulmonaria arborea 1032. | Schoenoprasum 374. |
| — — gallica 779. | Schoenus 74. |
| Pulsatilla 575. 576. | Scoparium 707. |
| | Scordium 598. |
| Q. | Scorodonia 597. |
| Quinquefolium 549. | Sedum 521. |
| | Semen canariense 119. |
| R. | Serpens 935. |
| Radiola 365. | Serpillum 627. |
| Ranunculoides 418. 578. | Sesamum 650. |
| Rapa 669. | Seseli 346. 352. |
| Raphanistrum 672. | Sideritis 618. |
| Rapistrum 672. | Sigillum Salomonis 383. |
| Rapunculoides 278. | Sisarum 331. |
| Rapunculus 273. 276. | Sisymbrium 665. |
| Rhaponticum 408. | Sium 352. |
| Rhizophora 1170. | Sophia 680. |
| Rhoeas 557. | Sphaeria 1207. |
| Robur 450. | Sphagnum 894. 904. 979. |
| | Sphondylium 326. |
| | Spica 602. |

INDEX SYNONYMORUM &c. 435

Spicant 877.
 Spicaventi 131.
 Spina cervina 280.
 Squamaria 639.
 Stoechas 811.
 Stramonium 267.
 Strumarium 685.
 Struthiopteris 877.
 Subularia 395.
 Succisa 203.

T.

Tamarisci 990.
 Tenageia 392.
 Tetrahit 611. 612.
 Tetralix 429.
 Teucrium 33.
 Thaliana 664.
 Thapsus 264.
 Thelypteris 884.
 Therebinthina 700.
 Thlaspi 655.
 Tithymalus 514. 519. 520.
 Tordylium 316.
 Trachelium 279.
 Tremella 1210.
 Tremelloides 1210.

Trichia 1190.
 Trichomanis 964.
 Trichomanoides 879. 941.
 Trifolium 254.
 Trinitatis flos 861.
 Tubera cervina 1191.

U.

Ulmaria 534.
 Ulva 1223.
 Urtica 608.
 Usnea 1034-1037.
 Uva ursi 463.

V.

Vincetoxicum 291.
 Virgaurea 827.
 Viscaria 505.
 Vitis Idaea 427.
 Vulneraria 730.
 Vulvaria 311.

W.

Webera 979.
 Weissia 905.

EXPLICATIO TABULARUM.

| | | | |
|-----------|-----------|--------------------------|--|
| TABULA I. | Figura I. | <i>Carex pilulifera.</i> | n. 100. |
| — | — | 2. | <i>aspera.</i> n. 102. |
| — | — | 3. | <i>splendida.</i> n. 103. |
| — | — | 4. | <i>elegans.</i> n. 104. |
| — | II. | 5. | <i>caespitosa.</i> n. 107. |
| — | — | 6. | <i>mutabilis.</i> α. n. 109. |
| — | III. | 7. | <i>mutabilis.</i> β. n. 109. |
| — | IV. | 8. | <i>Fucus Sprengeli.</i> n. 364. |
| — | V. | 9. | <i>Cucubalus chloranthus.</i> n. 477. a. panicula deflorata. |
| — | — | 10. | <i>Cheiranthus scapigerus.</i> n. 663. |
| — | VI. | 11. | <i>Cnicus dubius.</i> n. 801. a. folium radicale. |
| — | — | 12. | <i>Leskia marchica.</i> n. 944. a. folium magnitudine auctum. b. Perichaetium auctum. c. Theca lente aucta. |
| — | VII. | 13. | <i>Lichen quercinus.</i> n. 1018. |
| — | — | 14. | <i>Verrucaria typographica.</i> n. 1066. |
| — | — | 15. | <i>Thaetaephora mesenteriformis.</i> n. 1152. |
| — | — | 16. | <i>Peziza lacera.</i> n. 1166. |
| — | — | 17. | <i>Clavaria parasitica.</i> n. 1178. |
| — | — | 18. | — <i>granulata.</i> n. 1179. |
| — | — | 19. | <i>Lycoperdon scabrum.</i> n. 1192. |
| — | — | 20. | — <i>equinum.</i> n. 1198. |
| — | — | 21. | <i>Sphaeria confluenta.</i> n. 1212. |

ADDENDA.

1235. CHARA tomentosa aculeis caulinis ovatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 89.

In fossis in der Jungfernheide prope Spandau rassisima. Aestate.

Caulis albido-tomentosus.

1236. CAREX crassa spicis masculis pluribus, female brevissime pedunculatis cylindricis, capsulis ventricosis striatis acuminatis.

Carex crassa. Ehrhardt. gram. Dec. VI. n. 59.

In der Jungfernheide passim. Majo.

Culmus triquetrus, striatus, bipedalis & ultrafoliosus. Bracteae inferiores culmo longiores. Spicae masculae quatuor, inferiores subpedunculatae oblongae; squamis fuscis oblongis acuminatis. Spicae feminae quatuor, brevissime pedunculatae, cylindraceae. Squamae oblongae acutae virides, fusco marginatae, capsulis paulo majoribus. Capsulae triquetrae ventricosae striatae. Stigma trifidum.

1237. ROSA mollissima germinibus subglobosis glabris, pedunculis hispidis, caule, petiolisque aculeatis, foliis tomentosis.

Prope Spandau passim. Junio.

Caulis fruticosus altitudine Rosae villosae, glabrescens striatus, aculeatus: aculeis alternis oppositisque. Folia bijuga, cum impari pin-

nata; foliola oblonga serrata, pilis densissimi albicantibus testa. Petioli aculeati. Pedunculi uniflori terminales hispidi solitarii. Germen glabrum subglobosum. Calyx hispidus. Corolla incarnata. Simillima *Rosae villosae* differt vero germinibus glabris. Anne varietas?

n. 684. adde.

Im Thiergarten rarius, prope Coepnick frequens,
Martio. Aprili.

n. 739. adde sequentem observationem:

Nostra planta etiam cirrhos possidet, licet minutissimi sint.

1238. *AGARICUS betulinus* acaulis coriaceus villosus: margine obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 607.

Im Thiergarten & alibi in arborum truncis persistens.

1239. *BOLETUS cinnabarinus* acaulis pulvinatus, totus intus & foris ruber. *Murr. syst. ed. 14.* p. 477. n. 6. *Jacq. austr. t. 304.*

In emortuarum arborum truncis hinter Spandau rarius. Hyeme.

Totus ruber coriaceus, sessilis, pileo oblongo ad glutinato glabro. Pori oblongi irregulares.

1240. *BOLETUS subsquamulosus* stipitatus pileo dimidiato, ochraceo: squamis fuscis subreflexis, poris inaequalibus.

Boletus subsquamulosus deformis, lateralis, dilatatus, carneo suberosus semipetiolatus ochra-

ceus, tergo glabro subunctuoso, fuscescente, maculis obscuris saepe revolutis, squamoso; tubis latis, brevibus, margine acutis, pallidioribus. *Batsch fung.* I. p. 97. n. 3. t. 10. f. 41. *Schaeff. fung.* t. 101. 102.

In den Papenbergen haud infrequens. Autumno.

1241. *Boletus rugosus* stipitatus perennis, pileo dimidiato rubro, croceo marginato nitido, poris tenuissimis flavescentibus.

Boletus rugosus stipitatus perennis, pileo dimidiato. *Jacq. aust.* t. 169. *Murr. syst. ed. 14.* p. 977.

Prope *Stolpe* rarissime. Persistens.

1242. *Hydnnum zonatum* stipitatum pileo plano fusco, striis obscurioribus concentricis, aculeis albido-griseis.

Hydnnum zonatum pileo conico-excavato, coriaceo, spadiceo vel nigro, fasciato; stipite brevi, valido in pileum diffuso, concolore, aculeis griseo-albis. *Batsch fung.* I. p. 111. n. 1. *Schaeffer fung.* 139. 272.

Prope *Doebritz* rarius. Autumno.

1243. *Clavarria pistillaris* clavaeformis simplissima lutea. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 620.

In der Jungfernheide rarius. Autumno.

Distinctissima a. *Clavaria lignea*.

Sphalmata typographica.

Pag. 1. lin. 6. stigmati. p. 9. l. 18. Gesundbrunnen.
p. 13. l. 26. Ophrys Nidus avis. p. 31. l. 20. dimidiis.
p. 33. l. 5. masculam. p. 39. l. 6. feminineis. p. 66. l. ult.
Hepaticae. p. 74. l. 10. americanam. p. 75. l. 16. desin-
nentibus. p. 78. l. 3. aculeis. p. 78. l. 26. officinale.
p. 79. l. 1. nemorofis. p. 85. l. 8. copiose. p. 94. l. 9.
inaperto. p. 95. l. 5. cultura. p. 101. l. ult. planum.
p. 132. l. 13. uncialia. p. 144. l. ult. specimina. p. 135.
l. 7. fauci. p. 153. l. 4. Lychnis. p. 175. l. 13. fruticosus.
p. 181. l. 17. Papaveris. p. 184. l. ult. Nymphaeae.
p. 183. l. 9. palustris. p. 188. l. 13. unguis. p. 189. l. 16.
apices unguium. p. 190. l. 4. pratensis. p. 215. l. 22. tha-
lliana. p. 220. l. 5. Erysimum. p. 230. l. 24. germini.
p. 233. l. 5. tamen. p. 252. l. 24. subtus. p. 260. l. 4.
erectis. p. 272. l. 13. dysenterica. p. 290. l. 21. sparsae.
p. 292. l. 26. dissertatione. p. 294. l. 26. pinnulis. p. 299.
l. 5. dele: .. p. 304. l. antepenult. simpliciusculo. p. 304.
l. ult. 124. p. 328. l. 23 & 24. opercula semper conica
acuta. p. 335. frequens. p. 341. l. 14. bidentatis. p. 345.
l. 12. transit. p. 349. l. 6. urceolatis. ibid. l. 28. andro-
gynus. p. 355. l. 11. misc. p. 358. l. 22. icones. p. 368.
l. 3. fuscus. p. 376. l. 21. conjunctae. p. 377. l. 14. dele
cant. p. 382. l. 9. albis. p. 386. l. 20. violaceo. p. 391.
l. 14. rufus. p. 393. n. 1141. dele synonima.

G. B. X. 267

TAB. I.



F.F. Beijclad nat. pinx.

A.F. Happe sculpf.

TAB. II.



Beyel Fecit

TAB. III.



TAB. IV



Beyel fecit

Happe Sculps.

TAB.V.








Beyel fecit

Harrpe sculps.

TAB. VI.



TAB. VII



Joh. F. Beyel ad nat. delin.

A. F. Happe sc.