

*Symbola ad faunam Aranearum Javae et Sumatrae cognoscendam. II. Sicariidae, Dysderidae, Drassodidae, Zodariidae.*

Mémoire

de M. VL. KULCZYŃSKI m. e.,  
présenté dans la séance du 12 Juin 1911.  
(Planché XXI).

Sicariidae.

**Loxosceles erythrocephala** (C. L. Koch)?

1838. *Scytodes erythrocephala* C. L. Koch, Die Arachniden, v. 5, p. 90, f. 399, 400.  
Java: Kagok, Pasuruan. Feminae solae.

**Scytodes longipes** H. Luc.

Tab. XXI, fig. 1, 2, 8, 13.

1845. *Scytodes longipes* H. Lucas, Ann. Soc. ent. Fr., s. 2, v. 3, p. 1, f. 2. —  
1872. *Scytodes marmorata* L. Koch, Die Arachniden Australiens, p. 292. t. 24,  
f. 2. — 1878, *Scytodes Taczanowskii* Thorell, Studi sui ragni Malesi e Pa-  
puani, v. 2, p. 166.

Inter *Scytodem marmoratam* L. Koch Javanam et exempla aliquot — masculina et feminina — in Americâ Centrali (Costarica: Terraba) a Rev. J. Nieborowski lecta, quae *Scytodi longipedi* H. Lucas subiungenda videntur, nullam differentiam evidentiorem inveni, *Scytodes* has itaque in unam speciem coniungendas censeo. Macula maxima, difficilis ad describendum, quae dorsum cephalothoracis occupat, in exemplis Javanis minus inaequalis esse solet, umbrina, fuligineo aut nigro anguste marginata extrinsecus et intus (circum maculas pallidas, quibus ornatur), maculis pallidis mediocriter variegata; in exemplis Americanis (adultis) macula fusca colore flavido insigniter abundius variegata est saepissime, obscurior quam in exemplis Javanis, in marginibus non evidenter obscurior quam intus. Sed differentia haec inconstans est<sup>1)</sup> et adeo levis, ut summum ad distinguendas varietates sufficere mihi videatur.

<sup>1)</sup> Exempla duo non adulta, in Venezuelâ lecta, quae possideo, melius cum

Lamellae corneae, quibus *venter* feminæ ad marginem epigastrii ornatur, subellipticae sunt, ante leviter truncatae, ca. 0·9 mm longæ, 0·45 latae, pilis aliquot erectis praesertim in parte anteriore ornatae, maximam partem modice et inaequabiliter: marginem inferiorem versus fortius, concavæ, margine interiore et postico complanato, supra partes concavas paulo prominenti; spatium, quo margines interiores earum inter se distant, ca. 0·4 latum est, anterius et posteriora versus dilatatum.

Maris *palpi* parte patellari 0·58 longâ, 0·39 latâ, tibiali 0·62 longâ, 0·42 latâ, tarsali (unguiculis exclusis) 1·23 longâ, paulo pone basim 0·36 latâ, paululo longiore itaque quam pars patellaris cum tibiali (hae coniunctim lineâ rectâ dimensæ 1·17 longæ). Stemma 0·97 longum; eius bulbus a latere visus subglobosus, 0·39 crassus et aequo circiter longus; pars terminalis in eius apice infra initium capere videtur (revera pars haec cum apice bulbi in parte exteriore inferiore coniungitur), in ipsâ basi supra paululo coarctata et hic 0·16 crassa est, apicem versus maximam partem modice et aequabiliter, prope ab apice autem subito angustata et in aculeum obtusiusculum, 0·09 longum desinens. Apicem versus compressa est pars terminalis et supra subterque carinata; carina superior, melius evoluta quam inferior, usque fere ad basim partis terminalis extenditur, inferior vero in eius medio sensim evanescit; latus interior partis terminalis plicis paucis, carinae superiori subparallelis ornatur. In omnibus his rebus convenient exæmpla Americana cum Javanis.

Java: Buitenzorg, Gunung Guntur, Kagok, Tjuruk, Protjot, Bumidjava, Kendalsrut, Diatibarang, Diatinegoro, Djedjek, Lebak siu, Simpar. — Lecta sunt exæmpla multa, adulta utriusque sexus et iuniora.

### **Scytodes venusta (Thor.).**

Tab. XXI, fig. 5 a, 5 b, 7, 11.

1890. *Dictis venusta* Thorell, Studi sui ragni Malesi e Papuani, v. 4, p. 301.

Variat haec species staturâ: feminæ unius e maximis, quas vidi, cephalothorax 2·8 mm longus est, 2·25 latus, clypeo ca. 0·75 lato, tibia cum patellâ IV 2·8 longa, abdomen 3·0 longum, 2·6 la-

exemplis Javanis quam cum adultis ex Americâ Centrali convenient picturâ cephalothoracis.

tum; feminae minimae cephalothorax 2·1 longus, 1·72 latus, clypeo ca. 0·64 lato, tibia cum patellâ IV 2·14 longa, abdomen (paulo contusum) ca. 2·2 longum.

Scutum dorsuale *cephalothoracis* modice solum altum dicendum (in exemplis dictis 1·45 et 1·05 altum). Nota haec tamen aliquatenus mutabilis et fallax est: partes marginales scuti dorsualis — ut in aliis *Scytodibus* — molles sunt praesertim in parte posteriore, euticulae, quâ cum coxis pedum coniunguntur, similes, margines scuti dorsualis itaque non semper facile cernuntur et scutum dorsuale plerumque paulo altius videtur, quam revera est; in exemplis spiritu vini fortius contractis contra pars quaedam marginalis scuti dorsualis sub reliquas partes duriores inflexa invenitur et cephalothorax humilior videtur quam in exemplis non contractis; ex. gr. femina quaedam ad Kendalsrut lecta cephalothoracem 2·9 mm longum (paululo longiorem itaque quam femina maior supra prolata), sed modo 2·18 latum et scutum dorsuale modo 1·12 altum (!) habet.

*Pictura* scuti dorsualis et pedum (ex parte) in hac specie satis sibi constare videtur, sterni, coxarum, trochanterum contra insigniter mutabilis est. Vittae intermediae scuti dorsualis plerumque (in exemplis pallidioribus) paulo pallidiores sunt quam vittae dorsuales et marginales, cum his non solum supra pedes II sed etiam supra III coniunctae. Linea media (aut vitta angusta potius ex lineis duabus composita), quâ spatium vittis dorsualibus interiectum in parte posteriore dimidiatur, nonnunquam evanescit; pars anterior intervalli commodum dicti modo tota colore rufo-umbrino pallidiore repletur, modo (plerumque) ad marginem posticum oculorum mediorum pari punctorum flavidorum et saepe ad marginem posticum areae oculorum in parte interiori vittarum fuscarum dorsualium pari macularum flavidarum oblongarum (fig. 5b) ornatur. *Sternum* modo pallide flavidum, modo rufescenti-fuligineum; margines eius plus minusve infuscati, modo aequabiliter, modo exadversus coxas late et insigniter, inter eas autem anguste. Coxae *pedum* I nigro-fuligineae esse possunt, reliquae gradatim pallidiores, III et IV subter in parte magnâ aut maximâ pallide flavidâ variegatae; in exemplis pallidis coxae I in lateribus et supra solum umbrinae sunt, non obscurae quidem, subter pallide flavidæ, reliquæ gradatim pallidius coloratae, IV totae fere flavidæ. Trochanteres partibus coxarum obscure coloratis similes; femora eis modo multo, modo non evidenter pallidiora, flava, abunde (postica parce aut parum) fusco

punctata, punctis plus minusve in series digestis, aut colore umbrino plus minusve suffusa et punctis obscuris evidentioribus carentia; pars apicalis femorum constanter flava, reliquā eorum parte itaque modo multo (si femora insigniter et aequabiliter infuscata sunt), modo non pallidior (in femoribus flavidis); sub parte flavidā femora IV annulo badio ornantur, annulus similis, minus expressus etiam in femore III (nonnunquam etiam in II) cernitur. Patellae, in lateribus saltem umbrinae aut nigrae, tibiis — quae flavidae, basi et apice anguste fusco annulatae (in pedibus posterioribus) sunt — evidenter aut multo obscuriores. Metatarsi flavi, IV basi anguste colore umbrino aut subnigro annulati; tarsi colore metatarsorum aut paululo pallidiores. *Abdomen* (secundum pauca exempla melius conservata) avellaneum, in parte anteriore fasciis pictum tribus diffusis, latis, in latera descendantibus, pallide castaneis, quarum anteriores duae in medio plus minusve interruptae sunt, in parte posteriore autem seriebus duabus macularum utrimque 4, plerumque obscuriorum, non late inter se distantibus; macularum harum sex anteriores breves sunt, postremae elongatae et angustae, mamillas versus convergentes; par earum primum in fasciā transversā tertiam, medium fere dorsum occupanti, situm.

*Venter* lamellis duabus ornatur formā paulo variantibus, rotundato-triangularibus fere, ca. 0·4 mm latis, 0·3 longis, inter se ca. 0·7, a margine epigastrii ca. 0·3 remotis, subplanis (vix concavis), in parte posticā exteriore fortius induratis et insigniter melius definitis quam ante et intus, atque minute profunde foveolatis, foveolā quaque pilum modice longum gerenti.

*Maris* (mediocriter conservati) *cephalothorax* 1·87 mm longus, 1·55 latus, parte ante oculos laterales prominenti 0·65 latā, 0·22 longā, humilis (in exemplo spiritu vini contracto scutum dorsuale 0·8 altum), densissime subtilissime granulatus et granulis maioribus ornatus pilos modice longos, crassiusculos, apice sat breviter acuminatos gerentibus, in series quinque digestis, quarum externae ab oculis lateralibus usque fere ad declivitatem posticam pertinent, leviter incurvatae, magis confertae et melius conditae et paulo longiores sunt quam series intermediae et mediana; pili similes atque commodum dicti aliquot etiam circum et ante oculos cernuntur. Pars cephalothoracis ante oculos prominens desuper visa anteriora versus paululo solum angustata, margine antico paene recto (paululo excavato). Diametri (maximae) *oculorum* mediorum 0·145, late-

ralium 0·13 longae; intervallum oculorum laterarium posticorum 0·69, laterarium anticum 0·55, spatium his et mediis interiectum 0·18 longum; area oculorum ante 0·25, pone 0·84 lata, 0·39 longa; clypeus sub oculis 0·13 altus. *Organum stridendi* abest. *Palporum*<sup>1)</sup> pars femoralis 0·6, patellaris 0·34 longa, haec 0·19 lata, tibialis 0·37 longa (aeque circiter lata atque patellaris, subcylindrica? — in exemplo nostro paulo corrugata), tibialis 0·68 longa, similis atque in *Scytode thoracica*, sed parte basali desuper visâ parum asymmetricâ et paululo longiore quam latiore (in *S. longipedi* H. Luc. insigniter latiore quam longiore et fere in latere exteriore solum angustatâ), unguiculo uno, mediocriter modo gracili, acuto, leviter et aequabiliter curvato, inermi instructa. Stemma 0·68 longum; bulbus a latere visus 0·165 latus, ea. 0·2 longus, oblongus, basi obliquâ, sensim in collum contractus subcylindratum, 0·065 latum, 0·25 longum, paululo deorsum curvatum; collum in partem terminalem abit item ca. 0·25 longam, fortiter praesertim in pare exteriore complanatam, paulo magis deorsum quam collum et paulo intus directam, basi aequa circiter atque collum latam, sensim leviter, in parte apicali autem fortius angustatam, ad apicem extrinsecus paulo sinuatam, in apiculum paulo foras directum itaque desinentem. Femur, patella, tibia, metatarsus, tarsus (unguiculis exclusis) pedum

I	2·6,	0·52,	2·98,	3·21,	0·55,
II	1·9,	0·52,	1·90,	2·07,	0·48,
III	1·42,	0·48,	1·26,	1·39,	0·40,
IV	2·0,	0·52,	2·0,	2·14,	0·52 mm longa.

*Abdomen* 1·5 longum, 1·1 latum.

*Color* probabiliter similis atque feminarum pallide coloratarum (in exemplo nostro ex parte — in cephalothorace — non bene conservatus). *Sternum* pallide flavidum. *Palpi* pallide flavidi; pars femoralis in latere exteriore prope medium, patellaris in utroque latere et in apice, tibialis subter prope medium et in apice colore umbrino aut fulgineo picta. *Pedes*, quorum coxae et trochanteres femoribus non obscuriora sunt, flavidi femoribus sex anterioribus saltem et tibiis atque metatarsis paris I fusco punctatis, femoribus IV et III sub apice fusco annulatis, patellis basi aut (anterioribus) etiam dorso exceptis nigris vel fuligineis, tibiis basi et apice et me-

<sup>1)</sup> Exemplum nostrum unicum caret palpo dextro.

tatarsis I saltem basi colore eodem non late pictis. *Abdomen* avellaneum colore nigro pictum; loco fasciae transversae anticae maculam modo medium rotundatam praebet exemplum nostrum, fasciae secunda et tertia fortiter curvatae ex arcubus binis procurvis, in medio in angulum coniunctis constant, in lateribus abdominis plus minusve recurvatae sunt; inter fasciam tertiam et mamillas abdomen utrimque vittâ ornatur nigrâ, lineis pallidis obliquis plus minusve in maculas tres divisâ.

Sumatra: Palembang, feminae. — Java: Kagok, feminae et mas; Kendalsrut, femina; Djedjek, femina.

### **Scytodes lugubris (Thor.)?**

Tab. XXI, fig. 6, 9.

1887. *Dictis lugubris* Thorell, Primo saggio sui ragni Birmani, p. 86.

Huic speciei fortasse adscribendae sunt feminae adultae duae et exemplum non adultum, in monte Gedeh (in aedificiis?) lecta, male conservata.

Exempli non adulti *cephalothorax*, pallide fulvus, hac picturâ medioeriter definitâ ornatur: dorsum macula occupat urnae non dissimilis, lineâ umbrinâ paulo diffusâ circumscripta; collum figuræ huius aequa latum est atque area oculorum, duplo saltem latius quam longius, lateribus parallelis; pars posterior modice solum ventrosa, posteriora versus minus cito angustata quam anteriora versus, in partem supremam declivitatis posticæ producta, hic modice dilatata, pone in medio in sinum triangularem excisa et utrimque paulo oblique truncata, angulo exteriore acuto. Figura haec in parte latiore vittâ dimidiatur flavidâ, aequa saltem atque area oculorum mediorum latâ, posteriora versus leviter angustatâ, lineam medium continent castaneam paulo diffusam; quae linea ante, in collo urnae, in ramos duos dividitur parallelos, latera vittæ flavidæ occupantes ita, ut hic e vittâ hac linea modo restet media fulva. Margines laterales maculae, de quâ agitur, aequa circiter lati atque pedum metatarsi aut tibiae, fulvi sunt colore castaneo suffusi; reliquæ partes, obscurius et pallidius castaneæ, vittas formant duas pone foveam medium attingentes et hic inter se fere coniunctas, ante usque ad marginem clypei pertinentes, in parte latiore maculae urniformis circiter duplo latiores quam partes marginales pallidae. Latera cephalothoracis picturâ evidentiore carent, in parte superiore angustiore fulva sunt, inaequaliter et obsolete colore casta-

neo tincta, in inferiore obscure et pallidius castanea et maculis paucis diffusis fulvis ornata. In declivitate posticâ anguli postici maculae dorsualis linea castaneâ, paulo inaequali et diffusâ, inter se coniunguntur; pars sub eâ sita media subquadrata pallidius et obscurius castanea, partes laterales flavidae. *Sternum*, *pedum* coxae et trochanteres ex parte colore castaneo variegati, patellae in lateribus castaneae et nigrae, basi et supra pallidiores; reliqua pedum partes flavidae, nigro punctatae et lineatae ut in exemplis a Thorellio descriptis. *Mandibulae* et *palpi* flava, castaneo maculata. *Maxillae* flavidae, extrinsecus castaneo marginatae, *labium* colore simili, apicem versus colore castaneo magis magisque tinctum. *Abdomen* avellaneum, supra subterque punctis et maculis parvis nigro-castaneis abunde adspersum, in dorso et lateribus praeterea fasciis transversis nigro-castaneis non latis, ex parte in medio angulatis, quinque (?), et supra mamillas vittis duabus concoloribus brevibus, in longitudinem directis pictum.

Picturae cephalothoracis supra descriptae vestigia plus minusve expressa etiam exempla nostra adulta praebent.

Lamellae, quibus *venter* feminarum adultarum pone epigastrum ornatur, oblique positae, 0·4 mm longae, 0·25 latae, in latere exteriore postico recte truncatae, ceterum inaequabiliter (pone fortius) rotundatae, marginem exteriorem versus sensim fortius induratae, sat profunde concavae, foveas formant versus marginem exteriorem sensim vadosiores; margo foveae nusquam supra foveam impendet. Ab epigastro distant hae lamellae ca. 0·15 mm, inter se (in parte posteriore) ca. 0·45; anguli exteiiores earum inter se ca. 1·15 remoti sunt.

Organo stridendi caret haec species.

### *Scytodes domestica* Dol.

Tab. XXI, fig. 3, 4, 10, 12.

1859. *Scytodes domestica* Dolleschal, Tweede Bijdrage tot de Kennis der Arachniden van den Indischen Archipel (Acta Societatis Scientiarum Indo-Neerlandicae, v. 5) p. 48, t. 6, f. 1. — *Dictis fumida* Thorell, Spindlar från Nikobarnna och andra delar af södra Asien cat. (Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, v. 24, n. 2) p. 33. — 1895. *Dictis domestica* Thorell, Descriptive Catalogue of the Spiders of Burma cat., p. 67.

Non recte speciem hanc T. Thorell generi *Dictis* subiunxit; pedum unguiculi eius terni sunt, non bini.

Mas et femina organo *stridendi* ornantur e dente in latere interiore partis femoralis palporum prope basim sito et e plicis cinciter 6 in latere exteriore mandibularum, sat late inter se distantibus.

Lamellae corneae, quibus *venter* feminæ ornatur, parum a margine epigastrii remotæ, ca. 0·29 mm longæ, 0·26 latae, insigniter obliquæ, anteriora versus divaricantes, latere exteriore modice convexo, interiore fortiter in angulum rotundatum curvato, in parte interiore et anteriore fortius quam in exteriore et in posticâ indu-ratae, carinâ fere in semicirculum curvatâ, angulum anticum exteriorem cum postico interiore coniungenti in partes duas divisae, quarum interior multo minor, modice convexa est, exterior autem, insigniter concava, foveam format versus carinam dictam profundiorem; supra fundum foveæ huius carina non parum impendet. Anguli antici exteriores lamellarum inter se ca. 0·75, postici intei-riores 0·4 mm distant.

*Maris* (cephalothorace 2·25 mm longo) pars patellaris *palporum* 0·32 longa, 0·19 lata, tibialis supra (parte apicali, quae membranacea est, inclusâ) 0·44 longa, summâ basi et apice 0·16, circiter in  $\frac{2}{5}$  longitudinis 0·27 lata, ovata sed lateribus apicem versus fere rectis, a latere visa basi et apice 0·18 crassa, ante medium (basi proprius) 0·26 crassa, latere inferiore paulo fortius quam superius convexo; pars tarsalis 0·65 longa; pars eius basalis 0·18 lata, paululo longior quam latior, fere in latere exteriore solum angustata et in rostrum contracta paulo fusiforme (prope medium ca. 0·07, basim versus ca. 0·055 latum). Stemma 0·7 longum; bulbus a latere visus 0·23 latus, subglobosus, paululo longior quam latior, in spinam abiens paulo complanatam (prope medium ca. 0·02 crassam, 0·03 latam) a basi cito, ceterum leviter modo angustatam, paene rectam, apice paulo oblique in aculeum gracillimum, ca. 0·05 longum, paululo magis deorsum et intus directum contractam.

*Maris cephalothorax* multo humilior est quam feminæ, ex. gr. scutum dorsuale 2·25 longum, fere 1·0 altum, feminæ 2·7 longum, 1·7 altum; sed hac in re feminæ variant (mares perpaucos modo vidi): feminæ cuiusdam ad Buitenzorg lectæ scutum dorsuale 2·5 longum, 1·23 altum est. Exempla cephalothorace humiliore differunt quidem colore pallidiore et picturâ melius distinctâ ab exemplis cephalothorace alto; et haec et illa tamen uni speciei adnumeranda censeo, quoniam mihi non contigit, ut certum aliquem limitem inter ea invenirem.

*Cephalothorax* maris picturâ distinctissimâ excellentis fulvus est, supra (inter vittas dorsuales fuscas) pallidior, purius flavidus, hunc in modum colore umbrino pictus: A margine clypei usque ad marginem posticum cephalothoracis vittae duae extenduntur spatium occupantes ante aequa atque area oculorum latum, posteriora versus lateribus paene rectis leviter angustatum, pone circiter triplo angustius quam ad oculos; spatium flavidum vittis his interiectum inaequale, in parte posticâ circiter  $\frac{1}{3}$  pedum tibias latitudine aequat, in  $\frac{2}{3}$  anterioribus, in quibus lineâ umbrinâ ad oculos medios initium capienti dimidiatur, subfusiforme, in parte latissimâ paulo latius quam area oculorum mediorum; ad apicem posticum lineae medianae umbrinae vitta flava, de qua agitur, ramulum utrumque emittit non multo quam ipsa angustiorem, anteriora versus et paulo foras directum, circiter  $\frac{1}{3}$  cephalothoracis longitudine aequantem; ante ramulos hos usque ad lineam oculorum posticorum vitta umbrina utraque lineolis ornatur duabus in longitudinem directis, fuligineis, quarum interior in margine interiore vittae, exterior lineolae interiori propius quam margini exteriori vittae sita est; cum lineolâ exteriore macula contingit fulva oblonga subrhombica, mediocriter definita; spatium oculis medio et lateralibus (colore nigro cinctis) interiectum fulvum est. Partes laterales cephalothoracis colore umbrino paulo pallidiore pictae: vittâ angustâ valde inaequali ornatae margini propiore quam vittis dorsualibus, ante et pone (hic magis) abbreviatâ, cum vittâ dorsuali radiis quinque, aequa circiter atque ipsa latis, paulo inaequalibus coniunctâ. Summus margo cephalothoracis in lateribus et pone niger est, ad eum cephalothorax umbrinus, valde inaequaliter quidem, color umbrinus enim ramulos latos inaequales quatuor vittam supramarginalem attingentes et inter eos maculas tres sursum emittit; ramulus anticus cum radio antico supra dicto coniungitur, reliqui cum radiis insequentibus alternant. *Sternum* dilute umbrinum, ante pallide flavidum, marginibus ceterum obscure umbrinis aut maculis talibus exadversus coxas ornatum et inter coxas I et II aut etiam inter II et III maculis flavidis pictum, vittâ mediâ angustâ flavidâ plus minusve incompletâ ornatum.

Pictura haec in maribus mediocriter modo variare videtur. Feminae adultae similem in modum pictae raro occurrunt; earum pictura *cephalothoracis* eo imprimis differt, quod vittae dorsuales umbrinae spatium occupant posteriora versus leviter modo angu-

statum; in exemplis obscurius coloratis spatium hoc in declivitate cephalothoracis posticâ deorsum modice dilatum est, quoniam pars declivitatis pallida vittae obscurae dorsuali utrique et radio postremo, ab eâ versus marginem cephalothoracis descendenti, interiectum colore umbrino omnino repletur. In exemplis picturâ modice saltem expressâ color umbrinus adeo dilatatur, ut pallidae restent solum: vitta media angusta, lineâ fuscâ, pone insigniter abbreviatâ dimidiata, et maculae utrimque tres (anteriores) aut rarius quatuor, vittis fuscis dorsualibus et vittis supramarginalibus interiectae, plerumque oblongo triangulares, apicibus foras directae; raro cephalothorax marginem versus maculis pallidis minoribus tribus, cum superioribus alternantibus ornatur. — In exemplis obscuris cephalothorax, obscure rufo-umbrinus, ut vestigia picturae descriptae lineam fuscam medium et utrimque lineam similem, ab oculis lateralibus retrofere directam, in declivitatem posticam non productam, margini exteriori vittae fuscae dorsualis respondentem praebet, quum in liquorem immersus est; nonnunquam in exemplis talibus vittae dorsuales paulo pallidiores sunt quam laterum partes adiacentes!; non raro partes earum in dorso et in declivitate posticâ sitae differunt paulo colore inter se et cephalothorax in liquorem immersus vestigiis vittarum duarum latarum, supra in declivitate posticâ late rotundato aut oblique truncatarum ornatus videtur. — *Sternum* plerumque totum obscure rufo-umbrinum.

Iuniorum (quos paucos vidi) pictura similis atque maris adulti. Pedes eorum eo manifestius fuseo annulati, quo iunius est exemplum, ex. gr. in pullo quodam cephalothorace 1·3 mm longo, femora annulis quaternis, plus minusve confusis praesertim in pedibus anterioribus, patellae singulis, tibiae ternis, metatarsi binis — omnibus praesertim in pedibus posterioribus manifestissimis ornata.

Species haec late per Orbem terrarum diffusa videtur; praeter exempla Javana (Buitenzorg, Kagok, Protjot, Kendalsrut, Djedjek, Lebak siu) et Sumatrana (Palembang) et par exemplorum Birmanicorum, quod mihi olim dono dedit T. Thorell, marem possideo ad fluvium Shire in Africâ meridionali a Cel. Pisuliński et feminam in Americâ Centrali (Costarica: Terraba) a Rev. J. Nieborowski lectam.

Dysderidae.

**Ariadna javana** n. sp.

Femina.

*Cephalothorax* 4·5 mm longus, 3·1 latus, fronte 2·5 latâ, lateribus partis cephalicae, quoad libera est, fere parallelis, subtiliter, in parte cephalicâ subtilissime impresso-punctatus aut elevato reticulatus potius, modice nitens, pilis tenuissimis suberectis inaequalibus sat abunde instructus. *Impressiones* cephalicae valde vadosae, radiantes partis thoracicae indistinctae. *Oculi* medii fere rotundi, laterales paulo oblongi, illorum diameter 0·25, lateralium posticorum 0·27 et 0·24, lateralium anticum 0·27 et 0·23 longae; oculi postici medii inter se et laterales antici cum posticis subcontingentes; oculi medii a lateralibus posticis 0·29, a lateralibus anticis 0·32, a margine clypei 0·75, laterales antici inter se 0·69, a margine clypei 0·4 remoti; area oculorum pone 1·38, ante 1·2 lata, 0·62 longa; series oculorum posterior in cephalothorace directo desuper adspecto subrecta, a parte anticâ superiore visa modice procura, marginibus superioribus oculorum lateralium cum punctis mediis mediorum lineam subrectam designantibus. *Sternum* 2·6 longum, 1·7 latum (coxæ pedum II 1·2, III 1·0 longae), omnium subtilissime reticulatum. *Mandibulae* leviter projectae, 1·7 longae, basi (cum angulo, quo in latere exteriore ornantur) 1·13, apice ca. 0·47 latae, intus leviter divaricantes, lateribus exterioribus insigniter inter se approximantibus apicem versus, dorso densissime subtiliter reticulato, subopaco, apicem versus sublaevi et nitido, pilis longis tenuibus erectis dispersis ornato, intus prope apicem instructae dentibus minutis graniformibus, ante 2 aut 3, pone 1. *Maxillæ* 1·7 longae, in parte latissimâ 0·65 latae, *labium* 0·87 longum, 0·65 latum. *Palporum* pars patellaris desuper visa 0·53 lata, intus 0·58, in latere exteriore 0·74 longa, tibialis aequa lata, intus 0·74, in latere exteriore 0·68 longa, in parte interiora superiore aculeis in altero palpo 3, in altero 6 ornata, tarsalis basi 0·42 lata, 1·03 longa, a basi apicem versus leviter angustata, aculeis ca. 8—10 in latere interiori instructa. *Pedes* longe pilosi, pilis magnam partem suberectis et praesertim in pedibus anterioribus apicem versus fortiter curvatis, anteriores posterioribus non multo quidem sed evidenter robustiores; tibia et patella I non incrassatae, metatarsi I subcylindrati. Pedum I femora inermia, II inermia aut — ut III — aculeo 1 apicem

versus in latere antico superiore, IV aculeo 1 supra pone basim ornata, patellae inermes, tibiae I subter modo aculeis instructae ante 4, pone 3, non longis, tibiae II subter 1 in dimidio basali fere in linea mediâ et 2 in apice, III ante et pone 1.1, subter pone in apice 1 aut etiam in dimidio basali 1, IV subter in apice (pone) et in dimidio basali setâ 1 longâ forti, metatarsi I subter utrimque aculeis 5 aut 6, II subter ante 5 et pone 5 aut 3 et in linea mediâ medium versus 1, III praeter aculeos apicales 3, pone 1.1, ante 1.1, subter 1 aut 3, IV subter medium versus 1, in apice pectine ex aculeis complanatis(?) ante 2, pone 3, ni fallor instructi. Unguiculi principales pedum I interior dentibus 15, exterior 13, pedum IV interior 9, exterior 8 ornatii, magnam partem recti, apicem versus curvati; dentes eorum apici propiores saltem, ni fallor, in latere unguiculo alteri opposito siti sunt. Internodia pedum

I 3·45, 1·40, 2·46, 2·07, 1·0,  
 II 3·17, 1·40, 2·49, 2·17, 1·03,  
 III 2·4, 1·13, 1·50, 1·81, 0·94,  
 IV 2·75, 1·26, 2·0, 1·88, 0·94 mm longa.

*Abdomen* 7·0 longum, 3·2 latum, disperse pilosum. *Colulus* optime evolutus, 0·16 longus, 0·95 latus; *mamillae* infimae sulco ornatae obliquo, in angulo basali interiore initium capienti, prope apicem articuli basalis in eius latere exteriore evanescenti, cuius cuticula non indurata et albida reliquo articulo insigniter pallidior est<sup>1)</sup>.

Ceterum in speciem hanc ea quadrant, quae de formâ *Ariadnae Snellemanii* scripsit T. Thorell in Studi sui ragni Malesi e Papuani, v. 4, p. 389—390.

*Cephalothorax* cum *mandibulis* badio-niger, hae apicem versus, ille pone pallidior, badius; *sternum* obscure badium, parte mediâ paulo pallidiore quam marginales, *labium* et *maxillae* basi fere colore sterni, apicem versus pallidiora. *Coxae* I badiæ, reliquæ gradatim pallidiores, IV fulvae. *Pedes* I cephalothorace non aut non multo, II eo evidenter pallidiores, tibia I reliquis partibus paululo modo obscurior, metatarsus et tarsus femore pallidiores; pedes posteriores anterioribus insigniter pallidiores, fulvi; *palpi* eis obscuriores, pedibus II colore similiores. *Abdomen* atro-violaceum, obsolete minute pallidius maculatum et in ventre tenuissime transverse li-

<sup>1)</sup> Sulcum similem, paulo minus manifestum, etiam *mamillae Ariadnae spinipedis* H. Luc. præbent.

neatum, ante et praesertim mamillas versus obscurius quam supra; latera dorso et ventre paulo pallidiora; lineis avellaneis mediocriter expressis ornatur abdomen utrimque tribus: ante in mediâ fere altitudine lateris linea longa initium capit, retro et paululo deorsum directa, paululo deorsum curvata, circiter  $\frac{3}{4}$  longitudinis attingens; pone lineae binae utrimque sitae sunt breves, inferior a mamillâ supremâ anteriora versus et paululo sursum directa, paene recta, superior curvata: ante inferiori subparallelia, pone deflexa. Epigastri pars media ventre paulo obscurior, castanea; scuta pulmonalia dilute flava; mamillarum partes fortius induratae pallide flavidæ.

Mas ignotus.

Java: Tjibodas, femina unica.

*Ariadna Snellemanii* (Hass.), quae speciei huic imprimis similis videtur, pedum armaturam paulo aliam (nota probabiliter inconstans), cephalothoracem laevissimum et nitidissimum habet teste T. Thorellio.

### Drassodidae.

#### *Drassodes russulus* (Thor.)?

Tab. XXI, fig. 14, 15, 16.

1890. *Drassus russulus* Thorell, Studi sui ragni Malesi e Papuani, v. 4, p. 358.

Huic speciei adscribenda sunt fortasse exempla sat multa in Javâ insulâ lecta, quamquam descriptio epigynæ a T. Thorellio l. c. prolata non bene in ea quadrat.

*Epigyne* exemplorum nostrorum, male definita, rotundato-triangularis dici potest, apice anteriora versus directa, ca. 0·65 longa et lata est. Partem anticam epigynæ fovea format parva, fundo plicis paucis transversis ornato, in fronte costâ in angulum apice rotundatum refractâ, in medio corneâ, latera versus molliore, impendi limitata, pone autem utrimque tuberculo definita pallido, aeque circiter atque fovea magno, paulo transverso, formâ paulo varianti (tubercula haec ni fallor, lamellæ sunt ex parte solum — in parte posteriore — epigynæ adnatae). Fovea cum tuberculis spatium occupat subtriangulare aut fere semicirculare, ca. 0·4 latum, 0·18 longum. Pars epigynæ media maior paulo fortius indurata est (obscurius colorata saltem), costâ angustâ sed obtusâ, pallidâ, pone in triangulum parvum dilatatâ, nonnunquam ex parte sulco acuto-dimidiata, ante modo tubercula supra dicta attingenti, modo inter-

ea productâ, in partes duas divisa subquadrangulares, ca. 0·3 longas, 0·18 latae, maximam partem leviter et aequabiliter convexas. Prope a margine antico partes hae sulco transverso paulo sinuato ornantur. Ad marginem posticum denique epigyne transverse sat profunde impressa est in foveam (aut sulcum latum) ca. 0·35 longam, in medio nonnunquam interruptam; in fundo foveae huius, non procul ab eius apice utroque sulcus initium capit plus minusve distinctus, anteriora versus et intus directus, costam medium epigynae attinens aut abbreviatus. — Sculptura epigynae paulo mutabilis est et in partibus nonnullis mediocriter solum perspicua.

In epigynâ humefactâ, pallidâ, parti mediae costae anticae arcus parvus fuscus respondet, tuberibus mediis maculae magnae oblongae subferrugineae, pone autem epigyne serie transversâ macularum quatuor inter se approximatarum ornatur; maculae medio propiores rotundatae sunt, ferrugineae, laterales subnigrae, maiores, paulo obliquae (anteriora versus et intus directae), oblongae, pone rotundatae, ante oblique truncatae, plus minus sulcis obliquis supra dictis respondent.

In descriptione suâ epigynae *Drassi russuli* T. Thorell foveam anticam et tubercula ad eam pone sita fortasse omisit (quamquam distinctissima sunt) et partes epigynae medium atque posticam solum attigit.

Ceterum descriptio feminae Thorelliana his rebus supplenda videtur:

Cephalothorax et abdomen, praeter pilos, *squamis* ornantur valde angustis in illo, mediocriter latis, lanceolatis in hoc. Oculi postici medii rotundati sunt, parte posticâ exteriore, quae obscure colorata est, omissâ paulo oblongi et obliqui videntur. Feminae cephalothorace 3·0 mm longo, in parte latissimâ 2·2, sub serie oculorum posticâ 1·25 lato area oculorum ante 0·74, pone 0·87 lata est, diametri oculorum anticorum mediorum 0·145, lateralium 0·16 et 0·115, posticorum mediorum 0·115, lateralium 0·145 longae; oculi antici medii inter se 0·13, a lateralibus 0·04, postici medii inter se 0·13, a lateralibus 0·195, ab anticis mediis 0·16, laterales antici a posticis 0·065 remoti; area oculorum mediorum ante 0·39, pone 0·37 lata, 0·42 longa; clypeus sub eâ 0·16, sub oculis lateralibus 0·145 altus. Mandibulae 1·15 longae, 0·6 latae, sulcus unguicularis ante supra dentem maiorem in angulo situm plerumque denticulo minuto uno, infra eum plerumque duobus, raro uno, pone dentibus duobus

(rarissime tribus) instructus. *Labium* basi 0·48 latum, 0·42 longum; *maxillae* a basi labii 0·84 longae, similes atque in *Drassodâ lapidicola* (Walck.). *Palporum* pars patellaris 0·47 longa, 0·26 lata, tibialis 0·53 longa, 0·23 lata, tarsalis 0·94 longa, femoralis supra aculeis 1·1, patellaris aculeo 1 in latere interiore, tibialis et tarsalis in latere eodem pone basim 2, longis setiformibus, haec etiam prope apicem subter et intus aculeis parvis 2 aut 3 instructa. Femora *pedum* anteriorum supra aculeo 1, ante 1, III supra et ante et pone 1·1, IV supra 1·1, ante et pone 1, patellae 0, tibiae I subter 2·2, II subter 2·2 aut 1·2, III ante supra 1, infra 1·1, pone 1·1, subter 1·2·2 aut 1·1·2, IV armaturâ simili sed pone ut ante aculeatae, metatarsi anteriores subter aculeis 2 pone basim, III et IV supra 2 pone basim et 2 apicem versus, ante et pone 1·1, subter 2·2 pone basim et prope medium ornati; armatura haec paulo mutabilis est. Scopulis ornantur tarsi omnes, metatarsi anteriores et — medio-criter evolutis quidem — pars quaedam lateris antici tibiarum anteriorum. Internodia pedum

I 2·3,	1·13,	1·73,	1·5,	1·2,
II 2·1,	1·05,	1·5,	1·35,	1·05,
III 1·88,	1·0,	1·28,	1·54,	0·95,
IV 2·55,	1·2,	1·90,	2·48,	1·0 mm longa.

Feminae minimaæ, quam vidi, cephalothorax 2·5 mm longus est.

Maris nostri maximi *cephalothorax* 2·9 mm longus, 1·95 latus, parte cephalicâ sub oculis posticis 1·2 latâ; area oculorum pone 0·84, ante 0·73 lata. Diametri *oculorum* anticorum mediorum 0·145, lateralium 0·16 et 0·11, posticorum mediorum 0·13, lateralium 0·13 longae; oculi antici medii inter se 0·095, a lateralibus 0·55, postici medii inter se 0·13, a lateralibus 0·16, a mediis anticis 0·145, laterales antici a posticis 0·045 remoti; area oculorum mediorum ante 0·37, pone 0·39 lata, 0·40 longa; clypeus sub eâ 0·18, sub oculis lateralibus 0·16 altus. *Mandibulae* 1·15 longae. 0·55 latae. *Palporum* pars femoralis supra aculeis 1·1 (raro 1·2) ornata, patellaris 0·47 longa, 0·28 lata, tibialis supra in linea media 0·37 longa, cum processu 0·42 longa, basi 0·22, prope apicem 0·31 lata, basi 0·21, prope apicem 0·40 crassa, subter leviter modo, supra insigniter incrassata apicem versus, dorso a basi linea rectâ adscendentî, prope apicem in arcum fortiter curvatum flexo, denique versus laminam tarsalem ad perpendiculum descendenti (descriptio processus tibialis inspi-ciatur apud *Thorellium* l. c.). Lamina tarsalis 1·05 longa, 0·5

lata (latitudinem femoris I parum superans); rostrum 0·3 longum. Stemma, processu apicali exteriore excepto, 0·65 longum, 0·45 latum, a latere exteriore visum in parte posteriore, ubi altissimum est, 0·30 crassum. Non parum complicatum est stemma et non facile ad describendum; quum ab imo adspicitur, partem eius posteriorem bulla cornea formare videtur subsemiglobosa, ante fere transverse truncata; usque ad hanc bullam fissurā a basi apicem versus primo insigniter, tum minus dilatatā stemma in duas dividitur partes: exteriorem interiore longiorem sed insigniter angustiorem; pars exterior a latere exteriore visa elongato triangularis est, apice mediam fere longitudinem rostri laminae tarsalis attingit, extra marginem laminae prominet in palpo desuper adspecto, mediocriter modo indurata est, apicem versus lamelliformis, subpellucida; pars interior fortius sed inaequabiliter indurata, non parum inaequalis, circiter dimidio longior quam latior (ab imo visa), apicem versus inaequabiliter angustata, latere exteriore paulo sigmoidi, basi propius convexo, apicem versus concavo, ad apicem in angulum parvum exciso, apice late truncata et sinuata ita, ut in dentes duos desinat, exteriorem brevem triangularem lamelliformem et interiorem, longius anteriora versus productum, qui uncus est corneus crassus, foras curvatus; margine exteriore partis huius processus quidam aliis, corneus ex parte ita occultatur, ut in stemmate non distorto margo suus solum angustus et apex latiusculus, leviter foras curvatus conspicatur; cum latere interiore partis exterioris, supra descriptae, autem processus contingit corneus, elongato triangularis, brevior, porrectus, cuius pars quaedam solum conspicitur in palpo a latere exteriore yiso. In *pedibus* anterioribus scopolis tarsi modo et dimidium apicale metatarsorum ornantur. Pedum armatura similis atque in feminis, sed tibiae II subter etiam in apice ante aculeo 1 fortasse constanter ornantur. Internodia pedum

I 2·78, 1·43, 2·55, 2·25, 1·58,

II 2·03, 1·08, 1·50, 1·38, 1·13,

III 1·8, 0·94, 1·24, 1·43, 0·90,

IV 2·33, 1·13, 1·73, 2·1, 0·98 mm longa.

Mares magis quam feminae staturā variare videntur; exempli minimi, quod vidi, cephalothorax 2·15 longus, 1·58 latus, palporum pars patellaris 0·36 longa, 0·23 lata, tibialis in linea mediā 0·31, cum processu 0·38 longa, prope apicem 0·26 lata, lamina tarsalis 0·87 longa, 0·42 lata (femur I 0·35 latum); internodia pedum

I 1·95, 1·00, 1·73, 1·58, 1·13,  
II 1·5, 0·79, 1·13, 1·05, 0·83,  
III 1·35, 0·68, 0·88, 1·08, 0·60,  
IV 1·8, 0·79, 1·35, 1·73, 0·71 mm longa.

Java: in vertice montis Pangerango lecta sunt exempla complura adulta et iuniora, in monte Gedeh feminae paucae.

**Echemus (?) pictus n. sp.**

Tab. XXI, fig. 17, 19, 20, 23.

**Femina.**

*Cephalothorax* 1·8 mm longus, 1·38 latus, parte cephalicâ, quoad libera, anteriora versus insigniter angustatâ, sub oculis lateralibus posticis 0·78, ante ca. 0·62 latâ, dorso a declivitate posticâ, quae sat praerupta est, anteriora versus leviter descendenti et recto usque ad oculos anticos medios; sulcus medius vadosus brevis. Granulis pilos fortiores gerentibus adspersus est cephalothorax, ceterum sublaevis nitidus. *Oculorum* series posterior sat fortiter procurva, marginibus posticis lateralium cum punctis mediis mediorum lineam subrectam (paululo recurvatam) designantibus; directo a fronte ad spectorum oculorum anticorum mediorum puncta media cum marginibus superioribus lateralium lineam rectam designant. Diametri oculorum anticorum mediorum 0·145, lateralium 0·13 et 0·095, posticorum mediorum 0·105, lateralium 0·113 longae; oculi postici mediis rotundati, antici mediis nigri, insigniter convexi, cum anticis lateralibus contingentes, inter se 0·065, a mediis posticis 0·115, hi inter se 0·08, a lateralibus 0·075, laterales antici a posticis 0·03 remoti. Area oculorum ante 0·5, pone 0·55 lata, area mediorum ante 0·34, pone 0·30 lata, 0·37 longa; clypeus sub eâ et sub oculis lateralibus ca. 0·08 altus. *Sternum* 1·1 longum, 0·87 latum. *Mandibulae* 0·57 longae, 0·27 latae, sublaeves, apice paulo oblique et breviter rotundato truncatae, margine apicali ante dentibus tribus, gradatim minoribus, pone dente uno, denti antico tertio subaequali armatae. *Labium* 0·31 longum, 0·26 latum; *maxillae* a basi labii 0·52 longae, a parte posticâ inferiore visae in latere exteriore a basi usque circiter ad  $\frac{3}{7}$  longitudinis rotundato dilatatae, tum apicem versus modice (paulo minus quam basim versus) angustatae et leviter sinuatae, impressione latâ obliquâ ornatae. *Palporum* pars patellaris 0·29 longa, 0·18 lata, tibialis 0·27 longa, basi 0·16, apice 0·18 lata, tarsalis 0·52 longa; palpi aculeis setiformibus abunde instructi. *Pedum*

femora supra aculeis 1.1.1, praeterea I et II ante 1, III et IV ante et pone 1 aut III pone 1.1, patellae modo 0, modo III aut III et IV pone 1, tibiae I subter prope medium 1 et in apice 1 (2?), II subter 1.2 aut 2.2 et ante 1, III et IV ante 1.1.1, pone 1.1, subter 1.1.2, metatarsi I et II subter pone basim 2, III, praeter aculeos in apice et prope eum sitos, in dimidio basali ante et pone 1, subter 2, IV ad apicem aculeati et subter aculeis 1.1, supra aculeis 2, in latere utroque aculeo 1 in dimidio basali armati; armatura pedum paulo mutabilis videtur. Pedum anteriorum tarsi et metatarsi, posteriorum tarsi (hi parce) scopulati. Internodia pedum

I	1.35,	0.78,	0.91,	0.89,	0.50,
II	1.3,	0.75,	0.91,	0.91,	0.48,
III	1.25,	0.70,	0.84,	1.02,	0.48,
IV	1.55,	0.78,	1.12,	1.46,	0.52 mm longa.

*Abdomen* 3.3, cum mamillis 3.8 longum, 2.0 latum, formâ in hoc genere vulgari. *Epigyne* leviter modo indurata, parum definita, paulo transversa, circiter 0.3 lata, 0.22 longa, simplex valde et paulo mutabilis, leviter convexa, prope marginem posticum foveolis ornata duabus vadosis, rotundatis, plus minusve evidenter, obscure coloratis, quarum puncta media inter se ca. 0.11 distant; cum margine postico epigynae foveolae lineolis coniunguntur fuscis, inter se parallelis, ca. 0.06 aut 0.08 remotis, leviter aut non impressis. In epigynâ humefactâ, pallide coloratâ, praeter foveolas et lineolas dictas maculae conspicuntur duae rotundatae, foveolis multo pallidiores, ca. 0.08 latae, coniunctim spatium 0.22 latum occupantes, cum margine antico foveolarum coniunctae. *Mamillae* infimae latitudine suâ saltem inter se remotae, ca. 0.5 longae, 0.2 latae, supremarum pars basalis 0.37 longa, 0.15 lata.

Cephalothorax et abdomen dense tecta videntur *pilis* inaequalibus, quorum minores tenuissime plumati sunt.

Exempli cuiusdam minoris cephalothorax 1.6 longus, 1.2 latus, pedum IV patella 0.68, tibia 0.97 longa.

Humefactae araneae *cephalothorax* cum partibus oris pedibusque flavo-testaceus, oculi colore nigro anguste cincti; in exemplis obscurius coloratis pars tarsalis palporum colore umbrino suffusa et tibia IV basi et apice annulo obscuro, parum expresso ornata. *Abdomen* avellaneum, colore fumoso plus minusve evidenter hunc in modum pictum: in medio fere dorso vitta initium capit parum lata, anteriora versus directa, sensim evanescens, marginem anticum

longe non attingens; prope eius apicem posticum punctum utrimque conspicitur saepe melius quam vitta expressum; in parte posteriore dimidiâ aut minore dorsum latera versus vittâ utrimque ornatur lateribus abdominis desuper adspecti subparallelâ, pone melius definitâ, ante diffusâ, plus minusve evidenter in fascias aliquot divulsâ breves, quarum anteriores obliquae: foras et retro directae sunt, posteriores autem transversae; vittae hae supra mamillas nonnunquam inter se coniunguntur. Latera abdominis ad mamillas colore fumoso inaequaliter picta sunt, ceterum nonnunquam colore eodem valde obsolete diffuse maculata in dimidio posteriore; venter nonnunquam vittâ mediâ fuligineâ, parum latâ, interruptâ ab epigastrio usque fere ad mamillas ornatur. *Mamillae* fulvae.

Desiccatae araneae abdomen (et cephalothorax?) isabellino-albidum videtur.

M a s.

*Cephalothorax* 1·7 mm longus, 1·35 latus, parte cephalicâ sub oculis lateralibus posticis 0·71, ante circa 0·52 latâ. Margines postici *oculorum* posticorum lateralium cum punctis mediis mediorum linéam evidenter recurvatum designant. Diametri oculorum anticorum mediorum 0·16, lateralium 0·13 et 0·105, posticorum mediorum 0·113, lateralium 0·13 et 0·115 longae; oculi postici medii inter se et a lateralibus 0·065, antici medii inter se 0·06, a mediis posticis 0·11, laterales antici a posticis 0·03 remoti; area oculorum ante 0·50, pone 0·55 lata, area mediorum ante 0·34, pone 0·29 lata, 0·37 longa; clypeus sub è 0·095, sub oculis lateralibus 0·08 altus. *Sternum* 1·0 longum, 0·8 latum. *Mandibulae* 0·48 longae, 0·24 latae. *Palporum* pars femoralis supra aculeis 1·1 ornata, patellaris 0·26 longa, 0·19 lata, lateribus subparallelis, tibialis supra in lineâ mediâ 0·18, cum processu 0·47 longa, basi 0·145, prope apicem 0·21 lata, apice in latere exteriore supra processu ornata longo, gracili, anteriora versus et paululo sursum, a basi usque ad medium etiam paululo foras directo; a latere visus processus hic modice angustatus est in dimidio basali, tum latitudine aequali, apice paululo oblique acuminatus, desuper simulque paulo a parte interiore adspectus maximam partem paululo modo angustatus, apice sat longe intus oblique truncatus, acutissimus. Lamina tarsalis 0·52 longa, 0·22 modo lata, fere a basi apicem versus modice et paene aequabiliter angustata, apice rotundata. Stemma usque fere ad apicem laminae tarsalis pertinet, humile est, angustum, 0·47 longum, 0·16 latum,

processibus evidentioribus caret<sup>1)</sup>), ab imo visum a basi fere, quae obliqua est, apicem paulo oblique truncatum versus leviter et maximam partem fere aequabiliter angustius fit. Mas unicus, quem vidi, caret pedibus dextris et pede II sinistro; femur III ante et pone aculeis 1.1, patella III pone 1, IV nullo, tibia I subter prope medium aculeis 2 et in apice 1 ante, IV in latere antico 1.1, metatarsus I subter prope basim 1 solum, III et IV subter pone basim 1 solum armati; ceterum pedum armatura similis atque in feminis; pedes postici scopulis carere videntur. Internodia pedum

I 1.33, 0.71, 0.91, 0.84, 0.46,  
III 1.16, 0.62, 0.81, 1.04, 0.48,  
IV 1.49, 0.71, 1.10, 1.42, 0.52 mm longa.

*Abdomen* 2.4, cum mamillis 2.7 longum, 1.4 latum. Dorsum ante scuto ornatum corneo, triangulari apice late rotundato, 0.95 longo, basi 0.62 lato. *Mamillae* infimae 0.45 longae, 0.16 latae, supremae 0.31 longae, 0.13 latae.

*Abdominis* scutum fulvum, vitta media fumosa in eius apicem paulo producta; dorsum praeter puncta duo in descriptione feminae commemorata punctis obscuris duobus aliis in lateribus scuti corni ornatum; puncta haec quatuor quadrangulum designant ca. 0.5 latum, ante vix angustius, 0.7 longum; color ceterum similis atque feminae; palpi toti pallide colorati.

Java: Kaligangsa, mas et femina et pulli; Kagok, feminae.

Aranea haec maxillarum formâ magis cum *Drassodeis* quam cum *Echemeis* convenire mihi videtur; probabiliter genus novum institendum est pro eâ.

### Scotophaeus (?) javanus n. sp.

Tab. XXI, fig. 21, 24.

#### Femina.

*Cephalothorax* 2.35 mm longus, 1.78 latus, parte cephalicâ sub oculis posticis lateralibus 1.0, ante ca. 0.91 latâ, dorso magnam partem recto et librato, prope oculos leviter declivi, pilis mediocriter longis, plus minusve erectis abunde instructus et inter eos pilis

<sup>1)</sup> Pars, quae stemmatis ab imo visi apicem occupat, fortasse conductor emboli est; margini eius interiori et laminae tarsali interiecta est spina quedam cornea, anteriora versus directa; in stenmate paululo distorto embolum vidisse video: aculeum gracilem penicidum, inter conductorem emboli et laminam tarsalem situm; aculeus hic in mediâ superiore parte figuræ nostræ 20 conspicitur.

subtiliter plumatis, adpressis ornatus, detritus laevis et nitidus (granulis, quae pilos fortiores gerunt, exceptis). *Oculorum* series posterior leviter procurva, punctis mediis mediorum cum marginibus posticis lateralium lineam modice recurvatam designantibus; directo a fronte adspectorum oculorum anticorum mediorum puncta media demissius quam margines superiores lateralium sita. Diometri oculorum anticorum mediorum 0·11, lateralium 0·13 et 0·095, posticorum mediorum, qui insigniter obliqui et oblongi sunt, sed propter colorem obscurum partis posticae lateralis humefacti rotundato-triangulares videntur, 0·13 et 0·10, lateralium 0·12 et 0·095 longae; oculi postici medii pone, ubi inter se proximi sunt, 0·03, a lateralibus ca. 0·05, antici medii inter se 0·04, a mediis posticis 0·095, laterales postici ab anticis ca. 0·05 remoti, hi cum mediis anticis fere contingentes; area oculorum ante 0·46, pone 0·55 lata, area mediorum ante 0·26, pone 0·275 lata, 0·31 longa; clypeus sub eâ 0·08, sub oculis lateralibus 0·065 altus. *Mandibulae* 0·73 longae, 0·44 latæ, pilis sat fortibus, suberectis, non dense ornatae, sublaeves, nitidae; sulcus unguicularis armatus ante dentibus tribus discretis, medio reliquis maiore, pone dentibus duobus quam dens anticus medius multo minoribus. *Sternum* ovatum, posteriora versus fortius angustatum, pone leviter acuminatum, 1·3 longum, 0·95 latum, laeve, pilis plumatis—ni fallor—carens. *Labium* 0·42 longum, 0·36 latum, apice rotundato truncatum. *Maxillæ* a basi labii 0·66 longae, ambæ simul sumptae a basi usque ad  $\frac{2}{5}$  longitudinis fortiter dilatae, inde apicem versus insigniter angustatae et leviter sinuatae, in parte latissimâ 1·1, apice 0·85 latae, late oblique impressæ. *Palporum* pars femoralis supra aculeis 1.2, patellaris intus 1, tibialis supra prope apicem 2, in latere interiore 1.1, tarsalis aculeis pluribus instructa, patellaris 0·40 longa, 0·21 lata, tibialis 0·34 longa, 0·21 lata, tarsalis 0·55 longa. *Pedum* femora anteriora supra aculeis 1.1, ante versus apicem 1, III supra 1.1.1, in utroque latere 1.1, IV supra 1.1.1, in latere utroque 1, patellæ anteriores nullo, posteriores utrimque 1, tibiae anteriores nullo, posteriores supra 1, ante et pone: supra 1 et infra 1.1, subter 2.2.2, metatarsi anteriores subter pone basim 2, III supra 2.2.2, ante et pone 1.1, subter 2.2 (nullo in apice), IV armaturâ simili (eadem?) et in apice subter aculeo 1 aut 2 instructi; pectine pilorum, quali *Prosthesimæ* ornantur, metatarsi posteriores carent; scopolis tarsi et metatarsi anteriores instructi sunt, posteriores carere videntur. Internodia pedum

- I 1·7, 1·13, 1·29, 1·0, 0·65,  
 II 1·5, 0·97, 1·10, 0·94, 0·65,  
 III 1·3, 0·78, 0·84, 1·04, 0·60,  
 IV 1·78, 1·04, 1·42, 1·78, 0·76 mm longa.

*Abdomen*, manifesto post partum, 3·2 longum, 2·0 latum, dense pilis simplicibus micantibus et pilis plumatis tectum. *Epigyne* rotundata 0·47 longa, parum angustior quam longior, modice convexa, foveis tribus ornata; harum antica transversa, a margine antico 0·13 remota, 0·26 lata, ante optime definita margine modice recurvato, acuto, complanato, impendenti, pone sensim vadosior et evanescens; foveae posteriores in mediâ longitudine epigynae initium capiunt, paululo pone  $\frac{3}{4}$  longitudinis pertinent, intus optime, pone bene, extrinsecus parum definitae sunt, subsemicirculares, basi 0·13 longâ retro et foras directâ, septo inter se distinctae in medio 0·09 lato anteriora est posteriora versus leviter dilatato, in transversum librato, in longitudinem paululo convexo. *Humefacta* epigyne palide fulva, circulis picta duobus ferrugineis fusco marginatis, 0·065 latit, inter se 0·15, a margine antico epigynae 0·26 remotis; ferrugineo colore praeterea sunt: margo anticus foveae anticae et fovearum posteriorum margines interiores cum parte quadam marginum posticorum et vittae obscurius marginatae, ca. 0·04 latae, medium partem epigynae occupantes, inter se valde approximatae, pone, ubi paululo dilatatae sunt et apice rotundatae, a margine epigynae ca. 0·065 remotae, in longitudinem directae, ante medium epigynae a se discedentes, foras curvatae et evanescentes. *Mamillae* infimae 0·39 longae, 0·19 latae, inter se insigniter plus quam latitudine suâ remotae; supremarum pars basalis ca. 0·20 longa, ca. 0·13 lata (pars apicalis retracta).

*Humefactae araneae* *cephalothorax* cum *partibus oris* et *pedibus* pallidius et laetus testaceus, *palporum* pars tibialis modice, tarsalis fortiter colore badio tincta; *abdomen* isabellinum, *mamillae* flavidæ, venter lineis duabus umbrinis, a lateribus epigynae retro ductis, paululo incurvatis, in dimidio posteriore evanescentibus pictus.

*Mas ignotus.*

*Java*: Buitenzorg, femina unica.

Non sine haesitatione araneam hanc generi *Scotophaco* subiungo, differt ea enim a plerisque saltem speciebus huius generis mandibulis pone dentibus duobus optime evolutis armatis; propter for-

mam maxillarum similem atque in *Prosthesimis* generi *Drassodae* non potest subiungi haec species.

**Prosthesima iusta** n. sp.

Tab. XXI, fig. 22, 25, 26.

Femina.

*Cephalothorax* 2.55 mm longus, 1.9 latus, parte cephalicâ sub oculis posticis 1.0, ante 0.94 latâ, dorso paene recto, leviter anterius versus descendantî, dense subtilissime reticulatus, parum nitens, pilis simplicibus, modice longis non dense instructus. *Oculorum* series posterior subrecta, eius oculi medii oblongi, posteriora versus subito a se discedentes; series anterior fortiter deorsum curvata, marginibus superioribus lateralium cum punctis mediis mediorum lineam subrectam designantibus. Diametri oculorum posticorum mediorum 0.095 et 0.08, lateralium 0.095 et 0.09, anticorum mediorum 0.065, lateralium 0.11 et 0.08 longae; oculi postici medii inter se et a lateralibus 0.04, a mediis anticis 0.115, hi inter se 0.065, a lateralibus 0.015, laterales antici a posticis 0.065 remoti; area oculorum ante 0.39, pone 0.42 lata, area mediorum ante 0.195, pone 0.225 lata, 0.26 longa; clypeus sub eâ 0.095, sub oculis lateralibus 0.075 altus. *Mandibulae* 0.8 longae, 0.42 latae, pilis inaequalibus non dense instructae, sublaeves; sulcus unguicularis ante dentibus 4, pone modo 3 modo 2, mediocribus armatus. *Maxillae* et *labium* similia atque in *Prosthesimâ subterraneâ* (C. L. Koch). *Palporum* pars patellaris 0.48 longa, 0.24 lata, tibialis 0.40 longa, 0.22 lata, tarsalis 0.68 longa, basi 0.17 lata, elongato conica, femoralis supra aculeis 1.2, patellaris intus 1, supra 1 in apice, tibialis supra 1 prope apicem, intus 3, tarsalis aculeis ca. 6 ornata. *Scopulis* tarsi et metatarsi *pedum* anteriorum solum ornati; metatarsi III et IV subter in apice pectine pilorum confertorum optime evoluto instructi. Patellae I et II inermes, III et IV aculeo 1 pone ornatae; pedum anteriorum tibiae subter inermes, metatarsi aculeis 2 subter pone basim, tibiae posteriores non solum in lateribus et subter sed etiam supra (aculeo 1 pone basim) ornatae. Internodia pedum

I 1.7, 1.15, 1.23, 1.20, 0.94,

II 1.55, 1.00, 1.07, 1.13, 0.91,

III 1.35, 0.81, 0.83, 1.13, 0.81,

IV 1.95, 1.17, 1.42, 1.85, 1.00 mm longa.

*Abdomen* 3.8 longum, 2.4 latum. *Epigyne* 0.56 longa, 0.52 lata,

modice definita, ante truncata, posteriora versus paululo dilatata, pone rotundata et levissime excisa in medio, sculpturâ simili atque in *Prosthesimâ subterraneâ*: paulo pone marginem anticum margine ornata acuto, deplanato, posteriora versus impendenti, in medio leviter procurvo, in latere utroque recurvato, pone hunc marginem paulo excavata; areola in parte latissimâ 0·29, ante 0·21 lata, 0·21 longa (parte posticâ mediâ exceptâ), trapezica, ante aperta, lateribus et angulis posticis rotundatis, pone in medio in triangulum parvum producta, cuius apex a margine postico epigynae 0·18 distat.

*Cephalothorax* humefactus nigro-badius, nigro marginatus et reticulatus; *mandibulae*, *labium*, *sternum* badia, hoc obscurius marginatum; *maxillae* sterno paululo pallidiores; *palpi* obscure fulvi, apicem versus colore badio suffusi; *pedes* cephalothoraci colore similes, apicem versus paulo pallidiores, femora I maculâ fulvâ oblongâ utrimque ornata. *Abdomen* fuligineum, subter umbrinum, *mamillae* subnigrae.

Mas. (probabiliter huius speciei).

*Cephalothorax* 2·6 mm longus, 1·95 latus, parte cephalicâ sub oculis posticis 0·94, ante ca. 0·78 latâ, dorso paululo convexo in longitudinem. Diametri *oculorum* posticorum mediorum 0·115 et 0·095, lateralium 0·095 et 0·08, anticorum mediorum 0·08, lateralium 0·115 et 0·09 longae; oculi postici medii inter se 0·04, a lateralibus 0·035, a mediis anticis 0·097, hi inter se 0·048, a lateralibus 0·015, laterales antici a posticis 0·048 remoti; area oculorum ante 0·38, pone 0·42 lata, area mediorum ante 0·18, pone 0·25 lata, 0·26 longa; clypeus sub eâ 0·115, sub oculis lateralibus 0·1 altus. *Mandibulae* 0·8 longae, 0·39 latae; earum sulcus unguicularis ante dentibus 3, pone 2 ornatus videtur. *Palporum* pars femoralis a latere visa leviter fusiformis, supra aculeis 1.2 armata, patellaris 0·42 longa, 0·26 lata, ut in feminâ aculeata, tibialis apice oblique truncata, in lineâ mediâ 0·29, in latere exteriore una cum processu (ca. 0·23 longo) 0·55 longa, basi 0·16, prope apicem 0·27 lata, supra et intus aculeis singulis(?) instructa; eius processus a parte superiore interiore visus paululo foras curvatus, apice brevissime incurvatus, a latere exteriore adspectus duplo circiter longior quam basi latior, fere rectus, ad apicem subter levissime sinuatus, apice obtusiusculus. *Lamina tarsalis* 0·8 longa, 0·44 lata, aculeis paucis instructa, margine exteriore (a parte exteriore viso) leviter et paene aequabiliter deorsum curvato. *Stemma* subter leviter et paene ae-

quabiliter convexum in longitudinem; bulbi lobus principalis ab imo visus leviter dilatatus anteriora versus, apice oblique truncatus, in latere exteriore brevior, angulis rotundatis; lobi huius pars apicalis interior superior (laminae tarsali propior) in processum abit rufo-testaceum, qui partem apicalem stemmatis ab imo visi format; a parte inferiore processus hic e basi latâ, dimidium stemma latitudine aequanti saltem subito angustatus videtur, foras et denique paululo retro curvatus, margine antico maximam partem aequabiliter convexo; apicem versus processus, de quo agitur, fortiter complanatus est, lamelliformis, sursum curvatus versus alveolum, cuius marginem exteriorem apice attingit; embolus, apici bulbi in parte exteriore adnatus, spina est nigra, sat brevis (0·12 longa), basi exceptâ recta, mediocriter modo gracilis, non setiformis, anteriora versus et paulo intus directa, processu priore maximam partem occulta, quum ab imo adspicitur stemma. *Internodia pedum*

I 1·9, 1·17, 1·49, 1·42, 1·04,

II 1·5, 0·94, 1·10, 1·17, 0·94,

III 1·4, 0·81, 0·97, 1·29, 0·78,

IV 2·05, 1·13, 1·55, 2·04, 1·00 mm longa.

*Abdomen* (paulo contusum) ca. 3 longum, 1·7 latum. Dorsi pars anterior scuto tecta corneo, ca. 1·15 longo et lato, triangulari angulis rotundatis, ut reliqua pars dorsi piloso. — Ceterum inspiciatur descriptio feminae.

Color pallidior quam feminae *Cephalothorax* latericius aut badius, margine infuscato, *sternum* paulo pallidius; *pedes* et imprimis *palpi* magis fulvi, horum pars tarsalis reliquis non aut non multo obscurior, femora I maculâ pallidâ evidentiore carent. *Abdomen* supra pallidius aut obscurius umbrinum, subter umbrino-cinereum, scutum dorsuale laetius, epigastrium pallidius latericia.

Java: Buitenzorg, femina; Kagok, mas; Diatinegoro, mas; Protjot, pullus probabiliter hujus speciei.

Femina huius speciei differt a *Prosthesimâ subterraneâ* (C. L. Koch), cui non parum similis est, pedibus paululo longioribus (tibia cum patellâ IV cephalothoracem longitudine acquat, in *P. subterraneâ* eo paululo brevior est; — nota parum perspicua et nescio an non satis sibi constans) et imprimis epigynâ insigniter minore: ex. gr. *Pr. subterraneae* cephalothorace 2·77 mm, tibiâ cum patellâ IV 2·62 longâ, areola epigynae 0·53 lata est.

An species haec distincta sit a *Prosthesimâ sarawakensi* Thor.,

ulterius inquirendum videtur; descriptio oculorum *P. sarawakensis* a Thorellio prolata in: Studi sui ragni Malesi e Papuani, v. 4, p. 362, non bene quadrat quidem in *P. iustum*, sed magnitudo eorum et intervalla non facilia sunt ad extricandum.

**Aphantaulax fasciata n. sp.?**

Tab. XXI, fig. 18, 27.

**Femina.**

Similis est haec aranea *Aphantaulacibus cinctae* (L. Koch) et *seminigrae* E. Sim.

*Cephalothorax* 2·6 mm longus, 1·6 latus, parte cephalicâ sub serie oculorum posticâ ca. 0·94 latâ. *Oculorum* area ante 0·45, pone 0·59 lata; series postica in cephalothorace directo desuper adspecto paululo recurvata, antica a fronte visa insigniter deorum curvata, marginibus superioribus oculorum lateralium cum punctis mediis mediorum lineam subrectam designantibus. Diametri oculorum (cornearum, quarum fines difficilius cernuntur, praesertim in oculis posticis) posticorum mediorum et lateralium 0·095 et 0·08, anticorum mediorum 0·105, lateralium 0·113 et 0·08 circiter longae; oculi postici mediis obliqui, posteriora versus discedentes, inter se 0·16, a lateralibus 0·095, a mediis anticis 0·13, hi inter se 0·065, a lateralibus 0·015, laterales antici a posticis 0·113 remoti; area oculorum mediorum ante 0·24, pone 0·31 lata, 0·31 longa; clypeus sub eâ 0·113, sub oculis lateralibus 0·09 altus. *Mandibulae* 0·9 longae, 0·39 latae; earum margo apicalis una cum dente, in quem compressus est in parte interiore, leviter modo obliquus; dens dictus latus, non longus, tamquam e dentibus duobus connatis compositus, interiore (in angulo mandibulae sito) trianguli acuto et exteriore humiliore lato; ad basim dentis huius margo mandibulae interior denticulo alio minuto acuto instructus est; margo posterior sulci unguicularis valde obtusus, indistinctus, exadversus angulum mandibulae dente brevi conico armatus. *Maxillae, labium, sternum* similia atque in *Aph. cincta*. *Pedum* femora anteriores supra aculeis 1.1 et in latere antico 1, posteriores supra 1.1.1 et in latere utroque apicem versus 1, patellae nullo, pedum anteriorum tibiae subter ad latus anticum 1.1, metatarsi subter pone basim 1, tibiae III supra 1, ante 1, pone 1.1, subter 1.1, praeterea subter ad apicem 2, tibiae IV ante et pone et subter 1.1 et ad apicem subter 2, metatarsi III et IV praeter aculeos in apice aut prope eum sitos (subter 2, in latere utroque 1, supra 2 — ni fallor)

subter 2, supra et in latere utroque 1 ornari videntur; pedum anteriorum metatarsi et tarsi, posteriorum tarsi et pars apicalis metatarsorum scopulata, scopulae pedum IV parum evolutae. Internodia pedum (quorum I et II paene aequali sunt longitudine)

I 1·4, 0·78, 1·0, 0·94, 0·71 (unguiculis exclusis),

III 1·3, 0·71, 0·87, 1·04, 0·71,

IV 1·6, 0·84, 1·17, 1·52, 0·74 mm longa.

*Abdomen* 3·8 longum; 2·0 latum, desuper visum paene ellipticum, cum mamillis 4·5 longum; harum infimae circiter latitudine suā inter se remotae, 0·7 longae, 0·26 latae, supremae, parte apicali retractā, 0·58 longae, ca. 0·18 latae. *Epigyne* similis atque in *Aph. cinctā*, foveā ornata subpiriformi pone latiore, 0·24 longā, 0·19 latā, a margine postico epigastrii 0·13 remotā.

Humeactae araneae *cephalothorax* obscure rufesceni-umbrinus in medio, margines versus obscurior; *mandibulae* colore partis cephalicae, *sternum* fuligineum, *labium* fulgineum apice pallidius, *maxillae* flavidō-umbrinae, extrinsecus nigro marginatae, apice intus pallidae. *Palporum* pars femoralis et tarsalis rufo-umbrinae, patellaris testacea, tibialis rufo-testacea. *Pedum* I coxae subter umbrinae basi pallidiores, reliquae flavidae, trochanteres et femora omnia obscure umbrina, ceterum pedes sex anteriores pallidius et obscurius testacei sunt, apicem versus paulo obscuriores, patellae III in lateribus infuscatae, in pedibus IV dimidium basale patellarum testaceum, partes insequentes rufesceni-umbrinae. *Abdomen* supra subnigrum, ventrem versus paulo pallidius, venter proprius secundum medium non usque ad epigastrium albidos; supra et in lateribus abdomen fasciis ornatur subalbis tribus, harum antica ad marginem anticū sita, in medio ita interrupta, ut abdomen desuper adspectum hic maculis duabus obliquis, foras et retro directis pictum videatur; fascia media in medio abdomine, postica paulo ante apicem sita, illa desuper visa latitudine ubique aequali, haec latera versus paulo dilatata, illa a fasciā anticā sescuplā latitudine suā, a fasciā posticā fere duplā latitudine remota. *Mamillae* nigrae.

Exemplum nostrum paulo detritum est; *cephalothorax* eius totus cum *sterno* sat dense longe albido pilosus fuisse videtur; *pedes* maximam partem pube pallide coloratā ornati; *abdomen* in partibus pallidis albo, in obscuris plerisque obscure pilosum; pars dorsi antica maculis pallidis interiecta etiam albo pilosa est, ita ut abdomen desiccatum hic fasciā albā non interruptā, sed in medio pone excisā

solum ornetur. Pili simplices (ex parte fortasse in parte basali omnium brevissime plumati).

Mas ignotus.

Java: Kaligangsa, femina una.

Aranea haec fortasse non species nova est sed femina adulta *Aphantaulacis zonatae*, quam T. Thorell secundum exemplum non adultum, in Birmaniâ lectum descriptsit<sup>1)</sup>.

### **Poecilochroa insularis n. sp.**

Tab. XXI, fig. 28.

Femina.

Cephalothorax 2·3 mm longus, 1·5 latus, parte cephalicâ sub oculis posticis lateralibus 0·78 latâ, lateribus supra basim palporum leviter sinuatis, in medio laevis, nitidus, in lateribus dense rugulosus, opacus; impressiones cephalicae indistinctae, sulcus medius vadous et brevis; dorsum a declivitate posticâ anteriora versus leviter descendens, paululo arcuatum. Oculorum area pone 0·5, ante 0·39 lata; series postica desuper visa modice recurvata, marginibus anticis oculorum lateralium cum punctis mediis mediorum lineam subrectam designantibus; series antica sat fortiter deorsum curvata; punctis mediis oculorum mediorum cum marginibus superioribus lateralium in lineam paene rectam dispositis. Diametri oculorum (cornearum) posticorum mediorum 0·073 et 0·08, lateralium 0·08 et 0·097, anterorum mediorum 0·097, lateralium 0·097 et 0·08 longae; oculi postici medii angulato-rotundati, fere transverse positi, inter se 0·08, a lateralibus 0·09, a mediis anticis 0·113, hi inter se 0·04, a lateralibus spatio minimo, laterales antici a posticis 0·113 remoti; area oculorum mediorum ante 0·22, pone 0·24 lata, 0·28 longa. Mandibulae 0·75 longae, 0·37 latae, dorso obsolete transverse plicato, margine apicali sat fortiter obliquo, ante in angulo et prope ab eo dentibus duobus triangularibus, inter se paulo remotis instructo, supra dentem in angulo situm denticulus minutus cernitur in margine mandibulae interiore; margo posticus sulci unguicularis omnino obtusus et indistinctus, exadversus angulum mandibulae dente parvo triangulari instructus. Labium 0·37 longum, 0·27 latum, ovatum basi truncatum; maxillae in latere interiore 0·63 longae, a parte inferiore posticâ visae in latere exteriore a basi usque circiter ad me-

<sup>1)</sup> T. Thorell, Descriptive Catalogue of Spiders of Burma cat. 1895, p. 34.

dium sat fortiter dilatatae, deinde marginem apicalem versus, qui in angulum fractus, in parte interiore oblique truncatus, in exteriore oblique rotundatus est, primum modice angustatae, tum paululo dilatatae, oblique insigniter impressae. *Sternum* 1.3 longum, 0.9 latum, laeve et nitidum. *Pedum* femora supra aculeis setiformibus 1.1.1, praeterea I in latere antico 1, II in latere eodem 1.1, III in utroque 1.1, IV ante 1.1, pone 1, patellae III in latere utroque aut in postico solum aculeo 1, IV pone 1 aut nullo, tibiae I subter ante 1.1 aut 1.1.1, tibiae II in latere respondenti 1 aut 1.1, III supra 1 pone basim, in latere antico supra 1.1 et infra 1.1, in postico 1.1, subter 1.1.2 aut 1.2.2, IV ante et pone 1.1, subter 1.2.2 ornatæ, metatarsi I inermes sunt, II aculeo 1 subter pone basim armati, III et IV sat abunde aculeati; tarsi omnes et metatarsi sex anteriores scopolis instructi. Internodia pedum

I 1.4, 0.78, 0.84, 0.78, 0.52,  
 II 1.3, 0.78, 0.84, 0.78, 0.52,  
 III 1.15, 0.68, 0.78, 0.97, 0.58,  
 IV 1.55, 0.84, 1.03, 1.33, 0.58 mm longa.

*Abdomen* 4.5, cum mamillis 5.0 longum, 2.3 latum, ovatum pone latius. *Mamillæ* infimæ latitudine suâ saltem inter se remotæ, 0.57 longæ, 0.19 latae, supremæ parte basali 0.50 longâ, 0.15 latâ. pars apicali ca. 0.13 longâ (in altero exemplo nostro pars apicalis mammilarum supremarum, exserta, 0.22 longa est, sulco transverso in partes duas divisa, quarum prima, ni fallor, mollior, certo in articulum basalem retrahi potest, secunda probabiliter constanter ex eo prominet). *Epigyne* ca. 0.24 longa, 0.32 lata, in parte anteriore mediocriter modo definita, in posteriore margine fere in semicirculum curvato finita; pars eius anterior in latere utroque in tuberculum elevata est humile diffusum, in medio autem late leviter impressa; tubercula pone foveâ finiuntur transversâ, formâ varianti; angulus exterior fovearum in sulcum abit subtilem, foras directum, mox retro curvatum et in pariete laterali epigynæ, quae in parte posteriore paulo elevata est, evanescentem; paries posticus epigynæ in foveam excavatus est profundam, paulo transversam, 0.08 latam. Epigynæ partes anteriores laterales fulvae sunt, posteriores laterales umbrinae et badiae, partes mediae pallide flavidæ; in margine foveæ posticæ epigyne maculis parvis duabus subsemicircularibus, inter se contingentibus, rufo-fuscis ornatur.

Humeactæ araneæ *cephalothorax* rufo-umbrinus, margines ver-

sus obscurior; *mandibulae* colore cephalothoracis, *sternum* obscure rufescens-umbrinum, *labium* simile, *maxillae* dilutiores, apice intus pallidae. *Palpi* flavo-testacei, parte tibiali colore fulvo, tarsali colore badio suffusâ. *Pedum* I coxae fulvae, reliquae flavidae, II quam III et IV paulo pallidiores; trochanteres coxis similes; femora umbrina; pedes I et II ceterum pallidius et obscurius fulvi, apicem versus et subter obscuriores quam in patellis et tibiis supra; pedum posteriorum patellae flavidae, IV in dimidio apicali laterum plus minusve infuscatae, tibiae patellis paulo obscuriores, lateribus plus minusve evidenter late umbrino vittatis, metatarsi et tarsi fulvi et umbrini, IV quam III obscuriores (pedum pictura mediocreiter expressa et manifesto paulo mutabilis). *Abdomen* (cuius color in exemplis nostris non bene conservatus est) umbrinum videtur, subter umbrino-cine-reum, supra in dimidio posteriore maculâ ornatum albidâ, in laterum partem inferiorem non descendenti, inaequali; margo anticus maculae huius aequabiliter recurvatus est, margo posticus valde inaequalis ita, ut macula e fasciis composita videatur duabus aut tribus inter se confusis, recurvatis, anticâ integrâ et posteriore aut posterioribus in medio late interruptis. *Mamillae* umbrinae aut fuligineae.

Pilis plumatis, quibus inter pilos simplices suberectos scutum dorsuale cephalothoracis et abdomen et pedes ornantur, confertis et adpressis, color corporis probabiliter insigniter mutatur; pili hi in cephalothorace et in maculâ albidâ abdominis et ex parte saltem in pedibus albidi sunt, paulo versicolores et micantes; dorsum abdominis etiam ante fasciâ recurvata, e pilis albidis formatâ ornari videtur; reliquae partes abdominis pilis obscurioribus teguntur. *Mandibulae* et *sternum* pilis simplicibus solum instructa videntur.

*Mas* ignotus.

*Java*: Kaligangsa, Semarang; *feminae* duae.

### *Poecilochroa vittata* n. sp.

Tab. XXI, fig. 29.

*Femina*.

*Cephalothorax* 2·9 mm longus, 2·0 latus, parte cephalicâ sub oculis posticis lateralibus 1·15 latâ, lateribus supra basim palporum leviter sinuatis, sulco medio vadoso, dorso inter declivitatem posticam et oculos levissime convexo. *Oculorum* series postica modice recurvata, punctis mediis mediorum cum marginibus anticis lateralium lineam

subrectam designantibus, series antica modice solum deorsum curvata, marginibus inferioribus oculorum mediorum insigniter demissius quam puncta media lateralium sitiis. Diametri oculorum posticorum mediorum ca. 0·105 et 0·12, lateralium 0·097, anticorum mediorum 0·105, lateralium 0·113 et 0·08 longae; oculi postici medii angulato-rotundati, inter se et a lateralibus 0·097, a mediis anticis 0·145, hi inter se 0·055, a lateralibus ca. 0·015, laterales antici a posticis 0·145 remoti; area oculorum ante 0·45, pone 0·65 lata, area mediorum ante 0·26, pone 0·34 lata, 0·36 longa; clypeus sub eâ 0·113, sub oculis lateralibus 0·08 altus. *Ma. dibulae* 0·9 longae, 0·47 latae, earum margo apicalis ut in specie praecedenti dentatus. *Labium* (0·5 longum, 0·37 latum) et *maxillae* (a basi labii 0·82 longae) similia atque in specie praecedenti, sed harum margo apicalis oblique rotundatus neque in angulum fractus<sup>1)</sup>. *Sternum* 1·7 longum, 1·15 latum, laeve. *Pedum* femora anteriora supra aculeis 1·1 (?), posteriora supra 1·1·1, I ante 2, II et III ante 1, IV utrimque 1 ornari videntur, patellae III solae pone aculeo 1, tibiae I subter ante 1·1 (in apice nullo?), II subter ante 1 aut 1·1 et in apice 1, in lateris antici dimidio apicali 1, III supra pone basim 1, ante 1, pone 1·1, subter 1·1·2, IV in latere utroque 1·1, subter 1·2·2, (metatarsis I caret exemplum nostrum), metatarsi II subter pone basim 2, posteriores aculeis compluribus instructi; scopolis ornantur tarsi omnes et metatarsi quatuor anteriores. Internodia pedum

I	1·8,	1·07,	1·23,	?,	?
II	1·8,	1·07,	1·20,	1·13,	0·68,
III	1·5,	0·87,	1·00,	1·29,	0·74,
IV	2·15,	1·17,	1·62,	1·88,	0·81 mm longa.

*Abdomen* 4·2, cum mamillis 4·9 longum, 2·4 latum, ovatum pone latius, modice depresso. *Epigyne* 0·5 longa, 0·35 lata, ovata, leviter convexa, pone in sinum excisa rotundatum, ca. 0·13 latum, qui sinus scleritâ repletur late et profunde excavato; scleritae partes non excavatae limbum formant parum latum (in exemplo nostro paulo asymmetricum), ante interruptum, cum marginibus sinus contingentem et eis non aut vix humiliorem. *Mamillae* infimae latitudine suâ saltem inter se remotae, 0·73 longae, 0·24 latae, supremae 0·7 longae, 0·21 latae.

Hume factus cephalothorax obscure rufescens-umbrinus, vittâ me-

<sup>1)</sup> Nota manifesto non magni momenti, quoniam margo apicalis interior *maxillae* mollis est.

diâ latâ, mediocriter definitâ et paulo inaequali ornatus. *Mandibulae* rufo-umbrinae. *Sternum* pallide fulvum marginibus fuscis. *Maxillae* colore sterni, extrinsecus fusco marginatae, apice intus pallidae; *labium* obscurius, rufo-umbrinum, obscurius marginatum in lateribus, apice pallidum. *Palporum* pars femoralis fulva, patellaris testacea, tibialis et tarsalis rufo-umbrinae. *Pedum* coxae flavidæ, femora umbrina, pedum anteriorum patellæ testaceæ, partes insequentes latericiae et badiæ, pedum posteriorum patellæ subter et in parte apicali laterum umbrinae, ceterum sordide flavidæ, pedes posteriores ceterum fulvi, tibiis in lateribus (IV etiam in parte apicali supra) metatarsisque apice infuscatis. *Abdomen* supra umbrinum, vittâ ornatum avellaneâ, ante aequæ circiter latâ, atque patellæ III longæ sunt, posteriora versus paululo angustatâ usque ad  $\frac{3}{5}$  abdominis, sed paulo ante eius medium obsolete leviter dilatatâ, in  $\frac{3}{5}$  abdominis fasciâ angustâ, recurvatâ, in latera abdominis descendantì decussatâ, pone eam primum latiore quam in fronte, tum angustatâ, subtriangulari, dentes utrimque 4 emittenti gradatim breviores, denique — supra mamillas — in maculas parvas duas divulsâ; tuberculum anale albidum; in laterum parte inferiore abdomen avellaneum est, venter prioprius — vittâ avellaneâ, ad epigastrium initium capienti, pone medium evanescenti exceptâ — pallide umbrinus; color avellaneus laterum prope a mamillis ramum sursum emittit in arcus duos fractum, tuberculum anale fere attingentem. *Mamillæ* obscure umbrinae, apice pallidae.

Scutum dorsuale abdominis, abdomen, pedes pilis simplicibus et inter eos pilis plumatis (in abdomine subter omnium brevissime plumatis) adpressis tecta. Corporis desiccati pictura alba aut albida in fundo umbrino probabiliter similis atque humefacti (exemplum nostrum non parum detritum est).

*Mas* ignotus.

Java: Buitenzorg, femina una.

### Zodariidae.

#### *Cryptothelæ sundaica* Thor. ssp. *javana* et *amplior* n.

Tab. XXI, fig. 30, 31, 42.

1890. *Cryptothelæ Sundaica* Thorell, Aracnidi di Pinang raccolti nel 1889 dai Signori L. Loria et L. Fea, p. 41 (typus).

*Cryptothelæ*, quae Javam insulam incolunt, probabiliter ut subspecies distinguendæ sunt a verâ *Cr. sundaica*, quam T. Thorell

secundum marem in insulâ Pinang lectum descriptis. *Cr. sundaicam* Pinangensem non novi quidem, facile tamen crediderim eam cum *Cryptothelâ* convenire, cuius feminam ad Singapore a Cel. L. Birô lectam vidi. Haec femina fere 7 mm longa est, cephalothorace 3·5 longo, 1·7 lato; epigyne eius cornea, subtrapezica, pone 1·0, ante ca. 0·5 lata, 0·6 longa, lateribus antico et postico modice, angulis anticis late rotundatis, pone in medio anguste incisa, in quâ incisurâ sulcus profundus initium capit 0·34 longus, ante in foveam subcordiformem, item profundam, 0·18 longam, 0·26 latam, optime definitam dilatatus; fovea septum continet humile, parum latum, quod in parte suâ anteriore adeo dilatatur, ut hic totam latitudinem foveae occupet; epigyne ceterum in universum modice et subaequabiliter convexa, ad sulcum in eius parte anteriore maiore depressa est ita, ut sulci pars anterior et fovea impressione contineantur parum definitâ in lateribus, subtriangulari, latere antico et angulis anticis rotundatis, ca. 0·35 longâ et latâ; cum margine antico impressionis huius, distinctissimo, septum dictum non aequabiliter coniungitur, sed ab eo gradu manifesto distinguitur<sup>1)</sup>. Partes epigynae depressae in angulis, in quos coëunt margines postici foveae et sulcus, leviter tumidae sunt. *Oculi* antici huius exempli subaequales mihi videntur (diametro corneae ca. 0·16 longâ) et laterales inter se aequo circiter atque a mediis remoti (ca. 0·11 mm); area horum oculorum ante 0·42, pone 0·26 lata est, 0·40 longa<sup>2)</sup>; area oculorum mediorum paene rectangula (pone 0·24 lata), parum plus duplo longior quam latior (0·53 longa).

Feminae ad Buitenzorg lectae (tres) insigniter maiores sunt: 9—10·5 mm longae, cephalothorace 4·6—5·2 longo, 3·38—3·8 lato. *Epigyne* (1·2—1·25 lata, 0·75—0·8 longa) similis atque in exemplo Singaporense, sed fundus sulci mediani in parte posticâ solum angustus est, anteriores versus dilatatur et magis aequabiliter in foveam anticam abit; in partem eius anteriorem septum medium ingreditur et (depressum et angustum) longe retro extenditur, quum in exemplo Singaporense apex septi posticus duplo circiter longius distet a margine postico epigynae quam a margine antico foveae; parie-

<sup>1)</sup> Nota fortasse non constans.

<sup>2)</sup> In descriptione maris a T. Thorellio prolatâ „oculi & antici...aream... aequo longam ac latam postice occupant“ certo lapsus est pro „... ac latam antice...“.

tes sulci, ubi hic in foveam abit, non tumidi. Fovea epigynae latior, ita ut margo eius anticus a margine postico epigynae circiter  $\frac{3}{2}$  aut  $\frac{5}{3}$  diametri transversae foveae distet (fovea 0·44, 0·44, 0·39 lata, eius margo anticus a margine postico epigynae 0·71, 0·68, 0·63 remotus), quum in exemplo Singaporeensi intervallum dictum parum minus sit quam dupla diameter transversa foveae (haec 0·26, illud 0·50 longum). Pars epigynae depressa (parte angustâ sulci medii exceptâ) longior quam latior (0·44, 0·44, 0·39 lata, ca. 0·55, 0·54, 0·52 longa). Pars septi antica a margine antico foveae ut in praecedenti gradu manifesto distincta (an constanter?). — Etiam in exemplis ad Buitenzorg lectis oculi antici subaequales mihi videntur (aut laterales mediis paululo maiores; diametri cornearum in exemplis nostris ca. 0·23, 0·195, 0·18 longae), eorum situs paulo mutabilis: laterales inter se aequae ac (0·195 mm, 0·24 mm) aut evidenter longius quam a mediis remoti (inter se 0·26, a mediis 0·195 mm). Etiam area oculorum mediorum paululo mutabilis, modo paene rectangula, modo pone paulo latior quam ante (ante 0·39, 0·40, 0·47, pone 0·40, 0·47, 0·52 lata), duplo longior quam pone latior aut evidenter brevior (0·78, 0·81, 0·84 longa).

Feminae duae ad Kagok lectae minores sunt quam exempla commodum dicta, maiores quam femina Singaporensis: ca. 7·7 longae, cephalothorace 3·9 longo. Epigyne earum 1·15—1·2 lata, 0·6—0·68 longa, sulco medio simili atque in exemplis ad Buitenzorg lectis, foveâ anticâ paulo latiore (0·37 lata est ea, margo eius anticus a margine postico epigynae ca. 0·49 mm sive  $\frac{4}{3}$  latitudinis foveae remotus); septi pars antica cum margine antico foveae aequabiliter coniuncta (an constanter?). Pars epigynae impressa circiter aequa modo longa ac lata. — Oculi etiam paulo mutabiles, antici subaequales (diametro cornea ca. 0·18 longâ) aream occupant ante 0·55, 0·65, pone 0·39, 0·40 latam, 0·48, 0·53 longam, eorum laterales inter se plus minusve longius quam a mediis distant (inter se 0·21 et 0·24, a mediis 0·18 et 0·16 remoti); area oculorum mediorum paululo latior pone quam ante (pone 0·44, 0·42, ante 0·40, 0·39 lata), non duplo longior quam latior pone (0·70, 0·68 longa).

An differentiae hae sibi constant, ulterius inquirendum est, quoniam feminas perpaucas modo vidi et mares non novi; in praesenti sufficiunt eae, ni fallor, ut *Cryptothelae* Javanae pro subspeciebus aut varietatibus propriis saltem habeantur; alteram earum (ad Ka-

gok lectam) *ssp. javanam*, alteram (ad Buitenzorg captam) *ssp. ampliorem* appello.

***Storena melanognatha* Hass.**

Tab. XXI, fig. 33.

1882. *Storena*(?) *melanognatha* Van Hasselt, Midden-Sumatra cet., Aranearae, p. 34, t. 2, f. 6, t. 5, f. 1, 2. — 1889. *Storena melanognatha* Thorell, Studi sui ragni Malesi e Papuani, v. 4, p. 330.

*Cephalothorax* huius speciei densissime, valde subtiliter reticulatus est, subopacus. *Diametri oculorum* (in exemplo cephalothorace 4·2 mm longo, 2·7 lato) anticum mediorum 0·21, reliquorum ca. 0·16 longae; oculi antici medii inter se 0·08, a lateralibus anticis 0·21, a lateralibus posticis 0·31, a mediis posticis 0·23, hi inter se 0·13, a lateralibus posticis 0·42, laterales antici a posticis 0·065 remoti; area oculorum mediorum ante 0·47, pone 0·42 lata, 0·58 longa; clypeus sub eâ 1·08, sub oculis lateralibus 0·90 altus. *Pedum* femora sex anteriora supra aculeis 1.1.1 (aculeus femoris I apici proximus minutus), IV supra 1.1.1.1, praeterea I ante prope apicem 1, II ante 1.1, pone in dimidio basali 1, III ante et pone 1.1, IV ante et pone 1, tibiae I subter aculeis 4 aut 5, ante 1 aut 2 aut 0, II subter 2.2.2, ante 1.1.1, III supra 1.1, ante 1.1.1, pone 1.1, subter 2.2.2, IV supra 1.1, ante 2.1.1.1, pone 1.1.1, subter 2.2.2, metatarsi I et II praeter apicales tres subter 2.2, II etiam ante 1, III et IV abunde aculeati (sed non supra in dorso proprio); etiam tarsi subter aculeati, aculeis in pedibus I vix, in IV insigniter a pilis distinctis. Metatarsi III et IV in parte apicali subter et in lateribus dense pilosi. Tibia IV 2·4, cum patellâ 3·5 longa. *Epigyne* ante et in lateribus male definita, margine postico leviter rotundato, pone in simum excisa transverse ellipticum, pone late apertum (ostio 0·29 lato); sinus totus scleritâ repletur ferrugineo, pallidiore quam partes adiacentes epigynae, 0·37 lato, 0·24 longo, glabro, laevi, nitido, non aut vix supra planum epigynae elevato, subplano, in marginibus modo convexo, paulo pulvilliformi itaque.

Venter in exemplis nostris in latere utroque vittâ pallidâ, obsoletâ, ante et pone abbreviatâ pictus, in altero pone epigastrum late pallidus et in mediâ longitudine fasciâ transversâ pallidâ, in medio interruptâ, in altero maculis paucis pallidis disiectis ornatus.

Sumatra: Palembang, feminæ duæ.

**Storena hilaris Thor.**

Tab. XXI, fig. 34.

1889. *Storena hilaris* Thorell, Studi sui ragni Malesie e Papuani, v. 4, p. 338.

Exempli nostri adulti unici, feminini, *cephalothorax* 3·15 mm longus, in parte latissimâ 2·18, inter sinus cephalicos 1·65 latus, densusime subtiliter reticulatus, parum nitens. Dorsum proprium a latere visum (in cephalothorace marginibus lateralibus scuti dorsualis libratis) anteriora versus leviter adscendit, deinde oculos versus paulo fortius descendit. Clypeus in longitudinem modice convexus. Area oculorum 1·05 lata, 0·52 longa. Oculi antici medii cum lateralibus posticis directo a fronte visi seriem formant paululo dorsum curvatam. Diametri oculorum (cornearum) anticum mediorum 0·195, reliquorum ca. 0·15 longae; oculi antici medii inter se 0·065, a lateralibus anticis 0·13, a lateralibus posticis 0·23, a mediis posticis 0·13, hi inter se 0·113; a lateralibus posticis 0·27, laterales antici a posticis 0·05 remoti; area oculorum mediorum rectangula, 0·39 lata, 0·49 longa, clypeus sub eâ 0·86, sub oculis lateralibus 0·73 altus. *Mandibulae* 0·95 longae, basi 0·71 latae, hic obsolete reticulatae, inferius indistincte transverse plicatae, in parte apicali laeves. *Sternum* dense subtiliter reticulatum. *Palporum* pars patellaris supra in linea mediâ 0·5 longa, 0·31 lata, tibialis 0·5 longa, 0·29 ad apicem lata, tarsalis 0·83 longa, basi 0·24 lata. *Pedum* II femur pone inerme, in latere antico aculeis 1.1 aut 1, patellae III et IV ante aculeo 1, pone nullo, tibia I ante 1 aut 1.1, subter 8, tibia II ante 1.1, subter 7 aut 8, III ante 1.1, subter 7, IV ante et pone 1.1, subter 5 aut 6, metatarsi I et II subter 4 aut 5 et in apice 2, pedes ceterum ut in specie praecedenti aculeati; etiam metatarsi II subter in apice solito densius pilosi. Internodia pedum  
 I 2·4, 0·84, 1·78, 1·88, 1·52,  
 II 1·9, 0·84, 1·42, 1·65, 1·29,  
 III 1·8, 0·84, 1·36, 1·91, 1·13,  
 IV 2·3, 0·91, 2·04, 2·85, 1·59 mm longa.

*Abdomen* (mamillis exclusis) 3·3 longum, 2·3 latum, ovatum pone latius. *Epigyne* similis atque in praecedenti, sed scleritae, quo sinus posticus (pone late apertus: ostio 0·31 lato in epigynâ a parte posticâ visâ) repletur, forma alia; hic 0·45 latus est, item quodammodo pulvilliformis, inaequabiliter procurvus, lateribus fortiter, margine postico paululo rotundato, margine antico, qui in lateribus optime,

in medio autem mediocriter definitus est, in angulum latum, apice obtusum, non usque ad mediam longitudinem scleritae exciso, in medio ca. 0·11, in lateribus 0·16 longus.

*Cephalothorax* cum mandibulis obscure rufescens-umbrinus, *sternum* et *labium* rufo-testacea, *maxillae* et *palpi* et *pedes* testacea, *palpi* et *pedes* apicem versus obscuriores, pedum femora apice castaneo annulata, patellae posteriores in parte apicali laterum castaneo diffuse maculatae, tibiae praesertim posteriores annulo castaneo, mediocriter expresso, supra interrupto in apice ornatae. *Abdominis* atroviolacei et avellanei pictura similis atque a T. Thorellio l. c. describitur.

Ceterum inspiciatur descriptio a Thorellio l. c. prolata.

Java: Mons Salak, femina et ex. non adultum. Exempla iuniora probabiliter huius speciei lecta sunt praeterea ad Tjibodas et ad Telaga bodas.

**Storena vicaria** n. sp.

Tab. XXI, fig. 36.

Femina *Storenae hilari* Thor. adeo similis, ut satis videatur indicare, quibus rebus ab eâ differat.

*Cephalothorax* 4·0 mm longus, 2·6 latus, angustior itaque quam in *S. hilari*, quod ni — fallor — e maiore longitudine partis cephalicae pendet; haec desuper visa a basi posticâ palporum fere 1·5 longa est et  $\frac{1}{3}$  longitudinis cephalothoracis paulo superat, in *S. hilari* (0·97 longa) autem non aequat. Dorsum partis cephalicae in longitudinem fortius convexum, paulo inaequabiliter quidem, ita, ut in medio in angulum fractum sit (valde latum et rotundatum) melius expressum quam angulus valde indistinctus, in quem coëunt dorsum partis cephalicae et declivitas postica (in *S. hilari* dorsum cephalothoracis sat evidenter angulatum est inter declivitatem posticam et partem cephalicam, in hac autem aequabiliter arcuatum). *Oculi* similes in utraque specie; diametri anticorum mediorum 0·22, reliquorum 0·16—0·18 longae; oculi antici medii inter se 0·08, a lateralibus anticis 0·16, a lateralibus posticis 0·27, a mediis posticis 0·21, hi inter se 0·16, a lateralibus posticis 0·36, laterales antici a posticis 0·065 remoti; area oculorum mediorum rectangula, 0·48 lata, 0·60 longa, clypeus sub eâ 1·08. sub oculis lateralibus 0·91 altus. *Mandibulae* 1·25 longae, basi 0·95 latae. *Pedum* armatura differentias quasdam praebet quidem, sed certo in hac specie et in

praecedentibus paulo mutabilis est (ex. gr. femur III in exemplo nostro alterum ante aculeis 2, alterum 4 ornatur); patellae omnes in latere antico aculeo 1, in postico nullo, tibiae I ante 1.1, II ante 1.1 aut 1.1.1, subter 6 aut 8, III ante et pone 1.1 aut 1.1.1, IV ante et pone 1.1.1 aut 1.1.1.1, metatarsi I subter, praeter apicales, aculeis 4 aut 6, ante 1 aut 0, II, praeter apicales, ante 1, subter 5 aut 6 instructi. Internodia pedum

I 2·4, 1·04, 2·10, 2·27, 1·72,  
 II 2·15, 1·04, 1·72, 2·07, 1·50,  
 III 2·1, 1·04, 1·62, 2·27, 1·30,  
 IV 2·6, 1·10, 2·27, 3·24, 1·78 mm longa.

*Abdomen* 4·0 longum, 2·7 latum. *Epigyne* similis atque in praecedenti, sed sclerites posticus (0·44 latus) ante late et profundius excisus, in medio 0·08, in lateribus 0·145 longus, non aequabiliter deplanatus, sed utrimque impressione vadosâ diffusâ ornatus ita, ut partes suae laterales tubercula forment manifesta.

Pictura similis atque *Storenae hilaris*; maculae dorsuales abdominis insigniter minores: anticae inter se et secundae inter se longius (in *S. hilari minus*) quam latitudine suâ, secundae ab anticis multo magis quam longitudine suâ remotae; maculae insequentes anguli sunt tenues, refracti, in medio interrupti; venter atroviolaceus, in latere utroque vittâ avellaneâ longâ, pone magis quam ante abbreviatâ, et pone epigynam vittis duabus avellaneis brevibus ornatus.

Mas ignotus.

Java: Protjot, femina una.

Aranea haec fortasse non species propria, sed subspecies *Storenae hilaris* est.

### *Storena fasciata* n. sp.

Tab. XXI, fig. 35.

Femina praecedentibus similis.

*Cephalothorax* 3·7 mm longus, in parte latissimâ 2·6, inter sinus cephalicos, qui vadosi sed distincti sunt. 2·1 latus, parte cephalicâ — ut supra dicitur, dimensâ — 1·28 longâ, densissime subtiliter reticulatus, parum nitens, a latere visus angulo inter declivitatem posticam et dorsum proprium parum expresso, dorso proprio modice convexo, ante paulo fortius declivi, quam pone acclive est. *Oculorum* anticum mediorum a fronte simulque paulo desuper adspectorum

margines postici cum anticis posticorum lateralium lineam subrectam designant, in cephalothorace directo a fronte viso oculi hi seriem formant subrectam, margines inferiores oculorum anticum mediorum cum superioribus anticum lateralium in lineam subrectam dispositi. Series postica oculorum 1·31, antica 1·12 lata. Diametri oculorum anticum mediorum 0·27, anticum lateralium et posticorum mediorum 0·21, posticorum lateralium 0·20 longae; oculi antici medii inter se 0·09, a lateralibus anticis 0·095, a lateralibus posticis 0·24, a mediis posticis 0·19, hi inter se 0·145, a lateralibus posticis 0·32, laterales antici a posticis 0·065 remoti; area oculorum mediorum ante 0·61, pone 0·49 lata, 0·66 longa, clypeus sub eâ 0·95, sub oculis lateralibus 0·78 altus, in longitudinem leviter modo convexus, in universum fere ad perpendiculum directus. *Mandibulae* 1·4 longae, 0·87 latae, densissime subtiliter, apicem versus obsolete reticulatae. *Sternum* densissime subtiliter reticulatum. *Pedum* femora sex anteriora supra aculeis 1.1.1.1, IV 1.1.1.1.1, praeterea I et II ante 1.1.1, I pone 1.1, II pone 1.1.1, III ante 1.1.1, pone 1.1, IV ante 1.1.1, pone 1 aut 1.1, patellae I nullo, reliquae ante 1 (aut passim 1.1), tibiae I ante 1 aut 1.1, subter 7 aut 8, II ante 1.1.1, subter 8, III supra 1.1, ante 1.1, aut 1.1.1 pone 1.1.1 (aculeus 1-us tenuis), subter 7, IV supra 1.1, ante 1.1.1 aut 1.1.1.1, pone 1.1.1, subter 7, metatarsi anteriores — praeter aculeos apicales 2 — subter 5 aut 6 et ante 1, posteriores abundius aculeati, tarsi subter aculeis parvis instructi. Metatarsi sex posteriores apice subter solito densius pilosi. Internodia pedum

I	2·85, 1·10, 2·43, 2·72, 1·91,
II	2·6, 1·10, 2·07, 2·43, 1·65,
III	2·45, 1·10, 1·94, 2·53, 1·42,
IV	2·9, 1·10, 2·65, 3·47, 1·78 mm longa.

*Abdomen* 3·6 longum, 2·5 latum, desuper visum paene ellipticum. *Epigyne* similis atque in praecedentibus, sed formâ scleritae postici evidenter distineta; hic 0·44 latus, in lateribus rotundatus, margine antico in angulum latum, apice retro directum fracto; apex anguli indistinctus, quoniam sclerites hic depresso est et sensim in partem epigynae praeiacentem abit; pone sclerites in lateribus solum rotundatus est, leviter quidem, in medio autem in lobum brevem latum paulo productus; sclerites in lateribus 0·16, in medio — una cum lobo — ca. 0·113 longus est.

*Cephalothorax* obscure castaneus; *mandibulae* ei similes, apicem

versus paulo pallidiores; *sternum* rufo-testaceum marginibus infuscatis; *labium* eo paulo obscurius, *maxillae* fulvae, in parte apicali magnâ flavidæ. *Palpi* testacei parte tarsali fusco-ferrugineâ. *Pedum* coxae sterno paulo pallidiores, dilute fulvae, femora similia; apicem versus pedes obscuriores sunt, annulis carent. *Abdomen* atroviolaceum, picturâ obscure avellaneâ parum perspicuâ (in exemplo non adulto optime expressâ) ornatum: desuper visum paululo pone medium fasciâ pictum angustâ, paulo recurvata, in medio late interruptâ; inter eam et mamillas maculae sitae sunt octo parvae, tres anteriores transverse triangulares, inter se distinctæ, prima et secunda in angulum refractæ, quarta et insequentes usque ad septimam transversæ, apices versus angustatae, late confusæ inter se et cum maculâ postremâ tuberculum anale occupanti. Latus utrumque abdominis vittis ornatum quatuor; earum antica supra scuta pulmonalia initium capit, oblique retro in ventrem descendit, in eius latere retro usque fere ad mamillas extendit; reliquæ vittæ ad mamillas in eorum lateribus initium capiunt, anteriora versus et sursum directæ sunt, sursum curvatae; earum primæ et secundæ in dorsum abdominis adscendunt, ubi secundæ fasciam supra dictam formant, primarum apices autem ut maculae in lateribus abdominis desuper adspecti cernuntur. Venter proprius vittis duabus pallidis, parum expressis, pone abbreviatis, ante (ad epigastrum) fasciâ transversâ coniunctis pictus. Annulus mamillas infra et in lateribus cingens et mamillæ pallide ferrugineæ.

Mas ignotus.

Java: Gutji, femina et pullus.

### **Storena (Ascea) dispar n. sp.**

Tab. XXI, fig. 37—41.

#### **Femina.**

*Cephalothorax* 1·6 mm longus, 1·1 latus, supra palpos omnium levissime sinuatus et ca. 0·94 latus, parte cephalicâ a basi palporum posticâ 0·49 longâ, anteriora versus leviter angustatâ, eius lateribus cum clypeo, qui modice rotundatus et 0·78 latus est, in angulos bene expressos coëuntibus; densissime subtiliter reticulatus est cephalothorax, parte cephalicâ modice nitenti, thoracicâ subopacâ. Declivitas postica a dorso proprio distincta; a margine postico cephalothorax adscendit usque circiter ad medium partis cephalicae arcu primo parum, tum fortius curvato; dorsum partis cephalicae sat for-

titer convexum, ante modice declive. Clypeus leviter in longitudinem convexus, in universum paululo projectus (paene directus). *Oculorum* series postica desuper visa insigniter procurva, marginibus anticis mediorum cum posticis lateralium lineam subrectam designantibus; in cephalothorace directo a fronte adspecto margines inferiores oculorum anticum mediorum cum superioribus lateralium in lineam rectam, oculi medii antici cum lateralibus posticis in seriem paululo sursum curvatam dispositi; series antica 0·43, postica 0·565 lata area oculorum 0·37 longa. Diametri oculorum anticum mediorum 0·105, lateralium 0·10, posticorum mediorum 0·09, lateralium 0·105 longae; oculi antici medii inter se 0·04, a lateralibus anticis 0·05, a lateralibus posticis 0·113, a mediis posticis 0·13, hi inter se 0·09, a lateralibus posticis 0·13, laterales antici a posticis 0·03 remoti; area oculorum mediorum ante 0·225, pone 0·26 lata, 0·32 longa, clypeus sub eâ 0·37, sub oculis lateralibus 0·29 altus. *Mandibulae* 0·55 longae, 0·37 latae, paulo reclinatae, dorso leviter in longitudinem convexo, supra subtilissime reticulato, ceterum laevi. *Sternum* laeve. *Pedum* femora aculeo 1 armata, reliqua internodia inermia. Internodia pedum

I	0·97, 0·40, 0·81, 0·87, 0·61,
II	0·87, 0·40, 0·71, 0·84, 0·53,
III	0·91, 0·44, 0·68, 0·91, 0·45,
IV	1·07, 0·44, 0·94, 1·13, 0·55 mm longa.

*Abdomen* tubculo anali et mamillis exclusis 2·4, cum eis 2·6 longum, 1·6 latum, ovatum pone latius. *Epigyne* in lateribus mediocriter definita, ca. 0·3 longa et lata, pone omnium levissime sinuata, a margine postico, ubi ca. 0·24 lata est, anteriora versus sensim leviter dilatata in parte 0·19 longâ, quae leviter et paene aequabiliter convexa est, tum in latere utroque depressa, in medio autem aequa alta ac pone; pars haec antica epigynae, non depressa, ca. 0·15 lata est, 0·08 longa, lateribus parallelis et rectis, margine antico sinuato et depresso, supra partes epigastrii praesiacentes evidenter elevata.

*Cephalothorax* rufescenti-umbrinus, margine nigricanti, parte cephalicâ paulo pallidiore, *mandibulae* colore faciei; *sternum* rufo-umbrinum marginibus obscurioribus, *labium* ei simile, *maxillae* pallidiores, apice flavidæ. *Palpi* testacei apicem versus obscuriores, parte tarsali badiâ. *Pedum* coxae et trochanteres flavidæ, ceterum pedes pallidius et obscurius fulvi apicem versus obscuriores; femora IV basi flavidæ. *Abdomen* sordide violaceum, supra maculis albissimis

quinque pictum: paulo pone marginem anticum fasciis duabus brevibus foras et paulo anteriora versus directis, fere in mediâ longitudine fasciis duabus paulo longioribus, fere transversis, foras et paulo retro directis; hae maculae quatuor apicibus exterioribus trapezium designant non multo angustius quam abdomen, ante aequae ciroiter latum ac longum, pone paulo latius; in linea mediâ abdomen fasciâ transversâ pictum est circiter  $\frac{1}{4}$  latitudinis suaee occupanti, spatiis subaequalibus a mamillis et a margine postico trapezii dicti remotâ. Tuberculum anale albidum. In latere utroque abdominis vitta cernitur albida brevis obliqua, retro et deorsum directa, triplo circiter longius a petiolo quam a mamillis remota. Epigastrium pallidum, epigyne obscure colorata. Venter vittâ occupatur subavellaneâ, pone paulo obscuriore et parum ante mamillas sensim evanescenti, ante latâ, paulo pone epigastrium utrimque in dentem magnum triangularem album, in latus abdominis adscendentem dilatatâ, tum mamillas versus modice et paulo inaequabiliter angustatâ. *Mamillae* inferiores pallide testaceae, superiores pallide flavidæ.

*Mas* differt a feminâ non parum formâ *cephalothoracis*. Hic ut in feminâ sculptus est, 1.55 mm longus, 1.18 latus, exakte ovatus, pone latior, supra basim palporum non sinuatus, inter palpos ca. 0.94 latus, parte cephalicâ anteriora versus fortiter angustatâ, a basi posticâ palporum 0.52 longâ, eius lateribus cum clypeo in arcum aequabilem coniunctis, quum desuper adspicitur cephalothorax; directo desuper adspecti oculi laterales postici marginem cephalothoracis attingere videntur. Dorsum cephalothoracis a latere visum inter marginem posticum et oculos anticos medios nusquam in angulum fractum. Directo a fronte adspecti *oculi* antici medii cum lateralibus posticis in seriem paene rectam dispositi. Area oculorum pone 0.52, ante 0.40 lata, 0.36 longa. Diametri oculorum parum inaequales, anticorum mediorum et posticorum lateralium ca. 0.105, reliquorum ca. 0.097 longae; oculi antici medii inter se 0.03, a lateralibus anticis 0.025, a lateralibus posticis 0.08, a mediis posticis 0.113, hi inter se 0.065, a lateralibus posticis 0.113, laterales antici a posticis 0.025, a margine clypei 0.37 remoti; area oculorum mediorum ante 0.225, pone 0.26 lata, 0.31 longa, clypeus sub eâ 0.44 altus, in longitudinem paene rectus et directus. *Mandibulae* (retractae) 0.4 longae, basi 0.32 latae, dorso in longitudinem paene recto. *Sternum* dense, sat obsolete reticulatum. *Palporum* pars fe-

moralis 0·55 longa, patellaris 0·24 longa, 0·195 lata, dorso sat fortiter in longitudinem convexo, lateribus subparallelis; pars tibialis ca. 0·13 lata, a basi ipsâ subito dilatata sursum et deorsum usque ad 0·39 mm, in latera autem minus: usque ad 0·24 mm, desuper visa ca. 0·13 longa; eius margo apicalis valde inaequalis: in latere exteriore infra in sinum profundum oblongum excisus, ad eum supra in processum productus ca. 0·11 longum; processus hic latius superius et marginem apicalem, paulo obliquum, subrecta habet, latus inferius autem excavatum, angulum apicalem inferiorem quam rectus multo minorem, in medio 0·08 latus est; ad processum hunc supra pars tibialis iterum sinuata est, late et valde profunde quidem, usque ad dorsum, quod desuper simulque paulo a latere postico paulo oblongum videtur, latere interiore recto, exteriore leviter rotundato, apice angustius rotundato et dentibus minutis aut granis potius 4 aut 5 ornato, paulo crenato itaque; margo apicalis interior partis tibialis parum inaequalis. Pars tarsalis fortiter compressa; lamina tarsalis formâ insignis, a latere interiore visa fere in semicirculum deorsum curvata, latitudine ubique subaequali, apice truncata et paulo sinuata; carinis duabus a basi usque ad apicem pertinentibus divisa est ea in partes tres, medium sive dorsalem et laterales duas; dorsualis pilosa, maximam partem subaequali latitudine, angusta (ca. 0·12 modo lata), in parte basali extrinsecus insigniter dilatata (usque ad 0·29 mm); pars lateralis interior item pilosa, ex parte saltem, etiam subaequali latitudine (ca. 0·14), sub carinâ, quâ a parte dorsuali distinguitur, in sulcum excavata, quo embolus longissimus setiformis recipitur, in universum fere ad perpendiculum directa; pars lateralis exterior etiam valde praerupta et sub carinâ impendenti, quâ limitatur, excavata in sulcum latum obtusum, qui tamen non ut in parte interiore sub angulo laminae apicali superiore (anteriore) finitur, sed sub eo secundum marginem laminae apicalem, hic anguste foras reflexum, versus angulum laminae apicalem inferiorem (posteriorem) curvatur et in eo finitur; pars haec glabra est, in dimidio basali infra carinâ optime expressâ, fortiter deorsum curvatâ ornatur, sub quâ paululo concava est; latitudo partis huius inaequalis, quoniam margo inferior a basi primum rectus est et libratus, tum in parte apicali circiter dimidiâ in sinum subsemicircularem excisus; pars laminae exterior itaque a basi primum dilatatur (usque ad 0·45 mm), tum apicem versus angustior fit. Pars dorsalis laminae tarsalis basi im-

pressa est pro receptione dorsi partis tibialis et ante hanc foveam diffusam item leviter concava. Stemma, non distortum, e partibus quatuor compositum videtur: posticâ, interiore, anticâ, exteriore; pars postica oblonga, retro et paulo intus directa, modice complanata, in latere exteriore paulo excisa, pone in embolum abit valde longum, setiformem, qui, ut supra dictum est, maximam partem sulco lateris interioris laminae tarsalis recipitur (apice tamen ex eo paulo prominet, fortasse loco suo motus in exemplo nostro); pars interior a latere visa multo altior quam longior (0·44 alta, 0·18 longa). sursum et paulo retro directa, latitudine subaequali, apice (supra) late rotundata, subplana, sulco deorsum curvato in partes duas, superiorem et inferiorem, divisa; pars haec paulo in latus exterius stemmatis extenditur, in quo in lamellam compressa est; pars antica apicem et partem stemmatis anticam exteriorem occupat, intus latior est, ante alulâ brevi latâ pellucida ornatur, in margine postico in dentem corneum triangularem obtusum obliquum producta, in latere exteriore stemmatis in concham compressa fere transverse positam, ante concavam; prope ab hac conchâ, pone, lamella alia cernitur multo minor, item subtransversa, in quam de-  
sinit pars stemmatis exterior. Internodia *pedum*

II 0·97, 0·40, 0·81, 0·94, 0·51,

III 0·94, 0·42, 0·71, 0·94, 0·42 mm longa;

(pedes I et IV desunt exemplo nostro). *Abdomen* 1·4, cum mamillis 1·5 longum, 1·0 latum, ovatum pone latius; dorsi pars anterior media scuto tecta corneo, ca. 0·7 longo, ca. 0·3 lato, posteriora versus modice angustato, apice late rotundato.

*Color* similis atque feminae, sed fasciae dorsuales *abdominis* anticae et mediae aequis fere angulis anteriora versus et foras directae; abdomen subter non evidenter pallidius quam supra, epigastrium castaneum scutis pulmonalibus et parte posticâ mediâ fulvis; venter paulo pone epigastrium utrimque maculâ ornatus magnâ rotundatâ, pallide flavidâ, e latere exteriore dentem angustum album, sursum et anteriora versus in lateris partem inferiorem emitenti.

Java: Kagok, mas et femina.

An *Storena* haec species distincta sit a *S. eleganti* (Thor.<sup>1</sup>), *S. te-*

<sup>1</sup>) *Asceua elegans* Thorelli 1887, Primo saggio sui ragni Birmanni, p. 76.

*nera* (Thor.<sup>1</sup>), *S. quinquestrigata* (E. Sim.<sup>2</sup>), ulterius inquirendum videtur. Cephalothorax *Storenae elegantis* (feminae) „vix nisi in clypeo evidenter etsi subtilissime rugoso-coriaceus“ describitur, abdomen pone fascias medias maculis duabus parvis et spatio parvo remotis, albis pictum. *S. tenerae* (maris) pars tibialis palporum desuper visa lobum apice truncatum formare videtur, e latere exteriore stilum porrectum brevem rectum... emittit, lamina tarsalis supra carinâ (unâ; an revera ita?) ornatur secundum descriptionem. *S. quinquestrigatae* oculi antici medii reliquis paulo minores, cum lateralibus posticis in seriem validissime recurvatam dispositi (quod de *S. dispari* dici non potest, quum in cephalothorace desuper simulque a fronte adspecto margines postici oculorum anticorum mediorum evidenter pone anticos lateralia posticorum siti sint), abdomen subter omnino atro-testaceum, pedum femora ad apicem leviter infuscata, epigyne praeter carinam anticam utrimque carinalâ longitudinali parvâ ornata dicitur.

---

Annotatio. *Filistata sundaica*, quam in parte primâ libelli huius descripta, in Javâ insulâ ad Kagok lecta est.

---

### Explicatio tabulae XXI.

1. *Scytodes longipes* H. Lue., cephalothorax feminæ Javanae.
2. Eadem species; cephalothorax feminæ in Americâ Centrali lectæ.
3. *Scytodes domestica* Dol., cephalothorax maris.
4. Eadem species; cephalothorax feminæ pallide coloratae.
- 5 a et b. *Scytodes venusta* (Thor.), cephalothoraces feminarum.
6. *Scytodes lugubris* (Thor.), cephalothorax exempli non adulti.
7. Eadem species; pars postica exterior scuti ventralis feminæ ( $\times 150$ ).
8. *Scytodes longipes* H. Lue., scuta ventralia feminæ.
9. *Scytodes lugubris* (Thor.), scuta ventralia feminæ.
10. *Scytodes domestica* Dol., scuta ventralia feminæ.
11. *Scytodes venusta* (Thor.), pars tarsalis palpi maris.
12. *Scytodes domestica* Dol., pars tarsalis palpi maris.
13. *Scytodes longipes* H. Lue., pars tarsalis palpi maris.

<sup>1</sup>) *Asceua tenera* Thorell 1895, Descriptive Catalogue of the Spiders of Burma cat., p. 29.

<sup>2</sup>) E. Simon 1905, Arachnides de Java, recueillis par le Prof. K. Kraepelin en 1904.

14. *Drassodes russulus* (Thor.), epigyne.
  15. Eadem species, pars tarsalis palpi sinistri maris ab imo visa.
  16. Eiusdem palpi partes tibialis et tarsalis a latere exteriore visae.
  17. *Echemus* (?) *pictus* n. sp., pars tarsalis cum apice partis tibialis palpi sinistri maris ab imo visa.
  18. *Aphantaulax fasciata* n. sp., apex mandibulae dextrae feminae a latere postico visus.
  19. *Echemus* (?) *pictus* n. sp., palpi sinistri maris partes patellaris, tibialis, tarsalis a latere exteriore visae.
  20. Eadem species; stemmatis (paulo distorti) et laminae tarsalis sinistrae pars apicalis a latere interiore visa; *l*: lamina tarsalis, *c*: conductor emboli?
  21. *Scotophaeus* (?) *javanus* n. sp., epigyne humefacta.
  22. *Prosthesima iusta* n. sp., pars apicalis palpi sinistri maris a latere inferiore simulque paulo a fronte visa.
  23. *Echemus* (?) *pictus* n. sp., epigyne humefacta.
  24. *Scotophaeus* (?) *javanus* n. sp., epigyne sicca.
  25. *Prosthesima iusta* n. sp., palpi sinistri maris pars tarsalis ab imo visa.
  26. Eadem species; epigyne.
  27. *Aphantaulax fasciata* n. sp., epigyne.
  28. *Poecilochroa insularis* n. sp., epigyne.
  29. *Poecilochroa vittata* n. sp., epigyne.
  30. *Cryptothelae sundaica* Thor. ssp. *amplior* n., epigyne ( $\times 16$ ).
  31. *Cryptothelae sundaica* Thor. typica?, epigyne ( $\times 16$ ).
  32. *Cryptothelae sundaica* Thor. ssp. *javana* n., epigyne ( $\times 16$ ).
  33. *Storena melanognatha* Hass., pars postica media epigynae.
  34. *Storena hilaris* Thor., pars postica media epigynae.
  35. *Storena fasciata* n. sp., pars postica media epigynae.
  36. *Storena vicaria* n. sp., pars postica media epigynae.
  37. *Storena dispar* n. sp., epigyne.
  38. Eadem species; partes tibialis et tarsalis palpi dextri maris desuper visae.
  39. Eiusdem palpi partes patellaris, tibialis, tarsalis a latere exteriore visae.
  40. Eiusdem palpi partes tibialis et tarsalis ab imo visae.
  41. Eadem partes a latere interiore visae.
- Pili in figuris plerisque (exceptâ 7-â) omissi sunt.
-



