

- Beispielhafter Auszug aus der digitalisierten Fassung im Format PDF -

Flora Ienensis

Heinrich Bernhard Ruppe
Albert Haller

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](#) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

ALBERTI HALLER

PHIL. ET MED. D. MED. ANAT. CHIR. BOT. P. P. O.
CONS. AVLICI ET ARCHIAT. REG. ET ELECT.
SOC. REGG. ANGL. ET SVEC. SOD.

FLORA IENENSIS

HENRICI BERNHARDI
RUPPII

EX POSTHVMIS AVCTORIS SCHEDIS

ET PROPRIIS

OBSERVATIONIBVS

AVCTA ET EMENDATA

ACCESSIONVNT PLANTARVM RARIORVM

NOVAE ICONES.



IENAE

Sumptibus CHRIST. HENR. CUNONIS

1745.

SERENISSIMO PRINCIPI
ET DOMINO
ERNESTO
AVGVSTO
DVCISAXONIAE
IVLIACI, CLIVIAE, MONTIVM,
ANGRIVARIORVM ET WEST-
PHALORVM
ET RELIQA
SVMMO TOTIVS CAESAREI
EQVITATVS PRAEFECTO ET
LEGIONIS PEDESTRIS AC
EQVESTRIS TRIBVNO,
ORDINIS VIGILANTIAE
CONDITORI MVNIFICENTISSIMO
RECTORI
ACADEMIAE IENENSIS
MAGNIFICENTISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO
CLEMENTISSIMO

S E R E N I S S I M E
P R I N C E P S
D V X
C L E M E N T I S S I M E



umile donum offre
ro SERENISSIME
PRINCEPS , &
animos ex eo sum-
si quod in ditio-
nibus TVIS na-
tum sit, & TVA E academiæ usi-
bus in primis inserviat.

Benignitatem cœli folique Je-
nensis non aliis fidelior testis &
nunc

nunc eruditis omnibus, & dein-
de posteris aperiet.

Sed & ipse, cum utile opuscu-
lum ornandum acciperem, ex
TVA Thuringia repetui, unde
auctius & melius redderem.

Denique volente providentia
per nuptias in numerum subditio-
rum TVORVM transii, cum b.
Teichmeyeri patria etiam mea
quodam modo facta sit; cuius viri
hæc maxima in terris fuit beatitas,
quod fidele ejus obsequium TIBI
non displiceret.

TV vero, PRINCEPS SE-
RENISSIME, utiliores subli-
mioresque literas & amas, & ita
excolis IPSE, ut in tanto fasti-
gio vix æmulum reperias.

IPSE denique in universam
ditionem TVAM circumspicis
undi-

unidique , eamque propria sapientia non alienis dirigis consiliis.

Hæ mihi causæ sunt, quare exiguum hoc humillimi cultus pignus ausus sim offerre

SERENITATIS TVAE

IN GEORGIA AVGVSTA
D. II. Septembris 1744.

DEVOTISSIMVS CLIENS
ALBERTVS HALLER.



LECTVRIS S.

ALBERTVS HALLER



ENR. BERNH. RVPPIVS,
Giessensis, Medicinæ cultor,
ad botanicen plane natus,
fuit robusto & brevi corpore,
oculis lynceis, pedibus inde-
fessis, acri ingenio, memoria tenacissima.
Incredibili ardore a prima ætate avia quæ-
que, & omnes agrorum sylvarumque an-
gulos perreptavit. Thuringiam inpri-
mis, & Saxoniam, & Misniam, & Lufa-
tiam, & Hassiæ partem, Wetteraviam,

P R A E F A T I O.

Rhenique littora, tūrsum ad Wormatiam usque, deorsum ad ipsam Leidam obambulavit. Hercynicorum montium humiliora adtigit, Illefeldæ ad legendas plantas publico sumtu aliquot septimanis moratus. Sæpiissime sub dio media in solitudine noctes peregit, tenui vietu & rusticorum fordibus adsuetus. Hic ipsi unicus labor, hæc fere voluptas fuit. Quare numerosissimis plantis, propria manu lectis, spontearum stirpium Germaniæ eam sibi comparavit cognitionem, in qua neminem, DILLENIΟ excepto, parem haberet. Id eo magis mirum videri possit, cum extra dignitatem omnem positus, omni librorum suppellestile, & litterarum commerciis, & horto destitutus, omnia sibi debuerit ipse. Et in tantis tamen difficultatibus non empiricam solum plantarum cognitionem memoriæ impressit, sed in characteres sollicite inquitivit, in petala nempe & loculos & semina: nonnunquam vero & in ipsa stamina. Nova genera pluscula ex iis observationibus definivit, a) & quibus in

a) Cameraria, Illecebrum, Dichotophyllum, Limnopeuce, Radiola, Plantaginella, Portula: etsi omnino vere DILLENIVES moneat [in *præf. ad app. flor.*]

P R A E F A T I O.

in posthumis accessit Ericoides s. Alsinastrum. Species vero numerosas, aut noviter detexit b), aut certe in Germania partim nondum, partim rarissime c) repertas, primus e natura eruit. Varietas ipse legit, quot quisquam aliorum botanicorum, in quibus, si non eadem, quæ in inveniendis novis speciebus laus, labor certe etiam major est. Characteres multos a Prestono, Rajo, Tournefortio male propositos correxit: &, quod in primis miror, in eo vitæ genere, paucissimas plantas male cognovit, aut ad mala scriptorum nomina retulit.

Neminem adeo facile invenias, qui floræ

(5)

flor. Giess.] alios eorum characterum paulo minus perfectos esse; & procul dubio vere idem alios a se ipso RUPPIO communicatos fuisse testatur.

b) Orchis præcox fœtida. Fagopyrum semine alato. Lathyrus palustris foliis pinnatis. Viola apetalos.

c) Brassica alpina perennis. Rubus alpinus foliis Ribes. Astragali duæ species, Elichrysum annuum floribus congregatis. Alsinastrum. Festuca Juncea. Hormina duo &c. Linaria triphylla. Pyrola Arbuti folio. Vulneraria ad fl. Pfrim nascens Tragi. Caprifoliæ rariores species. Marrubiastrum Cardiacæ folio.

P R A E F A T I O.

rae alicujus urbis edendæ fuerit aptior. His enim viris, quos sua virtus in honorifica munia constituit, otium fere deficit, quo angulos agrorum perreptent omnes, eosque ab excursionibus s̄aþe ipsa deterrat dignitatis cura, aut debilior valedictio.

Ergo floram ejus urbis, in qua plurimis annis vixerat, ex R V P P II chartis, a. 1718. edidit IOHANNES HENRICVS SCHVRTTE Med. tunc studiosus & repetito, auctiorem 285. plantis a morte R V P P II a. 1726. Dn. FROELICH. In ea flora R V P P I V S R I V I N I, patroni sui, præcepta secutus est, methodum tamen, quam R I V I N V S in paucis generibus explicaverat, per omnem botanices ambitum diduxit, nitido & facili, quantum ea methodus patitur, ordine, & LINNAEI d) laudes merito. Aliqua etiam in classibus R I V I N I mutavit in melius, & genus planarum flore composito castius constituit e). Plantas dedit, quot ante ipsum in septen-

d) *Class. plant.* p. 233. 234. ubi Auctorem vocat, in generibus circumspectum, in methodo facilem, in synonymis adcuratum, in speciebus detegendis & distinguendis felicem &c.

e) p. 114. Ex plantis nempe flore composito Parnassiam

P R A E F A T I O.

septentrionali Europa nullus alias; cum locis natalibus fidelibus, quæ rarissime quarentem destituant. Nomina breviter fere protulit, additis varietatibus, & observationibus miscellaneis, etiam botanicis, propriis plerumque neque inutilibus. In alios botanicos, ut erat parum comitæ vitæ innutritus, durior fuit, ut passim temperare acerbas voces nefarum mihi visum sit f). Icones paucos, &, quales ab ea fortuna poterant sperari, malas dedit.

Hic ergo liber est, quem edendum tunc suscepi, quando b. sacer meus TEICHMEYERVS Botanicen Jenæ docebat. Exempla consumferat numerus eorum, qui in florentissima Academia medicinæ student, non pauca etiam in præstantissimorum aliis in terris botanicorum bibliothecas transierunt, quos passim cum laude R V PPII meminisse videoas.

Cum

fiam, Nigellam, Helleborum, & similes expuxit, quas admisuerat RIVINVS.

f) p. 186. ed. II. ubi meritissimum de se ipso & de omni re herbaria RIVINVM, frigido & aspero joco, vel quasi botanicorum coryphaeum vocat.

... und die nächsten 10 Seiten ...
... and the next 10 pages ...

& Historia. *Ptarmica altera* Matthioli. *Xeranthemum flore simplici, purpureo, majore* H. L. Bat. *Xeranthemum aliud, sive Ptarmica quorundam* J. B. 3. 25. In hortis floret Junio, Julio & Augusto. Floris colore variat. Germ. *Perpetuel-Blume*, *Papier-Blume*.

STOEBE flore pleno variorum colorum, cum praecedente.

V. Plantæ flore composito ex polypetalo & regularibus. a)

CARLINA acaulos, magno flore C. B. Pin. pag. 380. *Carlina acaulos* J. B. 3. pag. 64. *Carlina altera* Dodon. Pempt. II. p. 727. In apricis, asperis montium passim floret Aug. & Sept. Nostræ radix est perennis quam maxime, hinc quæritur : quo modo *Carlina acaulos, flore magno, radice perenni, montis aurei* H. R. Paris. ab hac nostra differat?

CARLINA caulescens, magno flore C. B. Pin. p. 380. *Carlina caulifera* J. B. 3. p. 64. *Carlina sive Leucantha* Dodon. Pempt. p. 727. Cum praecedente : hujus pariter atque praecedentis radices quotannis a Rhizotomis copiose eruuntur, & Lipsiam deportantur venales. *Eber-Wurtz*. Germanis dicitur, non secus ac praecedens. [Varietas.]

HERACANTHA Tabernæmont. & Rivini. *Carlina sylvestris, vulgaris* Clus. Histor. CLVI. *Cnicus sylvestris, spinosior* C. B. Pin. pag. 378. *Carlina sylvestris quibusdam, aliis Atractylis* J. B. 3. 81. In apricis asperis cum *Carlina* passim, floretque Julio & Augusto. b)

Obs. 1. Hanc plantam Celeberrimus Wedelius noster **Carlinam scandentem** appellat, & contra sodam commen-
dat, vid. *Amœnitates Materiæ medicæ* ipsius pag. 175. in-
de

Flosculi vero in margine feminæ in centro androgyni sunt, uti in multis *Erigerontis*, *Elichrysi*, *Petasitis*, *Conyzæ*, *Ab-
sinthii*, speciebus, quas inter plantas flosculis omnibus re-
gularibus relinquit RUPPIVS.

a) Eadem, quæ de *Xerantheino*, hic valet observatio, squamæ

de & Germ. *Sood-Distel* vocatur, nec non *Creutz-Distel*, unde forsan nomen Heracanthæ ortum; potius *Drey-Distel* scribendum esse puto, siquidem Hieronymus *Tragus* testatur, præcipue eam, quæ terna gerit capita, præ cæteris extolli & æstimari.

2. Eandem proprietatem *Carlinæ vulgari* attribuit Camerarius in Epit. Matthioli Germanica pag. 220. his verbis: *Etliche hencken den dornichiten Blumen-Kopf von der Eber-Wurtzel über den Tisch, vermeinen, so man ihn ansiehet, helfe er wider das Kotzen und Sood des Magens,* addit Camerarius: *gehört ein starker Glaube darzu.*

3. D. Mauritius Hoffmannus in floræ Aldorfinae deliciis sylvestribus huic pariter synonymon facit *Carlinam sylvestrem minorem* Clus. in Histor. hisp. pag. 451. Mirandum vero, si hoc ita sit, Clusium hanc plantam nullibi quam aridis circa Salinanticam locis observasse, cum ubi vis sit obvia.

4. Aliquando caule lato, monstroso fasciato occurrit, quæ *Carduus monstrosas figura Cornu copia Imperati* C. B. Pin. p. 379. cuius figura videatur in Chabræo.

CLASSIS IX.

DE

PLANTIS FLORE PERFECTO,
SIMPLICI IRREGVLARI, MO-
NOPETALO GAVDEN-
TIBVS.

I. Semine nudo unico.

VALERIANA major, odorata radice J. B. 3. part 2. 209. *Valeriana hortensis* Dodon. Pempt. 349. *Phu ponticum*; *Valeriana pontica* Tabernæm. icon. 164. *Valeriana hortensis*: *Phu Olusatri folio* *Dioscoridis* C. B. P. 164. In hortis florat. Linnæus. C. M. P. 164. *Valeriana hortensis* Linnæus. C. M. P. 164.

Wurzel, quia cati insigniter delectantur hujus radicibus, præcipue tempore verno, iisque miris gestibus, (quos Matthiolus facete & graphice pag. 38. descripsit) se super-volutant.

VALERIANA sylvestris major C. B. P. 164. *Valeriana angustiore folio*, R IV. *Valeriana major*, *Herba benedicta* Tabernæm. icon. 165. *auf der Wellmese, und auf dem Forst*, floret Jun. & Jul.

VALERIANA palustris major C. B. c. I. *Valeriana palustris, major, profunde lacinata* C. B. Prodr. 86. In pratis uliginosis im grossen Paradiß, floret cum præcedente. [Varietas foliis latioribus.]

VALERIANA palustris minor C. B. P. 164. *Valeriana minima* Dodon. Pompt. *Valeriana minor* R IV. (mas) In pratis uliginosis bey Ziegenhain und den Fürsten-Brunnen, noch häufiger auf denen feuchten Wiesen, wo man nach Jena-Priessnitz geht, auch im grossen Paradiß. Floret Majo. [Femina &

VALERIANA aquatica minor, flore minore. Raji Hist. 389. *Valeriana minor flore exiguo* R IV. [femina] Cum præcedenti, hujus figura videatur in D. Rivini ordine plantarum flore irregulari monopetalo. Hæc præcedente altius assurgit, & folia communiter terna habet opposita. [In posthumis corrigit hæc ternata folia & error rem vocat R A I. omnino binata sunt.]

VALERIANA foliis Calcitraptæ C. B. *Valeriana annua, altera* Clusii Hist. LIV. In hortis Curiosorum. Floret Junio & Julio.

P. H V foliis Glasti. *Valeriana rubra* C. B. P. 165. *Valeriana rubra latifolia* J. B. c. I. In hortis Curiosorum flore rubro & albo occurrit. Floret Junio & Julio. Phu differt a Valeriana flore caudato, sive calcari donato, uti Antirrhinum differt a Linaria. [Ob eandem causam Valerianoides vocavit VAILLANTIVS. Stamen habet unicum. Sed ob semen, & habitum conjunxit denuo LINNAEV S.] Nugæ veterum quorundam Botanicorum facile elucescunt, qui ex hac planta varia effluxerunt, de-

PHV folio angustiore. *Valeriana rubra angustifolia* C. B. P. 165. J. B. 2. p. 211. Cum præcedente.

VALERIANELLA arvensis, præcox, humili, semine compresso. Moris. Unib. *Valeriana campestris inodora, major* C. B. P. 165. *Locusta* Rivini. *Locusta herba* J. B. 3. 323. *Herba ramistica* Jungermanni. [ob caulis perpetuum dichotomiam] *Lactuca agnina* Tabernæm. Germ. Rapuntzgen, *Feld-oder Läninger-Lattig*, Nüssgen-Salat. Sæpe in monstrosa & abortiva foliosa capita degenerat. In arvis & inter segetes floret Majo; foliis integris & ferratis variat. A Valerianis differunt Valerianellæ semine pappo non coronato.

VALERIANELLA arvensis, scrotina, altior, semine turgidiori Moris. Umbell. Cum præcedente: foliis autem est angustius divisis, Semina nuda gemella hanc plantam habere, Clariss. Rivinus tradit, sed reclamat autopha.

VALERIANELLA cornucopiaeoides Riv. *Valeriana peregrina purpurea albava* C. B. P. p. 164. *Valeriana indica* Clus. In hortis Curiosorum æstate floret.

VALERIANELLA altera tenuifolia semine Scabiosæ stellatae E. A. B. COLUMNÆ in Ecphrasi. *Valerianella semine stellato* C. B. p. 165. In hortis Curiosorum. Ex considerata hac planta constat Dipsacum, Scabiosam, & Succisam, & Valerianellam, melius ad irregulares monopetalas, gymnomonospermas, quam ad plantas flore composito referri: siquidem florum stanina minime in tubulum circa pistillum coœuntia habent, & semina a reliquis compositis evidenter differunt. Neque sufficit florum in capitulum coagmentatio, alias enim Rapuntium Scabiosæ capitulo, Eryngium, Globularia, Hæmanthus, Ananas, Amaranthus, Trifolia compositis floribus accenserit deberent.

SCABIOSA pratensis hirsuta, quæ officinarum C. B. P. 269. *Scabiosa major, communior, hirsuta, folio laciniato*. J. B. 3. 2. *Scabiosa arvensis, sive segetalis* Tabern. icon. 159. Apostem-Kraut, Scabiosen. In pratis v. g. auf der Zvsl im Paradiese & alibi floret æstate; sepiusque flore

quasi pleno deprehenditur nach Kunitz bin, ejusque colore quoque variat, hinc occurrit quandoque.

S C A B I O S A pratensis flore albo, cum priori. [Varietas.]

S C A B I O S A multifido folio, flore flavescente C. B. P. 270. *Scabiosa ochroleuca flore, sive VII.* Clus. Histor. III. In Campestribus montosisque v. g. an Hecken und Strassen nach Camburg, und Eckardtsberge zu, und häufig bey Naumburg, floret Jul. & Aug. [Asterocephali omnino species, flosculis quinquefidis, foliis omnibus laciniatis, cæterum valde adfinis sequenti. Ex Tartaria etiam habui.] Interdum gemino capite, ut & sobolibus abundans occurrit.

S C A B I O S A capitulo globo C. B. P. 270. *Scabiosa minor vulgaris* J. B. 3. 3. *Scabiosa V.* Clusii Hist. II. magnitudine variat & foliorum segmentis; hinc IV. figuræ apud Tabernæmont. icon. 160. 161. 162. In montosis, apricis & vineis floret tota æstate; ista auch häufig auf dem Forst. Interdum prolifera deprehenditur, [v. g. circa Walckenried] non secus ac Succisa, & Scabiosa americana. Occurrit etiam flore pleno.

S C A B I O S A stellata, folio laciniato, major C. B. P. 271. *Scabiosa major cum pulchro semine* J. B. 3. 9. *Scabiosa major Hispanica, sive prima* Clusii Hist. I. In horto medico, floret Jul. & Aug.

S C A B I O S A peregrina rubra, capitulo oblongo C. B. Pin. p. 270. *rubra peregrina quibusdam Indicæ* J. B. In hortis passim floret autumno in brumam usque; flore albo, carneo, atro-purpureo, nec non variegato, & aliis coloribus multum variat. Aliquando & prolifera occurrit, quæ forsitan Scabiosa prolifera Lobel. Tabern. & Clus.

E A D E M foliis in tenuiores laciniæ divisæ floreque atrorubente & odorato, quam C. BAVHINVS ex Horto patavino cum nomine *Scabiosæ nigræ odore Zibethi* habuit. Cum præcedente.

S C A B I O S A alpina, foliis Centaurei majoris C. B.

Pin. 270. In horto medico floret Jun. & Jul.

gro hirsuto Tournefort. Instit. p. 466. *Succisa*, sive *Morus diaboli* J. B. 3. II. Auf dem Forst, und im Clusewitzer Holtze, floret Augusto; Foliis glabris, & hirsutis nec non angustioribus variat, aliquando & flore carneo alboque occurrit, nec non prolifera, deprehenditur, quæ *Succisa alpina*, flore prolifico, cœruleo H. R. Paris. Germ. *Abbiß*, *Teuffels-Abbiß*. Nomen habet a radice quotannis putrescente & superius velut renascente, quod ipsi cum Hieraciis nonnullis, Aro, & Gladiolo commune est. A *Scabiosa* distinguitur laterilibus flosculis minus speciosis. a)

DIPSACUS sativus C. B. P. 185. J. B. 3. 73. *Carduus fullonum*, sive *Dipsacus sativus* Lobelii icon. 17. *Labrum veneris* Matthioli. *Weber-Karthen*, *Karthendistel*. In agris circa pagos satus: *Bey Weimar und Eckartsberge*, item nach *Apolda* hin. Floret Julio & Augusto.

DIPSACUS sylvestris, aut *Virga pastoris major* C. B. P. c. I. *Dipsacus sylvestris*, sive *Labrum veneris* I. B. 3. 74. & Lobel. icon. 18. *Labrum veneris alterum* Matthioli. Ad sepes & scrobes passim in agrorum, vinearumque limitibus, juxta vias publicas floret Aug.

DIPSACUS folio laciniato C. B. Pin. p. 385. *Dipsacus secundus* Tabernæmontani, ad vias publicas juxta scrobes zwischen *Worms* und *Franckenthal* & in tota Alsacia, diversis a prioribus. Floret Julio & Augusto.

DIPSACUS sylvestris, capitulo minore, vel *Virga pastoris minor* C. B. P. 385. *Virga pastoris* Matthioli. *Dipsacus minor* Thalii. Ad torrentum ripas v. g. am Mühlgraben vor dem Johannis-Thor, auch an den Stadt-Graben hinter dem horto Medico, und bey Clusewitz, im tiefen Loche wo man aussm Raubenthale kömmt, floret Aug.

GLOBULARIA vulgaris Tournefortii Institut. 467. *Bellis cœrulea*, caule folioso C. B. P. 262. *Aphyllantes*

Anguillaræ, sive *Globularia Bellidi similis* J. B. 3. 13. floret Majo, provenitque in sylvis, *bey Freyburg und Schmohne*, it. *hinter Naumburg*, v. g. *in Hackens Hölzgen*, auch *bey Halle in der Heyde*, flore albo aliquando variat. Semen habet nudum, unicum, & flores irregulares, barbatos tautum, trifida barba instructos. a)

H. Seminibus nudis quaternis.

ECHIVM vulgare C. B. P. 525. J. B. 3. 586. *Echium Dodoni* Penipt. 631. In locis Canipestribus passim juxta vias publicas floret Jun. & Jul. Flore cœruleo, rubro & albo variat. Germ. *wilde Ochsen-Zunge*. Multi loco Anchusæ utuntur. In monticolosam aliquando hispidam jubam extuberat, parvis hinc inde gaudentem floribus.

ECHIVM angustifolium asperius an *Echium majus* ♂ *asperius flore albo* C. B. P. an potius *Echium sylvestre hispidum maculatum* EIVSD. *Echium* 2. vel *rubro flore* CLVSI Pann. In hortis Curiosorum, floret cum præcedente.

ECHIOIDES flore cœruleo Rivini. *Buglossum sylvestre minus* C. B. P. 256. *Echium Fuchsii*, sive *Borago sylvestris* J. B. 3. 581. *Buglossa sylvestris* Dodon. Penipt. 628. In agris frequens, sonderlich *bey der neuen Schencke und auf der Insul*, floret Jun. Jul. & Aug.

ECHIOIDES flore albo Rivini. b) *Echioides alba* Column. Part. I. 185. *Buglossum arvense, annuum, Lithospermifolio*. Tournefort. Instit. p. 134. *Lithospermum arvense, radice rubra* C. B. P. 258. *Lithospermum nigrum*.

a) Minime, & ex TOVRNEFORTIO non bene hæc exscribit RUPPIVS. Nam & calyx, & flos bilabiatus est, & uterque labium superius bifidum, inferius trifidum habet. Enum. Stirp. Helv. p. 667. Cl. LINNAEVS, in nova editione Characterum n. 88. labium superius simplex facit. Sed fideles exposui observationes.

grum quibusdam, flore albo, semine Echii. J. B. 2. 592.
Inter segetes floret Aprili & Majo, aliquando etiam
Octobri refloret. Germ. Schminck-Wurtz, quod radix
cutem rubro colore inficiat.

ECHIOIDES flore pullo Rivini. *Echium flore pullo*
Clusii. *Echium sylvestre lanuginosum*, pullo flore Cha-
bræi p. 517. In agris eorumque limitibus bey Borsten-
dorff und Jena-Priesnitz, auch wo man nach Ammer-
bach geht, auch nach Spiznasens Gut, nach Schwabhau-
sen zu. Floret Jun. & Jul. [Inter Wölnitz & Fürsten-
brunnen. Cis Sülzam copiose. Radix perennat]

ECHIOIDES flore pullo, calice amplo Riv. a) Inter segetes bey Apolda und nach Jena-Priesnitz zu, copiosius vero in omnibus agris inter Bebra & Laucha floret cum præcedente. Caules magis supini, latius dif-
fusi perianthium ventricosum, & radix semine prolate
eimoritur.

BVGLOSSOIDES cretica Rivini. *Buglossum creti-
cum caulinis procumbentibus, flore variegato odorato,
Echii foliis verrucosis* HERM. H. L. B.

[Quæ sequuntur naturalem classem constituant Gymno-
tetraspermarum verticillatarum, staminibus duo-
bus longioribus, duabus brevioribus]

TEUCRIVM Bæticum Clus. Hispan. 229. J. B. 3. 291.
Teucrium peregrinum, folio finuoso C. B. P. 247. In
hortis floret Jun. & Jul.

CHAMAEDRYS minor, repens. C. B. P. 248. *Chamædrys repens, minor* Dodon. Pempt. 43. In apricis &
montosis, nec non vineis passim floret Jun. & Jul. *Ga-
manderlein, oder Berg-Scordien.*

CHAMAEDRYS minor, repens, flore albo. Sæpius oc-
currit auf dem Haß-Berge cum præcedente. [Varietas]
IVA moschata folio multifido RIV. Botrys chamæ-
dryoi-

3) Monop. irreg. T. 8. in posterioribus exemplaribus, non in
prioribus. Ceterum Echium Echioides & Buglossoides.

dryoides C. B. P. p. 138. *Chamædrys altera* Matth. *Iva moschata* TAB. Frequens in vineis, Junio & Julio floret.

SCORDIVM C. B. P. 247. *Chamædrys palustris, canescens*, sive *Scordium officinarum* Tournefort. Institut. 205. *Lachen-Knoblauch*, *Scordien*. In pratis uliginosis bey Laucha, auf denen Oberndorffischen Wiesen, auch sonst an der Unstruth, und bey Naumburg floret Jul. Interdum etiam occurrit im grossen Paradiese, sed rarius.

SCORODONIA Riv. *Chamædrys fruticosa, sylvestris, Melissæ folio* C. B. Pin. 205. *Scordium alterum, seu Salvia sylvestris* C. B. P. 247. bey Gießen in Wäldern, v. g. in der Linder-Marck, und auf den Dießberge, floret Majo & Jimio.

MARVM Cortusi. J. B. 3. 242. *Chamædrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis* Tournefort. p. 505. In hortis floret Jun. & Jul. *Vulgus Marum verum* vocat, unde aliqui satis inepte effinxerunt *wahrhaftig bitter*, quasi amarum verum latine diceretur.

CHAMÆPITYS officinarum. *Chamæpitys lutæa, vulgaris, sive folio trifido* C. B. P. 249. *Chamæpitys odorata, flore luteo* J. B. 3. 295. *Ajuga, sive Chamæpitys mas* Dioscoridis Lobel icon. 382. *Schlag-Kräutlein, Schlag-Kraut, Erd-Kiefer, Feld-Cypress, Erd-Pin.* in agris montosis & lapidosis, v. g. bey dem Forst, bey dem Jäger-Hause, beym Raubenthal und bey Wage, (copiose ad M. Kunitzberg, fere e regione Borstdorf). floret Jul.

A V G A folio integro Rivini. *Polium Lavendulæfolio* C. B. P. 220. *Polium pannonicum vel majus Clusii* Pannon. *Polium montanum officinarum*. Foliis aliquando denticulatis variat. In apricis passim in vineis & montosis, asperis, meridiei expositis floret Jun. & Jul. Germ. *wilder Rosmarin, wilder Lavendel, Berg-Lavendel.*

O C I M V M latifolium, maculatum & crispum C. B. Pin. *Basilicum indicum maculatum* Eystett. In hortis variis floret Jul. & Aug. Germ. *Basilien-Kraut*. Huic folia rubro suffusa, eximie odorata.

cum præcedente, color tam foliorum, quam florum in alio albus, in alio niger est. Sed etiam hirsutie & levitate ita variat, ut pro diversis plantis sit recensitum.

O C I M V M vulgatus C. B. l. c. *Ocimum medium* Matth. cum præced.

O C I M V M minus angustifolium foliis serratis C. B. P. p. 226. *Ocimum minus angustifolium flore albo* H. E Y C H S T. Cum præced.

O C I M V M Anisi odore C. B. l. c. *Ocimum anisatum* H. E Y C H S T. Rarius in hortis.

O C I M V M minimum C. B. l. c. *Ocimum minus caryophyllatum* T A B. cum prioribus, sed rarius.

H O R M I N V M coma rubra R I V. *Horminum sativum* C. B. P. 238. In hortis quandoque obvium floret Jun. & Jul.

H O R M I N V M coma violacea, de quo videatur J. B. Cum priori.

H O R M I N V M folio laciniato R I V. *Horminum angustifolium laciniatum* C. B. P. p. 239. In hortis Curiosorum.

H O R M I N V M spurium R I V. *Horminum sylvestre latifolium* Clusio. J. B. 3. 314. *Horminum sylvestre* III. Clusii Histor. XXIX. In horto medico, ubi vulgo Horminum foliis Betonicæ vocant: Floret cum præcedente

H O R M I N V M sylvestre salvifolium minus. C. B. Pin. p. 239. *Horminum sylvestre*, V. species prior Clus. hist. In pratis & campestribus, juxta vias publicas & in cœmeteriis bey Erdeborn, grossen Ehrig und Eiſleben, auch bey Alstädt [Inter Tieffenthal & grossen Fanern abunde] floret æstate.

H O R M I N V M Riv. *Sclarea* Tabernæm. icon. 373. *Horminum sclarea dictum* C. B. P. 238. *Gallitrichum sativum* J. B. 3. 309. *Orvala*. Dodon. Penipt. 292. Germ. *Muscateller-Kraut*, quia vina hujus additione vina muscatellina mentiuntur. *Scharlach - Kraut*. In hortis floret æstate.

H O R M I N V M flore albo R I V. *Sclarea vulgaris lanu-*