


- Beispielhafter Auszug aus der digitalisierten Fassung im Format PDF -

Flora Zeylanica

Carl von Linné

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](http://Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt am Main)) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.



24p.

3230.

9230

CAROLI LINNÆI,
ARCHIATR. REGII; MED. & BOT. PROF. UPSAL;
ACC. IMPERIAL. UPSAL. MONSPEL.
STOCKH. BEROL. SOC.

F L O R A
Z E Y L A N I C A

Sistens

PLANTAS INDICAS
Z E Y L O N Æ
INSULÆ;

Quæ

Olim 1670 - 1677. lectæ fuere

A

PAULO HERMANNO,
PROF. BOT. LEYDENSI;

Demum

Post 70 annos

Ab

AUGUSTO GÜNTHERO,
PHARMACOP. HAFNIENSI,
Orbi redditæ;

HOC VERO OPERE

Revisæ, Examinatæ, Determinatæ & Illustratæ

GENERIBUS CERTIS,
DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
SYNONYMIS PROPRIIS,
DESCRIPTIONIBUS COMPENDIOSIS,
ICONIBUS PAUCIS.

HOLMIÆ,

Sumtu & Literis LAURENTII SALVII. 1747.

Lat
20.1.97
ff.

THE LONDON AND ASTORIA

SALES AND MARKETING

OF THE

COMPANY

INCORPORATED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

1000 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10018

TELEPHONE (212) 512-1000

FACSIMILE (212) 512-1000

TELETYPE (212) 512-1000

TELEPHONE (212) 512-1000

VIRO SPECTATISSIMO & PERIN-
DUSTRIO

AUGUSTO
GUNTHERO,

PHARMACOPOLÆ REGIO HAFNIENSI.

Herbarium Indicum, *quinque voluminibus constans, quod ante biennium ad me misisti, nomina ut plantis adscriberem, heic reddo.*

Gratulor orbi erudito, quod hic Thesaurus, qui per 50 annos fuerat suppressus, indignorum manibus versatus, & in Barbarorum hominum scriniis sepultus, rerum vicissitudine iterum emerferit & ab interitu fuerit vindicatus.

Est hoc opus Herbarium Zeylanicum, quondam a Principe Botanicorum, PAULO HERMANNO, lectum in Zeylona multis itineribus, periculis, laboribus, curis, nec sine Fœderati Belgii maximis sumtibus.

Ante dimidium seculum eruditi de hac rarissima collectione uno ore loquebantur, eandem in summum augmentum scientiæ expectabant, sed inopinato fato periit Hermannus, periit & collectio hæc, quam dein diutissime deplorarunt Botanici.

TIBI vero hanc desideratissimam collectionem reservarunt fata, ut tua ope revivisceret, ut per hanc famam & æternam nominis gloriam reportares.

Reddo heic Tuum opus; nomina plantis, ut petiisti, non tantum adscripsi, sed plantas & nomina luci publicæ exposui; horas diesque bene multos, eosque laboriosissimos, hisce impendi, quos vix ac ne vix mihi restituas. Letabor tamen si hæc officia, in Amicum non minus dignum, quam ignotum, me contulisse experiar.

Vivas sospes & felix diutissime.

Dabam Upsaliæ 1747. d. 23. Junii.

AUTOR.

PRÆFATIO.

FLORÆ EXERCITUS *seculo XVI*, conquifitus studio & diligentia laboriofiffimorum Virorum *Brunsfelfii, Cordi, Tragi, Fachfii, Gefneri, Matthioli, Tabernæmontani, Lobelii, Dodonæi, Clufii, Camerarii, Alpini, Columnæ, Cæfalpini, Baubinatorum* circumfcribebatur 6000 tantum plantarum *Speciebus*, adeoque in his castris mereri adhuc facile erat.

SECULO vero *XVII* in scenam prodibant multi & summi in arte Heröes, qui plantas confcribebant ex toto orbe; uti *Alpinus, Aldinus, Zanonus, Bocconus; Grifleus, Salvadorus; Cornutus, Barrelierus, Dodartus, Magnolius, Tournefortius; Morifonus, Rajus, Plukenetius, Petiverus, Sberardus; Hermannus, Kiggelarius, Commelini; Breynius, Loefelius, Mentzelius, Anmannus; Rudbeckii*; & præter hos qui remotiffimas Indias adibant: *Bontius, Hermannus, Rheedeus, Rumpfius, Camellus; Oldenlandus; Hernandus, Marcgravius, Pifonus, Bannifterus, Sloaneus, Surianus*, quorum opera exercitus confcriptus fuit ad numerum 20000 circiter *Specierum*. Corruiffent tum propria mole ingentes copix, nifi *Præfeti* summi intruxiffent exercitum in *Legiones, Cohortes, Manipulos*, uti *Morifonus, Rajus, Hermannus, Rivinus*, & qui hos omnes fuperavit, immortalis *Tournefortius*; (hic poftquam dubia fepofuimus) 500 *Genera* plantarum diftinctiffima adornavit.

NOSTRUM hoc SECULUM Botanicos, neque numero neque meritis præcedentium feculorum inferiores, aluit. Summus *Vaillantius* vaffiffimam legionem COMPOSITORUM intruxit. Laboriofiffimus *Scheuchzerus* integram legionem GRAMINUM adornavit. Solidiffimus *Dillenius*, præter numerofas *Excoticas*, perfectiffimam legionem MUSCORUM conquifivit. Oculatiffimus *Michelius* legionem FUNGORUM observavit. Clariffimus *Plu-*

mierus, triplici itinere in Americam, legionem 900 NOVARUM plantarum detexit. Insuper *Dillenius MESEMBRYANTHEMA*, *Boerhaavius PROTEAS*, *Bradlaeus CACTOS*, *Commelinus ALOES* instruxerunt. Porro Plantarum caussa *Scheuchzerus* & *Hallerus ALPES*, *Kæmpferus INDIAM*, *Schawius AFRICAM*, *Hartogius CAPUT B. SPEI*, *Feuillæus CHILLI*; *Tournefortius ARCHIPELAGUM*; *Buxbaumius*, *Messerschmidius*, *Gerberus*, *Heintzelmannus*, *Gmelinus*, *Stellerus RUSSIÆ* imperium, *FARTARIAM* & *SIBIRIAM* peruestigarunt; Et sic Floræ copiæ stupendo plantarum numero nostro etiam seculo auctæ sunt.

De hisce nostris etiam loquamur temporibus & de Botanicis qui hodie strenue in castris Floræ militant. In GALLIA eminent Summi *Jussæi*, tres fratres, qui Pyrenæos perquisiverunt, qui fortalitium Floræ Parisinum instruxerunt, qui remotissimas terras Peruvianas adiverunt. *Sauvagesius* numerosissimas Monspelienses plantas quotidie legit. *Barrerus*, ex America redux, plantas Gallix æquinoctialis scrutatur. *Maynardus* Pyrenæos adire proposuit. In ANGLIA *Martynus* rariores plantas æstimat, *Millerus* rariores Horti Chelsejani studiose conservat, *Collinsonus* Americæ septentrionalis plantas conquirat, *Catibæus* Carolinianas pulchre delineat, *Claytonus* plantas Virginix legit, *Bartramius* ad minutissimas Americæ attendit, *Coldenius* Noveboracenses omnes examinat, *Mitchelius* ex America redux nova parat, *Lithorpius* Oxonii antecessorum vestigia premit. In BELGIO Triumviri *Royenus*, *Gronovius*, *Buzmannus* florent; horum primus Hortum Leydensem quotidie auget, secundus Virginix, a Claytono missas plantas, sedulo examinat; tertius de Zeylona, Africa & Amboina optime meruit; horum vestigiis insistent *Gorterus* in Geldrix Campis & *Wachendorpius* in Horto Ultrajectino. In GERMANIA inter Helvetos eminet

... und die nächsten 10 Seiten ...
... and the next 10 pages ...

gius petiolato. Pedunculi foliis longiores, axillares, solitarii, erecti, nudi, apice ramosi. Legumina torosa, dissiliencia in contortas spirales valvulas.

PHASEOLUS.

280. PHASEOLUS caule erecto anguloso hispido.

Hort. cliff. 499.

Phaseolus ortocaulis, Mungo persarum, turcarum Masc, hispanorum Max. *Hern. mex. 887.*

Phaseolus erectus, caule & folio rigidis, flore pallide luteo, filiqua crassa ampla. *Bont. ind. 152.*

Burm. zeyl. 190.

Phaseolus erectus hirsutus, caule quinquangulari auriculato, flore viridi-lutescente, filiqua in rostrum incurvum desinente. *Pluk. alm. 290.*

Phaseoli villosi species. *Burm. zeyl. 188.*

Bumum. Buncæ. *Herm. zeyl. 22.*

281. PHASEOLUS caule erecto tereti, floribus capitatis, leguminibus cylindræis horizontalibus.

Act. stockh. 1742. p. 202. t. 7. f. 2.

Phaseolus zeylanicus, filiquis radiatim digestis. *Dill. elth. 315. t. 235. f. 304. Burm. zeyl. 192.*

Mun. Mung. *Herm. zeyl. 47.*

Obs. *Decoctum seminum in Colica calculosa commendatur a Chinensibus.*

DOLICHOS.

282. DOLICHOS caule volubili, foliolis ovatis tomentosis, floribus solitariis, seminibus bicornibus.

Phaseolus zeylanicus tomentosus, salviæ foliis, lobis parvis oblique articulatis, alter. *Burm. zeyl. 188.*

Phaseolus minor bisnagaricus, foliis argenteo-villosis, filiquis torosis brevibus spadicea hirsutie pubescentibus, fructu parvo scaraboide nigro. *Pluk. alm. 290. t. 52. f. 3.*

Wælundu. Wælunduwæl. *Herm. zeyl. 6.*

β Hedyfarum trifoliatum salviæ folio. *Burm. zeyl.* 117.

Telamandu. Budamani. *Herm. zeyl.* 25.60.

Descr. Caulis *volubilis, scaber*. Folia *petiolata, ternata*; foliolis *ovatis, obtusis, subtus venosis, utrinque tomentosis, mollibus*. Flores *solitarii ex alis*. Semina a *Plukenetio depicta duas antennas ferunt insectorum instar*.

CLITORIA.

283. CLITORIA foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 360.
Roy. lugdb. 369.

Flos clitorius flore cæruleo. *Burm. zeyl.* 100.

Flos clitoridis ternatensibus. *Breyn. cent.* 76. t. 31.
Raj. hist. 870.

Ternatea flore simplici cæruleo. *Tournef. act.* 1706. p. 84.

Phaseolus indicus, glycyrrhizæ foliis, flore amplo cæruleo (pleno). *Comm. hort.* 1. p. 47. t. 24.

Phaseolus foliis pinnatis. *Riv. tetrap.* 40.

Faba purgatrix Catharodu zeylonensibus. *Grim. zeyl.* 124.

Schanga-cuspi. *Rheed. mal.* 8. p. 69. t. 38.

Kataroduwæl, Katarodu. *Herm. zeyl.* 10. 32. 61.

β Flos clitorius, flore albo. *Burm. zeyl.* 101.

Descr. Radix *annua*. Caulis *volubilis, teres, humanæ altitudinis*. Folia *solitaria, pinnata ex quinque aut septem foliolis ovatis, obtusis*. Flores *magni, in alis sessiles*.

GLYCINE.

284. GLYCINE foliis pinnatis conjugatis, foliolis paribus ovali-oblongis obtusis.

Glychirrhiza indica vulgo. *Herm. lugdb.* 494.

Glychirrhiza indica filiquis & seminibus pisi coccineis, hilo nigro notatis. *Herm. prodr.* 337.

- Glycyrrhiza vel Glycyrrhizæ adfinis arborefcens americana, floribus ex luteo & rubro variegatis, folio acuminato, filiqua latiffima. *Breyn. prodr. 2. p. 53.*
- Phaseolus glycyrrhizites, folio alato, pifo coccineo atra macula notato. *Sloan. flor. 70. hift. 1. p. 180. t. 112.*
- Phaseolus alatus major, fructu coccineo macula nigra notato. *Comm. mal. 211.*
- Phaseolus arborefcens alatus & volubilis major orientalis, fructu coccineo hilo nigro notato. *Pluk. alm. 294. t. 214. f. 5.*
- Phaseolus ruber Abrus vocatus. *Alp. ægypt. 40. t. 40.*
- Phaseolus indicus ruber bontio. *Raj. hift. 889.*
- Phaseolus indicus vulgo falfo Pæonia indica vocata. *Comm. hort. 124.*
- Phaseolus fecundus ruber, qui Abrus profpero alpino dicitur. *Bont. jav. 136.*
- Phaseolus ruber Abrus vocatus minor coccineus, nigra macula notatus. *Morif. hift. 2. p. 71.*
- Vicia africana. *Cluf. exot. 15.*
- Arachus indicus five africanus. *Park. theatr. 1071.*
- Orobus americanus, fructu coccineo nigra macula notato. *Tournef. infl. 393.*
- Orobus indicus Abrus alpini dictus, fructu coccineo macula nigra notato. *Burm. zeyl. 177.*
- Cicer indicum, fructu nigro macula nigra notato. *Amm. char. 338.*
- Pifa floridiffimo rubro colore, una macula excepta, ex novo orbe nuper allata. *Gefn. hort. 272.*
- Pifum coccineum americanum, an orobi fpecies? *Lob. hift. 516. ic. 2. p. 67.*
- Pifum americanum. *Dalech. hift. 450.*
- Pifum indicum minus coccineum. *Baub. pin. 313.*
- Pifum americanum coccineum aliis Abrus. *Baub. hift. 2. p. 263.*
- Pifum americanum coccineum vel nigrum, Abrus quibusdam. *Chabr. fciagr. 403.*

Abrus. *Vest. ægypt. 25. Dal. pharm. 238. Hort. cliff. 488.*

Konni. *Rheed. mal. 8. p. 71. t. 39.*

Olinda. Olida. *Herm. zeyl. 16.*

Descr. Radix perennis. Caulis lignosus, volubilis, levis. Folia alterna, bina, eidem basi inserta, pinnata sine impari: foliolis numerosis, æqualibus, ovali-oblongis, subsessilibus, obtusis, glabris, integerrimis. Pedunculi ex alis solitarii, petiolis crassiores, longiores, spicati, inferne nudi. Legumina compressa, unilocularia, obtusa, torosa. Semina globosa, coccinea, altero latere lata nigra macula.

TRIGONELLA.

285. TRIGONELLA leguminibus sessilibus subsolitariis subfalcatis, foliolis integerrimis, caule diffuso.

Astragalus minimus repens triphyllus, filiquis falcatis. Herm. zeyl. 33. Burm. zeyl. 39 (Synon. non.)

Lotus maderaspatanus villosus, ornithopodii filiqua singulari. Pluk. alm. 226. t. 200. f. 7.

Pilæ species. Herm. zeyl. 13.

Descr. *Herba procumbens, parum ramosa. Folia ternata, petiolata: foliola subæqualia, oblongiuscula, glabra, integra; stipulæ ovato-lanceolatæ. Legumina solitaria vel bina eodem pedunculo, in alis subsessilia, recurva, compressa.*

HEDYSARUM.

286. HEDYSARUM foliis simplicibus cordato-oblongis, petiolis alatis, ramis triquetris.

Hedysarum zeylanicum, aurantii folio. Burm. zeyl. 120.

Hedysarum monophyllum zeylanicum pediculatum. Herm. zeyl. 35.

Onobrychis zeylanica monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. Burm. zeyl. 176, t. 81. opt.

Onobrychis zeylanica, aurantii folio. *Pet. succ.* 247.
n. 16. *Raj. app.* 247.

Descr. *Caulis triangularis*. *Folia cordato-oblonga, acuminata, basi parum emarginata, petioli utrinque membrana aucti, apice acute emarginati, aurantii forma, petiolo brevissimo, teretiusculo. Racemus florum minimorum. Legumina longa, polysperma, hispida, villosa, membranacea, vix articulata.*

287. *HEDYSARUM* foliis simplicibus cordato-oblongis, petiolis simplicibus, stipulis vaginantibus. *Hedysarum monophyllum repens, filiculis glabris non crenatis. Herm. zeyl.* 33.

Genista articulata repens, foliis crassiusculis planis acutis. Burm. zeyl. 104, t. 49, f. 1.

Undupyali alia species, folio singulari oblongo. *Herm. zeyl.* 5. 10.

Descr. *Planta herbacea, procumbens. Folia inferiora obverse ovata, basi emarginata, superiora magis oblonga & cordato-lanceolata, acutiora; omnia glabra, venosa, petiolis insidentia simplicibus, teretiusculis. Stipulae acuminatae, vaginarum instar caulem involventes. Spicae versus apices caulium longae, angustae. Rami pauci. Legumina cylindrica, glabra, articulata, recta, more Ornithopi dissiliencia articulatum, licet articuli extus vix conspiciantur, nec intus diversa loculamenta faciant.*

288. *HEDYSARUM* foliis simplicibus cuneiformibus.

Hedysarum monophyllum repens, folio nummulariae rotundo, filiculis hispidis parvis. Herm. zeyl. 31.
Burm. zeyl. 113.

Onobrychis maderaspi. nummulariae folio, ornithopodii filiquis. Pet. gaz. 41, t. 26, f. 4. *Raj. app.* 247.

Descr. *Caules longi, angulati, diffusi. Folia alterna, simplicia, obverse ovata sive cuneiformia, obtusa brevi acumine, glabra, petiolo brevissimo; stipulae*

subulatæ, petiolo longiores, patulæ, minime, caulem vestientes. Spicæ ex alis solitariæ longo pedunculo. Flores minimi. Legumina declinata, lunata, dorso hispida, monosperma.

289. HEDYSARUM foliis simplicibus, foliolis strobilorum cordatis obtusis.

Onobrychis indiæ orientalis, fagi foliis alternis, filiculis spica longa dispositis. Pet. mus. 788. Raj. hist. 3. app. 234.

Carpinus zeylanica filiculosa five arbuscula zeylanica filiculosa carpino similis. Burm. zeyl. 54. (synon. non.)

Carpinus zeylanica. Herm. zeyl. 53. 70.

Descr. Arbor foliis oblongo-ovatis, simplicibus, alternis, integerrimis, petiolatis; stipulis subulatis; ramis teretibus. Strobili ex foliorum alis, facie Carpini, in pedunculo simplici, flexuoso, constantes Bracteis cordatis, subsessilibus, obtusis, numerosis, imbricatis, facie involucri Commelinæ, magnis, intra quas (singulas) floris rudimentum; hisce strobilis ab omnibus distinguitur & maxime a 292 specie.

290. HEDYSARUM foliis simplicibus ovatis obtusis integerrimis. *Hort. cliff. 499.*

Hedysarum monospermum zeylanicum pediculatum, Burm. zeyl. 114.

Hedysarum humile, capparidis folio maculato. Dill. elth. 170. t. 141. f. 168.

Descr. Non occurrit inter plantas zeylanicas Hermannii, frequens tamen hodie in Hortis Botanicis.

291. HEDYSARUM foliis binatis petiolatis: floralibus sessilibus.

Hedysarum bifolium, siliquis articulatis echinatis. Burm. zeyl. 14.

Hedysarum minus diphyllum. Sloan. flor. 73. hist. 1. p. 185. Raj. app. 450.

Onobrychis maderaspatana diphyllis, filiculis clypeatis hirsutis, minor. *Pluk. alm. 270. t. 246. f. 2.*

Planta bifolia humirepa indica, foliis in propriis furculis dipetalis, glöbulis feminalibus monospermis. *Ray app. 404.*

Planta bifolia humirepa, ari folio, flosculis aureis villosis articulatis. *Comm. mal. 54.*

Nelam-mari. *Rheed. mal. 9. p. 161. t. 82.*

Mahafwænna. *Herm. zeyl. 18. 59.*

β Hedyсарum bifolium, foliolis ovatis, filiculis asperis geminis inarticulatis. *Burm. zeyl. 114. t. 50. f. 1.*

Descr. *Caules teretes, procumbentes, versus radicem ramosi. Petioli filiformes, longitudine foliorum. Folia conjugata seu binata in singulo petiolo, petiolulis brevissimis adfixa, subovata, altero latere angustiore. Ex alis pedunculi longitudine foliorum, duos aut tres flores ferentes, singulos inter par foliorum sessilium & magis acuminatorum enatos. Legumina compressa, articulata, ex tribus vel quatuor articulis subrotundis, echinatis.*

292. HEDYSARUM foliis ternatis; foliolis strobilorum conjugatis orbiculatis.

Hedyсарum trifoliatum frutescens, flore & fructu inter duo foliola rotunda absconditis. *Burm. zeyl. 116. t. 52.*

Onobrychis maderaspatana triphylla, filiculis eleganter foliaceis. *Pet. mus. 790. Raj. hist. 3. app. 234.*

Onobrychis indica triphyllis, foliis amplis mucronatis, filiquis parvis in spicam longam ex alis inter bina foliola circinata arcte conniventia reconditis. *Pluk. amalth. 161. t. 433. f. 7.*

Palæghas. *Herm. zeyl. 36.*

Descr. *Caulis frutescens. Rami obtuse angulati. Stipulæ ovatæ, acuminatæ, scissæ, caducæ. Folia ternata petiolis brevibus: proprio intermedio petiolo longiore. Foliola lateralia subrotundo-ovata; in-*

termedium quadruplo majus, ovato-oblongum, obtusum; omnia margine repanda. Spicæ seu Coni ex alis folio longiores, constantes ex pedicellis alterne distichis, brevibus, in quibus flosculi aliquot erecti, & hos includentia foliola duo, orbiculata, sessilia (in pedicello) margine repanda, conniventia in unum. Legumina glabra, duobus tribusque articulis.

293. HEDYSARUM foliis ternatis, pedunculis umbelliferis, caule fruticoso.

Hedysarum trifoliatum arborescens, floribus ex alis foliorum, siliquis copiosis glabris. *Burm. zeyl.*

115. t. 51.

Waldamini, Mahapilæ. *Herm. zeyl. 21.*

Descr. *Frutex ramis lignosis: inferioribus teretibus, fuscis, superioribus angulatis, villosis. Folia petiolata, ternata: foliolis ovatis, petiolatis, intermedio duplo majore. Pedunculi ex alis foliorum umbellulam ferentes, solitarii, petiolis breviores. Flores albi. Legumina articulata, compressa, levia, recurva.*

294. HEDYSARUM foliis ternatis, floribus spicatis, leguminibus articulis pluribus: infimis uno, stipulis setaceis.

Hedysarum trifoliatum, siliculis inferibus solitariis, superioribus articulatis. *Burm. zeyl. 117. t. 53. f. 1.*

Hedysarum triphyllum zeylanicum rotundifolium. *Herm. zeyl. 35.*

β Hedysarum trifoliatum arborescens, floribus spicatis, foliis subrotundis: subtus lanuginosis. *Burm. zeyl. 115.*

Ætundupyali. *Herm. zeyl. 22.*

Descr. *Caules teretes, duriusculi. Stipulæ acuminatæ in setam. Folia ternata, petiolata & petiolulata, intermedio productiore. Foliola ovato-oblongiuscula, obtusa. Spicæ florum angustæ. Legumi-*

na inferiora unico articulo, reliqua pluribus, hinc undulatis.

Obf. Varietas β magis procumbens, foliola obtusiora; sed non video notam, qua distingui possit aut debeat. Legumina infima non semper unico articulo, tum difficile cognoscitur.

295. HEDYSARUM foliis ternatis, leguminibus membranaceis lævibus integris, caule ramisque hispidis.

Hedysarum trifoliatum viscosum, filiquis articulatis peltatis. *Burm. zeyl.* 114.

Hedysarum zeylanicum trifoliatum viscosum, phaseoli folio subrotundo, filiculis compressis hirsutis. *Herm. zeyl.* 36.

Phaseolus viscosus, spicato flore ac fructu villosus. *Burm. zeyl.* 187.

Descr. Caulis fruticosus. Folia ternata, petiolis longiusculis: foliola tenuia, lata, rhombeo-rotundata, intermedio duplo majore. Rami summi pilis patulis viscidis hispidi. Legumina ovali-oblonga, membranacea, lævia, utrinque obtusa. Adeoque admodum adfinis est Hedysaris 1. 2. *Hort. cliff.* 365. sed differt, quod non altera sutura sinuatum sit legumen, sed utrinque integrum.

296. HEDYSARUM foliis ternatis, caule suffruticoso, leguminum articulis duobus.

Hedysarum triphyllum, filiculis glabris peltatis geminis inarticulatis. *Burm. zeyl.* 114. t. 50. f. 2.

Hedysarum zeylanicum angustifolium triphyllum, filiculis compressis articulatis. *Herm. zeyl.* 31.

Onobrychis zeylanica trifolia minor perennis. *Raj. app.* 457.

Undupyali alia species, folio longiore. *Herm. zeyl.* 5.

Descr. Caulis fruticosus. Folia ternata trifolii; foliolis ovato-oblongis, glabris, subæqualibus. Flores

spicati. Legumina villosa, ex duobus articulis orbiculatis sæpius composita.

297. HEDYSARUM foliis ternatis, foliolis obverse cordatis, pedunculis unifloris ternis.

Hedysarum trifoliatum repens, acetosellæ folio glabro, caule hirsuto. *Burm. zeyl.* 119. t. 54. f. 2.

Hedysarum trifoliatum maderaspatanum, lujulæ folio, ferri equini filiquis. *Pet. mus.* 649.

Undupyali. *Herm. zeyl.* 2. 4. bis.

β Hedysarum trifoliatum repens, folio ovali glabro, caule hirsuto, filiqua plana articulata. *Burm. zeyl.* 118. t. 54. f. 1.

γ Hedysarum procumbens γ trifolii fragiferi folio. *Dill. elth.* 172. t. 142. f. 169.

Hedysarum trifoliatum repens filiculis compressis glabris crenatis. *Herm. zeyl.* 38. *Burm. zeyl.* 116.

Undupyali majus. *Herm. zeyl.* 5.

Descr. *Herba procumbens & diffusa: ramis filiformibus, longissimis, ramosis, facie Medicaginis 2: dæ Flor. Suec.* 621. Folia ternata, foliolis subæqualibus, obverse ovatis, minimis in hac gente, glabris. Pedunculi ex alis foliorum sæpius tres, capillares, singuli uniflori, raro bifidi sive biflori. β. γ. majores & foliola minus cordata.

ÆSCHYNOMENE.

298. ÆSCHYNOMENE caule scabro, folio infimo quadripinni. *Hort. cliff.* 365.

Hedysarum annuum majus zeylanicum, mimosæ foliis. *Journes. inst.* 402. *Burm. zeyl.* 119.

Onobrychis annua zeylanica mimosæ foliis, filiquis articulatis asperis, major. *Herm. lugdb.* 458.

Mimosa non spinosa major zeylanica. *Breyn. cent.* 51. t. 52. *Raj. hist.* 982.

Mahadya. Hyambula. *Herm. zeyl.* 41.

β Galega indica, filiquis articulatis, foliis latioribus, ramulis ad exortum alatis. *Burm. zeyl.* 103.