

vant complètement distinct des pièces constitutives du labre.

M. J. Mabile communique la note suivante :

Molluscorum novorum diagnoses succintæ,
auctore JULES MABILLE.

1. *HYALINA ROCHEBRUNI*, J. Mabile in *Musceo Parisiensi* 1881. Testa late umbilicata, depressa, argute striatocostulata, sat fragili, subdiaphana, haud nitente, rubescente ac maculis luteolis sparsis ornata; spira convexiuscula, prominula, apice minuto, lævigato; anfr. 5-6 sat celeriter regulariterque crescentibus, convexiusculis, sutura impressa separatis; ultimo majore, non descendente, rotundato, versus aperturam obscure angulato, subtus subinflato; apertura obliqua, lunata, intus albescente, transverse ovalis; peristomate recto, acuto, marginibus arcuatis, columellari subpatente. Diam. maj. 11; min. 8 1/2; alt. 4; *l'Île de Gomera l'une des Canaries où il a été recueilli par le Dr Verneau.*

2. *HELIX AGLAOMETA*, J. Mabile in *Mus. Par.* 1881. Testa perforata, depressa, solida, opaca, nitidiuscula, irregulariter denseque striata, e griseo rufescente, zonulis nigris subinterruptis ac maculis corneis, ornata; spira convexiuscula, apice minuto, lævigato, nitido, luteoloque; anfr. 5-6 convexiusculo depressis, sat regulariter rapideque crescentibus, sutura angusta separatis; ultimo magno, declivi rotundato, versus aperturam dilatato, subtus convexiusculo, non descendente; apertura parum obliqua, lunato-rotundata; peristomate acuto, recto, intus tenuiter incrassato, marginibus subdistantibus, bene arcuatis, columellari patulo, perforationem subtegente. Diam. maj. 10; min. 9; alt. 5 1/2 mill.; *dans l'Île de Ténériffe : Dr Verneau.*

3. *HELIX PHRYGANOPHILA*, J. Mabile in *Mus. Paris.* 1881. Testa anguste umbilicata, conico-globosa, solida, nitida,

exilissime costulato-striata, alba, supra fasciis flammisque purpurescentibus, subtus zonulis evanescentibus ornata; spira conoidea, elata, apice minuto, lævigato; nitido, acuto, purpureo-nigricante; anfr. 6 1/2 regulariter celeriterque crescentibus, parum convexiusculis, sutura distincta, crenata, separatis; ultimo majore, convexo-rotundato, ad aperturam non descendente, subtus convexo; apertura obliqua, lunata, transverse ovali, marginibus convergentibus, lamina tenuissima junctis; peristomate recto, acuto, intus albo-labiato; margine dextro parum basali magis, curvato, columellari ad insertionem anguste patulo. Diam. maj. 10; min. 8 1/2-8 3/4; alt. 6 1/2 mill.; *Ténériffe à Buenavista : D^r Verneau.*

4. HELIX NUBIVAGA, *J. Mabilie in Sched. 1875.* Testa umbilicata, parvula, depresso-convexa, fragili, subpellucida, e corneo-fusca, pilis brevibus, caducissimis induta, plerumque limo inquinata; spira convexiuscula; anfr. 4 sat convexiusculis regulariter crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo majore ad peripheriam angulato, subtus convexiusculo; apertura obliqua, lunato-ovalis, marginibus approximatis; peristomate simplici, recto, tenui; margine columellari paululum dilatato. Diam. maj. 5; min. 4 1/2; alt. 2 1/2 mill.; *Ténériffe.*

5. HELIX EVERGASTA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata, subgloboso-conica, solida, subnitente, e luteo-rufescente ac zonulis 4 fuscis parum conspicuis ornata, irregulariter costulato-striata lineisque densissimis, oculo armato solum conspicuis; ac granulis minimis munita; spira conica, prominente, apice minuto, obtuso, concolore, rugoso; anfr. 5, convexiusculis sat regulariter rapideque crescentibus, sutura subimpressa, albo filosa et crenulata separatis; ultimo magno, rotundato-declivi, subangulato, ad aperturam longe ac sublente descendente subitoque deflexo, fortiter perconstricto; apertura perobliqua, irregulariter lunato-ovalis; peristomate non reflexo, late subplano expanso, intus candido, extus lutescente; marginibus approximatis callo albo plus minusve crasso junctis, externo late curvato, columellari

rectiusculo, denticulato, adnato, ad umbilicum callose appresso. Diam. maj. 23 1/2-25; min. 20; alt. 14-15; mill.; *de l' Ile Ténériffe par M. Maugé.*

6. HELIX THORYNA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata, convexo-depressa, subfragili, tenuiscula, subopaca, haud nitente, e viridi rubescente, zonulis evanidis 3 notata; spira convexa, parum prominente, apice luteolo, obtuso, punctulato; anfr. 5 planulato-declivibus, subregulariter crescentibus, sutura distincta separatis; ultimo magno, subacute carinato, versus aperturam rotundato (carina evanescente) paululum inflato, vix constricto; apertura obliqua, lunata oblongo-rotundata; peristomate intus subincrassato, acuto, expanso, marginibus convergentibus, externo angulatim arcuato, columellari paululum incrassato, appresso, ad umbilicum callose adnato. Diam. maj. 21-23; min. 18; alt. 10, mill.; *Ténériffe : M. Bourguignat.*

7. HELIX IDIOTRYPA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata convexo-depresso subglobosa, solida, opaca, haud nitente, e viridulo albescente, irregulariter malleato et rugose plicato-striata, spira concava, parum prominente, apice rugoso, obtuso, decorticato, concolore; anfr. 5, irregulariter (primis 1-3 planulati, sublente, ceteri convexiusculi, rapide) crescentibus, sutura lineari praesertim in ultimis impressa, separatis; ultimo magno, ad peripheriam subacute angulato, versus aperturam turgidulo-rotundato, oblique subdilato, paululum constricto, abrupte descendente, subtus complanato nitido; apertura obliqua, lunata, subquadrato ovali; peristomate crassiusculo, intus albo labiato, acuto, plane expanso, marginibus subconvergentibus, externo angulatim arcuato, columellari rectiusculo, excavato, longe adnato. Diam. maj. 20; min. 18; alt. 9 1/2 mill.; *Ténériffe : M. Bourgueau.*

8. HELIX HEDEIA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata late depresso subglobosa, opaca, crassa, haud nitente, e rufescente brunneo, 1-3 zonulis evanidis, brunneisque cincta, striata (striæ granulosaë); spira subde-

presso convexa, apice valido, obtuso, impressulo, lævigato; anfr. 5 subregulariter (primi planulati, ceteri convexi) crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo maximo, rotundato, linea subprominula cincto, ad marginem paululum complanato, versus aperturam angulatim turgido, parum constricto, abrupte descendente; apertura obliqua, lunata, transverse suboblonga; peristomate crasso, intus labiato, plane expanso, margine externo arcuato, columellari angulatim adnato, intus longe subdentato, callose appresso. Diam. maj. 25; min. 22; alt. 12 mill., *Ténériffe* : Dr. Verneau.

9. HELIX HELYGAIA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881*. Testa imperforata, depresso-conica, solida, rude stricta ac in speciminibus adultis lineis decurrentibus plus minusve conspicuis ornata; spira late convexa, apice obtuso; anfr. 5 parum convexiusculis, irregulariter (primi rapide, ceteri velociter) crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo maximo, turgidulo, linea parum prominente subcarinato, versus aperturam compresso, angulatim dilatato ac constricto; apertura obliqua, lunata, parvula, obscure subquadrata; peristomate incrassato, subduplicato, marginibus subconvergentibus, lamina crassiuscula junctis, columellari longe appresso, ad umbilicum callose adnato cum externo angulo obtuso juncto; externo sinuatim curvato. Diam. maj. 25 1/2; min. 21-22; alt. 14, mill.; *Ténériffe* : Dr. Verneau.

10. HELIX IDRYTA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881*. Testa imperforata, depresso-conica, opaca, striata, striisque decurrentibus parum conspicuis ornata, quandoque obscure subgranulata; spira conica, parum elata; apice minuto, obtuso, punctato; anfr. 5 parum depressis, sat regulariter rapideque crescentibus, sutura subimpressa separatis; ultimo maximo, angulato, versus aperturam declivi ac leviter abrupteque descendente, subtus convexo inflato; apertura obliqua, lunata, ovata; peristomate duplicato, reflexo, marginibus convergentibus, externo sinuoso, tuberculato, subangulato, columellari crasso late appresso expansoque, perforationem occultante.

Diam. maj. 19-25 ; min. 21 ; alt. 12 1/2-13 mill. ; *Ténériffe* :
Dr Verneau.

11. HELIX CARDIOBOLA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1884.*
Testa imperforata, depresso-subconoidea, crassa, striis parum conspicuis ornata, quandoque punctata ; spira depresso-conica, apice obtuso, minuto ; anfr. 5 subdepressis irregulariter (primi minuti, lente, ceteri, præsertim ultimus, rapidissime) crescentibus, sutura impressa separatis ; ultimo magno, desuper aspecto, versus aperturam subdilato ac paulo inflato, lateraliter compresso, subtus gibboso ; apertura obliqua, subovali ; peristomate crasso, vix reflexo, intus extusque labiato ; marginibus subremotis, externo bidentato, columellari subexcavato, longe adnato, late expanso, perforationem occultante. Diam. maj. 22-23 ; min. 18-20 ; alt. 12 mill. ; *Ténériffe* : *Dr Verneau.*

12. HELIX HEDONICA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1884.*
Testa imperforata depresso-conica, subglobosa, solida, opaca, costulato-striata ac irregulariter minute malleata ; spira convexo-conica parum elata, apice obtuso, rugose punctulato ; anfr. 5 convexiusculis, irregulariter (1-4 rapide, 5 rapidissime) crescentibus, sutura impressa separatis ; ultimo maximo, angulato, lateraliter compresso, antice oblique turgidulo, subtus complanato turgido, ad aperturam subito deflexo ac constricto ; apertura parum obliqua, lunata, oblongo-subquadrata, marginibus subconvergentibus callo tenui junctis ; peristomate obtuso, subreflexo, incrassato, margine columellari subrecto angulatim adnato, ad insertionem callose appresso, externo curvato. Diam. maj. 24-27 ; min. 21-22 ; alt. 12-14 mill. ; *Ténériffe* : *Dr Verneau.*

13. HELIX THESPESIA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1884.*
Testa imperforata, depresso-suborbiculata, tenui parum nitente, oculo armato late costulato-striata ac irregulariter crispato-malleata, e corneo-rufo vel viridescente ; spira subdepressa, apice subacuto, erubescente, obscure punctulato ; anf. 4 1/2-5 convexiusculis ; subregulariter

(primi rapide ceteri rapidissime) crescentibus; sutura impressa obscure marginata quandoque albo-filosa junctis; ultimo magno, primum angulose rotundato, demum rotundato, breviter lentèque descendente, subtus parum inflato; apertura obliqua, lunata, transverse oblongo-ovata, marginibus subdistantibus; peristomate acuto, breviter reflexo intus albo subincrassato, marginibus subparallelis, columellari longe adnato, late expanso, callo albo umbilicum occultante. Diam. maj. 18-19; min. 16-16 1/2; alt. 8-9 mill.; *Les Canaries*: Dr Verneau.

14. HELIX HEDYBIA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881*. Testa imperforata, depresso globosa, solida, striatula, oculo armato punctulata, vel irregulariter malleato crispata, haud nitente, rosacea; spira globuloso-convexa, parum prominente, apice obtuso, concolore, lævigato; anfr. 5 convexis, irregulariter (primi lente, penultimus celeriter, ultimus rapidissime crescentibus) sutura impressa separatis; ultimo rotundato, abrupte descendente, versus aperturam angulatim dilatato, non gibboso, linea dorsali paulo infra medio subimpressa; apertura obliqua, transverse ovali, marginibus subconvergentibus, peristomate acuto, albo, intus incrassato, margine externo incurvato, columellari angulo parum conspicuo juncto, columellari sub recto, planulato, adnato. Diam. maj. 18-20; min. 15-16; alt. 9 1/2-10 mill.; *Les iles Canaries*: Dr Verneau.

15. HELIX ETHELEMA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881*. Testa imperforata, depresso subglobosa, crassa, haud nitente, irregulariter striata ac granulis densis minimis undique exasperata, zonulis parum conspicuis interruptis quinque fasciata, spira subconvexa, apice obtusulo, nitido, granuloso; anfr. 5 irregulariter (primi 1-2 subdepresso-planulati, 3 convexiusculus, rapide, ceteri complanato-rotundati rapidissime) crescentibus, sutura impressa quandoque subcrenulata junctis; apertura obliqua, lunata, oblongo-ovata, marginibus subparallelis, paululum approximatis, callo sat crasso, albo, punctulato; junctis; peristomate crasso, late subplano-reflexo, margine externo longe curvato cum basali angulo obtuso juncto;

columellari adnato, intus longe dentato ad insertionem callo crasso appresso. Diam. maj. 27; min. 20-21; alt. 13 mil.; *Grande-Canarie*: *M. Ripoché*.

16. *HELIX PERRIERI*, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1884*. Testa imperforata, depresso-conica, crassa, opaca, subacute carinata, oculo armato, minutissime decussata, costulato striata; spira conica, parum elata, apice obtuso, punctulato; anfr. 5 1/2 convexo-declivibus, irregulariter (1-3 celeriter, 4 rapide, ultimus rapidissime) crescentibus, sutura lineari separatis; ultimo maximo, angulato, ad aperturam compresso-dilatato ac subito constricto, subtus oblique convexo-turgido; apertura subhorizontali, lunata, oblongo-ovata, marginibus distantibus, callo crasso junctis; peristomate crasso, bilabiato, extus reflexo, margine dextro arcuato, columellari adnato incrassato ad insertionem calloso appresso. Diam. maj. 30; min. 25-25 1/2; alt. 14 1/2; *Ténériffe*: *Dr Verneau*.

17. *HELIX CACOPLASTA*, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1884*. Testa imperforata subdepresso-globulosa, crassa opaca, ad peripheriam obtuse angulata, haud malleata nec granulata, irregulariter striata; spira convexo-conoidea, parum prominente, apice obtuso, lævigato, anfr. 5 1/2 convexo-rotundatis sat regulariter rapidissimeque crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo maximo, primum compresso rotundato, demum rotundato tumido, versus aperturam paululum constricto, subtus turgidulo, breviter rapideque descendente; apertura parum obliqua, lunata, late oblongo-subrotundata, marginibus subdistantibus, callo crassiusculo junctis, peristomate crasso, vix reflexo, intus labiato, margine externo sinuose curvato, columellari adnato, angulatim incrassato, ad insertionem breviter excavato et callose appresso. Diam. maj. 30; min. 25; alt. 18 mill.; *Ténériffe*: *Dr Verneau*.

18. *HELIX CALLIPONA*, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1884*. Testa imperforata, conoideo-subglobosa, crassa, opaca, dense costulato-striata; spira conica, sat prominente, apice obtuso, valido, lævigato; anfr. 6 convexi-declivibus,

regulariter rapidissimeque crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo magno, carinato, plus minusve compresso-rotundato, subtus convexo, ad aperturam deflexo; apertura obliqua subparvula, lunata, oblongo-rotundata, marginibus subdistantibus callo tenui junctis, peristomate crasso, labiato, convolute reflexo, marginibus curvatis, columellari angulatim adnato ad insertionem callose late appresso. Diam. maj. 28-30 $\frac{1}{2}$; min. 23 $\frac{1}{2}$ -25 $\frac{1}{2}$; alt. 16-17 mill.; *Ténériffe* : Dr Verneau.

19. HELIX VERNEAUI, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1884.* Testa imperforata subgloboso-depressa, solida, opaca, oblique arcuatim plicato-striata; spira conoidea, subprominente, apice obtuso valido, substriato; anfr. 5-6 subrotundatis, irregulariter (primi celeriter ceteri rapidissime) crescentibus sutura simplici anguste impressa separatis, ultimo magno, angulato, supra compresso, versus aperturam turgidulo (carina evanescente) ac paululum constricto, subtus parum inflato, subito ac brevissime deflexo; apertura parum obliqua, late lunato-ovata; peristomate crasso, subbilabiato, acute reflexo, marginibus subapproximatis, margine externo curvato, columellari adnato ad insertionem callose appresso, longe incurvato. Diam. maj. 28 $\frac{1}{2}$ -30 $\frac{1}{2}$; min. 24-25; alt. 14 $\frac{1}{2}$ -15 mill.; *Ténériffe* : Dr Verneau.

20. HELIX PSATHYROPSIS, *J. Mabilie in sched. 1879.* Testa imperforata, crassiuscula, solida, subopaca, costulato-striata, ac granulis minimis undique exasperata, zonulis latis albo vel luteo interruptis quadrifasciata; spira conica, parum prominente, apice minuto, sublævigato nitido, obtuso; anfr. 5 convexis, subregulariter (primi lente ceteri rapide) crescentibus, sutura crenata luteoque filosa junctis; apertura obliqua, lunata, oblique longe ovata, marginibus approximatis; peristomate reflexiusculo, intus incrassato, carneolo; margine externo subsinuatum arcuato, columellari rectiusculo, appresso, dente albo elongato minuto, ad insertionem excavato calloseque appresso. Diam. maj. 22; min. 19; alt. 11 mill.; *Grande-Canarie* : a dom. Tarnier accepta.

21. HELIX EMPEDA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata, crassa, opača, striato-costulata; spira conica, sat prominente, apice mamillato, obtuso, punctulato; anfr. 5, convexo-declivibus, regulariter rapidissimeque crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo magno, rotundato-inflato, linea dorsali obscure angulato, ad aperturam compresso declivi, parum constricto, rapideque descendente, subtus turgido; apertura perobliqua, lunata, irregulariter rotundata, marginibus distantibus; peristomate recto, crasso, reflexiusculo intus labiato, margine externo medio oblique dentato, angulatim curvato, basali arcuato, lamina parum prominente munito, angulo obtuso juncto, basali brevi, adnato, callose appresso. Diam. maj. 25; min. 20; alt. 16 mill.; *Grande-Canarie*: *Dr Verneau.*

22. HELIX POIRRIERI, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata, depresso-conica, solida, striata, haud malleata nec granulata, spira conica sat elata, apice minuto, obtuso; anfr. 5 subdepresso convexiusculis, irregulariter (1-3 regulariter rapideque, ceteri rapidissime) crescentibus, sutura simplici bene distincta separatis; ultimo maximo, angulato, antice oblique compresso-rotundato, perconstricto, abrupte descendente, subtus convexo-inflato; apertura obliqua, irregulariter transverse ovali; peristomate incrassato, obtuso, dentato, marginibus callo crasso junctis, dextro sinuoso, bidentato, columellari subrecto, angulatim adnato, late expanso perforationem occultante. Diam. maj. 21-25 1/2; min. 20-21; alt. 13 mill.; *Ténériffe*: *Dr Verneau.*

23. HELIX GLYCEIA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata, subgloboso depressa, crassa, irregulariter striata quandoque obscure granulata; spira obtuse conica, apice mamillato, lævigato; anfr. 5 depresso-convexiusculis, sensim crescentibus, sutura lineari separatis; ultimo magno, angulose rotundato, versus aperturam oblique dilatato, abrupte breviterque deflexo, subtus turgido. Apertura obliqua, lunata, irregulariter subquadrata; peristomate crasso, revoluto, intus extusque la-

biato, marginibus non approximatis callo tenui junctis, externo angulatim curvato, medio tuberculato, columellari longe appresso ad insertionem callose expanso excavatoque. Diam. maj. 26-30; min. 23-25; alt. 15 1/2 mill.; *Ténériffe* : *Dr Verneau*.

24. HELIX EVERGETA, *J. Mabilie in Mus. Paris, 1881*. Testa imperforata convexo-orbiculata, crassa, parum nitente, striatula, irregulariter malleata præsertim in anfractu ultimo ac tuberculis minutissimis undique exasperata, zonulis maculis albidis plus minusve interruptis quadrifasciata; spira convexo-depressa, apice minuto, punctulato, obtuso parum nitente; anfr. 5 convexo-depressis, irregulariter (primi rapide ceteri rapidissime) crescentibus, sutura lineari junctis; ultimo maximo, compresso-rotundato, subito deflexo, parum constricto, subtus convexo; apertura obliqua, lunata, oblique irregulariter oblongo-subovata; peristomate obtuso, fortiter incrassato reflexoque, sordide carneo; marginibus sub approximatis callo tenui junctis, externo sinuatim curvato cum basali angulo obtuso juncto, basali adnato, longe contorte lamellato; columellari brevissimo callose appresso. Diam. maj. 24; min. 19; alt. 11 mill.; *Grande-Canarie* : *M. Ripoche*.

25. HELIX EPHORA, *J. Mabilie in Mus. Paris, 1881*. Testa imperforata, subgloboso-turbinata, crassa, solida, opaca, costulato-striata, undique minute malleato-punctulata; spira sat prominente, apice obtuso, lævigato; anfr. 5 convexiusculis, sat regulariter rapide que crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo magno, angulato, versus aperturam compresso-rotundato, constricto; apertura obliqua lunata, subovato triangulari; peristomate crasso, reflexo, marginibus approximatis, externo sinuoso-subdentato versus columellarem obtuse angulato, columellari arcuato, appresso, callo mediocri umbilicum occultante. Diam. maj. 19 1/2; min. 16; alt. 11 mill.; *Ténériffe* : *Dr Verneau*.

26. HELIX GANODA, *J. Mabilie in Mus. Paris, 1881*. Testa

late pervie umbilicata, discoideo-depressa, subfragili, opaca, e corneo-rufescente, supra irregulariter costulato-striata, parum nitida, infra nitidiuscula; spira subprominula, apice obtuso, nitido, lævigato; anfr. 7 sat regulariter rapidissimeque crescentibus, sutura impressa separatis, ultimo magno ad peripheriam rotundato-angulato, supra compresso, non descendente; apertura obliqua, lunato-rotundata; peristomate recto, acuto, non incrassato nec labiato, marginibus distantibus. Diam maj. 9; min. 8; alt. 3 1/2 mill.; *Gomera*: Dr Verneau.

27. HELIX BATHYCOMA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata, depresso-subglobosa, crassa, opaca, haud nitente, brunnea, zonulis 4 saturatoribus ornata, costulato-striata, in junioribus pilis squamiformibus densis munita, in adultis squamulis granulosis undique exasperata; spira regulariter convexa, parum prominente, apice rugoso, nitidiusculo, obtuso, purpurascente; anfr. 4 1/2, 5 convexo-depressis, regulariter rapideque crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo magno, rotundato, antice constricto, subtus convexo-planulato, rapide descendente; apertura obliqua, lunata, late irregulariter oblongo-ovata, marginibus subapproximatis; peristomate acuto, intus valde labiato, e carneo violacescente, late planeque reflexo, margine externo arcuato basali angulo plus minusve conspicuo juncto, basali rectiusculo, crasso, adnato, intus lamina quandoque prominuta instructo, ad insertionem callose appresso. Diam. maj. 22-23; min. 18-19; alt. 10 1/2-11 mill.; *Grande-Canarie*: M. Ripoché.

28. HELIX RIPOCHI, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata, convexiusculo orbiculata, striata, quandoque decussata præsertim ad suturam anfractus ultimi, tenuiter regulariterque vermiculis albis malleato punctata ac undique granulis minimis induta, fasciis 5 violaceis interruptis fasciata; spira convexiuscula, subprominente, apice obtusulo, nitido punctulato-rugoso, purpurascente; anfr. 4, convexiusculis irregulariter (primi regulariter rapideque, ultimus rapidissime) crescentibus,

sutura distincta separatis; ultimo maximo, compresso-rotundato, subconstricto, rapide descendente; apertura parum obliqua, lunata, elongato-ovata, subangusta, marginibus subparallelis non approximatis; peristomate perincrassato, intus labiato, convolute reflexo, rosaceo tincto, margine exteriori sinuatim curvato, basali rectiusculo, longe adnato, planulato, intus lamina valida armata ad insertionem fortiter calloso appressoque. Diam. maj. $24 \frac{3}{4}$; min. 20; alt. 12 mill.; *Grande-Canarie*: *M. Ripoché*.

29. HELIX OPTHALMORYCHA, *J. Mabilie in sched. 1880*. Testa subanguste pervie umbilicata, depressa, orbiculari, crassiuscula, solidula, subopaca, alba, costulis elevatis æquidistantibus supra et subtus ornata (interstitiæ costularum striatæ; spira subprominula, apice subplanato, minimo, nitido, lævigato, luteoque tincto; anfr. 5 subregulariter (1-2 convexiusculi, 3 subplanulatus, 4-5 convexiusculi) crescentibus, sutura lineari, crenulata separatis; ultimo majore, acute carinato (carina crenulata), subtus convexo, adumbilicum obscure angulato, ad basin carinæ impresso, lineaque circumdato; apertura obliqua, lunata, trapeziali, marginibus subdistantibus; peristomate acuto, recto, margine externo rectiusculo, ad carinam angulato, basali concave arcuato; Diam. maj. 8; min. 7; alt. $2 \frac{1}{2}$ mill.; *Les Canaries*: *Dr Jousseau*.

30. HELIX CARTA, *J. Mabilie in sched. 1879*. Testa imperforata, crassa, opaca, striata ac undique ruditer malleata, spira conoidea, prominente; apice obtuso, lævigato; anfr. 5 convexis, regulariter rapidissimeque crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo maximo, rotundato, antice turgidulo et paululum dilatato, subtus convexo; apertura obliqua, lunata, oblongo-ovata, marginibus subdistantibus; peristomate acuto, reflexo, intus incrassato; margine externo subangulatim curvato, columellari incrassato, longe appresso, intus fortiter lamellose dentato ad umbilicum expanso callose appresso. Diam. maj. 29-31; min. 24-25; alt. 16-18 mill.; *Grande-Canarie à Puerto-la-Luz, a dom. Tarnier accepta*.

31. HELIX CHERSA, *J. Mabille in sched. 1879*. Testa imperforata, depresso-orbiculata, solida, opaca, haud nitente, e griseo-rufescente ac costulis laminiformibus æquidistantibus ornata (interstitiæ costularum rugoso vel minutissime granulosa), quandoque linea rufula ad peripheriam cincto, spira depresso-conoidali, apice valido obtuso, ruguloso; anfr. 4-5 irregulariter (primi convexiusculi, lente, 4 convexo-planulatus rapidissime) crescentibus, sutura lineari ad ultimum impressa separatis; ultimo maximo, carinato, versus aperturam compresse inflato, subtus convexo, breviter ac subito descendente; apertura obliqua, lunata, elongato-ovata, marginibus approximatis; peristomate livido, late plane expanso, acuto, subreflexo, intus incrassato, margine externo regulariter curvato, columellari subrecto, intus longe subdentato, adnato, ad insertionem callose appresso. Diam. maj. 23; min. 18; alt. 10 mill.; *Ténériffe: Dr Rambur*.

32. HELIX THAUMALEA, *J. Mabilla in sched. 1881*. Testa imperforata, subglobosa, solida, parum opaca, striata, undique minutissime granulata ac superficialiter obscure crispato malleata, subtus læviuscula, rubescente, maculis litterisque albidis notata, 4-5 zonulis fuscis vel nigricantibus plus minusve saturatoribus interruptisque ornata; spira convexo-depressa, parum prominente, apice rubello, obtusulo, nitido, rugoso-punctato; anfr. 5 irregulariter (1-3 convexiusculi regulariter, 4 rapidissime, 5 turgido-inflatus velociter) crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo permagno, rotundato-tumido, subtus convexo inflato, ad aperturam lente descendente subitoque deflexo; apertura perobliqua, lunata, suboblongo-ovata, marginibus subapproximatis, callo crassiusculo junctis; peristomate crasso, dilatato, e sordide albescente, luteo-lique tincto, intus fortiter incrassato; margine externo regulariter curvato, columellari contorto, nitidissimo, dente lamelloso elongato instructo, adnato, ad insertionem callo crasso, nitido, perforationem occultante appresso. Diam. maj. 31-33 1/2; min. 24-25; alt. 14 1/2-16 mill.; *Lanzarote: Dr Rambur; M. Ripoché*.

33. HELIX HIEROPHANTA, *J. Mabilie in Mus. Paris.* Testa subdepresso-globosa, solida, crassiuscula, opaca, haud nitente, striata, oculo armato decussata, lineis aterrimis, maculis punctisque nigris, purpureis vel rufescentibus ornata; spira depresso-convexa, parum prominente, apice minutissimo, lævigato, subobtusio, nigro tincto; anfr. 4 1/2-5 subregulariter (primi convexiusculi, ceteri ad suturam planulati rapide) crescentibus; ultimo majore, rotundato-angulato, non descendente, subtus convexo, ad aperturam paululum compresso, apertura obliqua, lunata, ovato-rotundata, marginibus distantibus, peristomate recto, acuto, intus incrassato remoteque labiato; margine externo rectiusculo, basali curvato, columellari concave incurvato, breviter appresso, callo minuto nitido umbilicum claudente vel subclaudente. Diam. maj. 15 1/2-16; min. 9-14 1/2; alt. 8-11 3/4 mil.; *Ténériffe*: *M. Bourguignat.*

34. HELIX PAIVANOPSIS. *J. Mabilie in sched. 1881.* Testa umbilicata, orbiculato-convexa, solida, opaca, granulato-striata, e luteo vel fulvo-grisea fasciis castaneis maculis albis interruptis quadrifasciata; spira convexa, apice fusco; anfr. 4 1/2-5 convexiusculis sat regulariter crescentibus sutura impressa separatis; ultimo magno, compresso-rotundato, circa umbilicum turgidulo, antice deflexo; apertura perobliqua, lunata, ovali, marginibus convergentibus; peristomate incrassato, intus albo labiato, margine externo expansiusculo, basali dilatato, appresso ad umbilicum patente. Diam. maj. 18-22; min. 15-18; alt. 8-11 mill.; *in insula Gomera.*

35. HYALINA THEMERA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa mediocriter umbilicata, depressa, sublucida, nitidissima, et corneo-lutescente, stris densissimis parum conspicuis ornata, spira perdepressa, subprominula, apice minutissimo, obtuso, lævigato, nitido; anfr. 6 convexiusculis præsertim ad suturam, irregulariter (primi rapide sat regulariter, ceteri rapidissime) crescentibus, sutura impressa obscure canaliculata, distincte crenulata separatis, ultimo maximo, rotundato-compresso ad aper-

turam planulato subdeclivi, dilatato non descendente; apertura parum obliqua, lunata, ovali, marginibus distantibus, regulariter curvatis, columellari paululum incrassato; peristomate recto, acuto, non reflexo nec patente. Diam. maj. 11-12; min. 10; alt. 4-4 1/2 mill.; *Grande-Canarie*: *M. Ripoché*.

36. HELIX CRYPSIDOMA, *J. Mabilie in sched. 1879*. Testa imperforata, subdepressa orbiculata, solida, crassa, opaca, undique malleato-crispata; spira convexiuscula, parum prominente, apice obtuso, nitido, ruguloso; anfr. 5-5 1/2 convexiusculis, irregulariter (primi sat regulariter ceteri rapidissime) crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo maximo, primum angulato demum rotundato-turgidulo, versus aperturam breviter subitoque deflexo ac subconstricto, subtus tumidiusculo; apertura lunata, oblique ovato-oblonga, marginibus approximatis callo tenui junctis; peristomate intus incrassato, subrevoluto, reflexo, acuto; margine externo parum excavato deinde curvato, columellari longe adnato, intus angulatim lamina dentiformi munito, ad insertionem callose appresso. Diam. maj. 25; min. 20; alt. 14 mill.; *Puerto-la-Luz, Grande-Canarie*.

37. HELIX EMBRITHA, *J. Mabilie in sched. 1879*. Testa imperforata, conico depressa, crassa, subopaca, ruditer crispato-malleata; spira convexa, prominente, apice lævigato, nitido obtuso; anfr. 5-6 (primi convexo-declivi, ultimus compresso rotundatus) sat regulariter rapideque crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo magno, primum angulato deinde rotundato versus aperturam constricto, deflexo, subtus turgidulo; apertura obliqua, lunata, oblonga, marginibus subdistantibus subparallelis callo crassiusculo junctis; peristomate intus incrassato, late reflexo, nitido, subrevoluto; margine columellari adnato fortiter incrassato versus umbilicum late callosoque appresso, rectiusculo, lamina obtusa instructo, externo regulariter curvato. Diam. maj. 27; min. 23; alt. 16 mill.; *cum præcedente*.

38. HELIX SUBGRAVIDA, *J. Mabilie in Mus. Paris. 1881.* Testa imperforata, solida, crassa, subgloboso-depressa, undique punctulis minimis exasperata, ac costulis vix perspicuis ornata; spira cornica, sat prominente, apice minuto, obtuso; anfr. 5 convexiusculis, irregulariter (primi lente regulariterque, ceteri rapidissime) crescentibus, sutura impressa angustaque separatis; ultimo magno, primun angulato demum rotundato-turgidulo, antice subito breviterque deflexo, apertura obliqua, lunata, irregulariter ovali, peristomate late reflexo, intus leviter incrassato, marginibus subconvergentibus, callo-conspicuo subjunctis; dextro sinuoso incurvato, columellari subrecto, dente elongato munito, angulatim adnato, late expanso perforationem occultante. Diam. maj. 30-31; min. 25; alt. 17; apert. long. 12 1/2-13; lat. 11-11 1/2 mill.; *Ténériffe : Dr Verneau.*

39. HELIX EVERIA, *J. Mabilie in sched. 1879.* Testa anguste umbilicata, obscure angulata, orbiculato depressa, tenera, sat fragili, haud nitente, striata, ac cuticula rufescente decidua pilisque debilibus, densis, vestita; spira subprominula, apice lutescente, nitido, obtuso, lævigato, anfr. 5 convexiusculis (primi regulariter, sublente, ceteri rapidissime) crescentibus, sutura angusta sat impressa separatis, ultimo majore, obtuse angulato, supra rotundato-declivi subtus inflato ad aperturam vix dilatato descendenteque; apertura obliqua, lunata, transverse ovali, peristomate acuto, vix incrassatulo, reflexiusculo, intus albo sublabiato, marginibus subconvergentibus, externo dilatato reflexo, bene curvato, columellari incurvato, subincrassato umbilicum subobtegente. Diam. maj. ; min. ; alt. mill.; *in insula Teneriffa : a doctore Verneau dominoque Bourgeau lecta.*

Il est procédé aux élections pour l'année 1882.

M. Hautefeuille est nommé Président pour le premier semestre 1882.

M. Duter est nommé Trésorier, M. Pellat, Archiviste.

MM. Fouret, Paquet, Blondlot sont nommés membres de la Commission de comptabilité.