

Descriptions de Coléoptères nouveaux.

1. MELANOPHILA ANTHAXIOIDES. Marquet.

Allongé, subparallèle, fortement déprimé, d'un noir mat, paraissant bronzé par reflet. Antennes un peu plus longues que la tête et le pronotum réunis, sétacées. Tête un peu bronzée, légèrement concave, très-finement réticulée. Pronotum réticulé comme cette dernière, en carré un peu plus large que long, bisinué en devant, légèrement anguleux sur les côtés avant leur milieu, fortement sinué et enfoncé de chaque côté à la base, avec les angles non relevés en angle droit, une petite impression au devant de l'écusson et un sillon médian très-prononcé. Ecusson cordiforme. Elytres plus larges et deux fois $\frac{3}{4}$ plus longues que le pronotum, avec de petites denticules postérieurement, atténuées vers le bout et terminées en pointe aiguë, à peine dilatées sous l'épaule avec le calus rendu saillant par une grande fossette intrahumérale; elles sont densément chagrinées et ont plusieurs dépressions fovéolées comme on en remarque sur diverses anthaxies du groupe de la *morio*. — Long. 11 mill.

Cet insecte diffère de l'*Appendiculata*, par sa réticulation qui lui donne un aspect très-mat, par la forme des côtés et des angles postérieurs de son pronotum, son bord antérieur formant un angle sensible dans son milieu et par les dépressions fovéolées de ses élytres.

Deux ♂ l'un trouvé à Hyères, et l'autre dans une forêt de pins près de l'Escorial (Espagne). MARQUET.

2. DEMETRIAS SAGITTA Coye. — Long. 5 mill.

D'un jaune pâle, allongé, applati. Tête noire, luisante, un petit canal partant du devant des yeux arrive à la naissance des antennes; deux très-fines et courtes stries perpendiculaires sur le milieu du vertex; dessus des yeux et devant de la tête finement ridés; postépistome impressionné de chaque côté à la hauteur des antennes; en arrière des yeux des poils roux et quelques petits points espacés s'étendent, en forme de demi-cercle, jusque sur le vertex; le disque lisse avec un point enfoncé au milieu à hauteur du devant des yeux. Ceux-ci petits, peu saillants. Epistome ferrugineux clair; labre et man-

dibules d'un ferrugineux jaune, ces dernières noircies au bout. Pronotum finement ridé en travers ; côtés légèrement relevés, angles antérieurs arrondis ; une impression garnie d'une courte strie au dessus des angles postérieurs qui sont assez relevés, arrondis, mais saillants ; bords antérieurs finement rugueux ; un peu au dessus de la base un petit cercle formé de fines rugosités, qui se perdent de chaque côté, dans les impressions ; un sillon central s'arrête au tiers antérieur et postérieur ; un point enfoncé à la base au dessus de l'écusson. Celui-ci triangulaire, entouré d'une fine bordure brune. Elytres allongées, parallèles, rebordées, plus larges que le pronotum ; une tache brune sur la suture, ayant la forme d'un triangle aigu : le grand côté en bas ; cette tache commence au tiers antérieur et finit un peu avant le sommet ; stries n'atteignant pas l'extrémité, formées de gros points à peine enfoncés, confluent ; intervalles peu convexes avec des petits points assez espacés, irrégulièrement placés. Pygidium avec ses côtés extérieurs enfoncés, son centre relevé et deux rangs d'assez gros points au bout. Pattes jaune pâle, transparentes ; tibias antérieurs échancrés extérieurement avant l'extrémité ; cette échancrure munie d'une épine ; quatrième article des tarsi bilobé, les ongles bruns ; cinquième antérieur marqué d'un gros point placé en dessus et à l'extrémité.

Coye.

Syrie, Kab-Elias.

3. ARISTUS ELEGANS Coye. — Long. 6,8 mill.

Noir luisant, avec les antennes, les pattes, le bord antérieur de l'épistome et le labre, plus clairs ; les palpes, l'écusson, la strie basilaire, le milieu du prosternum, l'extrémité des hanches, le milieu des trois premiers segments de l'abdomen et l'anus ferrugineux. Tête large, convexe, arrondie, un peu ovalaire, couverte de gros points enfoncés, plus fins sur le vertex, confluent en rides sur l'épistome qui est carrément tronqué ; une fossette profonde en forme d'oreille, au dessus de l'insertion des antennes, reliées par un fin sillon transversal, droit. Mandibules fortes, lisses. Antennes atteignant la base du pronotum. Pronotum de la largeur de la tête, de $\frac{1}{4}$ moins long que large, rétréci de moitié postérieurement ; sillon central court, bien marqué, légèrement effacé aux

L'Abbeille VI 2^e partie 1870, mai.

3

deux extrémités, une dépression transversale ayant le bord antérieur; régulièrement couvert de gros points enfoncés, confluents, plus petits, moins serrés sur les bords antérieur et postérieur: les côtés rebordés, arrondis, se relèvent à la base où ils forment un angle droit, saillant, surmonté d'une fossette peu profonde. Elytres parallèles, légèrement convexes, aussi larges que la tête, moins larges que le pronotum; stries lisses, 6, 7 et 8 plus profondes, à peine ponctuées; intervalles plans, avec des gros et petits points entremêlés, comme enchaînés, couvrant leur surface; cette ponctuation plus enfoncée, plus rugueuse, sur les côtes; sur le neuvième quelques grosses fossettes aux deux extrémités. Dessous du prothorax et de la poitrine couverts de rugosités. Abdomen finement ponctué, finement ridé.

Syrie, Kab-Elias. Mars-avril. Sous les pierres, dans les terrains arides des hauts plateaux de Djébel Knicé, au Nord-Ouest de Kab-Elias. Rare. COYE.

4. OCHTHEBIUS TORRENTIUM Coye. — Long. 2 mill.

Oblong, convexe, d'un brun cuivreux, assez brillant en dessus, noir mat, chagriné en dessous; antennes d'un jaune-roux clair; pattes, pronotum, bouche, prosternum et une tache au sommet des élytres, ferrugineux. Tête brune, ponctuée, subtriangulaire, avec cinq fossettes: deux frontales, larges, rugueuses, marquées en arrière d'un petit bouton ferrugineux et séparées par un fin sillon, qui est formé par deux points allongés à peine séparés; deux plus petites, plus profondes en avant des yeux, se réunissent sous le sillon frontal; une moins apparente sur le vertex. Yeux gros et saillants. Epistome légèrement convexe, finement pointillé, finement rebordé antérieurement. Labre à peine échancré au milieu, très-finement pointillé. Palpes maxillaires d'un brun foncé. Pronotum deux fois moins long que large, à peine plus large que la tête les yeux compris; fortement ponctué, avec les angles antérieurs avancés en forme de dent, les postérieurs fortement échancrés; bord antérieur et base sinués, entourés d'une membrane; côtés latéraux arrondis avec une large fossette, à fond très-lisse miroitant; sillon longitudinal profond, large, effacé aux deux extrémités, avec deux fossettes rugueuses de chaque côté sur le disque: la fossette postérieure est allongée, obliquement placée, l'antérieure est isolée. Écusson brun, trian-

gulaire. Elytres de la largeur du pronotum, légèrement renflées au centre; rebordées latéralement: finement sous l'épaule et à l'extrémité, largement en forme de gouttière au milieu; épaules relevées en bosse; stries formées de gros points carrés, enfoncés, confluent: interstries lisses, étroits, convexes, effacés du tiers postérieur au sommet. Suture élevée, bronzée, brillante. Avant-dernier segment de l'abdomen luisant, marginé de ferrugineux.

Syrie. — Juin. — Dans les mousses très-courtes, immergées qui tapissent les rives du Nahr Djahha, (près la source), petite rivière torrentueuse qui passe au pied du village de Kab-Elias. COYE.

5. THORICTUS CIRCUMFLEXUS Coye. — Long. 2,5 mill.

Brièvement ovalaire, très convexe, marron brillant, aptère. Tête petite, brune, enfoncée dans le prothorax, déprimée et fortement inclinée en avant; finement et densément ponctuée, rugueusement entre les antennes, avec un enfoncement perpendiculaire, médian, peu profond. Epistome rugueux, séparé du front par une dépression transversale; bord antérieur échancré. Labre petit, transverse, finement velu en dessus. Mandibules assez robustes, bidentées à l'extrémité, s'arrondissant et se joignant en avant du labre. Palpes assez épais, courts, à articles cylindriques, d'un testacé ferrugineux. Antennes à base fovéolée, entaillée en dessous, surmontée de deux fines carènes brunes placées en triangle; aussi longues que le premier quart du pronotum au dessous; premier article très-gros, allongé, à bout globuleux, rousâtre; le deuxième moins épais, plus court, cylindrique, ferrugineux; 3° à 8° bruns, très-serrés les uns contre les autres, grossissant faiblement, mais progressivement; la massue se compose du neuvième qui est plus développé que les précédents à l'extrémité et des dixième et onzième qui sont ovalaires d'un testacé clair et velus. Pronotum très-grand, très-large, très-convexe, à ponctuation fine, espacée sur le milieu, plus rapprochée, rugueuse sur les côtes externes; les bords latéraux largement arrondis et comprimés en avant, se rehaussent vers la base, rendent les angles postérieurs bombés et forment une côte qui se dirige obliquement vers le centre du disque; base d'un brun noir, fortement appliquée sur les élytres, rebordée canaliculée avec une profonde et large impression en

arrière des angles postérieurs, lesquels sont obtusément arrondis. Ecusson d'un brun noir, triangulaire avec un sillon médian. Elytres ovalaires très-convexes, se rétrécissant progressivement en arrière, finement vermiculées avec quelques fines rides éparses; de la largeur du pronotum, de $\frac{1}{3}$ plus longues que celles-ci; parsemées de petits points finement râpeux, plus confluent sur les côtés, principalement sur les bords extérieurs des épaules où ils deviennent rugueux; base fortement appliquée contre le prothorax, avec un rebord en forme d'accolade; le milieu du premier tiers très-convexe, épaules très-saillantes en dessus, suivies intérieurement d'une large et profonde fossette rebordée, milieu du disque très-hombé, s'inclinant progressivement vers le sommet qui est arrondi; suture noire, légèrement élevée, soudée; quelques poils raides et courts, distancés, le long du bord externe. En dessous le corps est largement emboîté par les élytres. Prosternum, mésosternum et métasternum d'un brun noir, très-courts, comprimés vers le centre qui est élevé et longé par une élévation cylindrique qui donne attache aux trois paires de hanches; l'épisternum entre les hanches intermédiaires et les postérieures est presque rempli par une membrane assez épaisse, jaunâtre, qui est elle-même recouverte d'une touffe de poils soyeux de même couleur, très-serrés et courts. Abdomen convexe, parsemé de petits points finement râpeux, qui servent d'insertion à des poils très-courts d'un jaune doré; premier segment développé, très-long et très-large, très-convexe au milieu, fortement excavé sous les hanches postérieures; ces cavités couvertes de fortes et longues rides placées en éventail; deuxième à quatrième segments étroits. Le cinquième ovalaire, aussi long que les deux avant-derniers réunis, non impressionné au milieu. Pattes brunes, très-rapprochées; cuisses d'un brun ferrugineux, assez renflées en dessus, un peu comprimées en dessous, épaisses, ponctuées, velues; tibias épais, allongés, faiblement épineux; tarse en crochets, épais, les quatre premiers articles égaux, velus en dessous, le dernier légèrement plus long, légèrement courbé, bi-ongulé.

Ressemble à l'*Orientalis* par la forme, la taille et la coloration, il s'en distingue par son pronotum sans rebord, et la costule sinueuse transverse en forme de circonflexe que l'on remarque à la base de ses élytres. COYE.

Syrie, Kab-Elias.

6. THORICTUS PUBESCENS Coye.— Long. 2 2/3 mill.

Brièvement ovalaire, très-convexe, marron, brillant, parsemé de longs poils inclinés d'un jaune doré, aptère. Tête large, fortement enchassée dans le pronotum, assez convexe et inclinée en avant, à ponctuation espacée qui sert d'insertion à de longs poils couchés, d'un jaune doré; front bombé, brun. Epistome petit, assez convexe, brun; bord antérieur largement échancré, carrément tronqué sur les côtés, séparé de la tête par un enfoncement transversal assez profond. Labre court, arrondi en avant, recouvert de poils roussâtres. Palpes assez épais, courts, à articles cylindriques d'un testacé clair. Mandibules fortes, à bords extérieurs creusés, arrondies et se croisant un peu en avant du labre. Antennes à peine plus courtes que la tête en dessous, où elles sont logées dans un canal bordé d'une assez haute carène noire, laquelle limite extérieurement le menton et la pièce prébasilaire; base brune en dessus, entaillée en dessous et formée par une alvéole placée en avant et sur les angles extérieurs de la tête; premier article très-gros, assez long, globuleux, roussâtre au bout; le 2^e moins épais, plus long, cylindrique; le 3^e de même forme que le 2^e, moins épais, plus court; les articles suivants sont tellement serrés les uns contre les autres qu'il ne m'a pas été possible de les compter: ils forment un cylindre compacte, égal à la longueur des deuxième et troisième réunis; la massue qui est grosse et ovalaire, paraît être formée de deux articles qui sont très-serrés et velus. Yeux très-petits, très-étroits, allongés, encastrés sur les rebords extérieurs de la tête, en arrière, assez éloignés des antennes et surmontés d'un épais faisceau de poils en forme de cils. Pronotum très-large, très-grand, très-convexe, avec une ponctuation très-espacée, plus dense, tout autour, laquelle sert d'insertion à des poils longs et couchés, d'un jaune doré; base rebordée, plus largement au milieu, assez arrondie, brune, fortement appliquée contre les élytres; les angles postérieurs petits, saillants, aigus, surmontés d'une large et profonde fossette, laquelle est remplie par une membrane roussâtre qui est elle-même recouverte en dessus et en dessous par une touffe de poils roux, fins, très-serrés; bord antérieur largement marginé de brun, les angles peu saillants, obtus. Ecusson invisible. Elytres de la largeur du pronotum, de 1/3 plus longues que celui-ci, ovalaires, sensiblement plus étroites en arrière,

largement brunes au milieu, parsemées de points espacés, plus rapprochés sur les côtés, qui servent d'insertion à de longs poils couchés d'un jaune doré; base cintrée, très excavée au milieu, relevée vers les épaules qui forment des angles saillants en avant, lesquels sont surmontés de deux faibles et courtes côtes. Suture noire, soudée. En dessous le corps est largement emboîté par les élytres. Prosternum, mésosternum et métasternum d'un brun noir; petits, très-étroits, élevés, fortement comprimés latéralement, avec une carène médiane assez élevée, (qui sert d'attache aux hanches), et une excavation profonde subtriangulaire, de chaque côté. Abdomen de cinq segments, d'un testacé ferrugineux, très-développé, très-large et très-long, fortement relevé au milieu, fortement excavé sous les hanches postérieures, ces impressions lisses; deuxième, troisième et quatrième peu larges, serrés les uns contre les autres, marginés de brun; le cinquième ovalaire, presque aussi long que les trois précédents réunis est impressionné transversalement. Pattes brunes très-rapprochées; cuisses assez renflées en dessus, comprimées en dessous, assez épaisses; tibias allongés, faiblement épineux; tarsi à quatre premiers articles velus en dessous, le dernier légèrement plus long que les précédents, bi-ongulé.

Voisin du *Pilosus*, mais plus petit, plus étroit, plus atténué par derrière, mais lisse et vilieux à peu près comme lui.

COYE.

Syrie, Kab-Elias.

7. THORICTUS LONGIPENNIS Coye. — Long. 1 4/5 mill.

Court, ovalaire, très-convexe, marron, brillant, glabre, aptère. Tête petite, élargie transversalement, enfoncée dans le prothorax, très-inclinée et déprimée en avant avec une très-fine ligne de très-petits points entre les yeux; une très-fine strie courbe passe par le milieu du vertex et se termine en arrière de chaque œil. Epistome à bord antérieur fortement échancré. Labre transverse, très-petit, très-peu distinct, recouvert d'un fin duvet grisâtre, bord antérieur très-finement bilobé. Mandibules petites, cornées à l'extrémité qui est imperceptiblement bidentée. Palpes très-petits, filiformes, le dernier article le plus long, cylindrique. Yeux très-petits, peu apparents, oblongs. Antennes insérées dans une petite excavation surmontée d'une très-fine carène triangulaire brunie, tout au tour; aussi lon-

gues que le tiers du pronotum ; premier article gros globuleux, roux ; deuxième et troisième ferrugineux ; deuxième moins épais et un peu plus allongé que le premier ; quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième très-serrés, cylindriques, grossissant faiblement, mais progressivement, le huitième assez développé, le neuvième le plus grand, ovalaire, velu de gris, d'un testacé-clair, légèrement et obliquement tronqué au bout. Pronotum très-convexe, bien plus large que la tête avec les côtés latéraux très-développés et très-arrondis en avant ; subtilement rebordé, imperceptiblement ponctué jusqu'au dessous des angles qui sont largement arrondis ; bien tronquée transversalement, enfoncée. Ecusson invisible. Elytres soudées, ramassées, courtes, très-convexes, de $\frac{1}{4}$ plus longues que le pronotum, plus étroites que celui-ci à la base, laquelle est surmontée d'une fine carène droite, transversale d'une épaule à l'autre ; une impression assez profonde, sur le côté interne de l'épaule, rend celle-ci saillante et forme une côte courte assez élevée ; une autre impression plus faible, rapprochée de la première, fait remonter deux petites élévations ; une fossette médiane rapprochée du bord antérieur ; très-subtilement rebordées, ce rebord surmonté d'une ligne de petits points, faiblement impressionnées latéralement avec une légère fossette sur le côté externe de l'épaule. Prosternum brun ; mésosternum avec une fine carène médiane. Abdomen de cinq segments finement rugueux, parsemés de poils très-courts. Le premier très-développé, très-large, très-long, fortement excavé sous les hanches postérieures, ces impressions marquées de nombreuses et fines rides, placées en éventail et limitées extérieurement par une ligne longitudinale de petits points allongés ; le quatrième de forme ovalaire presque aussi longs que les trois premiers réunis, fortement impressionné au milieu. Pattes très-rapprochées, assez robustes, d'un brun ferrugineux, peu longues ; cuisses épaisses, rugueusement ponctuées ; tibias assez développés, garnis de petites épines ; tarsi épais et courts, en forme de crochets : les intermédiaires plus épais ; quatre premiers articles égaux, assez serrés et velus en dessous, le cinquième plus allongé, bi-ongulé.

Ressemble un peu au *Grandicollis*, mais il est plus petit et plus étroit, ses élytres sont proportionnellement plus longues, subparallèles, le pronotum est fortement et régulièrement arrondi sur les côtés, qui débordent les élytres.

COYE.

Syrie, Kab-Elias.

8. *MEROPHYSIA OVALIPENNIS* Coye. — Long. 4,5 mill.

Allongé, étroit, cylindrique, convexe, marron, brillant, glabre. Tête convexe, très-densément et très-finement ponctuée, légèrement plus étroite que le pronotum. Epistome arrondi en avant, tracé par une ligne courbe noire. Mandibules très-petites, arrondies, cachées au repos par le labre. Yeux excessivement petits, presque nuls. Labre avancé, recouvert d'une pubescence rousse. Antennes insérées en avant des yeux, les trois premiers articles testacés, avec une impression au côté antérieur de leur base. Pronotum légèrement plus long que large, presque carré, très-densément et très-finement ponctué; côtés faiblement arrondis, subtilement cintrés tout près de la base, celle-ci noire, droite au milieu, légèrement et transversalement impressionnée, finement rugueuse, avec une entaille sur les côtés internes formant un angle assez saillant dont la pointe s'appuie sur le rebord de la base des élytres; côtés latéraux subtilement rebordés, l'arête externe de ce rebord brune. Ecusson invisible. Elytres très-finement et très-densément ponctuées, légèrement plus larges que le pronotum, ovalaires, très-convexes, soudées; suture brunie, légèrement excavée; très finement rebordées de l'épaule à l'angle apical externe; bord réfléchi épais, large, emboitant largement le corps, l'arête interne brune. Poitrine très-développée, bombée au milieu, défléchie et élargie postérieurement, ponctuée, noircie au dessus de l'insertion des hanches postérieures. Abdomen de quatre segments; le quatrième ovalaire, deux fois aussi long que le troisième.

Plus allongée et plus étroite que la *Formicaria*, elle a la forme générale de la *Carinulata*; elle diffère de l'une par sa ponctuation plus forte, son pronotum moins dilaté latéralement, en devant, à angles postérieurs aigus, et de l'autre par l'absence de carènes. Elle doit être voisine de l'*Orientalis* décrite par M. de Saulcy qui m'est inconnue.

COYE.

Syrie, Kab-Elias.

9. *GYMNETRON MARSEULI* Coye. — Long. 3 2/3 mill. non compris le rostre.

♂ Corps ellipsoïde. Tête noire, globuleuse, couverte de points enfoncés, confluents, garnis de poils roussâtres

courts couchés. Antennes ferrugineuses, premier article du funiculaire long, assez épais, deuxième plus menu et presque aussi long, 3-5 petits granuleux, la massue brune. Rostre cylindrique, serré contre le corps entre les hanches, atteignant les intermédiaires, pubescent à la base, garni de poils très-courts au milieu, de poils plus longs avant l'extrémité, le bout glabre, luisant, ferrugineux. Pronotum noir, légèrement plus large que long, fortement rétréci en avant avec une strie formant collerette, arrondi sur les côtés, surtout vers le tiers postérieur, faiblement bisinué à la base, convexe, couvert de points en cul de dé, confluent, garnis de poils couchés, d'un roux sale; ces poils plus fournis à la base et sur les bords latéraux. Écusson en triangle allongé, couvert de squamules d'un cendré blanchâtre. Elytres brique foncé, épaulées très-prononcées, légèrement plus larges que le pronotum à la base, de moitié plus longues que celui-ci, convexes, légèrement déprimées à la suture, sous l'écusson, cette dépression d'un rouge noirâtre; stries sulcifformes, fortement ponctuées, dont cinq entières en dedans du calus huméral, intervalles plans, obsolètement rugueux, sur le milieu, des poils clair semés, hérissés, inclinés vers les côtés externes; une touffe de longs poils roussâtres hérissés, serrés, couvrent le tiers postérieur de la suture et arrivent au sommet. Les bords externes et l'extrémité entourés d'une frange de soies très-courtes, très-rapprochées, d'un cendré roussâtre. Pygidium incliné, entièrement recouvert d'une pubescence roussâtre. Dessous du corps noir, entièrement couvert de points confluent, garnis de soies couchées, cendré-blanchâtre. Pattes fortes; tibias ferrugineux obscur, avec une torte épine intérieure à leur extrémité. Les deux dernières paires de cuisses fortement comprimées en dessous à leur extrémité. La poitrine, le premier segment abdominal et la base du second, profondément impressionnés. Les deux derniers égaux, bien moins larges que les autres.

Syrie. En fauchant les herbes dans l'Oasis de Kab-Elias. — Novembre.

Je dédie cette espèce à M. de Marseul, bien connu du monde savant par ses excellents ouvrages et ses nombreuses publications entomologiques, qui me comble de gracieuses attentions.

COYE.

Elle vient se placer après le *Graminis*, dont elle se distingue par sa forme convexe, sa couleur rouge brique

L'Abeille VI 2^e partie 1870, juin.

3

des élytres, ses antennes ferrugineuses et sa villosité plus claire et moins dense et son rostre qui ne dépasse pas les hanches intermédiaires.

10. *BARIDIUS CHEVROLATI* Coye. — Long. 4,3 mill. sans le rostre.

Corps assez convexe, luisant en dessus et en dessous. Tête noire, petite, vaguement et finement ponctuée; rostre brun, courbé, densément ponctué, strié-fenestré sur les côtés, bout spatuliforme. Antennes brunes, pronotum noir, d'un tiers plus long que large, arrondi sur les côtés, rétréci et étranglé en avant, légèrement convexe, fortement et uniformément ponctué; une ligne médiane longitudinale lisse; les bords extérieurs ciselés; une légère impression de chaque côté au dessus de la base formée par la réunion de points plus gros. Écusson lisse, fourchu. Elytres brunes, striées; un peu plus larges que le pronotum, à épaules légèrement saillantes; stries impunctuées, intervalles plans, avec une ligne de petits points sur leur milieu. Les deux premières stries atteignent l'extrémité; aux deux tiers postérieurs, entre la troisième et sixième, s'élève une bossette sur laquelle se terminent les quatrième et cinquième, celle-ci plus courte; la sixième se continue le long du bord extérieur de la petite élévation et vient presque se réunir à la troisième; les septième et huitième dépassent cette saillie; la neuvième se joint à la deuxième en contournant le sommet. Pygidium fortement ponctué en dessus. En dessous le prothorax est comme guilloché sur les côtés; son centre, toute la surface du mésosternum et du métasternum, sont entièrement rugueusement ponctués et couverts de poils squamuleux, qui sortent de chaque trou, sous forme de gouttelettes d'un blanc sale. Poitrine profondément impressionnée, canaliculée. Le premier segment abdominal et la base du second présentent un léger enfoncement; ces deux segments ainsi que le dernier sont larges et couverts d'une forte ponctuation espacée. Les deux avant-derniers arceaux sont parallèles, égaux, bien plus étroits que les autres, et marqués d'une ligne de points sur les côtés avec le milieu lisse. Pattes ponctuées, garnies de poils squamuleux comme ceux de la poitrine.

Syrie (près Kab-Elias). — En fauchant les plantes qui croissent sur les bords des marais de la Bekaa. — Mars. Avril.

COYE.

11. ONTHOPHAGUS FURCICEPS.

♂ Ovale, assez convexe, noir luisant. Chaperon presque en demi-cercle, strigueux transversalement, entouré d'un même rebord élevé, formant un angle obtus par derrière, saillant au devant des yeux; tête surmontée d'une large lame perpendiculaire, partant des yeux, rétrécie dans son milieu, terminée par deux cornes obliques, mousses, dépassant les tubercules du pronotum; au devant d'une crête assez élevée en arc parallèle au rebord du chaperon. Pronotum transverse, bombé, couvert de poils squamifères aciculés et granulés, fins et assez serrés; arqué et finement rebordé à la base, avec les angles à peine marqués, rebordé et fortoment dilaté arrondi avec un calus impressionné au milieu des côtés, subsinué au devant des angles, armé en devant d'une saillie bilobée au milieu et de chaque côté d'un tubercule aigu. Elytres de la largeur du pronotum, courtes, convexes, élevées en bosse à l'épaule, entourées d'un mince rebord, marquées de six rainures complètes en dedans du calus huméral, et d'une raccourcie enfoncée derrière; interstries plans, lisses avec quelques fins points pilifères aciculés, sur deux rangées. Pygidium peu ponctué. Jambes antérieures armées de quatre fortes dents, obtuses au bout. — Long. 10. — Larg. 6 mill.

Cette curieuse espèce dont je ne connais que le ♂, et trouvée à la Bekaa, ressemble un peu au *Camelus*, mais elle est plus luisante et plus convexe, sa lame est plus étroite et plus longue, son tubercule médian prothoracique plus étroit et plus allongé, la granulation du pronotum plus forte et moins serrée et les interstries des élytres n'ayant que de rares points pilifères. S. MM.

12. PACHYDEMA COVEI.

Ovale oblong, convexe, d'un marron luisant uniforme, garni en dessous de longs poils jaunes. Front plan, densément et finement rugueux, épistome séparé par une strie de chaque côté, ponctué, en demi hexagone à bord élevé tranchant, subsinué au bord antérieur; yeux très-étranglés et enfoncés. Antennes à funicule de quatre articles, deuxième et quatrième plus longs que les autres. Massue de cinq feuillets, très-longs dans le ♂. Pronotum rebordé dans tout son pourtour, finement pointillé, bisi-

nué et rétréci en devant avec les angles obtus, anguleusement dilaté au milieu sur les côtés, de chaque côté à la base avec les angles arrondis. Ecusson plan, en ogive, lisse. Elytres plus larges à la base et deux fois plus longues que le pronotum, pointillées, élevées en bosse à l'épaule, étroitement rebordées, élargies sur les côtés, avant le milieu, rétrécies peu à peu en arc par derrière avec l'angle sutural droit ou obtus. Pygidium lisse avec quelques points, perpendiculaire, long, arrondi au bout. Jambes antérieures à trois dents dont la supérieure est à peine sensible, postérieures très-élargies, coupées obliquement au bout; tarses très-longs et grêles, à articles égaux; crochets aigus et armés au dedans d'une forte dent très-aiguë et en crochet.

♀ Plus ventrue, plus bombée, un peu plus distinctement ponctuée; jambes antérieures mieux tridentées; tarses beaucoup plus courts ainsi que la massue des antennes. — Long. 17. — Larg. 10 mill.

Cette belle espèce a été découverte dans la plaine de la Bekaà par le capitaine Coxe, qui s'est plu à répandre ses nouveautés parmi ses amis avec beaucoup de désintéressement.

Elle se rapproche pour la coloration et la forme de l'*Unicolor*, si j'en juge d'après la description, mais elle est beaucoup plus grande et les tarses antérieurs n'ont pas les premier et deuxième articles dilatés dans le ♂.

S. MM.

13. ADELOCERA DRUSA.

Allongé, subparallèle, noir opaque, couvert sur toute la surface de points assez gros d'où sort un très petit poil obscur; simples serrés sur la tête, plus espacés sur le pronotum; cerclés sur les élytres, en ligne, les uns plus gros représentent les stries dorsales, les autres plus petits formant une série sur chaque interstrie. Antennes brun ferrugineux, premier article long et gros, deuxième petit, moniliforme, 3-10 trigones, larges et courts, à angle interne obtus, dernier ovalaire. Front largement creusé en triangle, tronqué et rebordé en devant avec une élévation sur les antennes. Pronotum de moitié plus long que large; à peine arqué et finement rebordé sur les côtés, canaliculé dans son milieu, impressionné à la base avec les angles aigus. Ecusson oblong, ponctué, arrondi au bout. Elytres de la largeur et près du double de la longueur du pronotum, avec l'épaule élevée, finement

rebordées et presque parallèles, sur les côtés, arrondies ensemble, mais en pointe chacune au bout. Mentonnière large, en demi-cercle, rebordée au bout. Tarses brun roux. — Long. 9 à 10. — Larg. 2,6 mill.

Sa couleur noire et mate, ses poils obscurs et plus courts, sa ponctuation cerclée des élytres, ses angles prothoraciques postérieurs plus aigus et moins redressés, le distinguent du *Lithophila*. Le *Græca* qui m'est inconnu a des poils argentés semés çà et là, les angles postérieurs du prothorax presque droits, et autres caractères que je ne retrouve pas ici.

S. MM.

Kab-Elias, Syrie.

14. CRYPTICUS DACTYLISPIGUS.

Subelliptique, bombé, court, noir luisant, glabre en dessus; dessous, bouche, antennes et pattes ferrugineux brun; pubescent. Tête large, densément ponctuée, élevée transversalement en carène entre les yeux, largement arrondie avec l'épistome en devant; labre transverse subsinué au bout; palpes à dernier article légèrement sécuriforme. Antennes grêles, troisième article beaucoup plus long que le quatrième, cinq derniers articles comprimés plus larges que longs. Pronotum transverse, finement reborde dans son pourtour, également ponctué, bombé, beaucoup plus large que long, tronqué droit à la base avec les angles obtus, arqué sur les côtés, rétréci et largement échancré en devant avec les angles arrondis. Ecusson large triangulaire. Elytres aussi larges à la base et de moitié plus longues que le pronotum, finement pointillées et moins luisantes, gibbeuses par derrière, arrondies et terminées en pointe. Appendice prosternal dépassant les hanches, rebordé, rugueux. Jambes antérieures armées au bout de deux fortes épines arquées, denticulées en dessous; tarses à premier article long, surtout aux quatre pattes postérieures, prolongé en dessous en une longue dent acérée, aux pattes antérieures. Long. 4,5 à 6. — Long. 3,5 à 3,5 mill.

Se distingue du *Quisquilius* par sa forme gibbeuse, élargie par derrière, son pronotum moins élargi, moins arrondi sur les côtés, ponctué moins densément, le dernier article des palpes moins fortement sécuriforme, et surtout par la dent du premier article des tarses antérieurs.

S. MM.

Algérie, Oran, Biskra.

15. CRYPTICUS ZUBERI.

Oblong subcylindrique, noir luisant en dessus, brun en dessous, avec les pattes, les antennes, les parties de la bouche d'un ferrugineux clair. Tête assez densément ponctuée comme le pronotum, mais moins fortement, élevée transversalement entre les yeux; épistome séparé par une fine ligne enfoncée droite, arrondi largement au bout avec les bords ferrugineux. Antennes grêles, troisième article un peu plus long que les deux voisins, les cinq derniers ovoïdes, presque transverses. Pronotum convexe, plus large que long, finement rebordé dans son pourtour, tronqué droit à la base, avec les angles droits un peu rentrés, arrondi sur les côtés, peu rétréci, coupé presque droit en devant avec les angles arrondis. Écusson large, en triangle. Elytres aussi larges et deux fois plus longues que le pronotum, subparallèles, arrondies par derrière avec l'angle sutural peu aigu, parsemés de petits points peu serrés, très-peu visibles avec des traces de stries pointillées. Appendice prosternal dépassant les hanches, aigu, creusé, rebordé. Jambes antérieures élargies, denticulées en dehors, terminées par deux courtes épines arquées; tarses antérieurs à premier article court et large, avec son angle interne aigu; postérieurs à premier article très-long et grêle. — Long. 4 à 6. — Larg. 2 à 3 mill.

Plus petit et surtout beaucoup plus étroit que le précédent, il s'en distingue par son pronotum moins rétréci en devant, ses élytres plus finement pointillées et marquées de stries pointillées à peine distinctes et surtout par ses tarses antérieurs.

Sarepta: Je l'ai dédiée à M. Zuber-Hofer, qui m'en a généreusement sacrifié un exemplaire. S. MM.

16. CANTHARIS FLAVIPES (Kind). Muls. Op. VIII 1838. 87.

♀ Oblongue, d'un vert doré brillant, plus bleu sur la tête et le prothorax, pubescente de longs poils jaunes, entremêlés sur le dos de poils noirs. Tête triangulaire, prolongée et renflée en bosse derrière les yeux qui sont réniformes; criblée de gros points avec les intervalles ruguleux; épistome transverse, séparé du front par une impression transverse; labre sinué au bout; palpes roux. Antennes noires, aussi longues que la moitié du corps;

filiformes, premier article renflé, hérissé de longs poils, deuxième petit, arrondi, les suivants d'égale longueur, plus ou moins fusiformes, dernier de moitié plus long que le précédent, terminé en pointe. Prothorax sculpté comme la tête, plus étroit, rétréci aux deux bouts, surtout en devant, dilaté en bosse sur les côtés un peu avant le milieu, sillonné dans son milieu et le long du bord basal qui est élevé. Ecusson en triangle arrondi au bout. Élytres beaucoup plus larges à la base et cinq fois plus longues que le prothorax, avec le calus huméral fort saillant, densément ruguleuses, élargies postérieurement et arrondies au bout. Pattes ferrugineuses avec les hanches et les genoux rembrunis. — Long. 12 — Larg. 4 mill.

Cette espèce ressemble beaucoup pour la forme de la tête et du prothorax, leur sculpture, la structure des antennes, la couleur des pattes à la *Dives*, mais elle n'en a pas les bandes rouge feu ; elle vient près de l'*Elegans* (Kind), qui a les antennes plus robustes, les palpes noirs, le pronotum plus bombé, plus finement pointillé et lisse ainsi que la tête, et les pattes de la couleur du corps.

Elle a été trouvée à Kab-Elias, Syrie. Mulsant n'en connaissait ni la provenance, ni la femelle. D'après lui le ♂ a le dernier segment ventral entaillé jusqu'au milieu, avec les angles terminés par un faisceau de longs poils ; jambes intermédiaires échancrées en dessous entre deux épines ; articles 1-3 des tarses brusquement dilatés ; métasternum avec deux tubercules hérissés d'une houppe de poils noirs. S. MM.

17. GYMNETRON VITTIPENNIS.

Oblong, noir, luisant, avec une bande longitudinale rouge sang sur les élytres, occupant toute l'élytre sauf les trois interstries internes jusqu'aux 4/5 et les deux externes, base des antennes et milieu des jambes et les tarses rougeâtres ; les exemplaires que j'ai sous les yeux sont frottés et dénudés. Tête densément rugueuse ponctuée ; front presque plan ; rostre allongé, cylindrique, presque droit, incliné seulement. Antennes courtes, articles du funicule un et deux assez longs, obconiques, l'un gros, l'autre grêle. Prothorax fortement transverse, convexe, arrondi sur les côtés, fortement rétréci et bordé d'un sillon en devant, tronqué aux deux bouts, densément ponctué. Ecusson en demi-cercle, rugueux. Élytres

assez convexes, plus larges que le pronotum, subparallèles avec les épaules arrondies et leur calus saillant, arrondies et brusquement rabattues au bout; fortement striées-punctuées, avec neuf stries dont six entières en dedans du calus huméral; interstries plans, marqués de petits points rares, mais plus nombreux vers la suture; rouges avec une bordure noire latérale, occupant les deux intervalles externes et une longue tache suturale commune de même couleur, occupant les trois interstries près de la suture et allant de la base jusque vers l'extrémité où elle s'arrondit. Jambes arquées vers le bout. ♂ comme dans les autres espèces du genre, impressionné à la base de l'abdomen. — Long. 3. — Larg. 1,8 mill.

Ressemble un peu pour la forme à l'*Elongatus*, mais rostre moins long, prothorax plus court et plus régulièrement arrondi sur les côtés, et différent de coloration; ses rapports sont plus intimes avec le *Spilotus*, mais il est plus oblong, ses élytres sont plus parallèles et le dessin autre.

S. MM.

Kab-Elias, Syrie.

18. PHYTCECIA MURINA.

Allongé, étroit, noir, densément pubescent de gris. Tête ronde, front bombé, couvert d'une longue pubescence; yeux profondément échancrés. Antennes de la longueur du corps, grêles, troisième article presque aussi long que le quatrième. Prothorax plus large que long, presque de la largeur de la tête, arrondi légèrement sur les côtés, plus étroit à la base qu'en devant, densément ponctué ainsi que la tête longé de trois bandes de poils plus longs et plus blancs que le reste, bande médiane se continuant sur l'écusson, qui est long et arrondi au bout, et sur le commencement de la suture. Elytres beaucoup plus larges à la base que le pronotum, quatre fois plus longues, avec les épaules saillantes, rétrécies peu à peu par derrière, déprimées sur le dos le long de la suture qui est élevée, tronquées obliquement à l'extrémité: de chaque côté une légère côte, partant du calus huméral, longe le bord externe: points gros, espacés, cachés par la pubescence. Cinquième segment de l'abdomen fauve, ainsi que les cuisses à partir du tiers et les jambes antérieures, l'extrémité des quatre cuisses postérieures, et obscurément les jambes intermédiaires, qui présentent une échancrure en dehors, avant l'extrémité. — Long. 7,5. Larg. 2 mill.

Diffère de l'*Ephippium*, auquel elle ressemble beaucoup, par son prothorax plus court et plus arrondi sur les côtés avec ses trois bandes de poils blancs, ses élytres plus atténuées, et marquées d'une faible côte presque latérale et l'extrémité de l'abdomen jaune rouge.

S. MM.

Sarepta, Russie.

19. SPHINCTICRÆRUS CONSTRICTUS.

Ovale, élargi par derrière, assez convexe, brun ferrugineux, jambes, prothorax, rostre et base des élytres plus rouges, antennes testacé clair; luisant, parsemé en dessus et en dessous de longues squamules blanches, en partie détruites dans mon unique exemplaire. Rostre cylindrique, un peu arqué, finement granulé, obsolètement carénué entre deux faibles sillons; yeux latéraux, verticaux, séparés par un front rugueusement ponctué, comme étant la continuation du rostre; tête d'une structure si étrange, que je ne soupçonne rien d'analogue dans toute la famille des Curculionides; enfoncée dans le prothorax, elle est entièrement invisible et séparée du front et des yeux par un étroit étranglement, si profond que la portion rétrécie est à peine égale en épaisseur au rostre. Antennes insérées un peu plus près de la base du rostre que de l'extrémité, sur les côtés un peu en dessous; scape mince, tordu, renflé au bout, aussi long que le reste de l'antenne, atteignant le bord postérieur des yeux; premier article du funicule gros, obconique, les autres serrés, allant en croissant de largeur, massue en fuseau terminée en pointe aiguë, obscure. Prothorax campanulé, à peine plus large que long, tronqué aux deux bouts, premier tiers rétréci assez brusquement, marqué de gros points serrés, formant des rangées transversales, régulières. Écusson oblong étroit. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax à sa base, presque carrées, plus élevées que lui, droites en devant avec les épaules saillantes, mais arrondies, fortement rabattues, retuses et arrondies au bout; stries fortes, assez régulières, formées de gros points oblongs, rapprochés, bien en dedans du calus huméral, juxtasaturale en sillon profond, jusqu'à l'extrémité, trois et cinq enfoncées à la base; interstries plans avec une rangée de petits points fins, troisième plus large

L'Abeille VI 2^e partie 1871, juin.

et plus élevé à la base. Bord pectoral antérieur largement échancré en arc; hanches antérieures contiguës, intermédiaires distantes; cuisses allongées, antérieures plus épaisses, armées en dedans d'une dent aiguë; jambes courtes à peine dilatées vers l'extrémité; tarsi à pénultième article bilobé; dernier grêle, terminé par deux crochets bifides, noirs. Segments de l'abdomen coupés droit, un et deux longs, les suivants en tranches très-étroites, à peine ensemble de la longueur du deuxième. Long. 2. — Larg. 1,2 mill.

Cette singulière espèce, trouvée aux environs d'Alger par M. Lallemand, dont j'ai acquis la collection, me semble être intermédiaire entre les *Anthonomus* et les *Bradynobatus*; sa forme le rapproche des premiers surtout pour la brièveté et la largeur des élytres, des seconds par le prothorax et le rostre; ses hanches intermédiaires distantes, ses ongles libres et bifides, ses segments abdominaux de longueur si disparate et surtout le profond étranglement de sa tête derrière les yeux, justifient l'établissement de cette nouvelle coupe générique que je nomme *Sphincticærus* (σφιγκτός serré, χραῖρα tête).

20. GYMNETRON PIPISTRELLUS.

Oblong, assez convexe, terne, brun, avec l'extrémité du rostre, les antennes et les pattes testacé clair, élytres marron; garni sur toute sa surface de poils sétacés blancs, dressés et courts sur le dessous, très-longs et couchés sur les élytres, où ils sont entremêlés d'autres fauves; sur le dos du pronotum ils sont gris et bruns. Front concave, rostre épais, très-court, atténué au bout, avec quelques points. Antennes insérées vers le milieu, 1^{er} article long, renflé au bout, 2^e aussi gros et plus court, massue ovide acuminée et un peu rembrunie au bout. Pronotum transverse, convexe, de la largeur des élytres, arrondi sur les côtés, peu ponctué, rétréci et rebordé en devant. Ecusson couvert d'une touffe de poils blancs. Elytres un peu plus de deux fois plus longues que le prothorax, subparallèles, arrondies au bout, convexes, striées-ponctuées, largement bordées de poils blancs qui semblent marquer une ligne longitudinale partant du calus huméral; ornées vers les 2/3 environ du milieu d'une petite tache brune dénudée. Jambes antérieures dilatées vers l'extrémité où elles présentent une cavité oblique, lisse et luisante pour loger les tarsi dont l'article ongulair est long,

arqué et terminé par deux fins crochets bruns ; cette cavité est bordée d'un peigne d'épines noires mousses très-remarquables. — Long. 2,5. — Larg. 1,3 mill.

Cette intéressante espèce de Bône (Algérie) rappelle par ses longs poils, sa forme et sa coloration le *Simus*, mais elle est plus parallèle, plus étroite, son rostre est un peu plus long et plus luisant, son pronotum moins ponctué, ses élytres n'ont pas ces taches noires transversales, et sa villosité est tout autre ; enfin je ne vois pas dans le *Simus*, cet élargissement oblique des 4 jambes antérieures bordé d'une série d'épines noires mousses, disposition qui pourrait bien être l'indice d'un genre différent.

21. TIMARCHIA PUNCTELLA.

Ovale oblong, bombé, noir, luisant, surtout ♂, couvert en dessus de points écartés, plus fins sur le pronotum, radiellés sur les élytres. Front convexe, sillonné longitudinalement dans son milieu, et bien distinct de l'épistome par un profond sillon transverse. Antennes filiformes, atteignant presque le milieu du corps. 1^{er} article globuleux, gros, 2^e petit, 3^e long, subcylindrique, les suivants allant peu à peu en diminuant de longueur, dernier terminé en pointe. Pronotum lisse bombé, étroitement rebordé dans tout son pourtour, très-transverse, fortement dilaté arrondi sur les côtés et rétréci fortement à la base ; angles antérieurs arrondis, postérieurs très-obtus. Ecusson en triangle large et court. Elytres allongées, plus larges que le prothorax, ayant leur plus grande largeur vers le milieu, entourées d'un rebord tranchant le long de la partie fuyante de l'épaule, n'atteignant pas l'angle sutural terminé en bec ; épipleures rugueuses ; points émettant des aciculations en rayons, interstices à peine visiblement pointillés. Pygidium strigueux, canaliculé au milieu. Cinquième segment de l'abdomen fortement rebordé. Pattes longues ponctuées.

♂ Articles des quatre tarsi antérieurs assez fortement dilatés ; dessus fort luisant. — ♀ tarsi, à articles petits triangulaires ; plus trapu, moins luisant en dessus. — Long. 17 à 20. — Larg. 9 à 12 mill.

Ressemble au *Turbida* pour la forme et la ponctuation des élytres, mais il en diffère par son prothorax à petits points espacés, par son front bombé, profondément sillonné, et l'absence complète de reflet bleu en dessous.

Algérie, Bône, Biskra.

22. *TIMARCHA SCABRIPENNIS*.

Oblong, convexe, noir terne, avec la tête, les articles dénudés des antennes et les pattes d'un violet luisant. Front plan, un peu déprimé en triangle, avec un court sillon sur le vertex, vaguement ponctué. Antennes longues, premier article gros renflé, deuxième un peu plus court que le troisième, celui-ci et les suivants obconiques allant en diminuant de longueur, dernier long en pointe obtuse. Pronotum peu convexe, transverse, coupé droit et de même largeur devant et derrière faiblement arqué sur les côtés, angles marqués, postérieurs un peu après redressés, étroitement rebordé dans tout son pourtour, marqué de gros points épars au milieu d'un pointillé fin et serré. Ecusson en triangle court et large. Elytres trois fois plus longues et un peu plus larges que le prothorax, convexes, couvertes de points nets, semés au fond d'enfoncements, dont les intervalles sont élevés et lisses, ovales, arrondies et rabattues postérieurement, entourées d'un rebord mince; épipleures finement ponctuéées. Pattes minces, allongées. Tarses dilatés ♂, surtout les quatre antérieurs. — Long. 12 à 13. — Larg. 7 mill.

Espagne; Andalousie.

23. *PLATYDERUS EMBLEMA*

Allongé, aplati, rouge-ferrugineux. Pronotum plus large que long, un peu rétréci au bord antérieur qui est avancé en pointe aiguë au milieu, bisinué de chaque côté avec les angles arrondis, ligne marginale interrompue; rebordé et arrondi sur les côtés, rétréci, sinué et entièrement rebordé à la base, avec les angles largement arrondis; strie médiane forte, fossettes basales larges et vaguement ponctuéées. Ecusson en triangle aigu. Elytres à peine plus larges et deux fois $1/2$ plus longues que le pronotum, à rebord basal presque droit, angles huméraux aigus; peu arquées sur les côtés, avec un mince rebord, arrondies au bout, stries profondes, lisses à bords élevés, ainsi que la suture; troisième et quatrième, cinquième et sixième réunies et racourcies par derrière, juxtascutellaire courte profonde, deux points peu distincts sur la troisième strie et un sur la deuxième; interstries creux, marqués d'une série de points très-serrés. — Long. 8. — Larg. 3 mill.

Cette curieuse espèce, dont j'ai deux exemplaires,

trouvés par Fernando Amor aux environs de Cordoue, se distingue aisément de toutes les autres espèces du genre par la forme des stries et des insterstries des élytres, elle a un peu la forme du *Ruficollis* et se rapproche du *Punctiger* Reiche.

24. AMARA BULLATA.

Oblong, convexe, d'un jaune paille, assez luisant, avec les yeux ronds et l'extrémité des mandibules noir brun, les éperons, les denticules des jambes et les genoux bruns. Tête grosse, une impression de chaque côté en dedans des yeux, reliées par une strie transversale droite et bien marquée. Antennes grêles, à troisième article deux fois plus long que le deuxième et un peu plus que le quatrième. Pronotum en cœur transverse, un peu convexe, presque droit en devant avec les angles arrondis et une strie marginale interrompue, fortement dilaté arrondi en devant et étroitement rebordé sur les côtés, très-rétréci et coupé droit à la base, qui est un peu échancrée et imparfaitement rebordée, avec les angles droits à angle pointu, déprimée, ponctuée et marquée de chaque côté de deux courts sillons longitudinaux dont l'interne bien enfoncé; ligne médiane fine et bien marquée. Ecusson en demicercle. Elytres de la largeur du pronotum, arrondies à l'épaule, parallèles sur les côtés, subsinueusement atténuées au bout; stries droites, bien marquées, finement pointillées, réunies postérieurement, troisième avec quatrième, cinquième avec sixième, deuxième avec septième et première avec huitième qui est densément crénelée à ses deux extrémités, juxtascutellaire liant la deuxième à la première; repli basal continuant le bord infléchi avec l'intervalle sutural; insterstries plans, égaux et lisses. Appendice prosternal arrondi au bout. ♂ tarsi antérieurs à articles 1-3 courts, assez fortement dilatés en cœur. — Long. 14. — Larg. 5 mill.

Ressemble beaucoup à *Nebria Schreibersi*, mais il est plus épais, plus parallèle, et son pronotum diffère beaucoup pour la structure, de celui de cette dernière, ses antennes sont plus courtes et plus grêles.

Sarepta (M. Zuber-Hofer).