

# L'Ophrys petite araignée, *Ophrys araneola* Reichenbach 1831, redécouverte de l'espèce en Vendée

Sylvain VRIGNAUD

**Abstract** : The *Ophrys araneola* which had not been seen in Vendée (France) since 1993 was rediscovered in may 1993 among a colony of *Ophrys sphegodes*. The writer underlines the risks of eventually confusing the two species and mentions the different characteristics of each in order to avoid any confusion.

**Mots clés** : Orchidées, Ophrys petite araignée, *Ophrys araneola*, Vendée.

**Key words** : Orchid, Ophrys, *Ophrys araneola*, Vendée (France).

## INTRODUCTION

Anciennement signalé en Vendée, l'Ophrys litigieux ou Ophrys petite araignée n'avait pas encore été observé par les botanistes de la Société Française d'Orchidophilie (groupement Poitou-Charentes-Vendée) depuis le début de leur travail de prospection (1993) visant à établir la cartographie des orchidées du département. La redécouverte de cette plante, au printemps 1999, porte à 29 le nombre d'espèces d'orchidées maintenant connues en Vendée.

## GÉNÉRALITÉS

Considéré anciennement comme une sous-espèce de l'Ophrys araignée et connu alors sous le nom d'*Ophrys sphegodes* Miller ssp. *litigiosa* (Camus) Becherer, 1925, ce taxon est traité depuis une vingtaine d'années comme une espèce à part entière par de nombreux auteurs, sous l'appellation *Ophrys araneola* Reichenbach, 1831 [in *Icon. Nona Cent.* p. 22, 1831]. Appelé Ophrys araignée précoce par J. LANDWEHR [1983], car il fleurit deux ou trois semaines avant l'Ophrys araignée, cet ophrys est plus connu sous le nom français d'Ophrys litigieux ou d'Ophrys petite araignée. Officiellement son aire de répartition est ouest-méditerranéenne - atlantique mais en fait la plante est disséminée un peu partout en France à l'exception de la Corse, du Limousin, de la Bretagne et du sud-ouest de l'Aquitaine [JACQUET, 1995]. L'Ophrys petite araignée est présent jusque dans le Pas-de-Calais, les Ardennes et l'Alsace.

## LOCALISATION EN VENDÉE

L'Ophrys petite araignée était signalé en 1984 aux Sables-d'Olonne en Vendée (P. Yésou, com. pers.). Dans son ouvrage sur la répartition des orchidées sauvages de France, P. JAQUET [1995] mentionne également la plante en Vendée, mais depuis 1993 elle n'avait pas été retrouvée dans le département et était inconnue au fichier de la cartographie des orchidées de Vendée (G. Delnott, comm. pers.). La proximité des stations de la vallée de l'Autize dans les Deux-Sèvres (P. Rouillier, comm. pers.) laissait cependant supposer une probable présence en Vendée. Cela fut confirmé le 1<sup>er</sup> mai 1999 par M. Biteau (botaniste) et J. Gonin (naturaliste vendéen) lors d'une journée de prospection consacrée aux orchidées dans une zone correspondant à la carte IGN à 1/25 000 : 1527 ouest, Coulonges-sur-l'Autize. La station découverte se situe sur la commune de Saint-Hilaire-des-Loges, sur un coteau calcaire de la vallée de l'Autize exposé à l'ouest et compte 3 pieds d'Ophrys petite araignée parmi 50 à 100 d'Ophrys araignée.

## IDENTIFICATION

L'Ophrys petite araignée est proche de l'Ophrys araignée. Le tableau suivant réunit les principaux critères permettant de différencier ces deux espèces. Comme ces ophrys présentent une grande variabilité, il faut veiller à la concordance de tous les critères en examinant plusieurs pieds et, en cas de doute, faire appel à un botaniste qui connaît bien les deux espèces.

### CONCLUSION

La redécouverte de l'Ophrys petite araignée en Vendée devrait attirer l'attention des botanistes et encourager tous les naturalistes à redoubler

de vigilance dans leurs futures prospections. En effet, il n'est pas toujours aisé de distinguer l'*Ophrys araneola* dans une vaste station d'*Ophrys sphegodes* même si le premier commence à fleurir deux semaines avant l'autre.

Principaux critères de différenciation	<b>Ophrys araignée</b> <i>Ophrys sphegodes</i>	<b>Ophrys petite araignée</b> <i>Ophrys araneola</i>
<b>Période de floraison</b>	De mi-mars à mi-mai	Plus précoce : mars à début avril (parfois plus)
<b>Aspect des fleurs</b>	Fleurs grandes, à couleurs contrastées	Fleurs de petite taille, à couleurs peu contrastées
<b>Couleur du labelle</b>	Brun foncé	Brun pâle
<b>Longueur du labelle</b>	Supérieure ou égale à la longueur du sépale dorsal > 10 mm	Inférieure à la longueur du sépale dorsal 8-9 mm
<b>Bordure du labelle</b>	Liseré jaune tout au plus	Bordure jaune
<b>Aspect des fleurs juste après la floraison</b>	Noir	Brun-clair

### RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BOURNERIAS M., 1998. – *Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg*. Paris, Société Française d'Orchidophilie, 416 p. ISBN 2-9510379-1-0.
- DELFORGE P., 1994. – *Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du nord et du Proche-Orient*. Paris, Delachaux et Niestlé, 480 p. ISBN 2-603-00929-X.
- JACQUET P., 1995. – *Une Répartition des Orchi-*

*dées Sauvages de France (3<sup>e</sup> éd.)*. Paris, Société Française d'Orchidophilie, 100 p.

- LANDWEHR J., 1983. – *Les Orchidées sauvages de France et d'Europe*. Paris, La Bibliothèque des Arts, 600 p.

Sylvain VRIGNAUD

48 bis, rue Félix Mathé  
F-03000 Moulins  
s.vrignaud@oreka.com

