

La Loutre d'Europe, *Lutra lutra*, de retour sur la Sèvre Nantaise

Benoît TEILLET & Pierre TESSIER

Abstract : After 1985, the otter (*Lutra lutra*) was not found any more on the Sèvre Nantaise (France). From 1997, a careful exploration revealed presence signs of its presence showing the coming back of this mammal.

Mots clés : mammifère, Loutre, *Lutra lutra* Linné 1758, Sèvre Nantaise, Pays-de-la-Loire.

Key words : mammal, Otter, *Lutra lutra* Linné 1758, Sèvre Nantaise, Pays-de-la-Loire (France).

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Prenant sa source dans le département des Deux-Sèvres, la Sèvre Nantaise traverse également sur son cours de 126 kilomètres, le Maine-et-Loire, la Vendée et la Loire-Atlantique. Son bassin versant s'étend sur 2 370 km² et comporte quatre affluents principaux : la Sanguèze, la Maine, la Moine et l'Ouin. Sur la partie deux-sévrienne, la rivière s'écoule en de larges méandres dans un paysage de bocage ouvert et faiblement vallonné, où quelques étangs ponctuent son cours. A partir de la Vendée, la rivière suit le plus souvent un lit encaissé et peut présenter un caractère torrentiel par endroit. A partir de Monnières (Loire-Atlantique), la Sèvre Nantaise devient navigable, à près de 20 km de sa jonction avec la Loire à Rezé, dans l'agglomération Nantaise.

HISTORIQUE DES POPULATIONS DE LOUTRES

De 1950 à 1985, la Loutre d'Europe est notée présente sur la Sèvre Nantaise, [SAINT-GIRONS, 1973 ; BOUCHARDY, 1984]. Commune au début de cette période sur l'ensemble du territoire français, elle va ensuite se raréfier [BOUCHARDY, 1986]. La Sèvre Nantaise n'échappe pas à cette régression et la présence de la Loutre n'est plus notée à partir de 1985 [LODÉ, 1989]. Concernant l'ensemble du bassin versant, seule la partie vendéenne de la Maine enregistre encore sa présence [LODÉ & GUILLEMOT, 1987]. Des prospections menées de 1991 à 1993 sur la Sèvre Nantaise confirment toujours son absence (Allenou, Paillat, Teillet, Tessier *).

ÉVOLUTION RÉCENTE DES POPULATIONS

L'étude menée pour la DIREN des Pays-de-la-Loire en 1994 par Erminea et Prolutra met en évidence la présence de la Loutre sur l'ensemble du réseau hydrographique de la Maine et donc une progression par rapport à 1987.

Fin 1997, des marquages sont identifiés sur la Sèvre Nantaise au sud-est de Clisson, à proximité de la Doucinière (Cugand), un affût permet également l'observation directe d'un individu (Loiret*). Elle est également signalée en 1997 et 1998 sur le bassin amont de la Sèvre Nantaise en Deux-Sèvres [AMIOT, 2000]. A partir de fin 1998, une série de prospections est réalisée et des secteurs de marquages sont mis en évidence dans la partie aval de la Sèvre Nantaise sur deux sites : à Gorges près du Beau Soleil, ainsi qu'à la limite entre Monnières et Maisdon-sur-Sèvre (Paillat & Teillet*). Les recherches poursuivies depuis 1999 témoignent de marquages réguliers sur ces lieux et permettent la découverte de nouveaux sites, à la Haie-Fouassière en Loire-Atlantique (Teillet*), ainsi qu'à Saint-Aubin-des-Ormeaux et à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée (Allenou, Barbier, Ouvrard, Paillat, Tessier*). Les prospections ainsi réalisées mettent en lumière l'occupation par la Loutre de la partie aval de la Sèvre Nantaise, excepté le secteur allant de Vertou à l'embouchure où aucun indice n'a été relevé en 1999 (Teillet, Paillat*). En revanche, les recherches effectuées en 1999 et 2000 en amont de Saint-Amand-sur-Sèvre (tête de bassin versant, en Deux-Sèvres) ne permettent pas de retrouver des indices de présence. L'absence d'une frange boisée et le relief peuvent constituer des explications parmi d'autres.

Aujourd'hui, le retour de la Loutre sur la Sèvre Nantaise est peut-être le fruit de l'expansion du noyau de population présent sur la Maine. La rareté des marquages relevés sur les affluents de la Sèvre Nantaise et les relevés discontinus en amont semblent témoigner d'un lent processus de recolonisation actuellement en cours. Espérons que le renforcement de la population de loutres dans la partie aval de la Sèvre Nantaise marquera le début du retour de cet attachant mustélide sur l'ensemble du réseau hydrographique.


*Communication personnelle

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AMIOT, J.-M., 2000. – La Loutre. In *Mammifères sauvages des Deux-Sèvres, atlas 1995-2000*. Niort, Deux-Sèvres Nature Environnement, 55. ISBN 2-9515864-0-0-X
- BOUCHARDY C., 1984. – La Loutre *Lutra lutra*. In *Atlas des mammifères sauvages de France*. Paris, SFEPM : 118-119.
- BOUCHARDY C., 1986. – *La loutre*. Paris, Sang de la terre, 174 p. ISBN 2-86985-003-4
- LODÉ T. & GUILLEMOT B., 1987. – La situation de la Loutre (*Lutra lutra*) dans la région de Montaignu (Vendée). *Rapport DDE, CETE-OUEST*, 38 p.
- LODÉ T., 1988. – La Loutre. In *Inventaire de Faune et de Flore 50, Atlas des mammifères terrestres de Loire-Atlantique*. Paris, MNHN, Secrétariat de la Faune et de la Flore : 46-47. ISBN 2-86515-050-X
- LODÉ T., 1989. – La Loutre en Loire-Atlantique : note préliminaire sur l'évolution récente des populations, l'alimentation et le comportement prédateur de *Lutra lutra*. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France*, II (2) : 69-76.
- SAINT-GIRONS M.-C., 1973. – *Les mammifères de France et du Bénélux*. Paris, Douin, 481p.

Benoît TEILLET
4, rue du Village Petit
44690 La Haie-Fouassière

Pierre TESSIER
La Rétière
85190 Maché
tessier.pierre@caramail.com



Loutre (dessin : Jean CHEVALLIER)