

Botanik und Naturschutz in Hessen 2, 66-71, Frankfurt am Main 1988.

Floristische Meldungen Neufunde - Bestätigungen - Verluste

36.-37. **Barbara Wolff**, Wallstraße 51, 6370 Oberursel

36. *Linaria repens* (L.) Miller

5816/12, Hoher Taunus: Ruppertshain, am „Victoria-Weg“ knapp 1 km östlich der Straße nach Schloßborn (3457970/5560720), 455 m NN; etwa 25 Pflanzen am Rand des Waidweges; 25. Aug. 1986, Beleg: Herbar Wolff.

37. *Linaria repens* x *vulgaris*

8 Pflanzen zusammen mit *L. repens* am vorigen Fundort. Beleg: Herbar Wolff.

38.-47. **Thomas Breunig**, Glümerstraße 20, 7500 Karlsruhe 21 (Mühlburg)

38. *Anthericum liliago* L.

6016/22, Westliche Untermainebene: zwischen Mönchbruchmühle und Haßloch, Haßlocher Busch (3462840/5538530), 96 m NN; Kiefernforst auf pleistozäner Flugsanddüne, 2 Exemplare; Juli 1981.

6016/22, Westliche Untermainebene: zwischen Mönchbruchmühle und Haßloch, Dünenzug nördlich der Bundesstraße 486 (3463560/5538670), 92 m NN; auf pleistozäner Flugsanddüne, 5 Exemplare; Juli 1981.

39. *Aphanes inexpectata* Lippert (= *A. microcarpa* auct.)

5721/32, Nördlicher Sandsteinspessart: Bad Orb, Streuobstgebiet südlich des Rückbergs (3522810/5566220), 230 m NN; lückige Wegböschung in extensiv beweidetem Magerrasen; 27. Juli 1984, Beleg: Th. Breunig 101, Herbar Breunig.

40. *Arnica montana* L.

RL 3/3

5721/21, Unterer Vogelsberg: zwischen Wittgenborn und Spielberg, am Südost-Ende des Großen Weihers, 360 m NN; zerstreut an mehreren Stellen eines brachgefallenen feuchten Borstgrasrasens; Juni 1983.

41. *Claytonia perfoliata* Willd.

5918/31, Westliche Untermainebene: Dreieich-Sprendlingen, westlicher Ortsrand (3477790/5543110), 128 m NN; kleiner Bestand in einer Grünanlage zwischen *Cotoneaster dammeri*; 15. Mai 1983.

42. *Cotoneaster integerrimus* Medicus

5816/32, Vortaunus: Eppstein, an der Straße nach Lorsbach (3457080/5556030), 190 m NN; 2 Exemplare in Felsspalten; 26. Aug. 1984.

43. *Cuscuta gronovii* Schultes

5819/31, Östliche Untermainebene: Hanau-Kesselstadt, am Mainufer 250 m; unterhalb der Schleuse (3490410/5554490), 98 m NN; auf *Mentha longifolia* schmarotzend; 11. Aug. 1984, Beleg: Th. Breunig 103, Herbar Breunig.

44. *Eruca sativa* Miller

5820/13, Nordwestliches Spessartvorland: Niederrodenbach, beim toom-Markt (3502190/5557140), 117 m NN; auf einer lückig bewachsenen Verkehrsinsel, vermutlich mit Einsaat eingeschleppt; 10. Juni 1983, Beleg: Th. Breunig 66/1983, Herbar Breunig.

45. *Gentiana pneumonanthe* L.

RL 2/3

6017/11, Westliche Untermainebene: Mönchbruch, Mönchbruchwiese zwischen Achtstaudenschneise und Mönchbruchallee, 91 m NN; wenige Exemplare; 29. Juli 1981.

46. *Geranium rotundifolium* L.

6317/22, Bergstraße: Bensheim, südlich des Kirchbergs (3473020/5505320), 140 m NN; häufig in Weinbergen; 19. Mai 1985, Beleg: Th. Breunig 210, Herbar Breunig.

47. *Lathyrus hirsutus* L.

RL 1/2

5720/44. Büdinger Wald: Gelnhausen-Roth, südöstlich des Herzberges (3511140/5563750), 165 m NN; wenige Exemplare in brachliegender Streuobstwiese; 20. Juni 1983, Beleg: Th. Breunig 81/1983, Herbar Breunig.

48.-53. **Thomas Borsch**, Albanusstraße 38. 6242 Kronberg48. *Carex hartmanii* Cajander

RL 1/2

5817/11 Vortaunus: Kronberg, „Hinterste Neuwiese“, 280 m NN; mehrfach im Juncetum acutiflori; 1. Aug. 1986.

5817/11 Vortaunus: Kronberg, Wiesental des Waldwiesenbaches zwischen dem Stadtteil Oberhöchstadt und der Bundesstraße 455, 260 m NN; reichlich im Juncetum acutiflori; 21. Mai 1985, Beleg: T. Borsch 222. Herbar Borsch.

5717/23 Vortaunus: Bad Homburg, „Kirdorfer Feld“ zwischen dem Stadtteil Kirdorf und dem Rotlaufweg, 210-230 m NN; vielfach in Feuchtwiesen, teils mit *Dactylo-rhiza majalis*; 21. Juni 1987.

Carex hartmanii hat im Taunus einen Schwerpunkt ihres Vorkommens in Hessen; siehe auch die Arbeit von KLEIN (Hess. Flor. Briefe 4(45), 1-2. 1955) und die Übersicht bei SCHNEDLER (Schriftenr. Angewandter Naturschutz 1, 22, 1987). Größere Bestände der Art finden sich etwa auf den Schmittröder Wiesen (5716/43) und den Hünerburgwiesen (5717/33). Die Segge hat auf einigen der genannten Wiesen in den letzten Jahren quantitativ zugenommen. Sie scheint durch einen späten Mahdtermin gefördert zu werden.

49. *Carex pendula* Hudson RL 3/-
5817/11 Vortaunus: Kronberg, im Gebiet nordwestlich der „Hintersten Neuwiese“, mehrfach (3465450/5562350 und 3465295/5562380), 290-310 m NN; zahlreich in feuchten Waldgesellschaften; 24. Juni 1985.

6217/44 Vorderer Odenwald: Auerbacher Schloßberg, um den Parkplatz „Höllberg“, 240-255 m NN; zahlreiche Pflanzen in Buchenwaldgesellschaften; 6. April 1986. Der Fundort wird von BURCK (Abh. Senckenberg. Naturforsch. Ges. **453**, 30, 1941) angeführt.

50. *Eleocharis uniglumis* (Link) Schultes RL 3/-
5817/11 Vortaunus: Kronberg, Wiesental des Waldwiesenbaches zwischen dem Stadtteil Oberhöchstadt und der Bundesstraße 455, 260 m NN; Bestände im Juncetum acutiflori mit reichlich *Dactylorhiza majalis*; 21. Mai 1985, Beleg: T. Borsch 221, Herbar Borsch, FR.

5817/11 Vortaunus: Kronberg, „Hinterste Neuwiese“, 280 m NN; mehrfach im Juncetum acutiflori mit reichlich *Dactylorhiza majalis*; 27. Mai 1986.

51. *Juncus filiformis* L. RL 2/-
5716/33 Östlicher Hintertaunus: Heftrich, Naturschutzgebiet „Heftricher Moor“; mehrfach in Feuchtwiesen; 6. Juni 1985.

52. *Luzula forsteri* (Sm.) DC. RL 4/4
5816/21 Vortaunus: Königsteiner Burgberg, Südwesthang (3461310/5560800), 380 m NN; etwa 15 Pflanzen an einer lichten Stelle im Eichenwald, auf Grünschiefer. Mit *Vincetoxicum officinale* (wenig) und *Anthericum liliago* (etwa 120 Exemplare); 16. Juni 1986, Beleg: T. Borsch 660, Herbar Borsch.

L. forsteri befindet sich im Gebiet an der Ostgrenze ihrer Verbreitung und ist in Hessen sehr selten. Nach einer vorläufigen Verbreitungskarte von SCHNEDLER (Schriftenr. Angewandter Naturschutz **1**, 25, 1987) handelt es sich beim Königsteiner Burgberg um den östlichsten rezenten Fundort in Hessen. HENSCHERL und MORDHORST (Schriftenr. Inst. Naturschutz Darmstadt **9**(1), 7-43, 1967) erwähnen die Hainsimse in ihrer Artenliste des Burgberges nicht, dagegen die beiden anderen Arten. Die Umgebung des Fundortes ist teilweise wegen der Aufschüttung von Gartenabfällen eutrophiert. Durch die Hanglage ist nicht ausgeschlossen, daß auch die *Luzula* einmal von einer Standortsveränderung betroffen sein wird.

53. *Oenanthe peucedanifolia* Pollich RL 1/2
5817/11 Vortaunus: Kronberg, „Hinterste Neuwiese“, 270 m NN; zahlreiche Pflanzen in nährstoffreichem Juncetum acutiflori; 7. Juli 1985.

54.-58. **Andreas König**, Hauptstraße 346, 6236 Eschborn 2 (Niederhöchstadt)

54. *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat
5819/41, Östliche Untermainebene: Hanau, Bahnhof Nord (3494620/5556620), 100 m

NN; wenige Pflanzen neben den Gleisen; 23. Juli 1987, Beleg: A. König 445/87, Herbar König.

6018/11, Messeler Hügelland: Langen „Vogelstation Märzenmühle“ (um 3478380/5539120), 163 m NN; wenige Pflanzen, möglicherweise aus Vogelfutterabfällen; 9. Okt. 1985, Beleg: A. König 781/85, Herbar König.

55. *Filago lutescens* Jordan RL 2/2
5917/14, Westliche Untermainebene: Kelsterbach, „Hinkelstein“ (3467600/5547620), 109 m NN; mehr als 50 Pflanzen an einem sandigen Wegrand; 31. Juli 1987, Beleg: A. König 466/87, Herbar König.

56. *Egeria densa* Planchon (= *Elodea densa* (Planchon) Caspary)
5917/31, Westliche Untermainebene: Kiesgrube südwestlich Kelsterbach (3464/5545), 95 m NN; steril, in großen Beständen eingebürgert am Nordwestufer, im klaren Wasser bis etwa 2 m Tiefe; 31. Juli 1987, Beleg: A. König 468/87, Herbar König.

57. *Crepis setosa* Haller fil.
6317/34, Neckarried: Lorsch, Kulturdenkmal „Kloster Hagen“, (3470300/5498420), 100 m NN; großer Bestand in junger Brachfläche; 7. Juli 1987, Beleg A. König 377/87 & W. Glanzner, Herbar König.

58. *Dittrichia graveolens* (L.) W. Greuter (= *Inula graveolens* (L.) Desf.)
Westliche Untermainebene: „Frankfurter Kreuz“ an mehreren Stellen jeweils große Vorkommen:

5917/23, Fußgängerweg entlang dem Flughafenzaun (3471500/5545860), 110 m NN; 3. Aug. 1987, Beleg A. König 478/87 a, Herbar König.

5917/41, Verbindungsschleife von der A 5 aus Richtung Kassel zur A 3 in Richtung Würzburg, 110 m NN; Aug. 1987.

5917/41, Mittelstreifen der A 5 in Richtung Kassel bei km 498,7, 110 m NN; Aug. 1987.

Die Art wurde auch vom Darmstädter Kreuz gemeldet: K. D. JUNG, Hess. Flor. Briefe **35**, 62-63, 1986.

59.-65. **Wolfgang Eger**, Schöne Aussicht 6, 3546 Vöhl 1 (Marienhagen)

59. *Eriophorum angustifolium* Honckeny RL 3/-
4917/13, Ostsauerländer Gebirgsrand: Reddighausen, an der Bahn zwischen Ort und Reddighäuser Hammer (337095/565230), 320 m NN; Standort zum Teil mit Fichten aufgeforstet, bis Ende der 50er Jahre in großer Individuenzahl.

5118/11, Ostsauerländer Gebirgsrand: Wetter. sumpfige Wiese am Judenfriedhof südlich des Juden-Küppelles (347922/543910), 270 m NN.

5018/23, Burgwald: sumpfige Waldfläche südöstlich der Pfaffenköpfe, nahe Höhenpunkt 321,7; der Fundort liegt in dem geplanten Naturschutzgebiet „Christenberger Talgrund“; Sommer 1964.

4719/44, Kellerwald: Sumpf an der Straße von Oberwerbe nach Niederwerbe bei Höhenpunkt 328,2.

4919/44, Burgwald: Herbelhausen, sumpfige Wiese nordöstlich des Ortes (349894/565243), 320 m NN; 17. Juni 1986, W. Eger & W. Becker. Arolsen.

60. *Digitaria ischaemum* (Schreber) Muhl.

4819/12, 4819/14, Kellerwald: auf geschotterten Bahnsteigen in den Bahnhöfen Herzhausen und Schmittlotheim, 250 m NN; 8. Aug. 1982 und in darauffolgenden Jahren.

61. *Eragrostis minor* Host

4819/12, Kellerwald: auf dem geschotterten Bahnsteig des Bahnhofs Herzhausen, 250 m NN; 8. Aug. 1982 und in darauffolgenden Jahren.

62. *Cynoglossum germanicum* Jacq.

4719/44, Kellerwald: im Wald südlich der Straße von Basdorf nach Niederwerbe bei Höhenpunkt 325,5 (349975/567509), 325 m NN; 31. Mai 1982.

63. *Butomus umbellatus* L.

4819/14, Kellerwald: Schmittlotheim, 250 m unterhalb der Ederbrücke bei Höhenpunkt 247 (349340/566918), 247 m NN; nach Hinweis von M. Mengel, mehrere Exemplare; 5. Sep. 1984.

4819/12, Kellerwald: Herzhausen, am Einlauf des Mühlgrabens in den Edersee (349268/567255), 245 m NN; Sommer 1984.

64. *Menyanthes trifoliata* L.

RL 3/3

4819/14, Kellerwald: Harbshausen, sumpfige Stelle auf der Himmelsbreite (349388/567075), 380 m NN; Sommer 1972.

4919/33, Burgwald: Willersdorf, sumpfige Wiese am Bach, etwa 250 m südöstlich Höhenpunkt 318,4 (348910/565350), 320 m NN; 11. Juni 1984.

4919/44, Burgwald: Herbelhausen, sumpfige Wiese nordöstlich des Ortes bei Höhenpunkt 318 (349894/565243), 318 m NN; 17. Juni 1986, W. Eger & W. Becker, Arolsen.

65. *Moenchia erecta* (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.

RL-2/1

4918/24, Ostsauerländer Gebirgsrand: Magerrasenstück südlich der Geismarer Straße an der Oschreufer-Brücke über den Gernhäuser Bach (348768/565885), 280 m NN; 4. Juni 1977.

66.-69. **Martin Lüdecke**, Wittelsbergerstr. 8a, 3550 Marburg 17 (Moischt)

66. *Centunculus minimus* L.

RL 3/3

4917/23, Ostsauerländer Gebirgsrand: auf einem lehmigen Waldweg in einem Seitental des Elbrighäuser Baches (347186/565722), 390 m NN; 3 Exemplare, 23. Juli 1987.

67. *Parnassia palustris* L.

RL 3/3

4919/24, Kellerwald: Feuchtwiese im Gehlinger Grund südlich Löhlbach (349924/565702), 420 m NN; etwa 30 Exemplare; daneben unter anderem *Carex demissa*, *C. pallescens*, *C. panicea*, *C. stellulata*, *Crepis paludosa*, *Dactylorhiza majalis*, *Eriophorum angustifolium*, *Pedicularis sylvatica*; Standort teilweise zerstört, Rest extrem gefährdet durch inzwischen gebauten Tiefbrunnen. Größe des Wasserentnahmetrichters und damit Möglichkeit des Trockenfallens ungeklärt; 21. Aug. 1985.

68. *Ranunculus lingua* L.

RL 2/3

4919/21, Kellerwald: Senke nordöstlich Frankenau (349635/566262), 410 m NN; 6 Exemplare, in eutrophierter Staudenflur, durch Drainmaßnahmen und weitere Düngung gefährdet; 15. Mai 1986.

69. *Trielochin palustre* L.

RL 2/3

4717/22, Hochsauerland: im Ittertal südlich Stryck, „Berwitt-Hütte“ (347348/568174), 630 m NN; 5 Exemplare, Sickerquelle am Hang, extensiv mit Rindern beweidete Wiese; Aug. 1985.