



Un busard cendré, *Circus pygargus*, consommateur d'œufs de Sternes pierregarins, *Sterna hirundo*

Jean CHEVALLIER

Abstract: On the lagoon of Bouin, in the Baie of Bourgneuf in Vendée (France), a Montagu's harrier has been observed on several occasions eating the eggs of Common Tern. This type of predation does not appear to be very frequent with this species of raptor.

Mots clés : Busard cendré, *Circus pygargus*, Rapace, prédation, lagune de Bouin (Vendée, France).

Key words: Montagu's Harrier, *Circus pygargus*, Raptor, predation, Laguna of Bouin (Vendée, France).

Le 19 mai 2003, pendant que je dessine les oiseaux de la réserve de la lagune de Bouin (baie de Bourgneuf, Vendée), un busard cendré, *Circus pygargus*, fait irruption, déclenchant l'envol des limicoles et des sternes. Il est immédiatement pris en chasse par les sternes pierregarins, *Sterna hirundo*, dont plusieurs dizaines de couples nichent sur le site. Le busard virevolte, aussi souple qu'une sterne dans le vent. Il se soustrait aux attaques, s'éloigne, revient puis repère un nid et

s'y pose pour prendre un œuf. Un goéland qui l'a remarqué, le poursuit et l'oblige à battre en retraite. Le busard emporte l'œuf mais le laisse tomber dans sa fuite. Loin d'abandonner pour autant, le voilà qui surgit peu après et le manège se reproduit, notamment sur le même nid. Il en est ainsi à plusieurs reprises et de nouveau un moment plus tard, mais cette fois-ci aucun goéland n'est là pour harceler le busard. Le rapace en profite pour manger l'œuf sur place, baissant la tête





Dessins : Jean CHEVALLIER

à chaque piqué des sternes qui se succèdent à quelques secondes d'intervalle. Il prend même le temps de consommer un deuxième oeuf du même nid et revient une nouvelle fois avant la nuit. Ce jour-là, le busard cendré a certainement consommé une dizaine d'œufs de Sterne pierregarin. Le lendemain, en quatre heures d'observation, je ne le vois venir que deux fois.

Si le Busard cendré consomme des œufs et à l'occasion des poussins, son régime alimentaire est néanmoins basé sur les campagnols qu'il capture dans les cultures et les prairies (GÉROUDET P., 1965. – *Les Rapaces diurnes et nocturnes d'Europe*. Édit. Delachaux & Niestlé : 217-222). Cet individu a donc trouvé une nouvelle source de nourriture abondante et disponible à peu de frais. Il aurait été intéressant de savoir s'il a continué ses prélèvements au cours de la saison de nidification. Notons enfin que le busard ne s'est pas aventuré sur la colonie plus regroupée, constituée de sternes caugek (*Sterna sandvicensis*), de mouettes mélanocéphales (*Larus melanocephalus*) et de mouettes rieuses (*Larus ridibundus*).

L'impact de cette prédation n'est sûrement pas très dommageable à une espèce comme la Sterne pierregarin qui produit facilement une ponte de remplacement. Par contre, l'apparition de ce genre de prédation spécialisée montre une limite à la mise en réserve de sites destinés à protéger des espèces pionnières comme les sternes.

Jean CHEVALLIER
Les Clos
78830 BONNELLES

