Tabelle 1 Mayer_Tabelle 27.05.10 09:21 Seite 1

Tabelle 1: Aufnahmen des *Sieversio-Nardetum strictae*. S = Schafweide, R = Rinder/Pferde-Weide, B = Brache; Lokalität: O = Obergurgl, V = Vent.

Table 1: Relevés of the *Sieversio-Nardetum strictae*. S = grazing by sheep, R = grazing by cattle/horses, B = abandoned; Locality: O = Obergurgl, V = Vent.

1–55 *Sieversio-Nardetum strictae trifolietosum repentis*
1–34 Variante mit *Rumex alpestris* / Variant with *Rumex alpestris*
35–55 Variante mit *Ranunculus nemorosus* / Variant with *Ranunculus nemorosus*
56–79 *Sieversio-Nardetum strictae callunetosum*
80–120 *Sieversio-Nardetum strictae festucetosum halleri*
80–100 Variante mit *Sempervivum montanum* / Variant with *Sempervivum montanum*
101–120 Variante mit *Mutellina adonidifolia* / Variant with *Mutellina adonidifolia*
101–107 Typische Subvariante / Typical subvariant
108–120 Subvariante mit *Trifolium pallescens* / Subvariant with *Trifolium pallescens*

TWINSPAN-Teilungsebenen	1				1			
	2		2		2		2	
	3	3	3	3	3	3	3	3
Syntaxa des *Sieversio-Nardetum strictae*	***Sieversio-Nardetum strictae trifolietosum repentis***		***Sieversio-Nardetum strictae callunetosum***		***Sieversio-Nardetum strictae festucetosum halleri***			
	Variante mit *Rumex alpestris*	Variante mit *Ranunculus nemorosus*			Variante mit *Sempervivum montanum*		Variante mit *Mutellina adonidifolia*: Typische Subvariante	Variante mit *Mutellina adonidifolia*: Subvariante mit *Trifolium pallescens*
Aufnahme-Nummer	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79		80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99		101 102 103 104 105 106 107	108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Meereshöhe (m)	1921 2200 1903 2006 2114 2050 2097 2214 2271 2126 2048 2279 2074 2249 2108 2020 2323 2020 2085 2081 2044 1924 1982 2055 2065 1995 1995 1905 1905 1890 1913 1944 1931 1958	1910 2170 2155 2105 1930 2010 1920 1879 2040 2190 2240 2040 2310 2300 2260 1945 1975 2200 2245 2255	2075 2038 2075 2187 2060 1917 1939 2175 1968 2034 2096 2096 1915 2065 2100 2075 2105 2248 2232 2065 2366 2417 2299 2101		2320 2295 2430 2410 2329 2250 2360 2450 2390 2550 2480 2550 2550 2480 2520 2450 2320 2400		2420 2450 2399 2290 2356 2440 2065	2360 2450 2420 2510 2480 2495 2460 2440 2430 2390 2310 2270 2275
Inklination (°)	7 13 25 26 15 19 0 31 10 15 25 35 24 32 15 10 30 30 31 36 25 16 35 40 32 30 30 20 18 29 38	20 34 28 25 35 4 14 18 23 22 7 32 28 24 11 7 16 4 16	26 28 20 35 14 10 10 28 35 20 33 13 35 34 29 33 34 0 30 38 34		36 35 35 41 30 21 20 20 27 34 35 38 34 35 25 36 25 25		15 20 23 16 15 15 33	27 30 35 34 23 25 30 30 25 30 34 27
Exposition	O SSO NO NO O SO O O SO O O S O SO SO O NO SO SO O SO O O SO O NO	SO SSW SSW SW SO NO NO OSO O SSW OSO SO NO SO SW WNW NO SO SO SO	SO SO O SO SO S O O SO SO SO SO SO SO O O SO SO O O O O		NO SO SO SO O SO SO SO O SO SO SO SO SO SO S S O N		SO SO O O NO SO SO N	NW W W W W W NW NW W W W W W WSW W NW W NW
Gesamtdeckung (%)	95 85 90 100 75 85 94 96 97 80 90 90 96 98 100 89 89 85 95 93 90 87 85 90 92 87 95 90 87 85 80 85	100 80 95 100 90 90 90 75 93 100 65 95 100 99 98 90 95 100 99	76 76 75 85 97 90 85 96 96 87 91 92 93 77 70 90 82 75 98 80		70 70 40 85 80 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 95 90 90 90 85		100 100 97 87 97 98 99	90 95 95 90 95 95 95 90 90 90 90 95 95 90 90 95 90 90
Anzahl der Mahden pro Jahr	0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Beweidung	– – – B B R R B B B B R B B B B R B R R R R R S S S S S S S S S – R R R R B B B B B B R R R B B B B B B R B B B B	B B B B R R R R R S S S S S S S S S S S S	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		S S S S S B B B S S S S S	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Lokalität	O O O O

Tabelle 1 Mayer_Tabelle 27.05.10 09:21 Seite 2

Zu Mayer et al.: Wirtschaftsgrünland und Weiden im inneren Ötztal

Tabelle 2: Aufnahmen des *Trisetetum flavescentis.* S = Schafweide, R = Rinder/Pferde-Weide, B = Brache; Düngung: M = Mist, K = Mineraldünger, MK = Mist + Minteraldünger; Lokalität: O = Obergurgl, V = Vent.

Table 2: Relevés of the *Trisetetum flavescentis*. S = grazing by sheep, R = grazing by cattle/horses, B = abandoned; Fertilization: M = farmyard manure, K = mineral fertilizer, MK = farmyard manure + mineral fertilizer. Locality: O = Obergurgl, V = Vent.

1–47 *Trisetetum flavescentis nardetosum*
- 1–9 Variante mit *Botrychium lunaria* / Variant with *Botrychium lunaria*
- 10–47 Variante mit *Deschampsia cespitosa* / Variant with *Deschampsia cespitosa*
  - 10–18 Subvariante mit *Carex nigra* / Subvariant with *Carex nigra*
  - 19–47 Typische Subvariante / Typical subvariant

48–102 *Trisetetum flavescentis typicum*
- 48–59 Variante mit *Peucedanum ostruthium* / Variant with *Peucedanum ostruthium*
- 60–78 Typische Variante / Typical variant
- 79–102 Variante mit *Dactylis glomerata* / Variant with *Dactylis glomerata*

| TWINSPAN-Teilungsebenen | 1 | | |