

- Digitalisierte Fassung im Format PDF -

Catalogus Plantarum

Zappa

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](#) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

(o) i (o)
CATALOGUS
PLANTARUM
METHODO LINNÆANA
QUAE IN HORTO SEXTIATO
FRATRUM ZAPPA
COLUNTUR
MDCCLXXXV.

A

gave Americana.

Eadem fol. varieg.

Fœtida.

Sobolifera.

Vivipara.

Aloe afr. major, maculata, perfoliata, spinosa.

Afr. minor, perfoliata, spinosa.

Arachnoidea.

Carinata verrucosa.

Disticha verrucosa linguiformis.

Glauca caulescens spinis rubris.

Humilis.

Margaritifera disticha verrucosa.

Margaritifera minor.

Margatifera minima.

mitriformis.

N 10
99

Aloe

о) 2 (о

Aloe Perfoliata caulescens.	Cactus mamil. <i>spin. flavis.</i>
— Plicatilis.	— Moniliformis.
— Retusa.	— Opuntia.
— Spiralis.	— Pereschia.
— Succotrina,	— Peruvianus.
— Variegata.	— Phyllanthus.
— Vera.	— Pitayava.
— Viscosa.	— Repandus.
Aletris fragrans.	— Sulciscarens.
— Guineensis.	— Tetragonus.
— Hyacinthoides.	— Triangularis.
— Uvaria.	— — variegatus.
Anthericum frutescens.	— Tuna.
	— Tuna minor <i>spin. alb.</i>
	Claytonia portulacaria.
Cacalia anteuphorbia.	Cotyledon hemisphaerica.
— Ficoides.	— Farinosa orbiculata.
— Kleinia.	— Laciniata.
— Repens.	— Punctata.
Cactus cochenilifer.	— Serrata.
— Curassavicus.	Crassula cultrata.
— Ficus indica.	Crassula perfoliata.
— — altera alba <i>edulis</i> .	— Planifolia nova.
— Flagelliformis.	— Punctato perfol. nova
— Flavescentia.	— Teragona.
— Grandiflorus.	
— Heptagonus <i>spin. alb.</i>	
— Mammillaris <i>spin. rub.</i>	

Eua

- Euphorbia antiquorum.
 — Canariensis.
 — Caput medusæ major.
 — — minor.
 — Cotinifolia.
 — Heptagona nova.
 — Mammillaris.
 — Mauritanica.
 — Myrsinites.
 — Nervifolia.
 — Officinalis.
 — Tirucalli.
 — Tithymaloides myrtifol.
 — Viminalis.
- Mesembryanthemum acinaciforme.
 — Barbatum.
 — — Humile.
 — Bellidiflorum.
 — Calamiforme.
 — Crassifolium.
 — Deltoides.
 — Falcatum.
 — Geniculiflorum.
 — Glaucum.
 — Glomeratum.
- Mesembryanth. Hispidum.
 — Linguiforme pellucid.
 — — villosum.
 — Noctiflorum.
 — Splendens.
 — Tenuifolium.
 — Tortuosum.
 — Uncinatum diacantos.
 — — triachantos.
 — Verruculatum.
 — Villosum.
- Portulaca anacampseros.
- Saxifraga aizoides ? Jaq.
 flora aust.
- Sempervivum arboreum.
 — Arachnoideum.
 — Tectorum.
- Sedum aizoon.
 — Anacampseros.
 — Reflexum.
- Stapelia hirsuta.
 — Variegata.
 — — monstrosa.
- Yucca aloifolia.
 — Gloriosa.
- Ar-

- Abrus precatorius*.
Acanthus mollis.
Acer platanoides.
Achillea ligustica.
 — *Ptarmica fl. pleno*.
 — *Tomentosa*.
Achyranthes indica.
 — *Prostrata*.
Aconitum napellus.
Acorus calamus.
Acrosticum marantæ.
Aetea racemosa.
 — *Spicata*.
Aeschynomene grandiflora
 — *Sesban*.
Agrostemma coron.fl. plen.
Albuca minor.
Alstroemeria peregrina.
Amonium zerumbet.
 — *Zingiber*.
Amorpha fruticosa.
Amygdalus nana fl. pleno.
Anagallis monelli.
Anagyris foetida.
Anemones plures varietat.
 — *Hepatica*,
Anthemis nobilis.
 — *Tinctoria*.
- Antirrhinum majus*.
Anthyllis barbajovis.
Apocynum androsaemifol.
 — *Cannabium*.
 — *Venetum*.
Aquilegia vulgar. fl. cœrul.
 — — *fl. carneo*.
 — — *fl. discolor*.
Arachis hypogaea.
Arbutus unedo.
Arduina bispinosa.
Aristolochia sempervirens
Artemisia abrotanum.
 — *Absinthium*.
 — *Arborescens*.
 — *Cœrulescens*.
Arum colocasia.
Arundo picta.
Asclepias curassavica.
 — *Fruticosa*.
 — *Incarnata*.
 — *Nivea*.
 — *Sibirica*.
 — *Syriaca*.
 — *Tuberosa*.
Aster acris.
 — *Chinensis varior. col.*
 — *Cordifolius*.
- Aster

- Aster Ericoides.
 — Humilis.
 — Macrophyllus.
 — Novæ angliæ.
 — Novi belgii.
 — Rigidus.
 Atraphaxis spinosa.
 — Undulata.
 Atropa belladonna.
 — Physaloides.

 Baccharis dioscoridis.
 Bellis perennis fl. fistulosa.
 Berberis vulgaris.
 Bignonia capreolata.
 — Catalpa.
 — Radicans.
 Bocsea Yervamora.
 Bromelia ananas.
 — — Lucide virens inerm.
 — — Fructu albescente.
 — — Fructu coccineo.
 — — Fructu viridi inermis.
 — — Purpurascens inermis.
 — — Variegata.
 Buchnera americana.
 Buphtalmum frutescens.
 — Salicifolium.
- Calla æhiopica.
 Callicarpa americana.
 Canna indica.
 — Glauca.
 — Fl. coccineo.
 Capsicum baccatum.
 — Annum olivæforme.
 Carica papaya plantæ fam.
 Carlina acaulis.
 Cassia bicapsularis.
 Marylandica.
 Nicitans.
 Occidentalis.
 Fistula.

 Cassine maurocenia.
 — Peragua.
 Catananche cœrulea.
 Ceanothus africanus.
 Celastrus buxifolius.
 — Myrtifolius.
 Centaurea ragusina.
 Ceratonia filqua.
 Cercis canadensis.
 — Siliquastrum.
 Cestrum diurnum.
 — Nocturnum.
 Chelone obliqua.
 — Penstemon.

Che.

- Chelidonium majus fl. pl.*
Chenopodium multifidum.
Chironia fruticosa.
Chrysocoma ciliata.
Cineraria amelloides.
 — *Maritima*.
Cissus acida.
Cistus canariensis.
 — *Creticus*.
 — *Crispus*.
 — *Helianthemum*.
 — *Incanus*.
 — *Ladanifer*.
 — *Laurifolius*.
Citharexylum quadrangul.
Clutia pulchella.
Clematis cirrhosa.
 . *Erecta*.
 . *Integritolia*.
 . *Orientalis*.
 . *Viorna*.
 . *Virginica*.
 . *Viticella fl. pleno*.
Cleome aculeata.
 — *Gigantea*.
Clethra alnifolia.
Clinopodium incan. varieg.
Clitoria ? guadeloupensis.

Coffea arabica.
Colutea arborescens.
 . *Orientalis fl. sanguin.*
Columnea humilis.
Commelinia africana.
Conyza faxatilis.
Coreopsis verticillata.
Coriaria myrrifolia.
Cornus mascula.
 — *Sanguinea*.
Coronilla emerus.
 — *Glauca*.
 — *Valentina*.
Crataegus aria.
 — *Azarolus*.
Crinum zeylanicum fl. var.
Christmum maritimum.
Crotalaria arboresc. novae.
Cupressus sempervirens.
Cycas circinalis.
Cyclamen europeum.
Cyperus esculentus.
 — *Longus*.
 — *Papyrus*.
Cytisus cajan.
 . *Laburnum*.
 . *Nigricans*.

 Da-

- Daphne cneorum. —
 — Indica. —
 — Laureola. —
 — Mezercum. —
 Decumaria barbara. —
 Dianthus caryophyll. pl. v.
 — Chinensis idem. —
 Digitalis obscura. —
 — Purpurea. —
 Dioscorea sativa. —
 Dodechateon meadia. —
 Dolichos lignosus. —
 — Minimus. —
 — Sexquipedalis. —
 — Soja. —
 Dictamnus albus. —
 Diospyros lotus. —
 Dracocephalum canariense
 — Sibiricum. —
 Duranta ellisia. —
 — Heterocarpum distans. —
 Ehretia bourreriae. —
 Eleagnus angustifolius. —
 Erica capensis. —
 Erysimum barbareaf. l. lut. pl.
 Erythrina corallodendron.
 — Herbacea.
- Ferraria undulata. —
 Ficus benghalensis. —
 Ficus indica *citrifolia*. —
 Firmiana chinensis *Marsili*. —
 Fraxinus excelsior. —
 — Ornu. —
 Fritillaria meleagr. pl. var.
 — Persica. —
 — — —
 Galega tinctoria. —
 Gardenia florida. —
 Genista tinctoria. —
 Geranium acutostum. —
 — Capitatum. —
 — Coriandrifolium. —
 — Cucullatum. —
 — Cucullæforme *nouum*. —
 — Gibbosum. —
 — Hibridum. —
 — Inquinans. —
 — — — *variet. fl. kerm.* —
 — Macroorrhizon. —
 — Odoratissimum. —
 — Papilionaceum. —
 — Peltatum. —
 — Trigonum *nouum*. —
 — Triste. —
 — Sanguineum. —
 — — — Ge-

- Geranium Vitifolium*. — *Hæmanthus puniceus*.
 — *Zonale*. — *Hedysarum canadense*.
 — — *ex albo varieg.* — *Gangeticum*.
Ginkgo biloba. — *Heliotropium peruvianum*.
Gleditschja inermis. — *Helleborus niger*.
 — *Triacanthos*. — *viridis*.
Globularia vulgaris. — *Hesperis matronalis*.
 — *Cordifolia*. — *Sibirica*.
Gloriosa superba. — *Heuchera americana*.
Glycine apios. — *Hibiscus malvaviscus*.
 — *Frutescens*. — *Manihot*.
Glycyrrhiza echinata. — *Moscheutos*.
 — *Glabra*. — *Mutabilis*.
Gnaphalium concolor. — *Rosa sinensis fl. pleno*.
 — *Foetidum*. — *Simplex*.
 — *Maritimum capen.nov.* — *Spinifex*.
 — *Stoechas*. — *Sabdariffa*.
Gorteria ringens. — *Syriacus*.
Gossypium arboreum. — — *fol. variegat.*
 — *Herbaceum*. — *Trionum*.
 — *Hirsutum*. — *Hieracium aurantiacum*.
 — *Religiosum*. — *Pilotella*.
 — *Ruffum ex ota hyttee*. — *Hypericum ascyrum*.
Grewia occidentalis. — *Canariense*.
Guajacum afrum. — *Triquetrum*.
 . — *Thymus*. — *Herpestes*.
 . — *Sandwicensium*. — *Ibe*.

- Iberis garexiana.
 Ilex aquifolium.
 Indigofera tinctoria.
 Inula crithmoides.
 Ipomea ooccinea.
 — Quamoclit.
 — Triloba.
 Iris graminea.
 — Persica.
 — Squallens.
 — Sustiana.
 — Variegata.
 — Xiphium.
 Itea virginica.
 Jasminum azoricum.
 — Fruticans.
 — Glanditlorum.
 — Odoratissimum.
 — Officinale.
 Jatropha curcas apium punct.
 Sanat.
 — Urens.
 Juglans nigra.
 — Regia.
 Juniperus communis.
 — Sabina.
 Justicia adhatoda.
 Kempheria galanga.
- Kunegunda Banks.
 Lantana aculeata.
 — Camara.
 — Trifolia.
 Lavandula canariensis.
 Lavatera micans.
 Laurus benzoin.
 — Nobilis.
 Liriodendron tulipifera.
 Lobelia cardinalis.
 — Longiflora.
 — Siphilitica.
 Lonicera caprifolium.
 — — fol. varieg.
 — Diervilla.
 — Sempervirens.
 — Symphoricarpos.
 Lotus jacobaeus.
 Lycium barbarum.
 — Europeum.
 — Fragile banks.
 — Rosmarinifolium var.
 riteas barbari.
 Lychnis chalcedonica fl.
 coccin. pleno.
 — Flos cuculi fl. pl.
 Lythrum virgatum.

Ma-

- Magnolia acuminata*.
 — *Grandiflora*.
Malpighia punicifolia.
Malva arborescens.
 — *Mauritiana*.
Marrubium crispum.
Medeola asparagoides.
Medicago arborea.
 — *Marina*.
Melia azederach.
Melianthus minor.
Mimosa farnesiana.
 — *Glaucia*.
 — *Horrida*.
 — *Nilotica*.
 — *Pernambucana*.
 — *Pigra*.
 — *Pudica*.
 — *Scandens*.
Mimulus ringens.
Mirabilis longiflora.
Mentha carolin. od. bergam.
 — *Cervina*.
 — *Piperita*.
 — *Sylvestris*.
Mespilus germanica.
Monarda clinopodia.
 — *Didyma*.
Monarda Punctata.
Moræa iridioides.
 — *Vegeta*.
Morus indica.
 — *Nigra*.
 — *Papirifera*.
 — *Tatarica*.
Myrica cerifera.
 — *Cordifolia*.
Myrsine africana.
Myrtus communis.
 — — *fl. pleno*.
 — *Pimenta*.
 — *Tarentina*.
Napæa lævis.
Nereum oleander.
 — *fol. varieg.*
Nepeta italicæ.
Nystantes sambac *fl. dupl.*
 — — *fl. pleno*.
Ocimum scutellarioides.
Oenothera fruticosa.
Olea europæa.
Onoclea sensibilis.
Origanum dictamnus.
 — *Majorana*.

- Osmunda regalis.
 — Spicant.
 Othonna cheirifolia.
 Oxalis pes-caprae.
 Passiflora holosericea.
 — Rotundifolia.
 — Suberosa.
 Pentapetes phœnicaea.
 Periploca græca.
 Petiveria alliacea.
 Phaseolus caracalla.
 Philadelphus coronarius.
 Phlomis herbi venti.
 — Leonurus.
 — Tuberosa.
 Phlox carolina.
 — Divaricata.
 — Glaberrima fl. albo,
 Phylica ericoides.
 Phyllis nobla.
 Phyteuma orbicularis.
 Pinus abies.
 — Picea.
 — Pinea.
 — Sylestris.
 Piper obtusifolium.
 — Pellucidum.
- Piper Reticulatum.
 Pistacia terebinthus.
 — Vera.
 Plantago maj. var. rosæformis
 Platanus occidentalis.
 — Orientalis.
 Plumbago zeylanica.
 Polianthes tuberosa fl. pl.
 Polypodium vulgare.
 Populus balsamifera.
 Poterium spinosum.
 Prasium majus,
 Prunus canadensis.
 — Caproniana nana.
 — Virginiana.
 Psoralea bituminosa.
 — Glandulosa.
 — Pinnata.
 — Sempervirens.
 Punica granatum.
 — — flore pleno.
 Pyrus baccata.
 — Cydonia.
- Reseda odorata.
 — Setamoides.
 Rhamnus alaternus fol. var.
 — Catharticus.
- Rham-

- Rhamnus Paliurus.* — *Zyzaphus.* — *Rheum compactum.* — *Rhabarbarum.*
Rodiola rosea. — *Rhododendron ferrugin.* — *Rhus copallinum.* — *Coriaria.* — *Cotinus.* — *ex Macao nova species*
Glabrum. — *Lævigatum.* — *Lucidum.* — *Radicans.* — *Succedaneum.* — *Toxicodendron.* — *Tiphynum? caule hirs.*
Veraix. — *Ribes alpinum.* — *Grossularia.* — *Nigrum.* — *Rubrum.* — *Rivina huniilis.* — *Robinia caragana.*
Frutescens. — *Halodendron.* — *Pseudoacacia.* — *Rosæ plurimæ.* — *Rubia tinctoria.* — *Rubus odoratus.* — *Rudbeckia hirta.*
Purpurea. — *Ruellia paniculata.* — *Ruscus aculeatus.* — *Hypoglossum.* — *Royena glabra.* — *Hirsuta.* — *Lucida.* — *Rumex Lunaria.*
Salix babilonica. — *Salsola fruticosa.* — *Salvia aurea.* — *Coccinea.* — *Indica.* — *Nivea.* — *Officinalis.* — *Sambucus laciniata.*
Nigra. — *Santolina chamaecyparissus.* — *Villosa variet. hispan.* — *Saponaria officinalis.* — *Satureja juliana.* — *Montana.* — *Virginiana.* — *Saxifraga crassifolia.* — *Saxi-*

- Saxifraga irregularis.
 Scabiosa africana frutesc.
 — Atropurpurea.
 — Colombaria.
 Schinus molle.
 Scutellaria cretica.
 Senecio capensis *nova spec.*
 — Doria.
 Sida abutilon.
 — Arborescens v. *Malva*
 — Brasiliensis.
 — Coronata.
 — Spinoza.
 Sideritis incana.
 Silene fruticosa.
 Silphium perfoliatum.
 — Terebinthinaceum.
 Smilax aspera.
 — China.
 — Sarsaparilla.
 Solanum auriculatum.
 — Capsicoides.
 — Carolinense.
 — Guadeloupense *novum*
 — Havanense.
 — Indicum.
 — Lycioides.
 — Macrocarpos.
 Solanum Mammosum.
 — Pleudocapsicum.
 — Sodomeum.
 — Tomentosum.
 — Zeylanicum.
 Solidago altissima.
 — Canadensis.
 — Lateriflora.
 — Mexicana.
 Sorbus aucuparia.
 — Domestica.
 Spiraea aruncus.
 — Crenata.
 — Hypericifolia.
 — Lævigata.
 — Opulifolia.
 — Salicifolia.
 — Trifoliata.
 — Ulmaria fl. *pleno*.
 Staphylæa pinnata.
 — Trifolia.
 Statice monopetala.
 — Scorzoneraefolia.
 Syringa persica fol. lacin.
 — Vulgaris.
 Tanacetum vulg. *crispum*.
 Tetragonia cornuta *solander*
 — Fruticosa.

Teu-

- Teucrium asiaticum*.
 — *Flavum*.
 — *Fruticans*,
 — *Marum*.
 — *Massiliense*.
 — *Polium*.
Taliatrum cornuti.
Thea bohea.
 — *Viridis*.
Theobroma augusta.
Thuya orientalis.
Thymus masticina.
 — *Serpillum*.
Tournefortia volubilis.
Tradescantia virginica.
Tropeolum maj. fl. pleno.
Turnera ulmifolia.

Ulex europeus.
Urena lobata.

 — *Algeriensis*.
Tauschia arborescens.
Tetragonia contorta.
 — *Hirtigooey*.
- Urtica nivea*.
Vaccinium vitis idea.
Valeriana officinalis.
Verbena jamaicensis.
Viburnum lanata.
 — *Roseum*.
 — *Tinus*.
Vinea rosea.
 — *Variegata*.
Vitex agnuscastus fl. albo.
 — — *fl. cæruleo*.
Vitis vinifera capensis.
 — *Caroliniana*.

Zanthoxylum clava hercul.
Zappania odoratiss. scopolii.
 — *genus novum*.
Zinnia multiflora.
 — *Paucifera*.
Zygophyllum fabago.

PLANTÆ IGNOTÆ NOVÆ.

Annona? ex insula Ota-hitee.

Caulis erectus, ramosus, ramis alternis declinatis, villosulis: *Folia* alterna breviter petiolata longitudine trium unciarum, latitudine 1. $\frac{1}{4}$ lanceolato-ovata, integriflora, acuta supra lucida, & levissime villosa, subius pallidiora & tomentoso-incana: *Petioles* semiunciales, teretes, villosi, lutescentes. *Stipulae* binæ, oppositæ, setaceæ, reflexæ, marcescentes.

Arbuscula trium annorum tripedalis altitudinis nondum flores protulit.

Planta ex Tongataboo sive Novo Amstelodamo.

Caulis erectus glaber, ramosus, punctulæ per totum caulem albis adspersus, lineisque per foliorum intervalla binis inscriptus; ramis sparsis patentibus. *Folia* alterna patentia brevissime petiolata, ovalia, longitudine 3 unciarum, latitudine 2 uncias superantia, pergamentacea, lucida, integriflora, concava, perennia, nervosa, nervis, simplicibus undecim circiter utrinque manifestis.

Habitus foliorum ad Plantaginem majorem accedens. an Hexandria?

Frutex quinque annorum 4 pedalis nundum floruit.

Hedysarum? ex Insula Ota-bitee.

Caulis erecto-patens, ramosus villis exiguis adspersus; ramis inferioribus arcuatis: *Folia* ternata obovato-cuneiformia, integerima, vix emarginata villis utrinque minutissimis adspersa, dependentia: *Petioli* communes, semiunciales, semiteretes, marginati, erecti, quorum pedicelli laterales breves unica stipula setacea notati; intermedius elongatus stipulas duas proferens
Planta suffruticosa trium annorum *ultrapedalis*,
ad hoc flores non gessit.

Portlandiae similis.

Caulis erectus carnosus laevis. *Folia* ficus indicæ elliptica, carnosa, lucida patentia utrinque obsolete villosa, apice reflexa, subundulata, subrepanda integerima, marginibus contractis, venisque alternis supernæ ramosis, quorum diameter longitudinalis 5 uncialis transversalis 2.

Petioli sessiles, subunciales, semiteretes, interne saepe atro-purpurei.

Habitus Phytolaccæ Frutex biennis ultrapedalis nondum floruit.

W. J. IV. C. 106.