

- Beispielhafter Auszug aus der digitalisierten Fassung im Format PDF -

Catalogus Plantarum

Zappa

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](#) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

(o) i (o)
CATALOGUS
PLANTARUM
METHODO LINNÆANA
QUAE IN HORTO SEXTIATO
FRATRUM ZAPPA
COLUNTUR
MDCCLXXXV.



A.*gave Americana*.

— *Eadem fol. varieg.*

— *Fœtida*.

— *Sobolifera*.

— *Vivipara*.

Aloe afr. major, maculata, perfoliata, spinosa.

— *Afr. minor, perfoliata, spinosa.*

— *Arachnoidea*.

— *Carinata verrucosa*.

— *Disticha verrucosa linguiformis*.

— *Glauca caulescens spinis rubris*.

— *Humilis*.

— *Margaritifera disticha verrucosa*.

— *Margaritifera minor*.

— *Margatifera minima*.

— *mitriformis*.

418

N 10
99

Aloe

о) 2 (о

Aloe Perfoliata caulescens.	Cactus mamil. <i>spin. flavis.</i>
— Plicatilis.	— Moniliformis.
— Retusa.	— Opuntia.
— Spiralis.	— <i>Perechia.</i>
— Succotrina,	— <i>Peruvianus.</i>
— Variegata.	— <i>Phyllanthus.</i>
— Vera.	— <i>Pitayava.</i>
— Viscosa.	— <i>Repandus.</i>
Aletris fragrans.	— <i>Sulciscarens.</i>
— Guineensis.	— <i>Tetragonus.</i>
— Hyacinthoides.	— <i>Triangularis.</i>
— Uvaria.	— — <i>variegatus.</i>
Anthericum frutescens.	— <i>Tuna.</i>
	— <i>Tuna minor spin. alb.</i>
	Claytonia portulacaria.
Cacalia anteuphorbia.	Cotyledon hemisphærica.
— Ficoides.	— <i>Farinosa orbiculata.</i>
— Kleinia.	— <i>Laciniata.</i>
— Repens.	— <i>Punctata.</i>
Cactus cochenilifer.	— <i>Serrata.</i>
— Curaassavicus.	Crassula cultrata.
— Ficus indica.	Crassula perfoliata.
— — altera alba <i>edula</i> .	— <i>Planifolia nova.</i>
— Flagelliformis.	— <i>Punctato perfol. nova</i>
— Flavescentia.	— <i>Tetragona.</i>
— Grandiflorus.	
— Heptagonia <i>spin. alb.</i>	
— Mammillaris <i>spin. rub.</i>	

Eus

- Euphorbia antiquorum.
 — Canariensis .
 — Caput medusæ major.
 — — minor .
 — Cotinifolia .
 — Heptagona nova .
 — Mammillaris .
 — Mauritanica .
 — Myrsinites .
 — Nervifolia .
 — Officinalis .
 — Tiscallii .
 — Tithymaloides myrtifol.
 — Viminalis .
- Mesembryanthemum acinaciforme.*
- Barbatum .
 — — Humile .
 — Bellidiflorum .
 — Calamitiforme .
 — Crassifolium .
 — Deltoides .
 — Falcatum .
 — Geniculiflorum .
 — Glaucum .
 — Glomeratum .
- Mesembryanth. Hispidum.*
 — Linguiforme pellucid.
 — — villosum .
 — Noctiflorum .
 — Splendens .
 — Tenuifolium .
 — Tortuosum .
 — Uncinatum diacantos.
 — — triachantos .
 — Verruculatum .
 — Villosum .
- Portulaca anacampseros.*
- Saxifraga aizoides ? Jaq.*
flora aust.
- Sempervivum arboreum.*
 — Arachnoideum .
 — Tectorum .
Sedum aizoon.
 — Anacampseros .
 — Reflexum .
Stapelia hirsuta .
 — Vatiegata .
 — — monstrosa .
- Yucca aloifolia .*
 — Gloriosa .
- Ar-

o) 4 (o)

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Abrus precatorius. | Antirrhinum majus. |
| Acanthus mollis. | Athyrris barbajovis. |
| Acer platanoides. | Apocynum androsaemifol. |
| Achillea ligustica. | — Cannabis. |
| — Ptarmica fl. pleno. | — Venetum. |
| — Tomentosa. | Aquilegia vulgar. fl. cœrul. |
| Achyranthes indica. | — — fl. carneo. |
| — Prostrata. | — — fl. discolor. |
| Aconitum napellus. | Arachis hypogaea. |
| Acorus calamus. | Arbutus unedo. |
| Acrosticum marantæ. | Arduina bispinosa. |
| Aetea racemosa. | Aristolochia sempervirens |
| — Spicata. | Artemisia abrotanum. |
| Aethionome grandiflora | — Absinthium. |
| — Sesban. | — Arborescens. |
| Agrostemma coron. fl. plen. | — Cœrulescens. |
| Albuca minor. | Arum colocasia. |
| Alstroemeria peregrina. | Arundo picta. |
| Amonium zerumbet. | Asclepias curassavica. |
| — Zingiber. | — Fruticosa. |
| Amorpha fruticosa. | — Incarnata. |
| Amygdalus nana fl. pleno. | — Nivea. |
| Anagallis monelli. | — Sibirica. |
| Anagyris foetida. | — Syriaca. |
| Anemones plures varietat. | — Tuberosa. |
| — Hepatica, | Aster acris. |
| Anthemis nobilis. | — Chinensis varior. col. |
| — Tinctoria. | — Cordifolius. |
| | Aster |

- Aster Ericoides.
 — Humilis.
 — Macrophyllus.
 — Novæ angliæ.
 — Novi belgii.
 — Rigidus.
 Atraphaxis spinosa.
 — Undulata.
 Atropa belladonna.
 — Physaloides.
 Baccharis dioscoridis.
 Bellis perennis fl. fistulosa.
 Berberis vulgaris.
 Bignonia capreolata.
 — Catalpa.
 — Radicans.
 Bocsea Yervamora.
 Bromelia ananas.
 — — Lucide virens inerm.
 — — Fructu albescente.
 — — Fructu coccineo.
 — — Fructu viridi inermis.
 — — Purpurascens inermis.
 — — Variegata.
 Buchnera americana.
 Buphtalmum frutescens.
 — Salicifolium.
 Calla æhiopica.
 Callicarpa americana.
 Canna indica.
 — Glauca.
 — Fl. coccineo.
 Capsicum baccatum.
 — Annum olivæforme.
 Carica papaya plantæ fam.
 Carlina acaulis.
 Cassia bicapsularis.
 Marylandica.
 Nicotiana.
 Occidentalis.
 Fistula.
 Cassine maurocenia.
 — Peragua.
 Catananche cœrulea.
 Ceanothus africanus.
 Celastrus buxifolius.
 — Myrtifolius.
 Centaurea ragusina.
 Ceratonia filqua.
 Cercis canadensis.
 — Siliquastrum.
 Cestrum diurnum.
 — Nocturnum.
 Chelone obliqua.
 — Penstemon.

Che-

- Chelidonium majus* fl. pl.
Chenopodium multifidum.
Chironia fruticosa.
Chrysocoma ciliata.
Cineraria amelloides.
 — *Maritima*.
Cissus acida.
Cistus canariensis.
 — *Creticus*.
 — *Crispus*.
 — *Helianthemum*.
 — *Incanus*.
 — *Ladanifer*.
 — *Laurifolius*.
Citharexylum quadrangul.
Clutia pulchella.
Clematis cirrhosa.
 . *Erecta*.
 . *Integritolia*.
 . *Orientalis*.
 . *Viorna*.
 . *Virginica*.
 . *Viticella* fl. pleno.
Cleome aculeata.
 — *Gigantea*.
Clethra alnifolia.
Clinopodium incan. varieg.
Clitoria ? guadeloupensis.
- Coffea arabica*.
Colutea arborescens.
 . *Orientalis* fl. sanguin.
Columnea humilis.
Commelinia africana.
Conyza faxatilis.
Coreopsis verticillata.
Coriaria myrrifolia.
Cornus mascula.
 — *Sanguinea*.
Coronilla emerus.
 — *Glauca*.
 — *Valentina*.
Crataegus aria.
 — *Azarolus*.
Crinum zeylanicum fl. var.
Christmum maritimum.
Crotalaria arboresc. nova.
Cupressus sempervirens.
Cycas circinalis.
Cyclamen europeum.
Cyperus esculentus.
 — *Longus*.
 — *Papyrus*.
Cytisus cajan.
 . *Laburnum*.
Nigricans.
 . *Silene*.
 Da-

- Daphne cneorum. —
 — Indica. —
 — Laureola. —
 — Mezercum. —
 Decumaria barbara. —
 Dianthus caryophyll. pl. v.
 — Chinensis idem. —
 Digitalis obscurata. —
 — Purpurea. —
 Dioscorea sativa. —
 Dodechateon meadia. —
 Dolichos dignosus. —
 — Minimus. —
 — Sexquipedalis. —
 — Soja. —
 Dictamnus albus. —
 Diospyros lotus. —
 Dracocephalum canariense
 — Sibiricum. —
 Duranta ellisia. —
 — Heterocarpum bicolor. —
 Ehretia bourreriae. —
 Eleagnus angustifolius. —
 Erica capensis. —
 Erysimum barbareaf. Nut. pl.
 Erythrina corallodendron.
 — Herbacea.
- Ferraria undulata. —
 Ficus benghalensis. —
 Ficus indica citrifolia. —
 Firmiana chinensis Marsili. —
 Fraxinus excelsior. —
 — Ormus. —
 Fritillaria meleagr. pl. var.
 — Persica. —
 — — —
 Galega tinctoria. —
 Gardenia florida. —
 Genista tinctoria. —
 Geranium acutostylum. —
 — Capitatum. —
 — Coriandrifolium. —
 — Cucullatum. —
 — Cucullæforme novum. —
 — Gibbosum. —
 — Hibridum. —
 — Inquinans. —
 — — — variet. fl. kerm. —
 — Macroorrhizon. —
 — Odoratissimum. —
 — Papilionaceum. —
 — Peltatum. —
 — Trigonum novum. —
 — Triste. —
 — Sanguineum. —
 — — — Ge-

- Geranium Vitifolium*. — *Hæmannia punicea*.
 — *Zonale*. — *Hedysarum canadense*.
 — — *ex albo varieg.* — *Gangeticum*.
Ginkgo biloba. — *Heliotropium peruvianum*.
Gleditschja inermis. — *Helleborus niger*.
 — *Triacanthos*. — *viridis*.
Globularia vulgaris. — *Hesperis matronalis*.
 — *Cordifolia*. — *Sibirica*.
Gloriosa superba. — *Heuchera americana*.
Glycine apios. — *Hibiscus malvaviscus*.
 — *Frutescens*. — *Manihot*.
Glycyrrhiza echinata. — *Moscheutos*.
 — *Glabra*. — *Mutabilis*.
Gnaphalium concolor. — *Rosa sinensis fl. pleno*.
 — *Foetidum*. — *Simplex*.
 — *Maritimum capen.nov.* — *Spinifex*.
 — *Stoechas*. — *Sabdariffa*.
Gorteria ringens. — *Syriacus*.
Gossypium arboreum. — *fol. variegat.*
 — *Herbaceum*. — *Trionum*.
 — *Hirsutum*. — *Hieracium aurantiacum*.
 — *Religiosum*. — *Pilotella*.
 — *Ruffum ex ota. hythee*. — *Hypericum ascyrum*.
Grewia occidentalis. — *Canariense*.
Guajacum afrum. — *Triquetrum*.
 — *Tigridie*. — *Herpestes*.
 — *Sanguinaria*. — *Ibe-*

- Iberis garexiana.
 Ilex aquifolium.
 Indigofera tinctoria.
 Inula crithmoides.
 Ipomea ooccinea.
 — Quamoclit.
 — Triloba.
 Iris graminea.
 — Persica.
 — Squallens.
 — Sufiana.
 — Variegata.
 — Xiphium.
 Itea virginica.
 Jasminum azoricum.
 — Fruticans.
 — Glandiflorum.
 — Odoratissimum.
 — Officinale.
 Jatropha curcas apium punct.
 Sanat.
 — Urens.
 Juglans nigra.
 — Regia.
 Juniperus communis.
 — Sabina.
 Justicia adhatoda.
 Kempheria galanga.
- Kunegunda Banks.
 Lantana aculeata.
 — Camara.
 — Trifolia.
 Lavandula canariensis.
 Lavatera micans.
 Laurus benzoin.
 — Nobilis.
 Liriodendron tulipifera.
 Lobelia cardinalis.
 — Longiflora.
 — Siphilitica.
 Lonicera caprifolium.
 — — fol. varieg.
 — Diervilla.
 — Sempervirens.
 — Symphoricarpos.
 Lotus jacobaeus.
 Lycium barbarum.
 — Europeum.
 — Fragile banks.
 — Rosmarinifolium var.
 riteas barbari.
 Lychnis chalcedonica fl.
 coccin. pleno.
 — Flos cuculi fl. pl.
 Lythrum virgatum.

Ma-

- Magnolia acuminata*.
 — *Grandiflora*.
Malpighia punicifolia.
Malva arborescens.
 — *Mauritiana*.
Marrubium crispum.
Medeola asparagoides.
Medicago arborea.
 — *Marina*.
Melia azederach.
Melianthus minor.
Mimosa farnesiana.
 — *Glauca*.
 — *Horrida*.
 — *Nilotica*.
 — *Pernambucana*.
 — *Pigra*.
 — *Pudica*.
 — *Scandens*.
Mimulus ringens.
Mirabilis longiflora.
Mentha carolina od.bergam.
 — *Cervina*.
 — *Piperita*.
 — *Sylvestris*.
Mespilus germanica.
Monarda clinopodia.
 — *Didyma*.
- Monarda Punctata*.
Moræa iridioides.
 — *Vegeta*.
Morus indica.
 — *Nigra*.
 — *Papirifera*.
 — *Tatarica*.
Myrica cerifera.
 — *Cordifolia*.
Myrsine africana.
Myrtus communis.
 — — *fl. pleno*.
 — *Pimenta*.
 — *Tarentina*.
Napæa lævis.
Nereum oleander.
 — *fol. varieg.*
Nepeta italicæ.
Nystantes sambac *fl. dupl.*
 — — *fl. pleno*.
Ocimum scutellarioides.
Oenothera fruticosa.
Olea europæa.
Onoclea sensibilis.
Origanum dictamnus.
 — *Majorana*.

... und die nächsten 10 Seiten ...
... and the next 10 pages ...

- Iberis garexiana.
 Ilex aquifolium.
 Indigofera tinctoria.
 Inula crithmoides.
 Ipomea ooccinea.
 — Quamoclit.
 — Triloba.
 Iris graminea.
 — Persica.
 — Squallens.
 — Sufiana.
 — Variegata.
 — Xiphium.
 Itea virginica.
 Jasminum azoricum.
 — Fruticans.
 — Glandiflorum.
 — Odoratissimum.
 — Officinale.
 Jatropha curcas apium punct.
 Sanat.
 — Urens.
 Juglans nigra.
 — Regia.
 Juniperus communis.
 — Sabina.
 Justicia adhatoda.
 Kempheria galanga.
- Kunegunda Banks.
 Lantana aculeata.
 — Camara.
 — Trifolia.
 Lavandula canariensis.
 Lavatera micans.
 Laurus benzoin.
 — Nobilis.
 Liriodendron tulipifera.
 Lobelia cardinalis.
 — Longiflora.
 — Siphilitica.
 Lonicera caprifolium.
 — — fol. varieg.
 — Diervilla.
 — Sempervirens.
 — Symphoricarpos.
 Lotus jacobaeus.
 Lycium barbarum.
 — Europeum.
 — Fragile banks.
 — Rosmarinifolium var.
 riteas barbari.
 Lychnis chalcedonica fl.
 coccin. pleno.
 — Flos cuculi fl. pl.
 Lythrum virgatum.

Ma-

- Magnolia acuminata*.
 — *Grandiflora*.
Malpighia punicifolia.
Malva arborescens.
 — *Mauritiana*.
Marrubium crispum.
Medeola asparagoides.
Medicago arborea.
 — *Marina*.
Melia azederach.
Melianthus minor.
Mimosa farnesiana.
 — *Glauca*.
 — *Horrida*.
 — *Nilotica*.
 — *Pernambucana*.
 — *Pigra*.
 — *Pudica*.
 — *Scandens*.
Mimulus ringens.
Mirabilis longiflora.
Mentha carolina od.bergam.
 — *Cervina*.
 — *Piperita*.
 — *Sylvestris*.
Mespilus germanica.
Monarda clinopodia.
 — *Didyma*.
- Monarda Punctata*.
Moræa iridioides.
 — *Vegeta*.
Morus indica.
 — *Nigra*.
 — *Papirifera*.
 — *Tatarica*.
Myrica cerifera.
 — *Cordifolia*.
Myrsine africana.
Myrtus communis.
 — — *fl. pleno*.
 — *Pimenta*.
 — *Tarentina*.
Napæa lævis.
Nereum oleander.
 — *fol. varieg.*
Nepeta italicæ.
Nystantes sambac *fl. dupl.*
 — — *fl. pleno*.
Ocimum scutellarioides.
Oenothera fruticosa.
Olea europæa.
Onoclea sensibilis.
Origanum dictamnus.
 — *Majorana*.

(o) ii (o)

- Osmunda regalis.
 — Spicant.
 Othonna cheirifolia.
 Oxalis pes-caprae.

 Passiflora holosericea.
 — Rotundifolia.
 — Suberosa.
 Pentapetes phœnicaea.
 Periploca græca.
 Petiveria alliacea.
 Phaseolus caracalla.
 Philadelphus coronarius.
 Phlomis herbi venti.
 — Leonurus.
 — Tuberosa.
 Phlox carolina.
 — Divaricata.
 — Glaberrima fl. albo,
 Phylica ericoides.
 Phyllis nobla.
 Phyteuma orbicularis.
 Pinus abies.
 — Picea.
 — Pinea.
 — Sylextris.
 Piper obtusifolium.
 — Pellucidum.
- Piper Reticulatum.
 Pistacia terebinthus.
 — Vera.
 Plantago maj. var. rosæformis
 Platanus occidentalis.
 — Orientalis.
 Plumbago zeylanica.
 Polianthes tuberosa fl. pl.
 Polypodium vulgare.
 Populus balsamifera.
 Poterium spinosum.
 Prasium majus,
 Prunus canadensis.
 — Caproniana nana.
 — Virginiana.
 Psoralea bituminosa.
 — Glandulosa.
 — Pinnata.
 — Sempervirens.
 Punica granatum.
 — — flore pleno.
 Pyrus baccata.
 — Cydonia.
- Reseda odorata.
 — Setamoides.
- Rhamnus alaternus fol. var
 — Catharticus.
- Rham-

- Rhamnus Paliurus.** — *Rubia tinctoria*.
 — **Zyzaphus.** — *Rubus odoratus*.
Rheum compactum. — *Rudbeckia hirta*.
 — **Rhabarbarum.** — *Purpurea*.
Rodiola rosea. — *Ruellia paniculata*.
Rhododendron ferrugin. — *Ruscus aculeatus*.
Rhus copallinum. — *Hypoglossum*.
 — **Coriaria.** — *Royena glabra*.
 — **Cotinus.** — *Hirsuta*.
 — **ex Macao nova species** — *Lucida*.
 — **Glabrum.** — *Rumex Lunaria*.
 — **Lævigatum.** — *Salix babilonica*.
 — **Lucidum.** — *Salsola fruticosa*.
 — **Radicans.** — *Salvia aurea*.
 — **Succedaneum.** — *Coccinea*.
 — **Toxicodendron.** — *Indica*.
 — **Tiphynum? caule hirs.** — *Nivea*.
 — **Veraix.** — *Officinalis*.
Ribes alpinum. — *Sambucus laciniata*.
 — **Grossularia.** — *Nigra*.
 — **Nigrum.** — *Santolina chamaecyparissus*.
 — **Rubrum.** — *Villosa variet. hispan.*
Rivina huniilis. — *Saponaria officinalis*.
Robinia caragana. — *Satureja juliana*.
 — **Frutescens.** — *Montana*.
 — **Halodendron.** — *Virginiana*.
 — **Pseudoacacia.** — *Saxifraga crassifolia*.
Rosæ plurimæ. — *Saxi-*

- Saxifraga irregularis.*
Scabiosa africana frutesc.
 — *Atropurpurea*.
 — *Colombaria*.
Schinus molle.
Scutellaria cretica.
Senecio capensis nova spec.
 — *Doria*.
Sida abutilon.
 — *Arborescens v. Malva*
 — *Brafilensis*.
 — *Coronata*.
 — *Spinosa*.
Sideritis incana.
Silene fruticosa.
Silphium perfoliatum.
 — *Terebinthinaceum*.
Smilax aspera.
 — *China*,
 — *Sarsaparilla*.
Solanum auriculatum.
 — *Capsicoides*.
 — *Carolinense*.
 — *Guadeloupense novum*
 — *Havanense*.
 — *Indicum*.
 — *Lycioides*.
 — *Macrocarpos*.
- Solanum Mammosum*.
 — *Pseudocapsicum*.
 — *Sodomeum*.
 — *Tomentosum*.
 — *Zeylanicum*.
Solidago altissima.
 — *Canadensis*.
 — *Lateriflora*.
 — *Mexicana*.
Sorbus aucuparia.
 — *Domestica*.
Spiraea aruncus.
 — *Crenata*.
 — *Hypericifolia*.
 — *Lævigata*.
 — *Opulifolia*.
 — *Salicifolia*.
 — *Trifoliata*.
 — *Ulmaria fl. pleno*.
Staphylæa pinnata.
 — *Trifolia*.
Statice monopetala.
 — *Scorzoneræfolia*.
Syringa persica fol. lacin.
 — *Vulgaris*.
Tanacetum vulg. crispum.
Tetragonia cornuta solander
 — *Fruticosa*.

Teu-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <i>Teucrium asiaticum</i> | <i>Urtica nivea</i> |
| — <i>Flavum</i> — | <i>Vaccinium vitis idaea</i> |
| — <i>Fruticans</i> , | <i>Valeriana officinalis</i> |
| — <i>Matum</i> — | <i>Verbena jamaicensis</i> |
| — <i>Massiliense</i> . | <i>Viburnum lantana</i> |
| — <i>Polium</i> . | — <i>Roseum</i> . |
| <i>Taliëstrum cornutum</i> . | — <i>Tinus</i> . |
| <i>Thea bohea</i> . | <i>Vinea rosea</i> . |
| — <i>Viridis</i> . | — <i>Variegata</i> . |
| <i>Theebroma augusta</i> . | <i>Vitex agnuscastus fl. albo</i> . |
| <i>Thuya orientalis</i> . | — <i>fl. cæruleo</i> . |
| <i>Thymus mastichina</i> . | <i>Vitis vinifera capensis</i> . |
| — <i>Serpillum</i> . | — <i>Caroliniana</i> . |
| <i>Tournefortia volubilis</i> . | <i>Zanthoxylum clava hercul.</i> |
| <i>Tradescantia virginica</i> . | <i>Zappania odoratiss. scopolii</i> |
| <i>Tropeolum maj. fl. pleno</i> . | <i>genus novum</i> . |
| <i>Turnera ulmifolia</i> . | <i>Zinnia multiflora</i> . |
| — <i>Tiliifolia</i> — | — <i>Paucifera</i> . |
| <i>Ulex europæus</i> . | <i>Zygophyllum fabago</i> . |
| <i>Urena lobata</i> . | |
| — <i>Tiliifolia</i> — | |
| — <i>monopetala</i> . | |
| — <i>Scotiascincellolata</i> . | |
| <i>Satureja bergera for. fasciata</i> . | |
| — <i>Aurea</i> . | |
| <i>Tauschia arvensis</i> . | |
| <i>Tessellaria cornuta</i> . | |
| <i>Himigloba</i> . | |

PLANTÆ IGNOTÆ NOVÆ.

Annona? ex insula Ota-hitee.

Caulis erectus, ramosus, ramis alternis declinatis, villosulis: *Folia* alterna breviter petiolata longitudine trium unciarum, latitudine 1. $\frac{1}{4}$ lanceolato-ovata, integrifima, acuta supra lucida, & levissime villosa, subius pallidiora & tomentoso-incana: *Petioles* semiunciales, teretes, villosi, lutescentes. *Stipulae* binæ, oppositæ, setaceæ, reflexæ, marcescentes.

Arbuscula trium annorum tripedalis altitudinis nondum flores protulit.

Planta ex Tongataboo sive Novo Amstelodamo.

Caulis erectus glaber, ramosus, punctulis per totum caulem albis adspersus, lineisque per foliorum intervalla binis inscriptus; ramis sparsis patentibus. *Folia* alterna patentia brevissime petiolata, ovalia, longitudine 3 unciarum, latitudine 2 uncias superantia, pergamentacea, lucida, integrifima, concava, perennia, nervosa, nervis, simplicibus undecim circiter uncinque manifestis.

Habitus foliorum ad Plantaginem majorem accedens. an Hexandria?

Frutex quinque annorum 4 pedalis nundum floruit.

Hedysarum? ex Insula Ota-hitee.

Caulis erecto-patens, ramosus villis exiguis adspersus; ramis inferioribus arcuatis: *Folia* ternata obovato-cuneiformia, integerima, vix emarginata villis utrinque minutissimis adspersa, dependentia: *Petioli* communes, semiunciales, semiteretes, marginati, erecti, quorum pedicelli laterales breves unica stipula setacea notati; intermedius elongatus stipulas duas proferens
Planta suffruticosa trium annorum *ultrapedalis*,
adhuc flores non gessit.

Portlandiae similis.

Caulis erectus carnosus laevis. *Folia* ficus indicæ elliptica, carnosa, lucida patentia utrinque obsolete villosa, apice reflexa, subundulata, subrepanda integerima, marginibus contractis, venisque alternis supernæ ramosis, quorum diameter longitudinalis 5 uncialis transversalis 2.

Petioli sessiles, subunciales, semiteretes, interne saepe atro purpurei.

Habitus Phytolaccæ Frutex biennis ultrapedalis nondum floruit.

W. D. IV. C. 106.