Veg.-Tab. 19: *Crepis paludosa*-*Juncus acutiflorus*-(Calthion)-Gesellschaft (Sumpfpippau-Waldbinsen-Quellwiese)

a Ausbildung mit *Cerastium holosteoides* (mit Nährstoff- und/oder Frischezeigern)
- aa Variante mit *Carex disticha*-Dominanz (mit Dominanz der Kamm-Segge)
- ab Variante mit *Succisa pratensis* (mit Molinion-Kennarten)
- ac Differenzialartenlose Variante

b Differenzialartenlose Ausbildung (ohne Nährstoff- und/oder Frischezeiger)
- ba Variante mit *Viola palustris* (mit Dauernässezeigern)
  - baa Untervariante mit *Molinia caerulea* agg.-Dominanz (mit Dominanz des Pfeifengrases)
  - bab Differenzialartenlose Untervariante (ohne Dominanz des Pfeifengrases)
- bb Variante mit *Scutellaria minor* (mit subatlantischen Arten)
  - bba Untervariante mit *Molinia caerulea* agg.-Dominanz (mit Dominanz des Pfeifengrases)
  - bbb Differenzialartenlose Untervariante (ohne Dominanz des Pfeifengrases)
- bc Variante mit *Carex panicea*-Dominanz (mit Dominanz der Hirse-Segge)
- bd Differenzialartenlose Variante
  - bda Untervariante mit *Molinia caerulea* agg.-Dominanz (mit Dominanz des Pfeifengrases)
  - bdb Differenzialartenlose Untervariante (ohne Dominanz des Pfeifengrases)

| Ausbildung: | a | | |