Veg.-Tab. 22: Arrhenatheretum elatioris, Ausbildungen mit *Bromus erectus* und *Luzula campestris* (Gruppe magerer Ausbildungen mit *Helictotrichon pubescens*).

Gruppe magerer Ausbildungen mit *Helictotrichon pubescens*

a Ausbildung mit *Bromus erectus* (Trespen-Glatthaferwiese, magere Glatthaferwiese sehr basen- bis kalkreicher Standorte)

aa Unterausbildung mit *Sanguisorba officinalis* (mit Wechselfeuchtezeigern)

aaa Variante mit *Agrostis capillaris* (mit kalkmeidenden Magerkeitszeigern)

aaaa Untervariante mit *Danthonia decumbens* (mit Calluno-Ulicetea-Kenn- und Differenzialarten)

aaab Differenzialartenlose Untervariante (ohne Calluno-Ulicetea-Arten)

aab Differenzialartenlose Variante (ohne kalkmeidende Magerkeitszeigern)

aaba Untervariante mit *Cirsium tuberosum* (mit kalkliebenden Molinion-Kenn- und Differenzialarten)

aabb Differenzialartenlose Untervariante (ohne kalkliebende Molinion-Kenn- und Differenzialarten)

ab Differenzialartenlose Unterausbildung (ohne Wechselfeuchtezeiger)

aba Variante mit *Agrostis capillaris* (mit kalkmeidenden Magerkeitszeigern)

abb Differenzialartenlose Variante (ohne kalkmeidende Magerkeitszeigern)

b Ausbildung mit *Luzula campestris* (Feldhainsimsen-Glatthaferwiese, magere Glatthaferwiese kalkarmer, mäßig basenreicher Standorte)

ba Unterausbildung mit *Sanguisorba minor* (mit Basenzeigern)

baa Variante mit *Sanguisorba officinalis* (mit Wechselfeuchtezeigern)

baaa Untervariante mit *Betonica officinalis* (mit Molinion-Kenn- und Differenzialarten)

baaaa Unteruntervariante mit *Danthonia decumbens* (mit Calluno-Ulicetea-Kenn und Differenzialarten)

baaab Differenzialartenlose Unteruntervariante (ohne Calluno-Ulicetea-Kennarten)

baab Differenzialartenlose Untervariante (ohne Molinion-Kenn- und Differenzialarten)

baaba Unteruntervariante mit *Danthonia decumbens* (mit Calluno-Ulicetea-Kenn- und Differenzialarten)

baabb Differenzialartenlose Unteruntervariante (ohne Calluno-Ulicetea-Kenn- und Differenzialarten)

bab Differenzialartenlose Variante (ohne Wechselfeuchtezeiger)

baba Untervariante mit *Danthonia decumbens* (mit Calluno-Ulicetea-Kenn- und Differenzialarten)

babb Differenzialartenlose Untervariante (ohne Calluno-Ulicetea-Kennarten)

bb Differenzialartenlose Unterausbildung (ohne Basenzeiger)

bba Variante mit *Sanguisorba officinalis* (mit Wechselfeuchtezeigern)

bbaa Untervariante mit *Danthonia decumbens* (mit Calluno-Ulicetea-Kenn- und Differenzialarten)

bbab Differenzialartenlose Untervariante (ohne Calluno-Ulicetea-Kennarten)

bbb Differenzialartenlose Variante (ohne Wechselfeuchtezeiger)

bbba Untervariante mit *Danthonia decumbens* (mit Calluno-Ulicetea-Kennarten)

bbbb Differenzialartenlose Untervariante (ohne Calluno-Ulicetea-Kennarten)

| Ausbildung: | a | | |